Supplemento straordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 56 del 9 marzo 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 9 marzo 1987 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 10

MINISTERO DELLA SANITÀ

Etichette che accompagnano i presidi sanitari (antiparassitari agricoli o fitofarmaci) nazionali ed esteri di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrati durante il semestre 1° luglio 1985 - 31 dicembre 1985 indicati nell'elenco n. 37 (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987).

V Elenco di etichette allegate ai presidi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441) in aggiornamento agli elenchi I - II - III e IV, pubblicati nei supplementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale *n. 215, n. 89, n. 203 e n. 240, rispettivamente del 6 agosto 1984, 15 aprile 1985, 29 agosto 1985 e 15 ottobre 1986.*

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

Numero e data registrazione		*Denominazione presidio sanitario*	*Impresa*	*Pagina*
0666	17- 2-1972	TRITAN	TERRANALISI	47
0667	6- 6-1972	AGATAL	FARMOPLANT	48
0668	23- 8-1972	TIAZIN BLU	FARMOPLANT	49
0673	29- 2-1972	TIOFTAL	FARMOPLANT	50
0681	17- 2-1972	SARVAP	SARIAF	51
0691	30- 5-1972	SOLTHION 25 WP	ICI SOLPLANT	52
0778	9- 5-1972	ENDOMED 35 PB	FARMOPLANT	53
0817	29- 2-1972	PERTILAM	DU PONT	54
0820	21- 8-1972	TRIMATON	DECCO RODA	55
0840	26- 6-1972	M-80	DU PONT	56
0849	6- 6-1972	METABROM 980	DREYFUS GENTILI	57
0857	22- 8-1972	LOVOZAL 40 PB	DU PONT	58
0873	30- 5-1972	SIPCAPLANT	SIPCAM	59
0928	23- 8-1972	ASPOR U	FARMOPLANT	60
0930	12- 3-1973	ALBOLINEUM	ICI SOLPLANT	61
0969	27-10-1972	COCCIDOL E	CAFFARO	62
0971	14-10-1972	LASSO	SIPCAM	63
1005	10-10-1972	MOGRAN	FARMOPLANT	64
1009	4- 1-1973	CUPRONOX 50	CHIMIBERG	65
1022	3-10-1972	M-80 BLEU	DU PONT	66
1029	7-10-1972	MOLINAM 726 EC	SIPCAM	67
1030	7-10-1972	MOLINAM 7,5 G	SIPCAM	68
1082	14-10-1972	FYDULEX G	DU PONT	69
1147	26- 4-1973	FITONEX COMBI	TERRANALISI	70
1151	26- 3-1973	ACARED 40 S	TERRANALISI	71
1166	26- 4-1973	DIMETOL 30 P.B.	TERRANALISI	72
1167	15- 2-1973	DIAZOL 20	TERRANALISI	73
1168	15- 2-1973	ROGOTER 40	TERRANALISI	74
1175	9- 2-1973	MOLINAM M	SIPCAM	75
1182	9- 2-1973	ZIRAMIT 90	CAFFARO	76
1189	9- 2-1973	SIMATRED	FARMOPLANT	77
1195	26- 3-1973	DODIL U.P.	CAFFARO	78
1220	7- 5-1973	DODIL	CAFFARO	79
1236	3- 8-1973	ARMEX	CAFFARO	80
1237	6- 8-1973	ATRED 50	FARMOPLANT	81
1269	29- 9-1973	DIPET	CAFFARO	82
1291	28- 7-1973	LUSADON CAFFARO	CAFFARO	83
1303	16-11-1973	GHER	DU PONT	84
1326	20-10-1973	MOLINAM MDP	SIPCAM	85
1328	6-12-1973	FOSFOMAL 50	TERRANALISI	86
1330	28- 3-1974	GRANDOR	VERCHIM ASTERIAS	87
1335	20-10-1973	MOLINAM DP	SIPCAM	88
1360	24-10-1974	ZEALIN L	SCAM	89
1376	6-12-1973	ETAZIN	TERRANALISI	90
1405	28- 1-1974	PANAM PB 50	FARMOPLANT	91
1414	29- 7-1974	CUPRENOX 16%	CHIMIBERG	92
1424	28- 1-1974	FUNGI MZ	SIVAM	93
1467	23-12-1976	DIMETIOX	CAFFARO	94
1506	21- 5-1974	MAPOSOL	ROUSSEL HOECHST	95
1501	10- 6-1974	REBEL	DU PONT	96
1515	10- 6-1974	DUASIL	DU PONT	97
1521	28- 3-1974	FRUMIDOR	SIPCAM	98
1526	7- 3-1974	MANFOSAR	SARIAF	99
1531	31- 7-1975	DAFENE E	RAVIT	100
1574	22- 4-1974	DINITIOL	CAFFARO	101
1608	10- 6-1974	GARDONA 50 PB	SHELL ITALIA	102
1618	25- 6-1974	SANSPOR	ICI SOLPLANT	103
1624	10- 6-1974	CASORON MIX	DU PONT	104
1644	10- 6-1974	PULL	DU PONT	105
1685	10- 6-1974	USTINEX PD	BAYER ITALIA	106
1700	23-10-1974	DURSBAN Granulare	DOW CHEMICAL	107
1706	19- 4-1975	PARAMON E.C.	DU PONT	108
1727	21- 5-1974	BAGNANTE AG. N	SIPCAM	109
1746	7-11-1985	ATEROX 25 P.B.	TERRANALISI	110
1747	7- 9-1974	ATEROX 12	TERRANALISI	111
1777	31- 5-1975	PARAMON 80	DU PONT	112
1782	12-11-1974	PARAMON 72	DU PONT	113
1801	23-10-1974	CASORON G-SR	DU PONT	114
1803	23-10-1974	TERSANIL Liquido	DU PONT	115

Numero e	*data registrazione*	*Denominazione presidio sanitario*	*Impresa*	*Pagina*
1883	21-10-1974	FOLIOL	SHELL ITALIA	116
1920	19- 4-1975	KORTHANE L.C.	DU PONT	117
1944	5-11-1975	TIEZENE	FARMOPLANT	118
1994	5-11-1975	TIEZENE	FARMOPLANT	118
1994	12- 4-1976	VENTUREX D. 65	TERRANALISI	119
2011	11-11-1975	TRIFENE	SIPCAM	120
2057	5-11-1975	CASORON 133 P.B.	DU PONT	121
2058	5-11-1975	BARGREN	DU PONT	122
2059	5-11-1975	TURCAN COMBI	AMONN	123
2129	30- 3-1976	LATHION METIL	SIPCAM	124
2131	20- 3-1976	AZILON	DU PONT	125
2132	30- 3-1976	BENZAFOS	DU PONT	126
2133	30- 3-1976	NICAMON	DU PONT	127
2162	12- 4-1976	FACAROL	SARIAF	128
2173	26- 3-1976	MEZENE	FARMOPLANT	129
2208	10- 4-1976	MINITROL 75	DU PONT	130
2210	10- 4-1976	SORITOX	DU PONT	131
2231	9- 4-1976	FLURAN	VERCHIM ASTERIAS	132
2319	23-12-1976	DOZIR	CAFFARO	133
2323	30- 9-1976	A-150 BLU	DU PONT	134
2327	6-10-1976	DU-TER S.	DU PONT	135
2329	20-12-1976	ARILITOX-G	DU PONT	136
2330	23-10-1976	LINURON 50	FARMOPLANT	137
2335	20-12-1976	TETRAFOS 10 G	SIPCAM	138
2336	6-10-1976	ATOMOL CAFFARO	CAFFARO	139
2340	5-10-1976	STOMP 330-E	CYANAMID	140
2354	13-12-1976	OSSICLORURO DI RAME SOLPLANT	ICI SOLPLANT	141
2355	23-10-1976	PARAFOS G-10	DU PONT	142
2356	23-10-1976	METIAMON	DU PONT	143
2438	14- 2-1977	OLPAR 90	DU PONT	144
2443	31- 1-1977	DIANTIN	DU PONT	145
2444	31- 1-1977	DIANTIN 20 E	DU PONT	146
2445	29- 1-1977	FITOGAMMA INODORO G 3	FARMOPLANT	147
2454	31- 1-1977	DIMILIN	DU PONT	148
2455	29- 1-1977	NESPOR PB 80	FARMOPLANT	149
2486	19- 3-1977	QUINOLATE AMONN	DU PONT	150
2499	13- 4-1977	ALDICARB AMONN	DU PONT	151
2517	16- 6-1977	FOSFERNO	ICI SOLPLANT	152
2521	13- 4-1977	ACTELLIC 25	ICI SOLPLANT	153
2550	13- 4-1977	TERFOS 20	TERRANALISI	154
2564	16- 6-1977	TERLIN 3 G	SIPCAM	155
2583	2- 7-1977	CARBOPAN	CAFFARO	156
2620	7- 9-1977	CONTROCARIE	CAFFARO	157
2621	2- 7-1977	LIQUIFOS 20	CAFFARO	158
2649	19-10-1977	VERDERIN E	CAFFARO	159
2650	12- 1-1978	DU-TER	DU PONT	160
2678	17-10-1977	ABOTRIL OP 80	ENOTRIA	161
2688	4-10-1978	LINDANE G-3	DU PONT	162
2692	23-11-1977	GIAVONEX G	DU PONT	163
2693	23-11-1977	GANON «S»	BAYER ITALIA	164
2701	23-11-1977	TCA BAYER	BAYER ITALIA	165
2707	2- 2-1979	REBEL BLU	DU PONT	166
2780	29- 4-1978	KILVAL	RAVIT	167
2827	26- 5-1978	GIOVANEX	DU PONT	168
2730	19- 4-1978	DIMETOL 20	TERRANALISI	169
2767	19- 4-1978	KITION «E»	CAFFARO	170
2783	10- 3-1980	POLIBAR	SABED	171
2860	9- 8-1978	BIFOS	CAFFARO	172
2886	4- 8-1978	BETOZON	SIPCAM	173
2938	22-10-1979	UTACAFFARO	CAFFARO	174
2940	23- 4-1979	LIMACIDE pellets	BIMEX	175
2946	4- 6-1979	MICROZOLFO 60	ENICHEM AGRICOLTURA	176
2979	22-12-1978	SIARAM	SIAPA	177
2983	13-11-1978	NIMROD OIDIUMSTOP	ICI SOLPLANT	178
2985	14- 7-1979	CUPROSSINA PB 50	FARMOPLANT	179
2992	30- 1-1979	AS 50	SIPCAM	180
2999	6- 4-1979	DICARBAM 50	BASF	181
3013	19- 4-1979	ARVIN	DU PONT	182
3014	30- 4-1979	METILFOS 50	DU PONT	183

Numero e data registrazione		*Denominazione presidio sanitario*	*Impresa*	*Pagina*
3022	30- 4-1979	KELTHANE E.C.	DU PONT	184
3023	8- 4-1979	NITRILON	DU PONT	185
3046	6- 4-1979	POLISOLFURO DI CALCIO AMONN	DU PONT	186
3078	30- 4-1979	BARIZOL 45-47	DU PONT	187
3082	4- 5-1979	TERFOS OLIO	TERRANALISI	188
3084	19- 4-1979	ARVIN 85	DU PONT	189
3094	5- 4-1979	AKREL	DOW	190
3103	25- 5-1979	CUPROSAN 20 M	DU PONT	191
3113	25- 5-1979	SOFRIL 80	RAVIT	192
3115	4- 6-1979	NEBUTRIN	DU PONT	193
3117	25- 5-1979	KELTHANE W 35	DU PONT	194
3157	15- 6-1979	PANAM P5	FARMOPLANT	195
3169	15- 6-1979	SEVIN 85 S	UNION CARBIDE	196
3176	· 6- 7-1979	TMTD 50 BIANCO	SIPCAM	197
3190	1- 8-1979	TABOIL	TERRANALISI	198
3193	6- 7-1979	MALADUST 25 POLVERE BAGNABILE	SARIAF	199
3228	1- 8-1979	DERAMON	DU PONT	200
3242	28-11-1979	KINOL	DU PONT	201
3248	25- 9-1979	KELTHANE W 35	ROHM AND HAAS	202
3263	10-10-1979	AMPELOSAN R	VERCHIM ASTERIAS	203
3264	10-10-1979	KELTHANE AP	ROHM AND HAAS	204
3268	25-10-1979	MISAN 50	FARMOPLANT	205
3279	10-10-1979	ORTHOFOR	CAFFARO	206
3294	27-11-1979	CLORIMID 50	DU PONT	207
3304	7- 1-1980	ETAZIN R	TERRANALISI	208
3321	10-10-1979	PHYTOX RAME BLU	CHIMIBERG	209
3341	20-11-1979	UTAZIN S CAFFARO	CAFFARO	210
3364	14- 1-1980	ZR E. BLU	SIPCAM	211
3365	26-10-1979	DACOL-5-U P	CAFFARO	212
3382	7- 1-1980	RL 20	SARIAF	213
3383	7- 1-1980	RL 40	SARIAF	214
3408	7- 1-1980	MANCAP	DU PONT	215
3409	4-12-1979	A-SPECIAN	DU PONT	216
3410	28-11-1979	DIKAMON 65	DU PONT	217
3467	14- 1-1980	MOLINAM G.	SIPCAM	218
3491	8- 2-1980	NEMINFEST	FARMOPLAST	219
3499	7- 2-1980	MOLINAM E.	SIPCAM	220
3515	10- 3-1980	CHILDION	DU PONT	221
3518	10- 3-1980	CLORTOSIP	SIPCAM	222
3532	20- 2-1980	CURZATE R	DU PONT	223
3554	20 - 2-1980	CURZATE F	DU PONT	224
3555	20 - 2-1980	CURZATE M	DU PONT	225
3591	4- 4-1980	CHILDION E	DU PONT	226
3602	4- 4-1980	KT 22	SIPCAM	227
3603	28- 1-1981	TRINULAN 12	VERCHIM ASTERIAS	228
3613	15- 9-1980	KARATHANE FN	ROHM AND HAAS	229
3615	15- 9-1980	KARATHANE WD	ROHM AND HAAS	230
3647	30-10-1985	MICROZOLFO BAGNABILE 90	INICHEM AGRICOLTURA	231
3649	30- 5-1980	MILDIN 5P	ENICHEM AGRICOLTURA	232
3652	30- 5-1980	UTAMIT K CAFFARO	CAFFARO	233
3659	17- 6-1980	SIVAMIL F	SIVAM	234
3663	30- 5-1980	UTACAFFARO RS	CAFFARO	235
3671	16-10-1980	STERASIP	SIPCAM	236
3692	30- 5-1980	PIRENYL E	RAVIT	237
3713	2- 7-1980	TRINET	DU PONT	238
3726	16-11-1980	SOLFOBARIO ROMAGNA 46%	SIAPA	239
3771	16- 6-1980	ROVRAL	RAVIT	240
3779	19- 6-1980	VAPAM	ROHM AND HAAS	241
3785	15- 9-1980	FOLTAMIN	DU PONT	242
3786	15- 9-1980	DIMETHOAT AMONN	DU PONT	243
3788	19- 6-1980	AFIDAMON	DU PONT	244
3789	13-10-1980	TEDION V-18	DU PONT	245
3791	19- 6-1980	TERSANIL Polvere	DU PONT	246
3794	15- 9-1980	UTARAME S CAFFARO	CAFFARO	247
3797	29-11-1982	QUINTAMON S	DU PONT	248
3827	15- 9-1980	PARAFOS 20	DU PONT	249
3845	12- 9-1980	ENDO 35 PB	SIPCAM	250
3847	3-10-1980	CUPRAVIT MICRO	BAYER ITALIA	251
3879	16-10-1980	CEPOS	CAFFARO	252

Numero e data registrazione		*Denominazione presidio sanitario*	*Impresa*	*Pagina*
4988	15-10-1982	BAMIST	BASLINI	322
5043	27-11-1982	DISTOR E.C.	DU PONT	323
5048	27-11-1982	BIP P.	FITOCHIMICA	324
5053	27-11-1982	ACTELLIC 5	ICI SOLPLANT	325
5055	27-11-1982	DISTOR W.P.	DU PONT	326
5067	27-11-1982	CALIBOR	DU PONT	327
5072	29-11-1982	GRILLOSTOP	ITALVERDE	328
5073	29-11-1982	GRILLKILLER	BIMEX	329
5102	29-11-1982	ZOLFO AZF	AGROZOOFARMA	330
5130	22-12-1982	NICHESAN	DU PONT	331
5135	22-12-1982	CALIBOR WP	DU PONT	332
5136	22-12-1982	POMONET	DU PONT	333
5176	1- 2-1983	SPASOR	SIAPA	334
5184	1- 2-1983	ERBIL	DU PONT	335
5198	1- 2-1983	FOLTAPET L 27-7	ICI SOLPLANT	336
5213	10- 2-1983	VALEX	DU PONT	337
5218	10- 2-1983	RIGRON	DU PONT	338
5243	16- 2-1983	MARLON PB	J. & A. MARGESIN	339
5245	16- 2-1983	ESCALIM	AGROZOOFARMA	340
5263	3- 3-1983	LISAMON	DU PONT	341
5281	16- 3-1983	CRONETON 40 P. B.	BAYER AG	342
5285	30- 3-1983	KOILPER BLAU	DU PONT	343
5296	30- 3-1983	QUINTAMON 4 P.S.	DU PONT	344
5302	30- 3-1983	SEFTAL 50 PB	SEPRAN	345
5312	15- 4-1983	TERBULIN	DU PONT	346
5321	26- 4-1983	DD 92 SCHERING	SCHERING	347
5329	9- 5-1983	TELONE II	BPD	348
5343	26- 4-1983	LIMASANEX	AGROZOOFARMA	349
5352	11- 5-1983	NELK BLAU	DU PONT	350
5359	19- 5-1983	ARGINET	CAFFARO	351
5436	14- 7-1983	SIMAZINA CAFFARO	CAFFARO	352
5461	9-11-1983	VITAVAX 38/38	UNIROYAL	353
5472	14- 9-1983	STICEREAL 2,4 D - Pso	SOLFOTECNICA	354
5475	10-10-1983	BYCOR BIETOLA	BAYER AG	355
5481	3-10-1983	BAZIN 80	BASLINI	356
5486	3-10-1983	ATRAFLO	AMONN FITOCHIMICA	357
5504	3-10-1983	BAYCOR Z.f.	BAYER ITALIA	358
5550	21- 1-1984	ARLYFAR	FIRLD FARM	359
5555	132- 1-1984	FENTAMON P.B.	DU PONT	360
5566	23-11-1983	CERTROL H	UNION CARBIDE	361
5607	6-12-1983	CARBOFURAN AMONN TALINEX	DU PONT	362
5630	6-12-1983	ANTICASCOLA L	DEMETRA ITALIA	363
5659	28-12-1983	EXILIN	DU PONT	364
5660	28-12-1983	LENAMON 80 P.B.	DU PONT	365
5664	28-12-1983	RODAMON ES	DU PONT	366
5665	28-12-1983	NEBUTRIN N	DU PONT	367
5675	28-12-1983	LINURON 50 AMONN	DU PONT	368
5713	2- 2-1984	BASEV	BASLINI	369
5715	12- 1-1984	CYMBUSH 5 L	ICI SOLPLANT	370
5727	2- 2-1984	FONEX	DU PONT	371
5735	27- 1-1984	DOROSAN	AMONN	372
5736	27- 1-1984	AVENIX	DU PONT	373
5737	2- 2-1984	EXATONE	DU PONT	374
5739	2- 2-1984	RODAMON G	DU PONT	375
5756	3-10-1985	GALBEN M 8-65	FARMOPLANT	376
5757	2- 2-1984	GALBEN F 8-50 BLU	FARMOPLANT	377
5758	3-10-1985	GABEN R 4-33 BLU	FARMOPLANT	378
5759	2- 2-1984	GALBEN M 8-65 BLU	FARMOPLANT	379
5765	12- 9-1985	TERRAZOLE 35% WP	VERCHIM ASTERIAS	380
5766	23- 2-1984	CAFERIN	ICI SOLPLANT	381
5770	23- 2-1984	BENAMON 50 P.B.	DU PONT	382
5771	23- 2-1984	RODAMON GF	DU PONT	383
5772	23- 2-1984	PILNET	DU PONT	384
5773	23- 2-1984	RODAMON P	DU PONT	385
5827	27- 3-1984	RODAMON OLIO	DU PONT	386
5828	27- 3-1984	SEPRAFORM	SEPRAN	387
5831	6- 4-1984	PANOCTINE	APA	388
5832	27- 3-1984	TRAMIZOL E.C.	DU PONT	389
5880	25- 4-1984	BAGOR	BASLINI	390

Numero e data registrazione		*Denominazione presidio sanitario*	*Impresa*	*Pagina*
5890	25- 4-1984	PANOCTINE L	APA	391
5901	6- 4-1984	TALPACID	RATTICIDA VENETA	392
5931	21- 6-1984	CARMETOL	DU PONT	393
5968	27- 6-1984	R6 ERRESEI SB 30/M-12	RAVIT	394
5969	19- 7-1984	BAKAR	BASLINI	395
5995	21- 6-1984	MANCOKAR	ROHM AND HAAS	396
5997	21- 6-1984	GALBEN Z8-65 BLU	FARMOPLANT	397
5998	30-10-1984	SERINAL PB 50	FARMOPLANT	398
6018	19- 7-1984	BATOT	BASLINI	399
6108	8-10-1984	GALBEN 5 Gr	Farmoplant	400
6127	8-11-1984	RUMIDIN 12 EC	VERCHIM ASTERIAS	401
62135	29-11-1984	FIRODAL C	CIBA GEIGY	402
6449	4- 7-1985	COBEZEN	RAVIT	403
6450	4- 7-1985	CIPOCLOR	RAVIT	404
6451	4- 7-1985	AGROIL	PAVONI	405
6452	4- 7-1985	ORMEX DR	SUNCHEMICAL	406
6453	4- 7-1985	ORMEX RA	SUNCHEMICAL	407
6454	11- 7-1985	ORMEX AN	SUNCHEMICAL	408
6455	11- 7-1985	DUECI GIBBERELLINE	DUECI	409
6456	11- 7-1985	RAYAL TAC 85	ROYAL CHIMICA	410
6457	11- 7-1985	ANTIGIAVONE L	ICI SOLPLANT	411
6458	11- 7-1985	METONEX	TERRANALISI	412
6459	11- 7-1985	VITIRIL COMBI RAMATO	BAYER ITALIA	413
6460	4- 9-1985	RONILAN C COMBI	BASF AGRITALIA	414
6461	11- 7-1985	OFF - SHOTT - T 85	VERCHIM ASTERIAS	415
6462	4- 9-1985	PEAR FULL	DEMETRA ITALIA	416
6463	4- 9-1985	KELT E 18	ITALCHIMICA	417
6464	4- 9-1985	THENODAN	ITALCHIMICA	418
6465	4- 9-1985	TEGITE	FITOCHIMICA GIULIANA	419
6466	4- 9-1985	TOPICIDA ITALCHIMICA	ITALCHIMICA	420
6467	4- 9-1985	SUCKER - OFF	AGRICO	421
6468	4- 9-1985	TRIFOCIDE PASTA	DECCO RODA	422
6469	4- 9-1985	GEO KOL	KOLLANT INDUSTRIE CHIMICHE	423
6470	4- 9-1985	DUECI ANTICASCOLA	DUECI	424
6471	4- 9-1985	GALBEN M 3-24	FARMOPLANT	425
6472	4- 9-1985	HEMORAT AGRICOLO	PROVIFARM DI TERRACCIANO ANACLE-TO	426
6473	12- 9-1985	TALPAX	PANZERA INDUSTRIE PIROTECNICA	427
6474	12- 9-1985	TAIREL Z 8-65 BLU	FARMOPLANT	428
6475	12- 9-1985	TAIREL 5 GR	FARMOPLANT	429
6476	12- 9-1985	TAIREL M 8-65 BLU	FARMOPLANT	430
6477	12- 9-1985	TAIREL M 8-65	FARMOPLANT	431
6478	12- 9-1985	TAIREL F 8-50 BLU	FARMOPLANT	432
6479	12- 9-1985	TAIREL R 4-33 BLU	FARMOPLANT	433
6480	12- 9-1985	CYCOCEL 5 C	BASF AGRITALIA	434
6481	12- 9-1985	ORMEX ST	SUNCHEMICAL	435
6482	12- 9-1985	ARENOL COMBI L	ROUSSEL HOECHST AGROVET	436
6483	12- 9-1985	DUECI RADICANTE LIQUIDO	DUECI	437
6484	12- 9-1985	CLORFOS 45	AMONN FITOCHIMICA	438
6485	12- 9-1985	CARBOFURAN TERRANALISI CARBOTER	TERRANALISI	439
6486	12- 9-1985	CLORAMON	AMONN FITOCHIMICA	440
6487	12- 9-1985	OXAMYL B.P.D. VIDATE	RAVIT	441
6488	12- 9-1985	CERESAN L	TERRANALISI	442
6489	12- 9-1985	GRAZON	DOW CHEMICAL	443
6490	12- 9-1985	VITIRIL S	BAYER ITALIA	444
6491	20- 9-1985	ISOTRIL S	RAVIT	445
6492	12- 9-1985	MALTIONOX 50	DOW CHEMICAL	446
6493	12- 9-1985	DIEFESAN CVC	FARMOPLANT	447
6494	20- 9-1985	SANDOFAN CF	SANDOZ PRODOTTI CHIMICI	448
6495	20- 9-1985	SANDOFAN F 10-35	SANDOZ PRODOTTI CHIMICI	449
6496	20- 9-1985	SANDOFAN PRO 25-10-15	SANDOZ PRODOTTI CHIMICI	50
6497	20- 9-1985	SANDOFAN PRO 56-10	SANDOZ PRODOTTI CHIMICI	451
6498	20- 9-1985	SANDOFAN CM	SANDOZ PRODOTTI CHIMICI	452
6499	20- 9-1985	SANDOFAN MET 10-56	SANDOZ PRODOTTI CHIMICI	453
6500	20- 9-1985	SANDOFAN PRO	SANDOZ PRODOTTI CHIMICI	454
6501	20- 9-1985	SANDOFAN M 8-56	SANDOZ PRODOTTI CHIMICI	455
6502	20- 9-1985	SANDOFAN C	SANDOZ PRODOTTI CHIMICI	456
6503	20- 9-1985	SANDOFAN MET	SANDOZ PRODOTTI CHIMICI	457
6504	20- 9-1985	METOGRAN	ENICHEM AGRICOLTURA	458

Numero e data registrazione		*Denominazione presidio sanitario*	*Impresa*	*Pagina*
6505	20- 9-1985	NOKAD	ENICHEM AGRICOLTURA	459
6506	20- 9-1985	CALOGRAN	ENICHEM AGRICOLTURA	460
6507	26- 9-1985	METAM SODIO	RAFFINERIE ALMAGIÀ	461
6508	26- 9-1985	TAIREL 35 SEMENTI	FARMOPLANT	462
6509	11- 7-1985	VITIRIL PR RAMATO	BAYER ITALIA	463
6510	3-10-1985	BAYFIDAN BCM	BAYER ITALIA	464
6511	3-10-1985	ZOLFOSOL 15	FITOCHIMICA GIULIANA	465
6512	3-10-1985	ZOLFOSOL 25	FITOCHIMICA GIULIANA	466
6513	3-10-1985	POLICALCIO 30	FITOCHIMICA GIULIANA	467
6514	3-10-1985	COCCIN S	FITOCHIMICA GIULIANA	468
6515	3-10-1985	BASOZEB RAME	BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE	469
6516	3-10-1985	RUMIDIN BLEND	VERCHIM ASTERIAS	470
6517	3-10-1985	LENTAGRAN COMBI	SIPCAM	471
6518	3-10-1985	VITAVAX MC	UNIROYAL CHIMICA	472
6519	3-10-1985	RATIBROM	KOLLANT INDUSTRIE CHIMICHE	473
6520	3-10-1985	MAISPEN	CYANAMID ITALIA	474
6521	3-10-1985	TIOMARE	CHIMIBERG	475
6522	3-10-1985	RUBIGAN BLEND	ELII LILLY ITALIA	476
6523	3-10-1985	OLFO BAGNABILE 90%	SOLFOCHIMICA DI INCARDONA PIETRO	477
6524	3-10-1985	FOLTISAN 50	DOW CHEMICAL	478
6525	3-10-1985	INSETTICIDA DUE	CHEMIA	479
6526	3-10-1985	TOBACOL	ENICHEM AGRICOLTURA	480
6527	3-10-1985	BIRGIN C	BAYER ITALIA	481
6528	3-10-1985	DIPTEREX 80 POLVERE SOLUBILE	BAYER ITALIA	482
6529	3-10-1985	PHYMONE	ICI SOLPLANT	483
6530	3-10-1985	NIENTERAGNO 25 FL	ICI SOLPLANT	484
6531	3-10-1985	ACARED OM	TERRANALISI	485
6532	3-10-1985	CERESAN	TERRANALISI	486
6533	3-10-1985	GUSATHION MS	BAYER ITALIA	487
6534	3-10-1985	CIDRAN 5/5 G	ENICHEM AGRICOLTURA	488
6535	3-10-1985	TURBON	RAVIT	489
6536	3-10-1985	GARTREL P	RAVIT	490
6537	3-10-1985	POLVERE CHIMIPLANT	CHIMIPLANT	491
6538	3-10-1985	RAMBLU	CHIMIPLANT	492
6539	3-10-1985	PLANTIL P	CHIMIPLANT	493
6540	3-10-1985	BRUSKOR	SOCOOR	494
6541	3-10-1985	FANKOR	SOCOOR	495
6542	3-10-1985	GRANKOR	SOCOOR	496
6543	3-10-1985	SIABORD	SIAPA	497
6544	3-10-1985	SILMITRAZ COMBI	SILIA	498
6545	93-10-1985	ISOCOB	RAVIT	499
6546	29-10-1985	RELDAN 50 PB	DOW CHEMICAL	500
6547	29-10-1985	ERKOR	SOCOOR	501
6548	29-10-1985	NOWOROL	BAYER ITALIA	502
6549	29-10-1985	TRIFLURAN	TERRANALISI	503
6550	30-10-1985	BAYCOR CP	BAYER ITALIA	504
6551	30-10-1985	HEDONAL DP - M	BAYER ITALIA	505
6552	30-10-1985	LUXAN ANTI-GERME in POLVERE	AGRICO ITALIA	506
6553	30-10-1985	BETOZON SL	SIPCAM	507
6554	3010-1985	BAGNANTE ANTISCHIUMA NT	SIPCAM	508
6555	7-11-1985	K-OTHRINEGRAINS ULV	ROUSSEL HOECHST AGROVET	509
6556	7-11-1985	K-OTHRINEGRAINS PP	ROUSSEL HOECHST AGROVET	510
6557	7-11-1985	K-OTHRINEGRAINS CE	ROUSSEL HOECHST AGROVET	511
6558	7-11-1985	NIENTERAGNO 12 PB	ICI SOLPLANT	512
6559	7-11-1985	GALBEN RF 5-9-24 BLU	FARMOPLANT	513
6560	7-11-1985	NACTRAN P	RAVIT	514
6561	21-11-1985	FLUTRIN	CYANAMID ITALIA	515
6562	21-11-1985	BETOZON - S	SIPCAM	516
6563	21-11-1985	CUPROSPOR 16	SIVAM	517
6564	21-11-1985	EDRIZAR COMBI	SIAPA	518
6565	21-11-1985	MONDIABIETOLA	ICI SOLPLANT	519
6566	21-11-1985	LASSO GD - G	MONSANTO ITALIANA	520
6567	21-11-1985	AIRON NO WEEDS	DETERPAN	521
6568	21-11-1985	SALVIN PS	FIELD FARM	522
6569	21-11-1985	TRAPEXIDE	SCHERING	523
6570	21-11-1985	EFFICUR BLU	SCHERING	524
6571	21-11-1985	EFFICUR	SCHERING	525
6572	21-11-1985	DIMITER	TERRANALISI	526
6573	21-11-1985	TILT - CF	CIBA GEIGY	527

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Etichette che accompagnano i presidi sanitari (antiparassitari agricoli o fitofarmaci) nazionali ed esteri di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrati durante il semestre 1° luglio 1985 - 31 dicembre 1985, indicati nell'elenco n. 37 *(Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 48 del 27 febbraio 1987).*

0003

QUINTAMON®

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile — Fungicida per la disinfezione del suolo e per la lotta contro malattie crittogamiche delle colture orticole, floricole ed ornamentali.

Composizione — 100 g di prodotto contengono:
50 g di Dicloran (2,6-dicloro-4-nitroanilina) tecnico al 95 % di purezza. (corrispondenti a 47,5 g di p. a. puro).
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio — Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico — In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche — Il QUINTAMON possiede un'azione preventiva e curativa contro il mal del colletto delle insalate, i marciumi pedali e radicali delle colture orticole, le rizoctonie della carota e dell'asparago, il mal del piede e del colletto dei garofani.

Modalità d'impiego — Disinfezione del terreno e dei terricciati (semenzai, piantonai e pieno campo): impiegare 2-3 g di prodotto per mq, interrandolo a 10-15 cm di profondità, oppure 200-300 g di formulato sciolti in acqua e distribuiti su 100 mq di superficie.

Mal del colletto della lattuga, dell'insalata e del radicchio:
Polverizzazioni: g 2-3 per mq, facendo in modo che le foglie basali ed il colletto delle piantine vengano a diretto contatto con il prodotto.
Nebulizzazioni: g 150-200 in 100 litri d'acqua. Ripetere il trattamento ogni 10-12 giorni a seconda dell'andamento stagionale.

Marciumi pedali e radicali delle colture orticole (pomodori, melanzane, peperoni, aglio, cipolle, carote):
Polverizzazioni: g 2-3 per mq, avendo cura di distribuire il prodotto nella zona del colletto delle piantine.
Nebulizzazioni: g 150-200 in 100 litri d'acqua.

Rizoctonia della carota e dell'asparago: disinfettare il terreno prima della messa a dimora delle colture, con 2-3 g di prodotto per mq.

Marciume dell'aglio, della cipolla e del porro: Distribuire nel solco di semina 25-30 g di prodotto ogni 100 m lineari. Prima della semina disinfettare i bulbi per impolveramento con 400-500 g di QUINTAMON per 100 kg di bulbi. Effettuare successivamente ripetute irrorazioni ogni 2 settimane con 150-200 g di prodotto per 100 litri d'acqua.

Marciume dei bulbi e dei tuberi (dalie, gladioli, narcisi, tulipani, gigli, fresie): impolverare i bulbi ed i tuberi con 400-500 g di prodotto ogni 100 kg, oppure immergerli per 20-30 minuti in una sospensione allo 0,4-0,5 %. Disinfettare il terreno con 3-4 g di prodotto per mq, intorno alle buche di semina.

Rizoctonia del garofano: marciumi del colletto e marciumi radicali delle piante floricole ed ornamentali.
Polverizzazioni: g 3-4 di prodotto per mq, distribuiti alla base del colletto.
Nebulizzazioni: g 150-200 in 100 litri d'acqua, bagnando bene la base delle piantine.

Preparazione della poltiglia e tecnica d'impiego — Il QUINTAMON può essere usato per nebulizzazioni con acqua e per trattamenti polverulenti a secco.
Polverizzazione: Effettuare delle polverizzazioni leggere con l'aiuto di un polverizzatore ben regolato.
Nebulizzazione: Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità — Per nebulizzazione il QUINTAMON è miscibile con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione Nr. 0003 del 7.9.71 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto 1 kg

0006

TMTD-Amonn

Polvere bagnabile — Fungicida organico per combattere malattie crittogamiche delle drupacee e delle pomacee.

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Composizione — 100 g di prodotto contengono:
80 g di Thiram (tetrametiltiuramdisolfuro) p.a. puro;
Bagnanti, disperdenti ed inerti: quanto basta a 100 gramml.

Registrazione n. 0006 del Ministero della Sanità del 8.9.71

CLASSE II

Il TMTD-AMONN è un fungicida organico attivo contro Corineo, Bolla, Ticchiolatura e Marciume (Botrytis) delle mele, delle pere, delle fragole.

Il TMTD-AMONN si distingue dagli altri composti organici per le seguenti caratteristiche:
— non è fitotossico;
— agisce anche contro il marciume dei frutti;
— svolge una certa azione contro il mal bianco;
— ha un effetto favorevole sulla colorazione dei frutti;
— non è tossico per le api e per gli insetti utili.

Compatibilità — Il TMTD-AMONN è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.). La miscela con certi prodotti- emulsionabili, o a base di rame, mercurio e arseniati non è consigliabile.

Quando il TMTD-AMONN viene usato in miscela con prodotti della classe I è obbligatoria l'osservanza delle norme precauzionali prescritte per la classe superiore.

Fitotossicità — Il TMTD-AMONN impiegato alle dosi e sulle colture consigliate, non è fitotossico.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso

Istruzioni per l'uso — Drupacee (peschi, ecc.)
Trattamenti autunno-invernali contro Corineo, Bolla, ecc.: g 400-500.
Trattamenti primaverili contro Corineo, Bolla, Ticchiolatura e Botrytis g 150-100.

Pomacee (melo e pero)
Trattamenti prefiorali: g 200
Trattamenti postfiorali: g 100
Trattamenti tardivi (per prevenire la Ticchiolatura in magazzino): g 150-200.

Preparazione della poltiglia — Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Rischi per la fauna utile — L'impiego del TMTD-AMONN non comporta rischi per la fauna utile. Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali

Natura del rischio — Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Informazioni mediche
— **Sintomi d'intossicazione:**
Nausea - vomito - coliche addominali - diarrea - rinorrea - broncospasmo - irrequietezza - prostrazione - irritazione nervosa seguita da astenia o paralisi - lacrimazione - dermatosi - congestione del viso quando il paziente ha bevuto alcole.
— **Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:**
Lavanda gastrica - terapia sintomatica - ossigenoterapia - respirazione artificiale - antistaminici - soluzioni glucosate endovena - vitamina C e complesso B.
— **Controindicazioni:**
Bevande alcooliche, grassi e olii.

NOCIVO

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
— Conservare la confezione ben chiusa
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
— Evitare di respirarne i vapori
— Non operare contro vento
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
— Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Da non usare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO 10 KG.

DU PONT
DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0007

Ziram 80

Polvere bagnabile — Fungicida organico a base di Ziram micronizzato.

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Composizione
100 g di prodotto contengono:
76 g di Ziram (dimetilditiocarbammato di zinco) p.a. puro;
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Registrazione n. 0007 del Ministero della Sanità del 7.9.71

CLASSE III

Lo ZIRAM 80, per l'estrema finezza e per l'alta adesività, lascia sulle piante trattate un deposito uniforme e molto resistente al dilavamento.

Compatibilità
Lo ZIRAM 80 è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.). La miscela con certi prodotti emulsionabili (METI-AMON, ecc.) non è consigliabile.

Quando lo ZIRAM 80 viene usato in miscela con prodotti della classe I o II è obbligatoria l'osservanza delle norme precauzionali prescritte per la classe superiore.

Fitotossicità
Non trattare cultivar sensibili ai ditiocarbammati.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso

Lo ZIRAM 80 è d'impiego generale contro le malattie crittogamiche delle piante, ma è particolarmente indicato per le seguenti colture:

Frutticoltura: Contro Ticchiolatura del melo e del pero: trattamenti prefiorali g 200-150; trattamenti postfiorali g 150. Contro: Bolla e Corineo delle Drupacee (Pesco, ecc.): Trattamenti al bruno (autunno-invernali) g 400-500; trattamenti al verde (primaverili-estivi) g 150.

Floricoltura: Contro Ruggine del garofano, Ticchiolatura delle Rose, ecc. g 150-200.

Orticoltura: Contro Ruggine dell'asparago, Marciume delle fragole, Antracnosi del cocomero, del fagiolo, ecc. g 200. Contro Peronospora, Alternaria e Septoria del pomodoro, ecc. g 300.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Rischi per la fauna utile
L'impiego dello ZIRAM 80 non comporta rischi per la fauna utile.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

ATTENZIONE - MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Da non usare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO Kg 1

DU PONT
DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0021

Perthane® EC

Concentrato emulsionabile — Insetticida clororganico per la lotta contro molti insetti nocivi in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e colture ornamentali.

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Composizione — 100 g di prodotto contengono:
44,9 g di Perthane [1,1-dicloro-2,2-bis-(p-etilfenil)-etano] p.a. puro;
Emulsionanti, tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi.

Registrazione n. 0021 del Ministero della Sanità del 17.9.71

CLASSE IV

Il PERTHANE EC agisce per contatto e per ingestione contro numerosi insetti nocivi: Cicaline, adulti e larve appena nate di Minatrici (Lithocolletis, Lyonetia, ecc.) e di Ricamatrici, Psille, ecc. Agisce inoltre contro una vasta gamma di insetti quali: Tingide del pero, Mosca delle ciliege, Mosca della frutta, Anarsia del pesco, Altiche, larve di Cavolaia, ecc.

Compatibilità — Il PERTHANE EC è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.). La miscela con certi prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile.

Quando il PERTHANE EC viene usato in miscela con prodotti della classe I, II o III è obbligatoria l'osservanza delle norme precauzionali prescritte per la classe superiore.

Fitotossicità — Impiegato alle dosi e sulle colture consigliate, il PERTHANE EC non è fitotossico.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura . ogni altro uso è pericoloso

Istruzioni per l'uso — Dosi per 100 litri d'acqua.

Frutticoltura:

Contro Psille, adulti e larve appena nate di Minatrici e di Ricamatrici, Mosca delle ciliege, Maggiolino, ecc.: cc 200-250.

Contro Antonomo del melo e del pero, Rinchite della frutta, Fillobi, Tentredini, Cecidomie, Cicaline, ecc.: cc 200.

Contro Mosca della frutta cc 300-400.

N.B. Il PERTHANE EC è un insetticida liquido e perciò non va usato nelle prime 4 settimane dopo la fioritura su varietà sensibili (Golden Delicious, Jonathan, William).

Viticoltura:

Cicadelle, Sigaraio, Scrivano: cc 200.

Maggiolino, Anomala, Oziorrinco e Apate della vite: cc 200-250.

Ortaggi, fiori e piante ornamentali: Altiche, Cavolaia, Tignole degli ortaggi, Coleotteri ecc.: cc 200-250.

Preparazione della poltiglia — Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

Rischi per la fauna utile — L'impiego del PERTHANE EC non comporta rischi per la fauna utile. Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Informazioni mediche — In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Da non usare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato della Rohm & Haas Co., Filadelfia.

CONTENUTO 1 - 5

DU PONT — DU PONT CONID SPA AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0023

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Evitare di respirarne i vapori.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.
Consigli terapeutici: abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.
Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ICI Solplant SpA

'AGROXONE' 3

Diserbante liquido: uccide le erbe infestanti dei cereali

COMPOSIZIONE

MCPA puro (sottoforma di sale sodico)	g 25
Disperdenti, bagnanti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

'AGROXONE' 3 è un erbicida selettivo ormonico, specifico per la lotta contro le erbe infestanti dei cereali: (vecce, senape, rafani, fiordalisi, rosolacci, acetosella, farfare, convolvoli, alisma, scirpo). 'AGROXONE' 3 non è efficace contro graminacee in generale, camomilla, margherita, echio comune, caglio, cerastio.

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITA' DI IMPIEGO
Per grano, segale, orzo, avena: lt 2-5 per ettaro.
Per il riso: lt 2-5 per ettaro.
Per melo e vite: lt 4-7 per ettaro contro convolvolo, romice, cirsio.
Usare le dosi alte quando le erbe infestanti sono in grande quantità, molto sviluppate e se le condizioni di clima sono instabili; in tutti gli altri casi, a seconda dell'esperienza locale, adottare le dosi inferiori.
Al termine dell'applicazione lavare accuratamente con soda e sciacquare con molta acqua tutti i recipienti che sono stati impiegati nel trattamento.

EPOCA DI TRATTAMENTO
Per il grano, segale, orzo, avena: il trattamento deve essere eseguito nel periodo compreso tra la fine della fase di accestimento e l'inizio della fase di botticella. **Per il riso:** il trattamento va eseguito dopo l'accestimento e prima che si formi nel culmo l'ingrossamento della spiga. È bene che le erbe infestanti si trovino in attivo sviluppo vegetativo. Può essere applicato anche dopo la fir tura, oppure subito dopo la semina in fase di pre-emergenza.
Al momento del trattamento la risaia non deve trovarsi in asciutta, ma presentare ancora la superficie degli appezzamenti coperta da qualche centimetro di acqua, onde evitare danni.
Per melo e vite: non trattare durante la fioritura e con temperature superiori a 20-22°C.

MODALITÀ D'IMPIEGO
'AGROXONE' 3 va diluito in acqua e irrorato sulle colture mediante un tipo di pompa che assicuri la massima uniformità nella distribuzione del liquido. Eseguire il trattamento con erbe infestanti in attiva crescita; evitare di trattare in giornate di pioggia o di vento. In caso di colture traseminate (ad es. trifoglio nel grano), il trattamento si può eseguire tra la semina e la nascita del seme traseminato.

Non ha alcuna importanza la quantità di acqua irrorata per ettaro; è importante che non venga distribuito per ettaro un quantitativo di 'AGROXONE' 3 maggiore di quello consigliato.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ
È sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi ed anticrittogamici: eseguirla con erbicidi solo se indispensabile e dopo aver consultato un tecnico di fiducia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Trattandosi di un erbicida, impiegarlo solo sulle colture consigliate. Evitare che vengano colpite le colture limitrofe o comunque sensibili.

RISCHI DI NOCIVITÀ
'AGROXONE' 3 è tossico per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione:
BASLINI Industrie Chimiche S.p.A. - Treviglio (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n. 0023 del 28-7-1971
'AGROXONE' - Marchio registrato Imperial Chemical Industries PLC

DA NON VENDERSI SFUSO

It 1

0024

Acarthane® WP

Polvere bagnabile — Acaricida ad azione collaterale antioidica.

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Composizione — 100 g di prodotto contengono:

18,2 g di Kelthane [1,1-bis-(p-clorofenil)-2,2,2-tricloroetanolo] p.a. puro; 9,1 g di Karathane tecnico [costituito dal 78% di Dinitro-(1-metileptil)-fenil crotonato e dal 22% di altri prodotti della reazione, principalmente Dinitro-(1-metil-eptil) fenolo];

Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Registrazione n. 0024 del Ministero della Sanità del 9.11.72

CLASSE III

L'ACARTHANE WP è un acaricida di elevata efficacia contro i più importanti acari delle colture agrarie. Ha pure un'azione antioidica collaterale.

Compatibilità — L'ACARTHANE WP è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.). La miscela con certi prodotti emulsionabili non è consigliabile.

Non usare l'ACARTHANE WP tre settimane prima o dopo l'impiego di olii minerali o prodotti oleosi. Attendere 8-10 giorni prima di usare l'ACARTHANE WP su piante trattate con nitroderivati organici (DIKARA-THANE, ecc.).

Quando l'ACARTHANE WP viene usato in miscela con prodotti della classe I o II, è obbligatoria l'osservanza delle norme precauzionali prescritte per la classe superiore.

Fitotossicità — L'ACARTHANE WP impiegato alle dosi e sulle colture consigliate, non è fitotossico.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura . ogni altro uso è pericoloso

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Istruzioni per l'uso — Melo e pero - g 200 per 100 litri d'acqua.

Per combattere gli attacchi dei ragnetti rossi durante l'estate iniziare le applicazioni al primo comparire degli stessi. Trattare accuratamente le piante in modo da assicurare una completa copertura di tutte le foglie.

Fragole - g 200 per 100 litri d'acqua.
Bagnare abbondantemente e ripetere il trattamento ad intervalli di 10-20 giorni se necessario.

Preparazione della poltiglia — Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume scolando bene.

Rischi per la fauna utile — L'impiego dell'ACARTHANE WP non comporta rischi per la fauna ut

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che p sono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assi rare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone e agli animali.

ATTENZIONE - MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio — Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto c la pelle.

Informazioni mediche — In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interve di pronto soccorso.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessil ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi ac ratamente con acqua e sapone.

Da non usare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

Marchio registrato dalla Rohm & Haas Co., Filadelfia.

CONTENUTO 1 KG.

DU PONT — DU PONT CONID SPA AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0028

Azamon®

ɔlvere bagnabile — Specifico per la lotta contro i più dannosi insetti in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e colture industriali.

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Composizione — 100 g di prodotto contengono:
20 g di Diazinone [0,0-dietil-0-(2-isopropil-4-metil-6-pirimidil)-tiofosfato] p.a. puro;
Bagnanti, disperdenti, coformulanti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Registrazione n. 0028 del Ministero della Sanità del 16.9.71

CLASSE III

L'AZAMON agisce per contatto e per ingestione, penetrando anche nei tessuti vegetali, contro: psille, afidi in genere, cocciniglie, tentredini, mosca delle ciliege, mosca delle olive, carpocapsa, tignole del pesco, larve di minatrici, tignole dell'uva, tortrice delle susine.

Compatibilità — L'AZAMON è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese). La miscela con certi prodotti emulsionabili non è consigliabile.
Quando l'AZAMON viene usato in miscela con prodotti della classe I o II è obbligatoria l'osservanza delle norme precauzionali prescritte per la classe superiore.

Fitotossicità — Impiegato alle dosi e sulle colture consigliate, l'AZAMON non è fitotossico.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso

Istruzioni per l'uso — Dosi per 100 litri d'acqua: g 150-250.
Frutticoltura: Contro psille del melo e del pero, afide verde, afide lanigero, carpocapsa, tignole del pesco, cocciniglie, tortrice delle susine tentredini, mosca delle ciliege, larve di minatrici e di tortricidi, ecc.
Viticoltura: Contro tignole dell'uva, larve di tortricidi, cocciniglie, ecc
Olivicoltura: Contro la mosca dell'olivo, cocciniglie, ecc.
Orticoltura: Contro afidi, mosca del cavolo, tortricidi, ecc.
Floricoltura: Contro afidi, tortricidi, ecc.

Preparazione della poltiglia — Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Rischi per la fauna utile — L'impiego dell'AZAMON non comporta rischi per la fauna utile.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assic rare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle pe sone e agli animali.

ATTENZIONE - MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio — Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto c la pelle.

Informazioni mediche — Sintomi d'intossicazione:
Scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchi - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibril zione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione art ciale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropi (mg 1-2 per gli adulti e mg 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fi a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media at pinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenc lente di PAM (g 0,50 per ogni 3 ore fino a g 3) o similari.
Controindicazioni: morfina, vitamina B_1, coramina, latte e grassi.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi de cute con sapone o soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessil ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi ac ratamente con acqua e sapone
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa chetta

Da non usare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO 1 KG.

0029

DITHANE® BLEU

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile — **Fungicida organico per combattere le principali malattie crittogamiche della vite, del pomodoro e del garofano.**

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Zineb (etilenbisditiocarbammato di zinco) p.a. puro gr. 65
(da p.a. tecnico al 100% di purezza)
Coloranti, bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
- *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
- *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
- *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA:
- **in caso di ingestione**
  Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;
- **per l'irritazione della cute e delle mucose**
  Lavaggio, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.
  Controindicato: alcool, olii e grassi.

Modalità e campi d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua: g. 200-300.
Vite: contro la peronospora.
Pomodoro fino alla prima fioritura: contro la peronospora.
Garofano: contro la ruggine.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON IMPIEGARE IN SERRA.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Compatibilità
Il DITHANE BLEU è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese). La miscela con certi prodotti emulsionabili non è consigliabile.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 0029 del 19.9.72 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 1 – 10

DU PONT
DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0030

Fumathane® S

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA!

Liquido miscibile — **Soluzione fumigante per la disinfezione del terreno.**

Composizione

100 g di prodotto contengono:
39,1 g di Metam-sodium (Vapam) [N-metilditiocarbammato di sodio (anidro)] p.a. puro (100% purezza);
Solventi quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
— Conservare la confezione ben chiusa
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
— Non operare contro vento
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni mediche

— In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

Il FUMATHANE S è un prodotto fumigante che deve le sue proprietà fungicide e collaterali al gas (Metilisotiocianato di sodio) che si produce nel terreno a seguito della sua decomposizione. Esso viene impiegato nel trattamento preventivo del terreno per combattere i parassiti fungini agenti dei marciumi radicali, marciumi del colletto, avvizzimento delle piantine, quali: Fusarium - Verticillium - Phialophora - Pythium.
Il FUMATHANE S svolge nel contempo altre interessanti azioni collaterali e cioè: azione erbicida, azione nematocida sulle forme libere, azione insetticida.

Modalità d'impiego

Preparazione del terreno: Per ottenere i migliori risultati e cioè una penetrazione e diffusione perfetta, il terreno deve essere ben sminuzzato e piuttosto umido.

Sostanza organica: Il letame e la torba devono essere interrati un mese prima del trattamento.

Temperatura del terreno: Al momento dell'applicazione la temperatura del terreno non deve essere inferiore a 14° C e non superare i 32° C.

Dosi raccomandate: La dose normale di FUMATHANE S è di 850 kg/ha. Tale dose dovrà essere portata a kg 1300-1700 quando si operi su terreni pesanti o infettati principalmente da verticillosi o fialoforosi.

Modalità d'impiego: Il FUMATHANE S deve essere distribuito in modo uniforme, diluito nell'acqua, mediante un irroratore a spruzzo oppure mediante l'impianto di irrigazione a pioggia. Per piccole superfici può essere impiegata l'innaffiatura. Immediatamente dopo, l'appezzamento trattato deve essere sottoposto ad una lenta irrigazione fino a quando il terreno risulterà bagnato ad una profondità di cm 25-30. E' possibile distribuire il FUMATHANE S anche con palo iniettore praticando i fori a distanza di cm. 15-18 come massimo ed effettuando subito dopo una irrigazione superficiale di qualche cm. Dieci-dodici giorni dopo il trattamento lavorare superficialmente il terreno per favorire la dispersione del gas originatisi dal FUMATHANE S.

Compatibilità

Il FUMATHANE S per la sua particolare formulazione non deve essere miscelato ad altri prodotti.

Fitotossicità

Il FUMATHANE S è fitotossico per tutte le colture in atto e deve pertanto essere impiegato soltanto per la disinfezione e la disinfestazione del terreno prima della messa a dimora delle colture.
Attendere 8-10 giorni prima di procedere alla semina ed al trapianto delle colture.

Rischi per la fauna utile

L'impiego del FUMATHANE S non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Titolare della registrazione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registr. n. 0030 del 17.9.71 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato dalla Rohm & Haas Co. - Filadelfia - USA.

Contenuto 50 - 100 kg

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0031

Karathane 1%

Polvere — Specifico per la lotta contro il Mal bianco e gli acari fitofagi in viticoltura, orticoltura e sulle piante ornamentali.

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Composizione — 100 g di prodotto contengono:

1 g di Karathane tecnico (costituito dal 78% di Dinitro-(1-metileptil)-fenil crotonato e dal 22% di altri prodotti della reazione, principalmente Dinitro-(1-metil-eptil) fenolo);

Inerti quanto basta a 100 grammi.

Registrazione n. 0031 del Ministero della Sanità del 6.9.71

CLASSE III

Il KARATHANE 1% è un antioidico organico per la lotta contro le diverse forme di Oidi. E' stato sperimentato che ha pure una buona efficacia contro le forme mobili degli acari (ragno rosso, ragno giallo), che infestano le piante coltivate.

Compatibilità — Per la sua particolare formulazione, il KARATHANE 1% deve essere impiegato da solo.

Non impiegare il KARATHANE 1% quando la temperatura ambiente è superiore ai 32°C.

Fitotossicità — Il KARATHANE 1% impiegato alle dosi e nelle epoche consigliate, non è fitotossico.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso

Istruzioni per l'uso — Dose per ettaro: da 20 a 35 kg, a secondo del tipo di coltura e dello stadio di sviluppo delle singole piante.

Colture ornamentali: (Rose, Zinnie, Crisantemi, Astri, Begonie, ecc.) sia in serra che in pieno campo.

Iniziare i trattamenti alla prima comparsa della malattia e ripeterli ad intervalli di 5-7 giorni.

Cucurbitacee: (Cocomeri, Cetrioli, Meloni, Angurie ecc.). Effettuare periodiche applicazioni ad intervalli di 7-10 giorni.

Viticoltura: Iniziare le applicazioni al primo allungamento del germogli e ripeterle in seguito con una cadenza di 10-14 giorni. Il KARATHANE 1% può essere applicato anche in fioritura.

Vivai (Melo, Pero, Pesco, Ciliegio, Mandorlo, ecc.). Impiegare da 27 a 35 kg per ettaro, ripetendo i trattamenti ogni 7-10 giorni.

Rischi per la fauna utile — L'impiego del KARATHANE 1% non comporta rischi per la fauna

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto (sulle cu tacee 7 giorni prima del raccolto).

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni ch sono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per a rare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante persone e agli animali.

ATTENZIONE - MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio — Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatt la pelle.

Informazioni mediche — In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti inte di pronto soccorso.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inacce: ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi e tamente con acqua e sapone.

Da non usare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

® Marchio registrato dalla Rohm & Haas Co, Filadelfia

CONTENUTO 25 KG.

DU PONT — DU PONT CONIO SPA AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0032

PERBOTRIN®

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile Fungicida organico per combattere le principali malattie crittogamiche delle pomacee, della vite, del pomodoro e garofano

Composizione
100 gr. di prodotto contengono:
Mancozeb p.a. puro gr. 45
(da p.a. tecnico all'80%)
Folpet p.a. puro gr. 30
(da p.a. tecnico al 90%)
Bagnanti, disperdenti, coloranti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA:
— in caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;
— per l'irritazione della cute e delle mucose
Lavaggio, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.
Controindicate: alcool, olii e grassi.

Modalità e campi d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua.
Pomacee: gr. 150-200 contro la ticchiolatura del melo e del pero, ruggini, corimeo, monilia ed altre malattie crittogamiche, nonchè per prevenire la lenticellosi sulla Golden Delicious.
Vite: gr. 150-200 contro la peronospora, antracnosi.
Pomodoro fino alla prima fioritura: gr. 150-200 contro peronospora, alternariosi, septoriosi, cladosporiosi, antracnosi.
Garofano: gr. 150-200 contro la ruggine.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON IMPIEGARE IN SERRA.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Compatibilità
Il PERBOTRIN è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) e degli olii minerali. La miscela con certi prodotti emulsionabili non è consigliabile. Il PERBOTRIN non deve essere usato 15-20 giorni prima o dopo l'impiego degli olii minerali.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Si consiglia l'impiego del prodotto su alcune varietà di pero (Spadona d'estate, Coscia, S. Maria, Butirra d'estate) che presentano una specifica sensibilità allo zinco.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto. Per non ostacolare la fermentazione dei mosti, sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Rischi di nocività Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 0032 del 21.12.71 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 5-1-10-25

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0033

Ga-Sol®

Liquido miscibile — **Soluzione fumigante per la disinfezione del terreno.**

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Composizione
100 g di prodotto contengono:
39,1 g di Metamsodium (Vapam) [N-metilditiocarbammato di sodio] (anidro) p. a. puro;
Acqua quanto basta a 100 grammi.

Registrazione n. 0033 del Ministero della Sanità del 7.9.71

CLASSE III

Il GA-SOL è un prodotto fumigante che deve le sue proprietà fungicide e collaterali al gas (Metilisotiocianato di sodio) che si produce nel terreno a seguito della sua decomposizione. Esso viene impiegato nel trattamento preventivo del terreno per combattere i parassiti fungini agenti dei marciumi radicali, marciumi del colletto, avvizzimento delle piantine, quali: Fusarium - Verticillium - Phialophora - Pythium, ecc. Il GA-SOL svolge nel contempo altre interessanti azioni collaterali e cioè: azione erbicida, azione nematocida sulle forme libere, azione insetticida.

Compatibilità
Il GA-SOL per la sua particolare formulazione non deve essere miscelato ad altri prodotti.

Fitotossicità
Il GA-SOL è fitotossico per tutte le colture in atto e deve pertanto essere impiegato soltanto per la disinfezione e la disinfestazione del terreno prima della messa a dimora delle colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.

Istruzioni per l'uso
Preparazione del terreno: Per ottenere i migliori risultati e cioè una penetrazione e diffusione perfetta, il terreno deve essere ben sminuzzato e piuttosto umido.

Sostanza organica: Il letame e la torba devono essere interrati un mese prima del trattamento.

Temperatura del terreno: Al momento dell'applicazione la temperatura del terreno non deve essere inferiore a 14° C e non superare i 32° C.

Dosi raccomandate: La dose normale di GA-SOL è di 850 kg/ha. Tale dose dovrà essere portata a kg 1300-1700 quando si operi su terreni pesanti o infettati principalmente da verticillosi o fialoforosi.

Modalità d'impiego: Il GA-SOL deve essere distribuito in modo uniforme, diluito nell'acqua, mediante un irroratore a spruzzo oppure mediante l'impianto di irrigazione a pioggia. Per piccole superfici può essere impiegata l'innaffiatura. Immediatamente dopo, l'appezzamento trattato deve essere sottoposto ad una lenta irrigazione fino a quando il terreno risulterà bagnato ad una profondità di cm 25-30. E' possibile distribuire il GA-SOL anche con palo iniettore praticando i fori a distanza di cm 15-18 come massimo ed effettuando subito dopo una irrigazione superficiale di qualche cm.

Rischi per la fauna utile
L'impiego del GA-SOL non comporta rischi per la fauna utile.

Dieci-dodici giorni dopo il trattamento lavorare superficialmente il terreno per favorire la dispersione del gas originatisi dal GA-SOL. Indi attendere ancora 8-10 giorni prima di procedere alla semina od al trapianto.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

ATTENZIONE - MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Informazioni mediche
— In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
— Conservare la confezione ben chiusa
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
— Non operare contro vento
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO 50 KG.
" 130 Kg

DU PONT
DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0035

Turcan®

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile — **Erbicida specifico per il diserbo del mais e del sorgo.**

Composizione
100 g di prodotto contengono:
50 g di Atrazina pura
Bagnanti: disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura dei rischi
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d acqua
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Il TURCAN è un erbicida specifico per il diserbo del mais e del sorgo. Agisce per contatto e per assorbimento radicale contro le più dannose malerbe annuali monocotiledoni e dicotiledoni, quali: giavone, borsa pastore, erba morella, amaranto, farinello, poe, persicaria, mercorella, stellaria.

Modalità d'impiego
Dose d'impiego: 4 kg per ettaro in 600-800 litri d'acqua.
Effettuare il trattamento preferibilmente in pre-emergenza, subito dopo la semina. Quando cause impreviste (stagione avversa, altri impegni di lavoro, ecc.) fanno ritardare l'intervento in pre-emergenza, il diserbo si può fare anche alla nascita del mais oppure in post-emergenza.
Una buona sistemazione del terreno ed un suo buon tenore in acqua facilitano l'azione diserbante del prodotto ed assicurano un ottimo risultato.
Non effettuare il diserbo su terreni torbosi o comunque molto ricchi di sostanza organica.
Le malerbe ad apparato radicale rizomatoso ed in genere quelle perenni (Vilucchio, Gramigne, Sorgo selvatico, Equiseto, Cirsium), nonchè le Setarie, la Digitaria ed il Giavone americano non sono combattibili con il TURCAN.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi aggiungerlo lentamente e sotto agitazione alla quantità d'acqua necessaria.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
Il TURCAN per la sua particolare formulazione e lo specifico campo d'impiego non deve essere miscelato con insetticidi, fungicidi e con concimi.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri erbicidi deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Si consigliano prove parcellari per le varietà poco note o di recente acclimatazione.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili successive, occorre un intervallo di 6 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco ecc.).
Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 0035 del 7.9.1971 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 1

DU PONT — DU PONT CONID SPA AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0039

Cloropin®

Polvere solubile — Erbicida sistemico specifico per il diserbo dei canali e delle ripe e per la lotta contro le graminacee.

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Composizione — 100 g di prodotto contengono:
85 g di Dalapon (2,2-dicloropropionato di sodio) p.a. puro;
Tensioattivi ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Registrazione n. 0039 del Ministero della Sanità del 8.9.71

CLASSE IV

Il CLOROPIN è un erbicida ad azione sistemica, efficace contro le graminacee annuali e perenni (setaria, digitaria, giavoni, gramigna, coda di volpe, fienarola, ecc.) nonchè contro altre monocotiledoni (cipollino, canna palustre, giunco, tifa, agropiro, ecc.).

Il CLOROPIN agisce per assorbimento fogliare ed una volta entrato in circolo nella pianta ne determina l'arresto dello sviluppo.

Compatibilità — Il CLOROPIN per la sua particolare formulazione e lo specifico campo d'impiego non deve essere miscelato con insetticidi, fungicidi e con concimi. La miscela con certi erbicidi emulsionabili non è consigliabile.

Quando il CLOROPIN viene usato in miscela con erbicidi della classe I, II o III è obbligatoria l'osservanza delle norme precauzionali prescritte per la classe superiore.

Fitotossicità — Il CLOROPIN può risultare fitotossico in particolar modo per i cereali, il mais, le barbabietole da zucchero, il riso, le colture orticole e floricole, i giovani impianti di frutteti e di vigneti, ecc. Evitare in ogni caso che la poltiglia diserbante colpisca l'apparato fogliare delle piante non direttamente interessate al trattamento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.

Istruzioni per l'uso — **Diserbo canali.** Contro cannuccia, tifa, carice, ciperi ed altre infestanti acquatiche: kg 18-20 per ettaro in 800-1000 litri d'acqua. Effettuare il trattamento in aprile-maggio, quando le infestanti sono in pieno sviluppo, oppure in agosto-settembre, durante e dopo la fioritura della cannuccia.

E' necessario bagnare bene le infestanti con la poltiglia diserbante. Un unico trattamento è normalmente sufficiente per eliminare l'infestazione per un anno.

Diserbo aree non coltivate. Contro le graminacee nelle aree industriali, parchi, viali, ripe, ecc.: kg 20-30 per ettaro in 800-1000 litri d'acqua.

E' consigliabile effettuare 2 trattamenti distanziati di un mese circa, impiegando metà dose di prodotto per volta. L'aggiunta di un bagnante alla poltiglia diserbante migliora l'efficacia del prodotto.

Preparazione della poltiglia — Sciogliere il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Rischi per la fauna utile — Il CLOROPIN non è tossico per la fauna utile e neppure per i pesci, per cui si può impiegare anche nel diserbo dei canali senza alcun pericolo per la ittiofauna.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Informazioni mediche — In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Da non usare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO 5 KG.

DU PONT
DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0062

Metilparatione 20

CLASSE I^a

VELENO

Insetticida liquido — Il METILPARATIONE 20 agisce per contatto, per ingestione e per asfissia in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, colture industriali e piante ornamentali.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
20g di Metil-parathion (0,0-dimetil 0-p-nitrofenil tiofosfato)tecnico all'80% di purezza;
Emulsionanti, tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
— Conservare la confezione ben chiusa
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
— Evitare di respirarne i vapori
— Non operare contro vento
— Evitare il contatto con la pelle e gli occhi
— Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
— Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

Informazioni mediche
SINTOMI D'INTOSSICAZIONE
Scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO
Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg 1-2 per gli adulti e mg 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore - iniezioni endovenose lente di PAM (g 0,50 ogni 3 ore fino a g 3) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.
Alcune controindicazioni: morfina - vitamina B1 - coramina - latte e grassi.

Caratteristiche
Il METILPARATIONE 20 ha un'efficacia citotropica, combatte cioè anche gli insetti penetrati nei tessuti vegetali (verme delle mele, delle pere, delle susine, minatrici, mosca del garofano, bega verde). Il METILPARATIONE 20 uccide anche le uova di diversi insetti (Carpocapsa, Capua, Afidi, Psillidi).

Modalità d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua
Contro Afidi in genere, Afide rosa del melo e farinoso del pesco, Psillidi, Tignola dell'uva, Carpocapsa, Capua ed altri Lepidotteri, Tentredini, Coleotteri, Tripidi, Afide verde del melo, Afide lanigero, Larve di S. Josè, ecc. cc125-175; Fleotripide, Tignola e Rinchite dell'olivo, Cydia molesta, Minatrici, Cocciniglie, ecc. cc175-250; Mosca e Bega del garofano, Mosca della frutta, Cocciniglia degli agrumi 250-350.

Preparazione della poltiglia
Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Il METILPARATIONE 20 è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.). La miscela con certi prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile.

Fitotossicità
Applicato sulle colture e secondo le modalità consigliate, il METILPARATIONE 20 non è fitotossico.

Rischi per la fauna utile
Il METILPARATIONE 20 è tossico per le api e per gli altri insetti pronubi, nonchè per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 0062 del Ministero della Sanità. del 1.12.71

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto 1 lt

0064

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione:
Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatite da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.

Consigli terapeutici:
Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per la dermatosi.

Controindicazioni:
È sconsigliata la digitale.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA Del gruppo Imperial Chemical Industries PLC

'AGROXONE' 5

Erbicida liquido emulsionabile a base di 2,4-D per diserbo dei cereali.

COMPOSIZIONE

2,4-D puro (sotto forma di estere)	g 32,5
Solventi, emulsionanti, disperdenti . . . . q.b. a	g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

p. p. ICI SOLPLANT s. p. a.

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione:
BASLINI Industrie Chimiche S.p.A. - Treviglio (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n. 0064 del 23-3-1971
'AGROXONE' - Marchio registrato Imperial Chemical Industries PLC

'AGROXONE' 5 è un erbicida selettivo ormonico specifico contro le erbe infestanti dei cereali: Vocce (Vicia), Senape (Sinapis), Rafani (Raphanus), Fiordalisi (Centaurea cyanus), Rosolacci (Papaver rhoeas, P. argemone), Acetosella (Oxalis acetosella), Farfara (Tussilago farfara), Convolvoli (Convolvulus arvensis), Alisma (Alisma plantago), Scirpo (Scirpus spp.).
Non è efficace contro graminacee in generale, Camomilla (Matricaria chamomilla), Margherita (Chrysanthemum segetum), Echio comune (Echium vulgare), Caglio (Galium spp.) Cerastio (Cerastium triviale).

EPOCA DI TRATTAMENTO

Per il grano: il trattamento deve essere eseguito nel periodo compreso tra la fine della fase di accestimento e l'inizio della fase di botticella.
Per il riso: il trattamento può essere eseguito prima dell'accestimento, e in tal caso dopo che le piantine di riso hanno già formato la 4ª-5ª foglia e con acqua alta 3-4 cm in risaia, oppure nel periodo compreso tra la fine dell'accestimento e prima che si verifichi nel culmo l'ingrossamento dovuto alla formazione della pannocchia. È bene che le erbe infestanti si trovino in attivo sviluppo vegetativo.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Per il grano: lt 0,400 - 1,250 per ettaro.
Per il riso: lt 0,400 - 1,000 per ettaro.
Usare le dosi più alte quando le erbe infestanti sono in grande quantità, molto sviluppate e se le condizioni ambientali sono instabili; in tutti gli altri casi, a seconda dell'esperienza locale, usare le dosi inferiori.
Non va immagazzinato vicino a derrate alimentari o sementi. Lavare accuratamente se possibile con acqua e soda recipienti ed attrezzature usate per i trattamenti.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Diluirlo in acqua e irrorarlo sulle colture mediante un tipo di attrezzatura che assicuri la massima uniformità nella distribuzione del liquido.
Non ha alcuna importanza la quantità di acqua irrorata per ettaro; è importante che non venga distribuito per ettaro un quantitativo di 'AGROXONE' 5 maggiore di quello consigliato.
Eseguire i trattamenti con erbe infestanti in attiva crescita; evitare di trattare in giornate di pioggia o di vento. In caso di colture traseminate (per esempio trifoglio nel grano) il trattamento si può eseguire tra la semina e la nascita delle sementi traseminate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

È sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi; eseguirla con gli erbicidi solo se indispensabile e dopo aver consultato un tecnico di fiducia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Trattandosi di un erbicida, impiegarlo solo sulle colture consigliate. Evitare che vengano colpite le colture limitrofe o comunque sensibili. Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi e floreali in genere; evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

AVVERTENZE

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

DA NON VENDERSI SFUSO

lt 1

0066

Agherud® PP

CLASSE III

ATTENZIONE - MANIPOLARE CON PRUDENZA

Liquido miscibile — Erbicida ormonico per il diserbo dei cereali e per la lotta contro il romice

Composizione — 100 g di prodotto contengono:
51 g di Mecoprop (MCPP) [acido 2,-(4-cloro-2-metilfenossi) propionico] p.a. puro, sotto forma di sale dimetilaminico;
Solventi quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio — Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni mediche — In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Caratteristiche — L'AGHERUD PP è un diserbante ormonico efficace contro numerose dicotiledoni annuali e biennali anche resistenti o difficili da combattere con il 2,4-D e l'MCPA come stellaria, veronica, vecce, gallio, tussilago, fiordaliso, ecc.

Modalità d'impiego — Frumento: lt 2 per ettaro in 400-800 litri d'acqua.
Effettuare il trattamento a partire da quando la coltura ha differenziato la 4ª-5ª foglia (inizio dell'accestimento) fino all'inizio dello stadio di botticella.
Non trattare con temperature inferiori a 5°C o quando si prevedono brinate.

Lotta contro i romici nei prati: Trattamenti localizzati con una soluzione allo 0,5-1% (cc 50-100 di AGHERUD PP per 10 litri d'acqua), avendo cura di bagnare bene anche all'interno, le rosette dei romici.

Per trattamenti su tutta la superficie, quando l'infestazione di romice è molto forte, impiegare lt 3-4 di AGHERUD PP per ettaro, in 400-800 litri d'acqua.

Per entrambi gli interventi effettuare il diserbo quando le piante di romice sono in attiva crescita (20-30 cm d'altezza).

Se entro 6 ore dal trattamento si verificano delle precipitazioni che possono dilavare il prodotto, ripetere il diserbo.

Preparazione della poltiglia — Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia diserbante già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità — L'AGHERUD PP per la sua particolare formulazione e lo specifico campo d'impiego non deve essere miscelato con insetticidi, fungicidi e con concimi. La miscela con certi erbicidi in polvere bagnabile non è consigliabile.
Quando l'AGHERUD PP viene usato in miscela con diserbanti della classe I o II è obbligatoria l'osservanza delle norme precauzionali prescritte per la classe superiore.

Fitotossicità — Applicato sulle colture e secondo le modalità consigliate, l'AGHERUD PP non è fitotossico.

Rischi per la fauna utile — L'impiego dell'AGHERUD PP non comporta rischi per la fauna utile.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 0066 del Ministero della Sanità del 6.9.71

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto 5 lt

Agherud® giallo

CLASSE 1

VELENO

Polvere solubile — **Erbicida specifico per il diserbo invernale dei cereali**

Composizione
100 g di prodotto contengono:
30g di DNOC (dinitro-ortocresolo) tecnico al 95% di purezza, sotto forma di sale ammonico
Tensioattivi ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
— Conservare la confezione ben chiusa
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
— Evitare di respirarne i vapori
— Non operare contro vento
— Evitare il contatto con la pelle e gli occhi
— Durante la preparazione e l'impiego usare tute, maschere ed occhiali protettivi
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
— Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

Informazioni mediche
— Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale e per assorbimento attraverso la pelle
— SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
Sudorazione - sete - nausea - spossatezza o agitazione psico motoria - tachicardia - dispnea - notevole ipertermia - colorazione gialla delle sclere - la morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.
— CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI CASO PER CASO:
Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5% . Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione. Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estose ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda . Trasfusioni o fleboclisi glusosate al 5% di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso ed ipotensione. Metil o propil tiouracile per ridurre il metabolismo basale - Ossigeno, respirazione artificiale - E' controindicata l'atropina.

Caratteristiche
L'AGHERUD GIALLO è un diserbante derivato del fenolo; agisce per contatto contro numerose infestanti annuali e biennali a foglia larga, quali: veccia, papavero, senape, ranuncolo, stellaria, fiordaliso, ederella e molte altre malerbe anche resistenti al 2,4-D od all'MCPA (camomilla, veronica, viola).

Modalità d'impiego
Cereali (frumento, orzo, avena, segale) kg8–16 per ettaro in 600-800 litri d'acqua.
Effettuare il trattamento a partire da quando la coltura ha differenziato le prime 2-3 foglie vere, fino a poco prima della levata.
Eseguire il trattamento in giornate serene e su piante asciutte.
Impiegare le dosi più basse (kg8–10per ettaro) quando le infestanti sono ai primi stadi di sviluppo; usare le dosi più alte quando la coltura da diserbare è nella fase di accestimento e le infestanti sono già sviluppate.
Con AGHERUD GIALLO è possibile eseguire il diserbo anche a temperature molto basse o prossime allo 0°C. In tale caso usare le dosi più alte consigliate.

Preparazione della poltiglia
Sciogliere il prodotto in poca acqua e quindi versarlo lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
L'AGHERUD GIALLO per la sua particolare formulazione e lo specifico campo d'impiego non deve essere miscelato con insetticidi, anticrittogamici e con concimi.

Fitotossicità
Applicato sulle colture e secondo le modalità consigliate, l'AGHERUD GIALLO non è fitotossico.

Rischi per la fauna utile
L'impiego dell'AGHERUD GIALLO non comporta rischi per la fauna utile.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12
Registrazione n. 0067 del Ministero della Sanità del 1.12.71
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto 5 kg

0080

0080

Classe III

ATTENZIONE manipolare con prudenza

AIRONE®

POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONI FUNGICIDA ORGANICO ACUPRICO

COMPOSIZIONE

Propineb puro	g 70
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti	q. b. a g 100

USO

Contro Peronospora della vite, Ticchiolatura delle pomacee, Peronospora del tabacco ed altre malattie crittogamiche del pomodoro (solo fino alla prima fioritura) e del garofano.

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento di Massa (MS)

Registrazione Ministero della Sanità N. 0080 del 10-3-1972

® Marchio registrato

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE - Contro la Peronospora g 120-160 in trattamenti preventivi da effettuarsi ogni qualvolta le condizioni di temperatura e di umidità rendano possibile una infezione (indispensabili almeno uno o due trattamenti a fine agosto-primi settembre contro eventuali attacchi tardivi). La lotta contro l'Oidio eseguita con zolfi in polvere dovrà essere completata aggiungendo alla poltiglia di AIRONE g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison per ettolitro.

POMACEE - Contro Ticchiolatura g 120-160; iniziare i trattamenti quando appaiono i primi abbozzi fogliari e continuarli fino a quattro settimane prima della raccolta in relazione alla frequenza delle piogge.

TABACCO - Contro Peronospora g 160.

POMODORO (solo fino alla prima fioritura).
Contro Peronospora, Septoriosi, Alternariosi e Ticchiolatura, g 160; aggiungere ad ogni ettolitro di poltiglia g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison.

GAROFANO - Contro Ruggine, Alternariosi, Septoriosi, Occhio di pavone, g 120-160.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto con poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea; diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando.

Preparazione della miscela con formulato liquido emulsionabile
Versare lentamente la quantità necessaria del formulato che si vuol miscelare nella sospensione del prodotto, preventivamente preparata, agitando con cura.

Preparazione della miscela con formulato polvere bagnabile
Miscelare le due polveri e stemperare con poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea, diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua agitando; oppure preparare separatamente le due sospensioni usando per ciascuna circa la metà dell'acqua necessaria, procedendo quindi alla miscelazione delle stesse sotto agitazione.

DIVIETI D'IMPIEGO

— DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
— DA NON IMPIEGARE IN SERRA
— DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con Olio bianco emulsionabile, Olio bianco emulsionato, Rogor L 40, Rogor PB 40, Rogor L 20, Cidial 50 L, Cidial olio, Cidial PB 40, Carpomon 20, Carposan 20, Oleoios 20, Oleoios 5, Zolfo Colloidale, Zolfo bagnabile, Panam, Fac 20, Ovifac.
Il prodotto è inoltre miscibile con i più comuni antiparassitari. E' consigliabile però procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti mescolati non presentino incompatibilità tra i coformulanti.
La miscela deve essere fatta comunque poco tempo prima dell'impiego.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto: g ...

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia
Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni
Alcool, olii, grassi.

Avvertenza
Consultare un Centro Antiveleni.

0116

Paramaag C. 97%

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA!

Liquido emulsionabile — Olio bianco emulsionabile per la lotta contro le cocciniglie ed il ragno rosso.

Composizione

100 g di prodotto contengono:
97 g di olio minerale al 95% di insolfonabile;
Emulsionanti, tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

Il PARAMAAG C. 97%, insetticida-acaricida contenente olio bianco emulsionabile, presenta i seguenti notevoli vantaggi:
- maggiore efficacia contro le uova di ragno rosso
- maggiore fluidità e quindi impiego più facile
- ottima sopportabilità da parte delle piante
- maggior deposito di olio minerale sulla pianta.

Modalità d'impiego

Dose per 100 litri d'acqua:

Frutticoltura: Pomacee (pero e melo);

1. Trattamento invernale (poco prima dell'apertura delle gemme) litri 3-3,5
2. Trattamento di fine inverno (dalle punte verdi alle orecchie di topo) litri 2-2,5. Per combattere contemporaneamente Lepidotteri, Afidi, Psillidi aggiungere al Paramaag C. 97% cc 100 di Parafos 50 o di Metiamon. Contro la Ticchiolatura si può aggiungere A 150, Ziramon o Azuram.

Drupacee (pesco, susino, ciliegio): trattamenti di fine inverno (all'ingrossamento delle gemme) litri 2-2,5.

Per combattere anche Lepidotteri, Afidi aggiungere cc 100 di Parafos 50 o di Metiamon. Contro Bolla e Corineo aggiungere Ziramon.

Agrumi: litri 2-2,5. Trattare dalla raccolta a poco prima della fioritura. Durante il perodo vegetativo litri 1-2.

L'epoca propizia per la lotta contro le Cocciniglie cade prima della deposizione delle uova o immediatamente dopo la nascita delle larve.

Piante e arbusti ornamentali a foglia caduca sempre verdi e con foglia resistente:

Trattamenti dall'inizio della ripresa vegetativa litri 2,5-3; durante il periodo vegetativo litri 1-1,5. Su Thuya, Taxus, Lauro, Oleandro litri 2-2,5, poco prima della ripresa vegetativa. Durante il periodo vegetativo litri 1-1,5.

Su Bosso, Ligustro (contro Cocciniglia a virgola), trattare subito dopo la nascita delle larve (da metà maggio ai primi di giugno) con litri 1-1,5. Il Paramaag C. 97% alla dose di litri 0,5-1 pulisce le foglie delle piante ornamentali da macchie calcaree.

Preparazione della poltiglia

Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

Il Paramaag C. 97% è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).

Il Paramaag C. 97% non deve essere miscelato con prodotti contenenti calce, zolfo, Karathane, captan e loro derivati. Non usare i suddetti prodotti 2-3 settimane prima o dopo il trattamento con Paramaag C. 97%; per gli zolfi è sufficiente un intervallo di 1-2 settimane.

Quando il Paramaag C. 97% viene usato in miscela con prodotti della classe I o II è obbligatoria l'osservanza delle norme precauzionali prescritte per la classe superiore.

Fitotossicità

Impiegato alle dosi e sulle colture consigliate, il Paramaag C. 97% non è fitotossico.

Rischi per la fauna utile

L'impiego del Paramaag C. 97% non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione no. 0116 del 6.9.71 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto 5 lt LT 25 - LT. 38

DU PONT

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0119

Acarion® E.C.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Concentrato emulsionabile — Acaricida a lunga persistenza

Composizione
100 g di prodotto contengono:
57 g di propargil [2-(p-tert-butilfenossi) cicloesil-2-propinilsolfito] p.a. puro (100% purezza);
Solventi ed emulsionanti: quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
L'ACARION EC è un nuovo acaricida particolarmente efficace contro le popolazioni di acari resistenti ai principi attivi tradizionali.
L'ACARION EC permette di combattere tutte le specie di acari fitofagi in frutticoltura, viticoltura, agrumicoltura, nonchè sulle colture industriali, orticole e floreali. In particolare l'ACARION EC è attivo contro: acari tetranichidi (ragno rosso, ragno giallo), eriofidi, tarsonemidi. Grazie alla sua lunga persistenza, l'ACARION EC permette di combattere anche gli acari nati dopo il trattamento.
L'ACARION EC è selettivo verso gli insetti utili ed è dotato di una bassissima tossicità per l'uomo e per gli animali a sangue caldo.

Modalità d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua: cc 80-100.
Frutticoltura: contro i ragnetti rossi (Panonychus ulmi e Tetranychus urticae) nei periodi di infestazione iniziale: cc 80. Nel periodo estivo con forti infestazioni o contro popolazioni di acari altamente resistenti, elevare la dose a 100 cc.
Viticoltura: contro i ragnetti rossi e contro il ragno giallo della vite: cc 80-100.
Agrumicoltura: contro gli acari fitofagi (ragnetti rossi, l'acaro rugginoso, eriofidi): cc 80-100.
Colture industriali, orticole e floricole: contro gli acari fitofagi (ragnetti rossi, eriofidi, tarsonemidi): cc 80-100.

Preparazione della poltiglia
Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
L'ACARION EC è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.). La miscela con certi prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile (es. a base di Binapacryl, Dodine).
Quando l'ACARION EC viene usato in miscela con prodotti della classe I o II è obbligatoria l'osservanza delle norme precauzionali prescritte per la classe superiore.

Fitotossicità
NON APPLICARE IL PRODOTTO SU PERI DI QUALSIASI VARIETA'.

Rischi per la fauna utile
L'impiego dell'ACARION EC non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 0119 del 9.11.78 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto 1 lt

Acarion® W.P.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile Acaricida a lunga persistenza

Composizione
100 g di prodotto contengono:
30 g di propargil [2-(p-tert-butilfenossi) cicloesil-2-propinilsolfito] p.a. puro (100% purezza);
Disperdenti e bagnanti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
L'ACARION WP è un nuovo acaricida particolarmente efficace contro le popolazioni di acari resistenti ai principi attivi tradizionali.
L'ACARION WP permette di combattere tutte le specie di acari fitofagi in frutticoltura, viticoltura, agrumicoltura, nonchè sulle colture industriali, orticole e floreali. In particolare l'ACARION WP è attivo contro: acari tetranichidi (ragno rosso, ragno giallo), eriofidi, tarsonemidi. Grazie alla sua lunga persistenza, l'ACARION WP permette di combattere anche gli acari nati dopo il trattamento.
L'ACARION WP è selettivo verso gli insetti utili ed è dotato di una bassissima tossicità per l'uomo e per gli animali a sangue caldo.

Modalità d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua: g 150-200.
Frutticoltura: contro i ragnetti rossi (Panonychus ulmi e Tetranychus urticae) nei periodi di infestazione iniziale: g 150. Nel periodo estivo con forti infestazioni o contro popolazioni di acari altamente resistenti, elevare la dose a 200 g.
Viticoltura: contro i ragnetti rossi e contro il ragno giallo della vite: g 150-200.
Agrumicoltura: contro gli acari fitofagi (ragnetti rossi, acaro rugginoso, eriofidi): g 150-200.
Colture industriali, orticole e floricole: contro gli acari fitofagi (ragnetti rossi, eriofidi, tarsonemidi): g 150-200.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
L'ACARION WP è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.). La miscela con certi prodotti emulsionabili non è consigliabile (es. a base di Binapacryl, TEPP).
Quando l'ACARION WP viene usato in miscela con prodotti della classe I o II è obbligatoria l'osservanza delle norme precauzionali prescritte per la classe superiore.

Fitotossicità
L'ACARION WP può essere impiegato anche su cultivar soggette a rugginosità (Golden Delicious), su cui è sconsigliabile l'applicazione, in determinati stadi fenologici, dei preparati liquidi emulsionabili.
NON APPLICARE IL PRODOTTO SU PERI DI QUALSIASI VARIETA'

Rischi per la fauna utile
L'impiego dell'ACARION WP non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 0120 del 9.11.72 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto 1 kg

0157

Brumolin®

CLASSE III

ATTENZIONE! MANIPOLARE CON PRUDENZA

Esca rodenticida pronta per l'uso

Composizione

100 g di prodotto contengono:

0,0375 g di Warfarin (3-alfa-acetonilbenzil-4-idrossicumarina) p.a. puro (100% purezza);

Coformulanti specifici, coloranti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici

— Conservare la confezione ben chiusa

— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto

— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua

— Non operare contro vento

— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti

— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

Informazioni mediche

— Avvelenamento grave per ingestione

— Sintomi d'intossicazione
Emorragie cutanee e delle mucose - ematuria. Neutralizza la vitamina K per cui a livello epatico si blocca la formazione di protrombina, la sintomatologia è pertanto prevalentemente emorragica.

— CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO
Antidoto specifico: vitamina K - vitamina C e P, consigliabili emotrasfusioni, in casi gravi.

Caratteristiche

Il BRUMOLIN è molto efficace nella lotta contro i roditori ed è impiegato con successo perchè riduce il potere coagulante del sangue causando la morte dei topi e dei ratti senza provocare repellenza nè per l'esca nè per il veleno.

Modalità d'impiego

Il BRUMOLIN è un'esca pronta per l'uso contro topi e ratti.

Distribuire g 200-500 di esca nei luoghi frequentati dai ratti.

Cercare un numero sufficiente di luoghi frequentati dai ratti e deporre in essi l'esca in quantità abbondante. L'esca si deve lasciare sul posto per qualche tempo affinchè tutti i ratti possano effettivamente cibarsene.

Il BRUMOLIN si deve distribuire a mucchietti versando il prodotto direttamente dall'imballaggio su un oggetto impermeabile all'acqua.

Non toccare mai l'esca con le mani perchè i ratti fiutano e diffidano di ogni odore estraneo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione

AGLUKON GESELLSCHAFT MBH - DÜSSELDORF (Germania)

Officina di produzione

AGLUKON GESELLSCHAFT MBH - DÜSSELDORF - AM WEHRHAHN 78/80.

Registrazione n. 0157 del 18.9.71 del Ministero della Sanità.

Distributrice per l'Italia

DU PONT CONIO SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto 0,5 - 2,5 Kg

® Marchio registrato dall'Aglukon Gesellschaft MBH - Düsseldorf (Germania).

DU PONT CONIO SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0172

Crothion®

Concentrato emulsionabile — **Insetticida ed acaricida sistemico con largo spettro d'azione**

Il CROTHION è un insetticida sistemico di rapido assorbimento; agisce prevalentemente per ingestione contro molti insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore (afidi, psillidi, tripidi, larve di minatrici, ecc.).
Il CROTHION è efficace anche contro le larve e gli adulti degli acari.

Composizione

100 g di prodotto contengono:
20 g di Monocrotophos (dimetilfosfato di 3-idrossi-N-metil-cis-crotonamide) p.a. puro (100% purezza);
Coloranti, tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
— Conservare la confezione ben chiusa
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
— Evitare di respirarne i vapori
— Non operare contro vento
— Evitare il contatto con la pelle e gli occhi
— Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
— Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando le confezioni)
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni mediche

— **Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.**
— **Sintomi d'intossicazione:**
Scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg 1-2 per gli adulti e mg 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (g 0,50 ogni 3 ore fino a g 3) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.
Alcune controindicazioni: morfina, vitamina B1, coramina, latte e grassi.

Modalità d'impiego

Dosi per 100 litri d'acqua:
Contro parassiti con apparato boccale succhiatore (afidi, psillidi, tripidi, acari, ecc.) cc 100-150.
Contro parassiti con apparato boccale masticatore (larve di tortricidi, di nottue, di minatrici, ecc.): cc 150-200.

Preparazione della poltiglia

Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

Il CROTHION è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.). La miscela con certi prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile.

Fitotossicità

Il CROTHION è ben tollerato dalla maggior parte delle colture, fatta eccezione per i ciliegi e per alcune varietà di pero e di melo.
Non impiegare il prodotto sulla Stark Delicious.

Rischi per la fauna utile

Il CROTHION è tossico per le api e per molti altri insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame. Non usare il prodotto in fioritura.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Pieve 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 0172 del 7.9.71 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto 1 lt

DU PONT — DU PONT CONID SPA AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0189

® Marchio registrato dalla Rohm and Haas Co. Philadelphia - U.S.A.

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:

— **Principio attivo**
MANCOZEB puro . . . . gr 80

— **Sostanze inerti e coadiuvanti** q.b. a gr 100

Classe III°

ROHM AND HAAS ITALIA S.P.A.
(Dott. A. Comuzzi)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
— Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore.
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
— Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
Avvertenza: Consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Melo - Pero - Contro la Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella gloedes. Impiegare 150-200 gr. di KOR-80 per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti all'apertura delle gemme e continuare fino alla fine seguendo i calendari suggeriti nella zona.

Vite - Contro la Peronospora (Plasmopara viticola), e l'Antracnosi (Sphaceloma ampelinum) impiegare 200 gr di KOR-80 per ogni 100 litri di acqua; iniziare i trattamenti in primavera quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie e continuare i trattamenti attenendosi alle disposizioni dei calendari di lotta suggeriti nella zona.
Contro l'Escoriosi (Phomopsis viticola), il Marciume nero, (Guignardia Bidwellii) ed il Rossore parassitario (Pseudopeziza tracheiphila) usare la stessa dose iniziando con un trattamento anticipato non appena le gemme cominciano a muovere e facendone seguire un altro all'omissione delle prime foglioline; proseguire quindi secondo il normale calendario di lotta antiperonosporica.

Pomodoro - Contro la Peronospora, l'Alternaria, la Septoria, l'Antracnosi e la Cladosporiosi, sia in campo quanto in semenzaio impiegare 200-300 gr di KOR-80 per ogni 100 litri di acqua. Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti solo fino alla prima fioritura ogni 7-10 giorni o più spesso nel caso di gravi attacchi. Di fronte a forti attacchi di Antracnosi impiegare Kg 3-3,5 di KOR-80 per Ha. di coltura.

Tabacco - Contro la Peronospora.
In semenzaio: iniziare i trattamenti con 100-150 gr di KOR-80 per ogni 100 litri di acqua quando le piante sono di cm 1,5 di diametro. Trattare ogni 3-4 giorni. Ripetere dopo ogni irrigazione o pioggia.

In pieno campo: usare il KOR-80 alla dose di 200 gr per ogni 100 litri di acqua. Trattare due volte alla settimana o più spesso se richiesto dalle condizioni ambientali.

Pioppo - Contro la Marssonina brunnea. Impiegare 400-500 gr di KOR-80 per 100 litri di acqua iniziando i trattamenti al più presto per prevenire qualsiasi attacco precoce (metà aprile in Val Padana). Ripetere per almeno 2-3 volte il trattamento ad intervalli medi di 15-20 giorni.

Garofano - In pieno campo - Ruggine (Uromyces caryophyllinus). Iniziare i trattamenti quando vi sono condizioni favorevoli alla malattia oppure appena le piante hanno formato le prime foglie. Impiegare da 120 a 240 gr di KOR-80 per ogni 100 litri di acqua. Trattare ogni settimana cercando di bagnare accuratamente tutte le parti delle piante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'
Il KOR-80 è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari quali il Kelthane (R), Karathane (R), zolfi bagnabili, esteri fosforici, Sevin, Gusathion polvere bagnabile. E' incompatibile con la poltiglia Solfo-Calcica, il permanganato di potassio e con i concimi fogliari contenenti Boro.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI FITOTOSSICITA' - Varietà di Pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

20124 MILANO - VIA VITTOR PISANI 28
TELEFONO 62.581

Formulato da: ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
Confezionato da: AMONN FITOCHIMICA S.p.A.
Stabilimento di Bolzano
Registrazione del Ministero della Sanità N. 0189 del 22.11.1971
DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO KG 1

0219

Endamon®

I CLASSE

VELENO

Polvere bagnabile — **Insetticida selettivo per la lotta contro i principali insetti nocivi in frutticoltura, orticoltura, colture industriali ed ornamentali.**

Composizione
100 g di prodotto contengono:
37,23 g di Endosulfan [1,2,3,4,7,7-esaclorobiciclo-(2,2,1) eptene-5,6-diossimetilen solfito] tecnico al 94% di purezza;
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Evitare di respirarne i vapori
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole)
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni mediche
- Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
- Sintomi d'intossicazione:
  Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (g 25 di solfato di sodio).
Per la liposolubilità di questo insetticida hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.
Barbiturici (luminal 0,1-0,2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.
Controindicazioni: la morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

Caratteristiche
L'ENDAMON agisce per contatto e per ingestione contro gli insetti nocivi alle colture agrarie. E' dotato di una buona efficacia iniziale, di una persistenza sufficientemente lunga nonchè di una buona selettività per gli insetti utili (api, predatori) verso i quali è innocuo fino alla concentrazione del 3%).

Fra i parassiti sensibili al prodotto ricordiamo: afidi, psille, cicadelle, minatrici, maggiolino, tentredini, antonomo del melo e del pero, cavolaia, afide lanigero, eriofide del nocciolo, dorifora della patata, altiche, cleono della barbabietola, acaro delle fragole, tignola del melo, meligete della colza e diversi altri insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore.
L'EDAMON svolge pure una certa azione secondaria contro il Ragno rosso.

Modalità d'impiego
Frutticoltura, orticoltura, floricoltura, ecc.: g 150-200 per 100 litri d'acqua. Impiegare la dose più alta quando si interviene contro: psille, afidi resistenti (afide nero del fagiolo, della fava, afide farinoso del pesco, larve di lepidotteri, dorifora della patata). Poichè l'azione dell'ENDAMON è prevalentemente di contatto, contro gli afidi è importante intervenire prima che le foglie si accartoccino.
Colture industriali e foraggere: Contro altiche, cleono della barbabietola, meligete della colza, ecc. kg 1,2-1,5 per ettaro.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
L'ENDAMON è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese). La miscela con certi prodotti emulsionabili non è consigliabile.

Fitotossicità
L'ENDAMON non causa alcun danno alle piante anche quando viene usato in piena fioritura.

Rischi per la fauna utile
L'impiego dell'ENDAMON non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.
L'ENDAMON è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione Nr. 0219 del 1.12.71 del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto kg 1-5

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0227

AGHERUD® DICAMBA

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Liquido miscibile — **Erbicida per il diserbo primaverile dei cereali e delle piante da frutto.**

Composizione: 100 g di prodotto contengono:
29,1 g di MCPA p.a. puro.
2,56 g di dicamba p.a. puro.
Solventi quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico: **Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.**

SINTOMI D'INTOSSICAZIONE
Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO
Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

CONTROINDICAZIONI
E' sconsigliata la digitale.

Caratteristiche: L'AGHERUD DICAMBA è un diserbante ormonico attivo contro numerose infestanti annuali e perenni a foglia larga, quali: camomille, aparine, veronica, fumaria, stellaria canapaccia, viola, spergola, convolvolo, romice, ortica, poligoni, ranuncoli, potentilla, artemisia.

Modalità di impiego: Cereali (frumento, orzo, avena, segale): lt 2,5-4 per ettaro in 400-600 litri d'acqua.
Effettuare il trattamento a partire da quando la coltura ha differenziato la 3ª - 4ª foglia vera (inizio dell'accestimento), fino all'inizio della levata.
Eseguire il trattamento in giornate calde e soleggiate, con temperature superiori agli 8° C.
Il diserbo con AGHERUD DICAMBA contro determinate infestanti resistenti (camomilla, veronica, stellaria) deve essere effettuato quando queste si trovano nei primi stadi di sviluppo.
Frutticoltura: (melo): lt 5-6 per ettaro in 1200-1500 litri d'acqua.
L'ALGHERUD DICAMBA può essere vantaggiosamente usato sul melo contro convolvolo, romice, ortica, poligoni, ranuncoli, potentilla, artemisia, trattando quando le infestanti sono in plena fase vegetativa.
Contro il romice i migliori risultati si ottengono trattando in autunno.
Avvertenza: Non trattare quando il melo è in fioritura o nella prima fase post-fiorale.

Preparazione della poltiglia: Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia erbicida già preparata.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: L'AGHERUD DICAMBA per la sua particolare formulazione e lo specifico campo d'impiego non deve essere miscelato con insetticidi, anticrittogamici e con concimi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione: DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione: DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12
Registrazione nr. 0227 del 6.9.1971 del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto lt 1-5-10-20

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0246

Triamon®

CLASSE IV

Polvere bagnabile — Erbicida selettivo per il diserbo di vigneti, frutteti, oliveti, vivai di piante forestali, asparagiaie, rosai, argini di risaia.

Composizione

100 g di prodotto contengono:

50 g di Simazina (2-cloro-4,6-bis-etilammino-s-triazina) p.a. puro (100% purezza);

Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

Il TRIAMON è un erbicida selettivo per il diserbo di vigneti, frutteti, oliveti, vivai di piante forestali, rosai, argini di risaia. Il TRIAMON agisce prevalentemente per via radicale contro le infestanti annuali in germinazione e comunque ad apparato radicale superficiale, quali: erba porcellana, borsa pastore, persicaria, geranio, stellaria, farinello, veronica.

Le malerbe perenni o ad apparato radicale profondo, quali gramigna, vilucchio, romice, artemisia non sono combattibili con il TRIAMON.

Modalità d'impiego

Impiegare in coltura specializzata. Non ripetere il trattamento prima di dodici mesi, data la lunga fitotossicità residua.

Vigneti, frutteti (melo e pero), oliveti ed agrumeti: kg 4-5 per ettaro in 600-1000 litri d'acqua. Impiegare la dose più bassa nei terreni leggeri o sciolti, quella più alta nei terreni pesanti. Effettuare il diserbo in primavera presto, prima che le malerbe comincino a germinare ed a svilupparsi.

Asparagiaie (di almeno 3 anni): kg 4 per ettaro in 600-1000 litri d'acqua, effettuando il trattamento prima che emergano i turioni; kg 2 per ettaro nel trattamento dopo la raccolta.

Vivai forestali di conifere e di latifoglie: kg 2-4 per ettaro a seconda del terreno, in 600-1000 litri d'acqua. Applicare il prodotto su terreno umido, dopo il trapianto delle essenze e quando queste hanno attecchito.

Escludere dal diserbo: pioppi, betulle, frassini, tigli ed i semenzai di conifere e di latifoglie.

Prima di applicazioni estese, fare dei saggi preliminari su piccole superfici, per accertare la sensibilità delle colture da diserbare.

Rosai (impianti di almeno 3 anni): kg 3-4 per ettaro a seconda del terreno, in 600-1000 litri d'acqua. Effettuare il diserbo in primavera dopo un'accurata lavorazione del terreno.

Argini di risaia: g 5 di prodotto in lt 1 di acqua per 10 mq; in pratica corrisponde ad una sospensione di kg 0,5 di TRIAMON per 100 litri d'acqua.

Il TRIAMON è praticamente insolubile in acqua, per cui la sua efficacia erbicida si protrae a lungo. Il TRIAMON agisce prevalentemente contro le malerbe in germinazione, mentre la sua azione sulle infestanti già sviluppate è molto lenta.

Una buona sistemazione del terreno ed un suo buon contenuto in acqua facilitano l'azione del diserbante. In caso di siccità effettuare delle sarchiature molto leggere.

Non applicare il prodotto su terreni torbosi o comunque con un alto contenuto di sostanza organica.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi aggiungerlo lentamente e sotto agitazione alla quantità d'acqua necessaria.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il TRIAMON per la sua formulazione e lo specifico campo d'impiego non deve essere miscelato con insetticidi, fungicidi e concimi.

Quando il TRIAMON viene usato in miscela con diserbanti della classe I, II o III, è obbligatoria l'osservanza delle norme precauzionali prescritte per la classe superiore.

Fitotossicità

Applicato sulle colture e con le modalità consigliate il TRIAMON non è fitotossico. Non usare il prodotto su colture diverse da quelle specificate nella presente etichetta.

Rischi per la fauna utile

L'impiego del TRIAMON non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione

DU PONT CONIO SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione

DU PONT CONIO SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 0246 del [illegible] del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto 1 - 5 Kg

DU PONT CONIO SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0290

Maitox®

CLASSE II

NOCIVO

Polvere bagnabile — Specifico per la lotta contro gli acari nocivi in frutticoltura (melo e pero), floricoltura e colture ornamentali.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
25 g di Clexatim (tricicloesil idrossido di stagno) tecnico al 95-96 % di purezza, corrispondenti a 23,75-24,0 g di p. a. puro.
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
- Nocivo per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Informazioni per il medico
SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
Cefalea occipitale continua o parossistica - ronzii auricolari - iperacusia - vertigini - rachialgia - dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra - ritenzione urinaria - insufficienza respiratoria e di circolo - interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie o paralisi) - dermatosi.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO
Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando — in relazione alla via di contaminazione — abluzioni cutanee, lavanda gastrica somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza.
Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale - terapia sintomatica.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 0290 del 16.9.71 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO — Contenuto 1 kg

Caratteristiche
Il MAITOX è particolarmente efficace contro le larve e gli adulti di molte specie di acari fitofagi.
Anche i ceppi resistenti ai tradizionali acaricidi fosforganici e cloroderivati sono sensibili al MAITOX.
Persistenza e prolungata durata d'azione del prodotto assicurano la protezione delle colture per lungo tempo.

Modalità d'impiego
Dose per 100 litri d'acqua: g 100-150.

Frutticoltura (melo e pero): contro il ragno rosso (Panonychus ulmi). Trattare alla prima comparsa degli acari sulle foglie, impiegando la dose minima consigliata. In caso di forti attacchi elevare la dose d'impiego fino a quella massima consigliata.

Floricoltura e colture ornamentali: (garofani, rose in pieno campo): contro il ragno rosso (Panonychus ulmi).
Poiché il MAITOX agisce per contatto, è necessario trattare con la massima cura, bagnando bene le piante ed impiegando un quantitativo di poltiglia sufficiente ad una omogenea distribuzione del prodotto, che per agire deve raggiungere anche la pagina inferiore delle foglie.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
Il MAITOX è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
E' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0319

[illegible] anticrittogamico misto colorato, dotato di persistenza, di proprietà attivanti la formazione e l'accumulo di clorofilla nelle foglie e di potere coprente.

Campi d'impiego e dosi: ogni 100 lt. d'acqua:
— **Vite:** peronospora, antracnosi, gr. 300-400
— **Pomacee:** ticchiolatura, septoria, ruggine, alternaria gr. 300-400
— **Pomodoro fino alla prima fioritura:** peronospora, alternariosi, septoria antracnosi gr. 300

Divieto d'impiego: divieto d'impiego in serra. Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Epoche d'impiego: usare il prodotto a scopo preventivo, a seconda del calendario d'incubazione delle malattie.

Modalità d'impiego: bagnare bene le colture da proteggere e ripetere i trattamenti ad ogni necessità. Si consiglia di aggiungere, ogni 100 litri di miscela, g. 100 di bagnante ASTROL.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura. Su alcune varietà di melo e pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia pertanto l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. **Cultivars di melo sensibili al rame:** Abbondanza Belfort, Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Renetta del Canada, Rome Beauty (Morgenduft), Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap. **Cultivars di pero sensibili al rame ed allo Zineb:** Abate Fêtel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Passacrassana, Trionfo di Vienna, Butirra Estiva, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Giardina, Kaiser, Mora, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, William, William precoce. Sulle nuove varietà o sulle varietà locali di melo e di pero, prima dell'applicazione a pieno campo, saggiare la selettività del formulato su alcune piante.

Nocività a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima della raccolta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti:-ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AMPELOSAN® R BLU

FUNGICIDA CUPRORGANICO

Composizione:

ZINEB puro		gr. 13
RAME METALLO (sottoforma di Ossicloruro) puro . . .		gr. 30
Coformulanti	. q.b. a	gr. 100

III CLASSE

ATTENZIONE:
manipolare
con prudenza

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. fitofarmaci
Via Tolara di Sotto 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61 - 79.94.62
Telex 511046

Registrazione N. 0319
del 5-8-1971
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bologna)

Conservare il prodotto
chiuso
nel contenitore originale,
in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Conservare la confezione ben chiusa • Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto • Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua • Non operare contro vento • Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti • Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi d'intossicazione: *l'ingestione provoca nausea - conati di vomito - sonnolenza - turbe nervose - bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).*

Terapia: *Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.*

Controindicazioni: *alcool, olii, grassi.*

AVVERTENZA: *consultare un Centro antiveleni.*

In caso di ingestione di Zineb può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz ed anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in Centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 1

Turcan® S

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA!

Polvere bagnabile — **Erbicida per il diserbo del mais e del sorgo.**

Composizione

100 g di prodotto contengono:

25 g di Atrazina (2-cloro-4-etilammino-6-isopropilammino-s-triazina) p.a. puro (100% purezza);

37,5 g di Simazina (2-cloro-4,6-bis-etilammino-s-triazina) p.a. puro (100% purezza);

Bagnanti, disperdenti od inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
— Conservare la confezione ben chiusa
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
— Non operare contro vento
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

Il TURCAN S è un erbicida per il diserbo del mais e del sorgo. Agisce per contatto e per assorbimento radicale contro le più dannose malerbe annuali monocotiledoni e dicotiledoni, quali: giavone, setaria, digitaria, poe, borsa pastore, erba morella, amaranto, farinello, persicaria, stellaria, mercorella.

Modalità d'impiego

Dose d'impiego: 4 kg per ettaro in 600-1000 litri d'acqua.

Effettuare il trattamento preferibilmente in pre-emergenza, subito dopo la semina. Quando cause impreviste rendono impossibile il trattamento subito dopo la semina, il diserbo si può fare anche più tardi, prima però della nascita del mais.

Una buona sistemazione del terreno ed un suo buon tenore in acqua facilitano l'azione diserbante del prodotto ed assicurano un ottimo risultato.

In caso di siccità, non verificandosi piogge entro le due settimane dal diserbo, occorre intervenire con delle opportune irrigazioni.

Non effettuare il diserbo su terreni torbosi o comunque molto ricchi di sostanza organica.

Le malerbe ad apparato radicale rizomatoso ed in genere quelle perenni (vilucchio, gramigna, sorgo selvatico), nonché il giavone americano, non sono combattibili con TURCAN S.

Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi aggiungerlo lentamente e sotto agitazione alla quantità d'acqua necessaria.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

Il TURCAN S per la particolare formulazione e lo specifico campo d'impiego non deve essere miscelato con insetticidi, fungicidi e concimi.

Quando il TURCAN S viene usato in miscela con diserbanti della classe I o II è obbligatoria l'osservanza delle norme precauzionali prescritte per la classe superiore.

Fitotossicità

Applicato sulle colture e con le modalità consigliate, il TURCAN S non è fitotossico.

Rischi per la fauna utile

L'impiego del TURCAN S non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione

AMONN FITOCHIMICA SPA - Bolzano

Officina di produzione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

Registrazione n. 0342 del [illegible] del Ministero della Sanità.

Contenuto 5-10 kg.

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0343

Chelamon®

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA!

Per prevenire e curare la clorosi ferrica delle piante.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
17 g di chelato di ferro della monoammide dell'acido etilen diamin-bis-ortoidrossifenilacetico (al 100% di purezza), contenente il 12% di Fe^{++} e corrispondente complessivamente a 2 g di Fe^{++};
16 g di Fe^{++} sotto forma di solfato ferroso tetra ed eptaidrato;
Bagnanti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
— Conservare la confezione ben chiusa
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
— Non operare contro vento
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Il CHELAMON è un chelato di ferro, solubile in acqua. Il prodotto è ineccepibilmente stabile fino a valori di pH 9. Il prodotto viene utilizzato anche in terreni calcarei. Il ferro inorganico del prodotto può essere riattivato, per cui si ha, in molti casi, un'azione residua più lunga ed efficace.

La clorosi ferrica:
Il ferro è indispensabile per la formazione della clorofilla e di sostanziali enzimi respiratori delle cellule. Mancando il ferro nel terreno, oppure non essendone possibile l'assorbimento da parte della pianta, questa stenta a svilupparsi, le foglie apicali ingialliscono, la pianta stessa si indebolisce e può addirittura morire. Le nervature delle foglie rimangono verdi, mentre la superficie rimanente ingiallisce. Le giovani foglie sono le più sensibili.
Svariate cause provocano la clorosi ferrica:
— Insufficiente disponibilità di ferro nel terreno - eccesso di calcio nel terreno (pH molto alto) - lunghi periodi di pioggia e conseguente solubilizzazione del calcio del terreno che blocca il ferro (idrossido di ferro) - umidità stagnante nel terreno - mancata aereazione nel terreno.

Modalità d'impiego
Piante da curare:
Le seguenti piante sono particolarmente sensibili alla carenza di ferro:
Fruttiferi: melo cotogno, melo, pero, pesco, susino, albicocco, agrumi in genere, vite.
Fiori: garofano, rosa, azalea, camelia, gardenia, ortensia, crisantemo, gladiolo.
Piante ornamentali: magnolia, molte specie di latifoglie, conifere.

Periodo d'impiego:
Il periodo migliore d'impiego per l'applicazione del CHELAMON è la primavera, fino al mese di giugno compreso. Gli agrumi vengono trattati anche in autunno. **Prevenire la carenza è senz'altro meglio che curarla. Bisogna trattare le piante anche nel secondo e terzo anno per evitare una rinnovata manifestazione della carenza stessa.**

Dosi d'impiego - Frutticoltura:

Alberelli da vivaio	g 6- 10
Piantonai	g 15- 25
Alberi giovani	g 40- 50
Alberi adulti	g 100-150
Alberi gravemente clorotici	g 200
Fiori ed altre specie ornamentali	g 1
— Viticoltura:	g 30- 50

Consigli pratici di applicazione:
La quantità di prodotto calcolata, determinata in base alla dose prescritta, viene disciolta in 10-20 litri d'acqua (a seconda delle dimensioni della pianta e la natura del terreno) e resa disponibile all'apparato radicale della pianta. Questo può avvenire in diversi modi:
a) facendo diversi buchi (4-10) attorno alla pianta e cioè all'estrema proiezione della chioma: versare la soluzione e chiudere i buchi;
b) con un palo iniettore collegato ad una pompa. Si fa un certo numero di iniezioni nella zona delle radici attive;
c) si fa un solco di fianco ai filari del fruttiferi (vite, melo a palmetta), si immette la soluzione e si chiude il solco.
Se possibile conviene irrigare abbondantemente dopo l'immissione del prodotto nel terreno. L'effetto del prodotto si manifesta in 10-20 giorni. Non innaffiare con la soluzione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
Per il suo particolare impiego, il CHELAMON deve essere usato da solo.

Fitotossicità
Applicato sulle colture e con le modalità consigliate, il CHELAMON non è fitotossico.

Rischi per la fauna utile
L'impiego del CHELAMON non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Intervallo di sicurezza
Poichè il CHELAMON viene applicato direttamente al terreno, il suo impiego può essere effettuato anche in prossimità della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 0343 del 23.11.74 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto 0,5-1-5 kg

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0362

Bagnante Amonn

CLASSE IV

Bagnante liquido

L'uso del bagnante nelle poltiglie antiparassitarie è nella maggior parte dei casi indispensabile per una lotta progredita.

Composizione

100 g di prodotto contengono:

20 g di nonilfenolpoliglicoletere con circa 8 gruppi di ossido di etilene al 100% di purezza;

Acqua quanto basta a 100 grammi.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici

— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua

— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

Con l'uso del BAGNANTE AMONN si aumenta l'efficacia dei fitofarmaci in quanto si ottiene un'uniforme distribuzione della sostanza attiva; si ha inoltre un risparmio di antiparassitari e una rapida e completa penetrazione della poltiglia irrorata nelle colonie dei parassiti.

Modalità d'impiego

25 cc per hl di poltiglia anticrittogamica;
50 cc per hl di poltiglia insetticida o acaricida.

Il BAGNANTE AMONN va aggiunto alle poltiglie già pronte per l'uso. E' superflua l'aggiunta del BAGNANTE AMONN ai prodotti già dotati di buona bagnabilità.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

Quando il BAGNANTE AMONN viene usato in miscela con prodotti della classe I, II o III è obbligatoria l'osservanza delle norme precauzionali prescritte per la classe superiore.

Fitotossicità

Applicato con le modalità e le dosi consigliate, il BAGNANTE AMONN non è fitotossico.

Rischi per la fauna utile

L'impiego del BAGNANTE AMONN non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Intervallo di sicurezza

Osservare l'intervallo di sicurezza indicato per i principi attivi ai quali il prodotto viene aggiunto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 0362 del 22.11.71 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto 1 lt

DU PONT

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0472

Cyclanite®

CLASSE IV

Polvere bagnabile

Diserbante selettivo del frumento, per la lotta contro coda di volpe, poe, loglio, spica venti ed altre graminacee.

Composizione

100 g di prodotto contengono:

31,2 g di Dichlobenil (2,6-diclorobenzonitrile) tecnico al 90% di p.a. puro;

11,2 g di Monolinuron [N'-(4-clorofenil)-N-metossi-N-metilurea] tecnico al 94% di p.a. puro;

Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici

— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua

— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

L'azione diserbante del CYCLANITE assicura non solo la distruzione dell'Alopecurus e di altre graminacee, ma anche l'eliminazione di infestanti annuali a foglia larga, evitando così, nella maggior parte dei casi, un trattamento complementare con erbicidi ormonici o diserbanti gialli.

Il CYCLANITE ha consentito di ottenere incrementi di produzione che variano da 4-5 q.li per ettaro fino a raggiungere i 25 q.li/ha nei casi di fortissima infestazione di Alopecurus.

Modalità d'impiego

Dose d'impiego: 4 kg/ha usando almeno 600 lt d'acqua per ettaro in caso di frumento non ancora accestito e poco infestato e non meno di 1000 lt d'acqua in caso di forte infestazione e frumento già sviluppato.

Epoca del trattamento (stadi vegetativi)

— il trattamento è possibile dallo stadio di 5ª-6ª foglia fino alla fine dell'accestimento del frumento. Scegliere il momento più adatto in funzione dello sviluppo delle infestanti da combattere, che dovranno essere in linea di massima negli stadi giovanili;

— non trattare quando l'Alopecurus ha superato i 3-4 culmini di accestimento;

— per combattere i Lollum trattare prima che le piantine abbiano più di 3-4 foglie;

— le Poe e l'Agrostis possono essere combattute anche quando hanno differenziato 4-5 culmi di accestimento.

Raccomandazioni importanti

— Trattare soltanto varietà di grano tenero;

— impiegare il prodotto solo su terreni di medio impasto o pesanti, escludendo in modo categorico i terreni leggeri;

— trattare soltanto frumenti sani, densi e vigorosi; non trattare frumenti che hanno sofferto per il gelo o attacchi parassitari (mosca dei cereali, elateridi), o frumenti troppo diradati;

— non trattare con tempo gelido o su terreno coperto di neve;

— non effettuare lavori colturali nei 15 giorni che precedono o seguono il trattamento;

— verificare l'esattezza di erogazione della pompa distributrice;

— regolare gli ugelli (getti) in modo da ottenere gocce grosse; irrorare con bassa pressione.

Apporto d'azoto compatibile

— L'apporto di 60-90 unità d'azoto/ha è consigliabile; questo apporto di azoto può essere effettuato indifferentemente prima, dopo o nello stesso giorno del diserbo.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi aggiungerlo lentamente e sotto agitazione alla quantità d'acqua necessaria.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

Per la sua formulazione e campo d'impiego, il CYCLANITE non deve essere miscelato con altri fitofarmaci.

Il CYCLANITE può essere tuttavia usato in miscela con WUXAL o con concimi liquidi a base di Urea e di Nitrato ammonico; è necessario soltanto disporre di un'attrezzatura che assicuri un'agitazione sufficiente della poltiglia diserbante. La miscela di sola Urea con CYCLANITE è sconsigliabile.

Fitotossicità

Applicato sulle colture e con le modalità consigliate il CYCLANITE non è fitotossico. Non usare il prodotto su colture diverse da quelle specificate nella presente etichetta.

Rischi per la fauna utile

L'impiego del CYCLANITE non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 0472 del 4.12.74 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto 1-5 kg.

® Marchio registrato dalla N. V. Philips.Duphar - Amsterdam

0473

Agherud® MCPA

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA!

Liquido miscibile — **Erbicida selettivo per il diserbo del grano, del riso e dei prati.**

Composizione

100 g di prodotto contengono:

30 g di MCPA (acido-4-cloro-2-metilfenossi-acetico) p.a. puro (100% purezza), sotto forma di sale sodico e potassico;
Tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
— Conservare la confezione ben chiusa
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
— Non operare contro vento
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

L'AGHERUD MCPA è un erbicida selettivo per il diserbo dei cereali in genere (grano, riso, avena, orzo). Viene assorbito prontamente dalle erbe infestanti, per cui non è dilavato dalla rugiada o dalla pioggia.

L'AGHERUD MCPA è efficace contro le infestanti dicotiledoni in genere, quali: ranuncolo, canapaccia, borsa pastore, ortica, papavero, vecce. L'AGHERUD MCPA ha inoltre una buona efficacia contro: cirsio, senape, ravanello selvatico, fiordaliso, atriplice, poligonacee, alisma, scirpus.

Modalità d'impiego

Grano. Litri 3-5 per ettaro in 200-600 litri d'acqua (a seconda della attrezzatura usata).

Effettuare il trattamento in primavera, quando la coltura si trova nello stadio vegetativo compreso fra la 5ª foglia vera e la levata.

Non diserbare con temperature inferiori ai 12° C.

Per il frumento consociato con leguminose foraggere (trifoglio o medica), il trattamento con AGHERUD MCPA deve essere fatto 15 giorni prima della semina della leguminosa.

Riso. Litri 2-4 per ettaro in 200-600 litri d'acqua. Eseguire il diserbo quando il riso ha già finito l'accestimento e prima che nel culmo si formi l'ingrossamento dovuto alla spiga.

Non è necessario dare l'asciutta totale nella risaia; è sufficiente abbassare il livello dell'acqua fino a far emergere la maggior parte delle erbe infestanti.

Il volume di acqua per ettaro non ha influenza sull'efficacia del prodotto, purchè esso venga distribuito con uniformità. Può essere quindi applicato con atomizzatori.

Trattare preferibilmente in giornate calde e non piovose e con temperature non inferiori a 12° C.

N.B. L'azione sul terreno da parte dell'AGHERUD MCPA può persistere fino a 6 mesi.

Preparazione della poltiglia

Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia diserbante già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

L'AGHERUD MCPA per la particolare formulazione e campo d'impiego non deve essere miscelato con insetticidi, fungicidi e con concimi.

Quando l'AGHERUD MCPA viene usato in miscela con diserbanti della classe I o II è obbligatoria l'osservanza delle norme precauzionali prescritte per la classe superiore.

Fitotossicità

L'AGHERUD MCPA non è fitotossico per i cereali (frumento e riso). Data la fitotossicità del principio attivo per l'erba medica e per il trifoglio, nel caso di trasemina di queste foraggere nella coltura del grano, effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina.

Rischi per la fauna utile

L'impiego dell'AGHERUD MCPA non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 0473 del 22.11.71 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto 1-5 lt

DU PONT

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0497

® ARESIN

(polvere bagnabile)

DISERBANTE SELETTIVO A BASE DI MONOLINURON

COMPOSIZIONE: Monolinuron [N-(4-clorofenil)-N'-metossi-N'-metilurea] puro g 47,56, coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Roussel-Hoechst Agrovet S.p.A.

20100 Milano - Casella Postale 1847

Officina di formulazione HOECHST AG
Hoechst, Francoforte s/Meno (Germania Occ.)
Officina di confezionamento SICOPA Snc
Pianello Val Tidone (PC)

Registrazione n. 0497 del 3.8.1973 del Ministero della Sanità

® Marchio registrato della Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s. Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s. Meno

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

- **Patata:** ARESIN si impiega in pre-emergenza prima che le piantine della patata spuntino attraverso il terreno, alla dose di kg 2-2,5 per ettaro in 400-600 litri d'acqua. L'eventuale rincalzatura deve essere effettuata prima che le piantine siano emerse o al più tardi quando il 10-20% delle stesse siano fuoriuscite dal terreno. Mediante tale rincalzatura le patate emerse vengono nuovamente ricoperte con il terreno e subito dopo, quando questo è ancora fresco, si effettua il diserbo. L'azione erbicida di ARESIN è più persistente in terreni dove non si eseguono lavorazioni al terreno dopo il trattamento. Il diserbo con ARESIN sulla patata, con conseguente limitazione delle lavorazioni meccaniche, diminuisce sensibilmente gli attacchi di virus. Anche la raccolta meccanica è di molto facilitata su colture diserbate con ARESIN.
- **Vite:** ARESIN si impiega alla dose di kg 5-8 per ettaro in 400-600 litri d'acqua per un trattamento sull'intera superficie. Spesso in pratica si esegue un trattamento limitato agli spazi sottostanti ai filari di vite, riducendo in proporzione la dose d'impiego. Il momento più favorevole è la primavera (spesso in coincidenza con il rigonfiamento delle gemme), dopo una lavorazione al suolo a mano o meccanica, possibilmente su terreno fresco e ben sminuzzato.
- **Erba medica di vecchio impianto:** ARESIN si impiega alla dose di kg 1-1,5 per ettaro in 400-600 litri d'acqua, effettuando l'applicazione in autunno dopo l'ultimo sfalcio; kg 0,7-1,2 per ettaro in 400-600 litri d'acqua, effettuando l'applicazione a fine inverno poco prima del risveglio vegetativo della medica.
- **Asparago:** il trattamento si effettua sul terreno già sistemato prima della fuoriuscita dei turioni. La dose d'impiego è di kg 1-2 per ettaro in 400-600 litri d'acqua.

Le dosi d'impiego per ettaro variano con la composizione del terreno: quella minima è valida per terreni leggeri, sabbiosi o moderatamente dotati di sostanza organica, quella massima per terreni pesanti o ricchi di sostanza organica. L'effetto erbicida è sempre in stretta relazione al perfetto livellamento e sminuzzamento della superficie del terreno e allo stato di umidità di quest'ultimo.
Una leggera pioggia dopo il trattamento favorisce l'azione del diserbante. Evitare però eccessivi apporti di acqua che, come le violente precipitazioni dopo il trattamento, possono arrecare danni alle colture. Preparare accuratamente il letto di semina. Seminare uniformemente ed il più profondo possibile in relazione alla specie coltivata.
ARESIN si irrora con le normali pompe a medio ed alto volume comunemente usate per il diserbo avendo cura di impiegare ugelli a getto sottile ed uniforme. Per la preparazione della poltiglia non occorrono accorgimenti particolari. Nel caso di pompe provviste di agitatore meccanico si può versare il prodotto direttamente nel serbatoio previamente riempito per due terzi del quantitativo d'acqua richiesto, aggiungendo quindi il rimanente. Per gli altri tipi di pompe stemperare prima il prodotto in poca acqua ed agitando energicamente aggiungere il volume richiesto.

CARATTERISTICHE

ARESIN è un diserbante selettivo specifico per la distruzione delle specie erbacee annuali infestanti le colture di patate e vite. ARESIN esplica la sua azione per via radicale e per via fogliare.
In base alle nostre attuali conoscenze ed in condizioni pedoclimatiche normali (terreno di medio impasto, sufficientemente umido, ben lavorato e sminuzzato nello strato superficiale, in ambiente mediamente piovoso) ARESIN combatte: giavone, setaria, amaranto, digitaria, farinello, persicaria, erba porcellana, camomilla, veronica, senape, mercorella, galinsoga, borsa pastore, erba morella, erba paperina, piantaggine, falso convolvolo, euforbia.
ARESIN alle dosi selettive per le colture, non combatte le erbe perennanti ad apparato radicale bulboso, profondo e rizomatoso, tipo: convolvolo, sorghum halepense, gramigna, cipollino, cardo campestre, equiseto, soffione.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

ARESIN secondo le nostre attuali cognizioni non è miscibile con gli insetticidi e gli anticrittogamici ora in commercio. E' invece miscibile con la maggor parte dei diserbanti attualmente in commercio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

ARESIN alle normali dosi d'impiego, esplica la sua azione fitotossica verso le malerbe per un periodo sufficientemente lungo (2-3 mesi) e comunque tale da consentire alle essenze coltivate di crescere per la quasi totalità del loro ciclo vegetativo senza la concorrenza delle infestanti.
Le colture che nella rotazione seguono dopo il periodo indicato non risentono alcun danno. Non trattare in giornate eccessivamente calde o soleggiate. Eseguire il diserbo in giornate poco ventilate.
Evitare superdosaggi o sovrapposizioni durante i trattamenti. Dopo il trattamento non effettuare per qualche tempo lavorazioni sulla superficie irrorata. Negli impieghi in pre-emergenza non irrorare su terreno secco nello strato superficiale.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GL' USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

1.1184 Kg

0507

Fungicida organico in polvere bagnabile ad azione preventiva e curativa per la difesa dei fruttiferi, vite, colture floreali ed ornamentali.

Si impiega in trattamenti liquidi contro Ticchiolatura, Oidio e Gloeosporium del melo, del pero e del nocciolo, Botrytis ed Oidio della vite; Oidio, Monilia e Ticchiolatura delle pesche, susine e albicocche; Oidio o Mal bianco, Botrytis, Sclerotinia, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi, Fusariosi e Verticillosi di colture floreali, Corineo del cipresso e Ceratociste del platano.

COMPOSIZIONE		
- Tiofanato metile (*) puro	g	70
- Coadiuvanti ed Inerti: quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano
(*) Sostanza attiva orig. NIPPON SODA Co. Ltd. (Tokyo - Giappone)

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - S.p.A. - Viale Gian Galeazzo,3 - Milano
Officina di produzione :
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III
ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Registrazione n. 0507 del 5-8-1971 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare o non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale.

FRUTTIFERI

Pomacee : Ticchiolatura ed Oidio del melo; Ticchiolatura del pero :
- trattamenti pre-fiorali e primi post-fiorali : g 70-100
- trattamenti post-fiorali successivi : g 50-60

Effettuare trattamenti distanziati di circa una settimana, specie durante la fase primaverile delle infezioni di Ticchiolatura, allargando il ritmo dei trattamenti successivamente. Il prodotto può essere usato in trattamenti curativi entro 60-72 ore dall'inizio delle piogge infettanti o in trattamenti bloccanti contro macchie già manifeste di Ticchiolatura. In tali trattamenti usare le dosi massime fra quelle sopra consigliate. Con piante aventi limitata crescita vegetativa usare sempre le dosi massime con abbondante miscela ed in intervalli ravvicinati fra i trattamenti. Trattamenti ripetuti riducono le popolazioni di acari parassiti (es. Ragnetti rossi).

Gloeosporium del melo e del pero : g 60-70 - Effettuare un trattamento con abbondante miscela per pianta 2-3 settimane prima della raccolta, al più tardi ai primi di settembre.

Gloeosporium ed altre infezioni di magazzino: per la protezione dei frutti dopo la raccolta - Effettuare i trattamenti per immersione o per irrorazione con idonea attrezzature ed in ambienti attrezzati con sistemi che garantiscano la tutela degli operatori e dell'ambiente effettuando i trattamenti entro una settimana dalla raccolta; impiegare il prodotto alla dose di 75-150 g/hl di acqua assicurandosi che il contatto tra la poltiglia e i frutti sia di 20-30 secondi.

Le mele e le pere trattate possono essere messe in commercio dopo almeno 15 giorni dal trattamento.

Drupacee : Monilia o Sclerotinia dell'albicocco : g 60-70 - Effettuare un trattamento all'inizio ed una alla fine della fioritura con ulteriori applicazioni in caso di stagione favorevole alla malattia.

Oidio, Ticchiolatura e Monilia del pesco, susino e albicocco : g 60-70 iniziare precocemente gli interventi, specie per la lotta contro l'oidio, mentre contro la Ticchiolatura e la Monilia iniziare dopo la fioritura e ripetere i trattamenti secondo l'andamento stagionale. Usare prodotti specifici contro la Vaiolatura o Gommosi o la Ruggine.

VITE

Botrytis ed Oidio dell'uva : g 70 - Effettuare applicazioni in fioritura, prima della chiusura del grappolo e successivamente ad intervalli di 3 settimane circa fino a 2-3 settimane dalla vendemmia, allargando od avvicinando il ritmo dei trattamenti secondo l'andamento più o meno favorevole allo sviluppo della malattia. Contro l'Oidio integrare la difesa con opportune somministrazioni di zolfi polverulenti o di zolfi bagnabili addizionati ai normali trattamenti antiperonosporici. Gli eventuali residui del prodotto sulle uve trattate anche in prossimità della vendemmia non disturbano il normale andamento della fermentazione.

Nota : il prodotto non è attivo contro la Peronospera della vite, che va combattuta mediante irrorazione dei comuni prodotti antiperonosporici, secondo i normali calendari dei trattamenti usati in zona.

NOCCIOLO

Gloeosporium delle gemme : g 150 con uno o due interventi ad un intervallo di 20-25 giorni tra di loro in autunno (settembre-ottobre) all'inizio delle cadute delle foglie con una accurata bagnatura della pianta, specialmente degli apici vegetativi.

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI

Fiori : Botrytis ed Oidio : g 60-70 - Per la lotta contro la Botrytis iniziare i trattamenti con l'inizio della fioritura e ripeterli ad opportuni intervalli, distribuendo per ogni trattamento almeno 1- 1,5 Kg di prodotto per ettaro di superficie trattata, se si usano pompe a basso volume o. acqua. Impiegare la dose per ettaro maggiore fra quelle indicate, in caso di stagione favorevole allo sviluppo della Muffa grigia. Per la lotta contro l'Oidio iniziare i trattamenti precocemente e ripeterli secondo l'andamento delle infezioni crittogamiche.

ROSA E PIANTE ORNAMENTALI

Oidio : g 60-70 - Iniziare i trattamenti alla prima comparsa [illegible] cessità. Contro la Ruggine e la Malattia delle macchie n[illegible] cifico.

GLADIOLO, TULIPANO ED ALTRE BULBOSE:

Marciume dei bulbi : fare il bagno dei bulbi prima dell'[illegible] ne a 750-1000 g/hl per la durata di 15-30 minuti. In ca[illegible] ti alla dose di 70-100 g/hl contro la Botrytis e Fusario[illegible] cifici contro malattie varie non controllate dal prodotto.

GAROFANO

Verticillosi e Fusariosi: g 1,5-2/mq - Distribuire il procc[illegible] colture, sciolto in 5-10 litri di acqua per metro quadrato [illegible] inizino le infezioni di tali crittogame. Ripetere il trattam[illegible] valli, specie per colture a lungo ciclo colturale e partico[illegible] stagionali più favorevoli allo sviluppo di tali malattie. Pe[illegible] stanziate od a buche si possono fare anche trattamenti l[illegible] alle buche, con l'avvertenza di distribuire sempre il prod[illegible] cate per metro quadrato di superficie effettivamente trat[illegible] mento interessi tutto l'apparato radicale di ogni coltura, [illegible] ficiente quantità di acqua, onde far penetrare il prodotto [illegible] le radici assorbenti. Una disinfestazione pre-trapianto d[illegible] matocidi riduce il numero dei parassiti che facilitano l'e[illegible] le radici e permette di ottenere una più completa efficac[illegible] cosi.

CIPRESSO E PLATANO

Cancro o Corineo del cipresso : g 100-150 - Intervenire [illegible] fino novembre e 2-3 volte da aprile a metà giugno con c[illegible] viene inoltre ripetere i trattamenti dopo ogni potatura.

Ceratociste del platano : trattare le superfici dei tagli di [illegible] di prodotto alla dose di g 150 ; nel caso si usino mastici [illegible] te di potatura o di altro genere aggiungere il prodotto all [illegible] evitare che la segatura di piante malate possa infettare so[illegible]

Preparazione della poltiglia : stemperare il prodotto in p[illegible] versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di [illegible] curatamente.

Avvertenza : l'impiego del prodotto è consentito solo in [illegible] indicate in etichetta.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto non è compatibile in miscela c[illegible] me Polisolfuri, Poltiglia bordolese, Calce. E' miscibile co[illegible] cassitari di impiego primaverile-estivo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve es[illegible] do di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate l[illegible] prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificasser[illegible] informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura ne[illegible] consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali dann[illegible] da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale [illegible] cia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle pe[illegible]

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso 25 Kg.

Soc. p. Azioni
SIPCAM
Soc. It. Prod. Ch. e per l'Agricoltura - Milano

0529

Combamon®

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Liquido miscibile — **Diserbante ormonico selettivo per i cereali**

Composizione
100 g di prodotto contengono:
31 g di 2,4-D p. a. puro; (da sale dimetilamminico);
25 g di MCPA p. a. puro; (da sale dimetilamminico);
Solventi: quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
— **SINTOMI D'INTOSSICAZIONE**
Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.
— **CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO**
Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.
— **CONTROINDICAZIONI**
E' sconsigliata la digitale.

Modalità d'impiego
Dosi per ettaro contro le più comuni infestanti dei campi di grano e delle risaie (matricaria, papaveri, ranuncoli, quadrettone, alisma, vilucchio, stoppione).
Frumento: litri 0,75-1,5 per ettaro tra la fine dell'accestimento e l'inizio dello stadio di botticella.
Riso: litri 0,3-0,5 per ettaro tra l'emissione della quinta foglia vera e l'inizio dello stadio di botticella.

Preparazione della poltiglia
Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
Il COMBAMON per la sua formulazione e lo specifico campo d'impiego non deve essere miscelato con altri prodotti.

Fitotossicità
Evitare che la poltiglia diserbante venga a contatto con colture sensibili, quali fruttiferi, pioppi, ortaggi, per le quali è dannoso.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DIACHEM SPA - Stabilimento di Albano S. Alessandro (BG)

Reg. n. 0529 dell'8.5.1973 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto lt 1 - 10

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0555

MEFLAN®

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile Erbicida per il diserbo in viticoltura e frutticoltura (melo e pero), olivicoltura, agrumicoltura, erba medica, strade, piazze, aree industriali ed argini di risala.

Composizione 100 g di prodotto contengono:
26,3 g di Simazina (2-cloro-4,6-bis-etilammino-s-triazina) tecnica al 95% di purezza, pari a 25 g di p.a. puro.
25,0 g di Dichlobenil (2,6 diclorobenzonitrile) tecnico al 90% di purezza, pari a 22,5 g di p.a. puro.
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione e i caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche: Il MEFLAN è un erbicida di pre- e post-emergenza, specifico per la lotta contro infestanti dicotiledoni che si riproducono per seme e per rizomi, e contro graminacee.
Le proprietà erbicide delle due sostanze attive che si completano a vicenda e la selettività per le colture, permettono l'impiego del MEFLAN in viticoltura, frutticoltura (melo e pero), olivicoltura, agrumicoltura ed erba medica.
Poiché le sostanze attive del MEFLAN non vengono traslocate in senso trasversale, il prodotto può essere impiegato anche per la lotta contro le infestanti degli argini di risaia
Il MEFLAN trova impiego inoltre nel diserbo totale di piazze, strade, campi sportivi ed industriali.

Modalità d'impiego Diserbo selettivo (Viticoltura, frutticoltura - melo - pero - olivicoltura, agrumicoltura): Kg 15-20 in 600-1000 litri d'acqua.
Effettuare il trattamento in primavera prima o durante la ripresa vegetativa o al più tardi all'inizio dello sviluppo delle infestanti.
Usare la dose più alta in terreni più ricchi di sostanza organica o molto infestati da graminacee e da altre malerbe difficili da combattere.
Una buona umidità del terreno o una leggera pioggia dopo il trattamento migliorano sensibilmente l'efficacia del prodotto.
Nel caso di lavorazioni al terreno (aratura) si consiglia di usare il prodotto immediatamente dopo. Il MEFLAN può essere usato in viticoltura ed in frutticolture a partire dal secondo anno d'impianto.
L'efficacia del prodotto si protrae per almeno 6 mesi a seconda del periodo d'impiego e del dosaggio.

Erba medica: Kg. 3-4 per ettaro in 600-1000 litri d'acqua.
Il periodo utile per l'applicazione coincide con l'intero periodo di riposo vegetativo dell'erba medica (da novembre a fine gennaio). I risultati migliori si ottengono effettuando il diserbo alla fine dell'autunno, quando le infestanti si trovano ancora nei primi stadi di sviluppo.
Evitare i trattamenti nei medicai di nuovo impianto seminati dopo il mese di luglio e quelli con consociazione di altre foraggere.

Diserbo totale: (strade, piazze, aree industriali, argini di risaia): Kg. 20-25 per ettaro. L'impiego del MEFLAN su argini di risaia quale erbicida totale è di interesse particolare E' opportuno impiegare il MEFLAN subito dopo la formazione degli argini, prima che le infestanti germoglino, oppure all'inizio del loro sviluppo impiegando 600-1000 litri di acqua per ettaro
Nello stesso modo il MEFLAN può essere usato come erbicida anche su strade, piazze, campi sportivi

Periodo d'impiego: E' opportuno impiegare il prodotto prima della ripresa vegetativa, in autunno dopo la vendemmia, oppure all inizio della primavera
Dove si esegue la lavorazione del terreno in primavera o sugli argini di risaia, si consiglia di eseguire il trattamento solo dopo la lavorazione o dopo la messa a punto degli argini

Preparazione della poltiglia: Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi aggiungerlo lentamente e sotto agitazione alla quantità d'acqua necessaria.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il MEFLAN per la sua particolare formulazione e lo specifico campo d'impiego non deve essere miscelato con fungicidi, insetticidi o concimi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili, prescritte per i prodotti più tossici

Fitotossicità: Applicato sulle colture e con le modalità consigliate il MEFLAN non è fitotossico
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture (es bietole, tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi Da impiegare su colture specializzate.

Rischi di nocività: L'impiego del MEFLAN non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12
Registrazione Nr 0555 del 17.8.72 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto 1 - 5 - 10 Kg

0563

ENDOTER

POLVERE BAGNABILE INSETTICIDA SELETTIVO PER USO AGRICOLO

COMPOSIZIONE: su 100, grammi:
Endosulfan puro **gr 32,5**
Coadiuvanti e inerti q. b. a gr 100.

CLASSE I

Attenzione: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 N. 1255.

Caratteristiche: L'ENDOTER è un insetticida efficace contro insetti dannosi alle colture agricole, in particolare afidi, psille e microlepidotteri.

Natura del rischio: Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - conservare la confezione ben chiusa - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua - evitare di respirarne i vapori - non operare contro vento - evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva) in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico: Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: Vomito, diarrea, parestesia diffusa, cefalea, vertigini: astenia intensa, convulsioni.

Consigli terapeutici - Intossicazione acuta: Lavanda gastrica abbondante, somministrazione di purganti salini (25 gr di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1 - 0,2 gr) contro i tremori muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.
Controindicazione: La morfina e l'alcool, e per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina

A V V E R T E N Z A : Consultare un Centro antiveleni.
Modalità di impiego: L'ENDOTER si usa a dosi varianti da 100 a 150 gr per ettolitro di acqua contro: afidi della bietola, della patata e della fragola, psilla del pero, tentredine del melo, del pero e del susino, dorifera, della patata, altica della bietola, acaro della fragola cemiostoma pandemis e cacoecia del melo, del pero e del susino nottua della bietola, della patata e della fragola.

Preparazione: Si emulsiona la quantità occorrente in poca acqua e si versa in tutta la quantità di acqua da irrorare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: E' miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
" AVVERTENZA „ In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: Il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili, gli animali domestici e il bestiame.

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima della raccolta: « Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato ».
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. »

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a — CENTO (Ferrara) — Tel. 906207

Stabilimento di produzione:
VISPLANT CHIMIREN s.r.l. - Via Salvi n. 1 - RENAZZO (FE)

Reg. n. 0563 del 16/2/1972 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO Peso kg

0578

CLASSE II

Gasol® DD

Facilmente infiammabile

NOCIVO

Liquido miscibile — Fumigante nematocida per la disinfestazione del terreno e reimpianti di vite, pesco, agrumi.

Composizione — 100 g di prodotto contengono:
100 g di DD (50 g di 1,2-dicloropropano e 50 g di 1,3-dicloropropene) p.a. puro (100% purezza)

Natura del rischio — Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Evitare di respirarne i vapori
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua o sapone
- Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole)
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico — Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle. Veleno neurotropo: provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico - tempo di latenza: anche parecchie ore.
Sintomi neurologici: cefalee, vertigini, sonnolenza, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopie,), disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave.
Sintomi a carico dell'apparato digerente e del fegato: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero da epatite tossica.
Sintomi a carico dell'apparato respiratorio: dispnea, tosse congestione ed edema polmonare.
Sintomi a carico degli occhi e della pelle: congiuntivite irritativa, irritazione cutanea.
Sono possibili lesioni renali tossiche e conseguente coma uremico.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO:

Rimuovere immediatamente i vestiti contaminati e lavare pelle e capelli con acqua e sapone.
Può essere utile l'applicazione cutanea di creme a base di cortisonici.
Lavare gli occhi con molta acqua corrente per almeno 15 minuti.
In caso di ingestione e se non è presente vomito: praticare lavanda gastrica (dopo intubazione se il paziente è in stato di incoscienza) seguita da istillazione di 3-4 cucchiai di carbone medicinale attivato e 30 gr. di solfato di sodio o di magnesio. Terapia sintomatica
In caso di inalazione: terapia sintomatica: aminofillina (250 mg.) contro spasmi bronchiali, somministrata per via rettale o endovena; cortisonici; ossigeno se necessario; se è presente edema polmonare somministrare anche diuretici (tiazide).
Nei casi gravi è indispensabile il ricovero in centro di rianimazione.

Controindicazioni: non somministrare sedativi a base di bromo, oppiacei, adrenalina per via parenterale, alcool, sostanze lipidiche come latte e olio.

Caratteristiche — Il GASOL DD è un fumigante specifico per la lotta contro i nematodi del terreno. Combatte anche numerosi insetti terricoli, quali grillotalpa, elateridi nonchè vermi, millepiedi.

Modalità d'impiego — Preparazione del terreno. Per ottenere migliori risultati con GASOL DD è necessario lavorare, sminuzzare e spianare bene il terreno, mantenendolo in buone condizioni di umidità.
Temperature del terreno. Al momento del trattamento la temperatura del terreno a 10-12 cm di profondità non deve essere inferiore a 5°C e non superiore ai 25°C. Le condizioni migliori per il trattamento si verificano generalmente in autunno e in primavera.
Dosi d'impiego: Kg 3-4 ogni 100 mq. Eseguire il trattamento iniettando il prodotto con l'apposito palo iniettore alla profondità di 10-15 cm ed in punti distanti 30-40 cm l'uno dall'altro. Per ogni iniezione impiegare cc 2,5-3 di GASOL DD.
Al termine del trattamento rullare il terreno o bagnarlo leggermente per evitare la dispersione dei vapori.
Lavorazioni e semine. Dopo almeno due settimane dal trattamento lavorare in profondità il terreno per facilitare la completa fuoriuscita dei vapori ancora presenti nel terreno stesso e quindi procedere alla semina od ai trapianti. Prolungare a quattro settimane l'intervallo fra il trattamento e la semina o il trapianto, qualora dopo il trattamento si verifichino delle piogge consistenti. Per la disinfestazione di grandi superfici impiegare le apposite macchine fumigatrici a traino.
DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRE ED AMBIENTI CHIUSI.
Intervallo di agibilità dell'appezzamento trattato:
48 ore;
È vietato l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non addette ai lavori ed agli operatori non adeguatamente protetti durante l'intervallo di agibilità.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità — Il GASOL DD per la sua formulazione e lo specifico campo d'impiego non deve essere miscelato con altri prodotti.

Fitotossicità — Il prodotto è tossico per gli alberi e per le colture in atto. Non trattare nelle loro vicinanze.

Rischi per la fauna utile — Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Intervallo tra il trattamento e il reimpianto: 28 giorni.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione esenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 0578 del 4.12.1971 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO   Contenuto 100 kg -50-25

DU PONT
DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0584

AZITION 25

INSETTICIDA POLIVALENTE IN POLVERE BAGNABILE

Composizione su 100 grammi:
— AZINFOS-METIL puro gr. 25
— Coadiuvanti e inerti q.b. a gr. 100

CLASSE I

CLASSE I^A

VELENO

Attenzione!
Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

Caratteristiche: L'AZITION 25 è un estere fosforico perfettamente tollerato anche dalle varietà più sensibili. Non produce rugginosità alcuna.

Natura del rischio: Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inacessibile ai bambini e agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Evitare di respirarne i vapori - Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico: Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidote a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofilline, coramina, latte, olio e grassi.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO:
L'Azition 25 si usa stemperando il quantitativo richiesto in poca acqua, versando poi il resto dell'acqua fino a raggiungere la concentrazione voluta.
L'Azition 25 si impiega allo 0,1 - 0,2 (100 - 200 grammi per 100 litri di acqua) contro i seguenti parassiti:
Frutticultura: psilla del pero - carpocapsa o verme del pero e del melo - cydia e anarsia del pesco - antonomo del melo - minatrici delle foglie, capua reticulana, pandemis, cacoecia del pero e del melo.
Viticultura: tignola dell'uva - tortrici.
Floricoltura: minatrici delle foglie - tentredini - afidi in genere - bega del garofano.
Agrumicoltura: tignola - cocciniglie.
Bieticoltura: Cleono - punteruolo e altica.
Orticoltura: dorifora della patata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
L'Azition 25 è miscibile con tutti gli antiparassitari in commercio esclusi quelli a reazione alcalina (polisolfuri: poltiglia bordolese, calce).
AVVERTENZA:
« In caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta ».
Rischi di nocività:
Il prodotto a seguito dei trattamenti è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE! da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
— « Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».
— « Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali ».

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizzetti, 2/a - CENTO (Ferrara) - Tel. 90.62.07

Stabilimento di produzione:
SCAM S.r.l. - Via Bellaria n. 164 - MODENA
Registrazione N. 0584 del 21 dicembre 1971 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg. 5**

0595

Milamon®

Granulato — **Fumigante per la disinfezione e la disinfestazione in pre-semina o in pre-trapianto dei semenzai, dei letti caldi e dei terreni destinati a colture ornamentali, orticole ed industriali.**

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA!

Composizione
100 g di prodotto contengono:
100 g di Dazomet (3,5-dimetil-1,3,5,2 H-tetraidrotiadiazin-2-tione) tecnico al 99% di p.a. puro.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Il MILAMON è un fumigante specifico per la disinfezione e la disinfestazione del terreno. Agisce contro gli agenti dei marciumi radicali (Fusarium, Verticillium, Rhyzoctonia, Pythium), contro i nematodi galligeni, contro infestanti nonché contro insetti presenti al momento del trattamento.

Modalità d'impiego
Dosi raccomandate
Contro funghi del terreno, ernia del cavolo, erbe infestanti, insetti del terreno, nematodi galligeni (Meloidogyne sp.): 40-50 g/m² o rispettivamente 200-250 g/mc di terra.
Contro nematodi liberi: 30-40 g/m² o rispettivamente 150-200 g/mc di terra.
Contro nematodi incistati (Heterodera sp.), anguillule degli steli (Ditylenchus dipsaci) e anguillule delle radici: 60-70 g/m².
Per un'azione diserbante limitata agli strati superficiali del terreno: 15-20 g/m².
Le dosi indicate sono valide per una profondità di incorporamento di 20 cm. Per una disinfestazione ed una disinfezione degli strati più profondi, aumentare il dosaggio di 15-20 g/m² per ogni 10 cm di maggiore profondità. Per combattere i nematodi galligeni delle radici, impiegare il MILAMON circa 2-3 settimane dopo il raccolto della coltura, per dar modo alle radici colpite di decomporsi. L'azione diserbante del MILAMON si limita agli organi di propagazione vegetativa (rizomi, bulbi, stoloni) ed ai semi in germinazione, presenti negli strati trattati.
Non somministrare letame o calciocianamide nel periodo interessato al trattamento.
Preparazione del terreno. Lavorare bene il terreno per distruggere le erbe infestanti perenni; preparare il letto di semina o di trapianto circa 7 giorni prima del trattamento. Sminuzzare e mantenere umido il terreno per favorire la germinazione delle erbe infestanti.

Istruzioni per l'uso
Pieno campo, aiuole, cassoni.
Spargere il MILAMON in modo uniforme sulla superficie da trattare, incorporandolo subito dopo nel terreno alla profondità desiderata. Se dopo 3-5 giorni dal trattamento non si sono avute piogge, irrigare il terreno con lt 7-10 di acqua per m² di superficie.

Applicare il MILAMON con temperature superiori ai 5-6° C.
Lavorazioni e semine dopo l'applicazione.
Normalmente sono sufficienti 2-3 settimane per eliminare i residui che possono disturbare la coltura. Con temperature del terreno inferiori ai 15° C allungare il periodo di attesa.
Alcuni giorni prima della semina o del trapianto lavorare superficialmente il terreno trattato per eliminare i gas trattenuti.
Per tranquillità, prima della messa a dimora della coltura ricorrere al «test del crescione».
Serre.
Nelle serre, come pure nei cassoni, prima di impiegare il MILAMON è necessario allontanare le colture e chiudere tutte le fessure, per evitare che il gas penetri nei locali adiacenti. Diverse piante ornamentali, come il Ficus sp., l'Asparagus plumosus, sono infatti molto sensibili al Dazomet.
Per l'applicazione del MILAMON ci si regola come per i trattamenti in pieno campo, mantenendo l'isolamento della serra fino alla completa scomparsa dei gas formatisi.
Terricciati.
Incorporare bene il MILAMON nel terricciato preventivamente disteso su un foglio di polietilene in mucchi alti 20-25 cm. Preparare infine dei cumuli alti fino ad 1 m, ricoprendo il tutto con fogli di polietilene. Dopo 1 settimana rimuovere i cumuli di terricciato, facendoli arieggiare; in 2-4 settimane, a seconda della temperatura del terricciato, questo è pronto per l'impiego. Per tranquillità, anche per i terricciati ricorrere al «test del crescione».

Modalità per il trattamento
Qualora fosse necessario, aggiungere al MILAMON della sabbia secca per facilitare lo spargimento.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Il MILAMON per la sua particolare formulazione e lo specifico campo d'impiego non deve essere miscelato con altri prodotti.

Fitotossicità
Il MILAMON è fitotossico per tutte le piante in crescita. Non applicare perciò il prodotto a meno di 1,50-2 metri di distanza dalle colture in atto o da alberi e da arbusti. Dopo il trattamento arieggiare bene le serre per eliminare i vapori che si liberano dal terreno.

Rischi per la fauna utile
L'impiego del MILAMON non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12
Registrazione n. 0595 del 4.12.71 del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto 5 25-10kg

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0607

Acarion® 6-E

- CLASSE III
- ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA!

Concentrato emulsionabile — Acaricida

Composizione

100 g di prodotto contengono:

80 g di propargil [2-(p-tert-butilfenossi) cicloesil-2-propinilsolfito] tecnico all'85% di purezza, pari a 68 g di p.a. puro;

Solventi ed emulsionanti: quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

L'ACARION 6-E è un acaricida efficace contro le popolazioni di acari resistenti ai principi attivi tradizionali.

L'ACARION 6-E permette di combattere tutte le specie di fitofagi in frutticoltura, viticoltura, agrumicoltura, nonchè sulle colture industriali, orticole e floreali. In particolare l'ACARION 6-E è attivo contro: acari tetranichidi (ragno rosso, ragno giallo), eriofidi, tarsonemidi. L'ACARION 6-E permette di combattere anche gli acari nati dopo il trattamento.

Modalità d'impiego

Dosi per 100 litri d'acqua: cc 70-85.

Frutticoltura: contro i ragnetti rossi (Panonychus ulmi e Tetranychus urticae) nei periodi di infestazione iniziale: cc 70. Nel periodo estivo con forti infestazioni o contro popolazioni di acari altamente resistenti, elevare la dose a 85 cc.

Viticoltura: contro i ragnetti rossi e contro il ragno giallo della vite: cc 70-85.

Agrumicoltura: contro gli acari fitofagi (ragnetti rossi, acaro rugginoso, eriofidi): cc 70-85.

Colture industriali, orticole e floricole: contro gli acari fitofagi (ragnetti rossi, eriofidi, tarsonemidi): cc 70-85.

Preparazione della poltiglia

Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

L'ACARION 6-E è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese). La miscela con certi prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile (es. a base di Binapacryl, Dodine).

Quando l'ACARION 6-E viene usato in miscela con prodotti della classe I o II è obbligatoria l'osservanza delle norme precauzionali prescritte per la classe superiore.

Fitotossicità

NON APPLICARE IL PRODOTTO SU PERI DI QUALSIASI VARIETA'.

Rischi per la fauna utile

L'impiego dell'ACARION 6-E non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

DA NON VENDERSI SFUSO

Registrazione n. 0607 del 21.12.71 del Ministero della Sanità.

Contenuto 1 lt

DU PONT — DU PONT CONID SPA AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0633

CLASSE I^A

SECANTIN

VELENO

LIQUIDO MISCIBILE - Erbicida di contatto specifico per il diserbo in viticoltura, frutticoltura, orticoltura, floricoltura.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

17,86 g Paraquat puro (sotto forma di dicloruro)

Tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi.

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3.8.1968 n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inacessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi di acqua. — Evitare di respirarne i vapori. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi — Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di due metri e cospargendole con calce viva). — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Attenzione: i sintomi dell'intossicazione, qualunque sia la via di introduzione nell'organismo, possono non comparire subito, ma anche dopo alcuni giorni (latenza prolungata).
L'introduzione nell'organismo anche di poche gocce del prodotto può essere fatale: non attendere la comparsa dei sintomi per procedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione, perchè sia praticata l'emodialisi.
Nel frattempo, nel caso di ingestione, provocare il vomito (attenzione ad eventuali lesioni esofagee) e somministrare una sostanza adsorbente come il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, la bentonite, il caolino, la terra a follone, la terra di Fuller, ecc.
Intossicazione per ingestione e per inalazione
I primi sintomi sono : epitassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà della deglutazione, dolori nella bocca e nella gola.
Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare con positività dei tests di funzionalità respiratoria. Dopo 2-3 giorni possono comparire dispnea ed edema-polmonare con segni di lesioni epatorenali.
L'edema polmonare evolve verso una fibrosi polmonare grave, sino alla morte per insufficienza respiratoria.
L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile, non appena si abbia il sospetto della presenza di paraquat nel sangue.
Intossicazione per contatto
Occhi: forte irritazione della cornea e della congiuntiva con possibili stristure (comparsa in 12-24 ore)
Cute: irritazione con comparsa, anche molto tardiva di vescicolo.
Unghie: macchie bianche con lesioni traversali e caduta.
Terapia: sintomatica, da praticarsi esclusivamente dal medico.
In ogni caso ulteriori informazioni sulla tossicologia del paraquat e sulla terapia possono essere richieste direttamente alla società produttrice di questo presidio sanitario.

CARATTERISTICHE

Il SECANTIN distrugge la parte aerea delle malerbe, anche di quelle più resistenti (gramigna, cirsio,vilucchio, artemisia), inattivandosi dopo brevissimo tempo a contatto con il suolo.
I tessuti lignificati delle piante non vengono invece colpiti. L'assoluta mancanza di persistenza del SECANTIN permette di impiegarlo anche a brevissima distanza della semina e del trapianto.

MODALITA' DI IMPIEGO

Viticoltura, frutticoltura e superfici arborate in genere: lt 3-5 per ha a seconda del tipo di infestazione e dello sviluppo delle malerbe.
Vivai di piante arboree: lt 4-5 per ha, avendo cura di proteggere durante il trattamento le piantine con il fusto non ancora ben lignificato.
Canali, bacini, scoline, sponde di canali e corsi d'acqua: da lt. 6 a lt 14 per ettaro per il diserbo totale contro la cannuccia, carice, tyfa. Per un risultato completo ripetere il trattamento 3-4 volte nel corso dell'anno.
Luoghi incolti: da lt 4 a lt 7 per ha, a seconda della specie di malerbe da combattere, ripetendo il trattamento non appena queste si saranno riformate.
Colture orticole e floricole: limitatamente agli interfilari impiegare lt 3-5 per ha, avendo cura con opportuni accorgimenti, di non colpire le piante coltivate.
Per il diserbo in pre-emergenza, pre-semina e pre-trapianto: lt 4-5 per ha.
Il diserbo con SECANTIN deve essere effettuato quando le malerbe hanno raggiunto un certo sviluppo (almeno 5-6 cm di altezza). In caso di forti infestazioni adottare i dosaggi più alti consigliati.
Il SECANTIN deve essere distribuito con un quantitativo di acqua compreso fra 300 ed 800 lt/ha, comunque sufficiente per un'omogenea distribuzione della poltiglia diserbante ed una buona bagnatura delle infestanti.
Per l'applicazione del SECANTIN usare pompe a bassa pressione e con ugelli non sottili. È sconsigliabile l'impiego di atomizzatori.
AVVERTENZA: È vietato l'impiego diretto sui foraggi

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità di acqua necessaria o nella poltiglia diserbante già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il SECANTIN per la sua formulazione e lo specifico campo d'impiego non deve essere miscelato con insetticidi, fungicidi od altri antiparassitari. La miscela con certi diserbanti in polvere bagnabile non è consigliabile.

Avvertenza: In caso di miscele con altri erbicidi deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

L'impiego del SECANTIN deve essere evitato su piante arboree giovani, con il fusto non ancora ben lignificato (es. vivai di piante da frutto, pioppelle)

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

Registrazione n. 0633 del 21.12.1971 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto lt 10 - 1 - 5

0641

Casoron® G

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

..nuli	**Erbicida per il diserbo di vigneti, frutteti (melo e pero), oliveti, piante ornamentali, aree industriali, campi sportivi, ripe e bordi stradali**
..mposizione	100 g di prodotto contengono: 7,5 g di dichlobenil (2,6-diclorobenzonitrile) tecnico al 90% di purezza, corrispondenti a 6,75 g di p.a. puro. Coformulanti, coloranti ed inerti quanto basta a 100 grammi.
..tura ..l rischio	Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
..rme ..ecauzionali	— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici — Conservare la confezione ben chiusa — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua — Non operare contro vento — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti — Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
..ormazioni ..il medico	**In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**
..atteristiche	Il CASORON G è un erbicida efficace contro la maggior parte delle erbe infestanti annuali, biennali e perenni, anche di difficile controllo come Equiseto, Cirsio, Romice, Tarassaco. La sostanza attiva del CASORON G viene assorbita dalle radici delle infestanti. In pre-emergenza il CASORON G agisce sulle infestanti germinanti e sui rizomi. All'inizio della vegetazione le malerbe sono più sensibili all'azione del CASORON G; è inoltre molto importante distribuire tempestivamente il prodotto su terreno umido o in periodi di pioggia. Il CASORON G non agisce per via fogliare e perciò non causa alcun danno alle colture nemmeno quando investe gli organi verdi (foglie, rametti). Per la vite è consigliabile tuttavia evitare di colpire i germogli. Nei vigneti con sistema di allevamento molto basso (tipo alberello, Sylvoz), è pertanto necessario trattare prima che le gemme si gonfino. Il CASORON G può essere usato tutto l'anno in trattamenti di pre- o post-emergenza, al più tardi all'inizio dello sviluppo delle malerbe. L'epoca più favorevole per il diserbo con CASORON G è però dopo la raccolta e dopo la vendemmia e in primavera, prima o subito dopo l'inizio della vegetazione. Evitare accumuli di prodotto in vicinanza dei fusti delle piante da frutto e dei ceppi delle viti. Sono particolarmente indicati i trattamenti localizzati in forma di strisce o di aiuole.
..dalità ..mpiego	**Campi e dosi d'impiego** (vedi sotto)

Campi e dosi d'impiego

1. **Diserbo selettivo**

VITE (dopo il 4° anno di impianto)	
su terreni leggeri e sabbiosi	80-100 kg/ha
su terreni pesanti ed argillosi	100-120 kg/ha
su terreni ricchi di humus	120 kg/ha
MELO (su franco, dopo il 5° anno di impianto)	
su terreni leggeri e sabbiosi	80-100 kg/ha
su terreni pesanti ed argillosi	100 kg/ha
su terreni ricchi di humus	120 kg/ha
OLIVO (dopo il 5° anno di impianto)	
su terreni leggeri	80-100 kg/ha
su terreni pesanti	100-120 kg/ha

2. **Diserbo totale**
   Diserbo di bordi stradali, piazze da gioco, aree di fabbriche e depositi, sedi ferroviarie, spartitraffico di autostrade, argini di canali di irrigazione e drenaggio, ripe.
   Dose d'impiego: 200-250 kg/ha, a seconda della composizione botanica delle infestanti e del loro sviluppo.

3. **Diserbo localizzato**
   Lotta contro cespi di romice, tussilago. Consigliamo di distribuire 0,5 g di CASORON G nella parte centrale del ceppo. Apposite attrezzature di distribuzione facilitano il lavoro.

4. **Diserbo delle erbe acquatiche**
   L'impiego del CASORON G è consigliabile anche per l'eliminazione delle erbe acquatiche, indifferentemente se natanti o sommerse.
   Con CASORON G si possono trattare anche i canali di bonifica. Non si consiglia l'applicazione incondizionata del CASORON G nei canali di irrigazione. Il CASORON G è praticamente innocuo per i pesci, non altera il contenuto in ossigeno ed il pH dell'acqua.

Dose d'impiego: 80-150 kg/ha a seconda della profondità dell'acqua.

5. **Diserbo selettivo delle piante ornamentali**
   Cespugli ornamentali: 4-6 g/m²
   Ribes ed altri cespugli fruttiferi: 8-10 g/m²
   Fino al secondo anno di impianto prestare molta attenzione all'applicazione.
   Le aiuole di rose vanno diserbate con CASORON G solo prima della ripresa vegetativa oppure dopo lo sviluppo completo dell'apparato fogliare.

6. **Diserbo totale in parchi, giardini, viali e sentieri**
   Contro malerbe a riproduzione annuale, è sufficiente una dose di 6-8 g/m². In presenza di una flora infestante mista, con malerbe a riproduzione mediante radici e rizomi, la dose d'impiego non deve essere inferiore a 25-30 g/m².

La natura del terreno e l'andamento climatico incidono in modo determinante sui risultati ottenibili. E' indispensabile al riguardo, distribuire il CASORON G in periodi di pioggia o almeno limitarne l'uso su terreni umidi. Risulta importante, inoltre, distribuire il prodotto uniformemente e con la massima regolarità sulla superficie da trattare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità	Impiegare il CASORON G da solo. E' sconsigliabile la miscela con altri antiparassitari granulari e con concimi. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili prescritte per i prodotti più tossici.
Fitotossicità	Applicato sulle colture e con le modalità consigliate il CASORON G non è fitotossico.
Rischi di nocività	L'impiego del CASORON G non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. **Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.** **Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.** Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Titolare della registrazione	DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2
Officina di produzione	DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 0641 del 7.2.72 del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO.
Contenuto 1-5-10-20-25 kg.
® Marchio e prodotto della Philips-Duphar B.V., Amsterdam (Olanda).

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0666

TRITAN

Anticrittogamico per uso agricolo a base di Trifenilacetato di stagno

Polvere bagnabile indicato per la lotta contro la cercospora della bietola.

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:

Fentin acetato puro	gr 19
Coadiuvanti e inerti q.b. a	gr 100

Attenzione!
Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

CLASSE I

VELENO

CLASSE I

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini o agli animali domestici - conservare la confezione ben chiusa - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. - Evitare di respirarne i vapori - Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico: Nocivo per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione:
Cefalea occipitale continua e parossistica - ronzii auricolari, ipercacusia, vertigini, rachialgia, dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra, ritenzione urinaria, insufficienza respiratoria e di circolo, interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie e paralisi) dermatosi.
Consigli terapeutici:
Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando in relazione alla via di contaminazione, abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrando ossigeno o respirazione artificiale. Terapia sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Il TRITAN si usa contro la cercospora della barbabietola da zucchero alla dose di gr 200-300 in 100 litri di acqua distribuendo 600 litri di acqua per ettaro. - Si eseguono da 2 a 4 trattamenti alla distanza di 15-20 giorni l'uno dall'altro. - Si prepara stemperando la quantità richiesta in poca acqua diluendola poi in tutta l'acqua da irrorare, agitando.

DA NON APPLICARSI CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
Il *TRITAN* si può miscelare con gli insetticidi specialmente in polvere bagnabile per la lotta simultanea contro i parassiti della bietola.
Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività:
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il pesce e il bestiame.

Intervallo che deve essere rispettato fra l'ultimo trattamento e la raccolta: 45 giorni.

— « Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso ».
— « Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».
— « Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali ».

TERRANALISI s.n.c.
VIA DONIZETTI, 2/A — CENTO (FERRARA) — TEL. 906207

Stabilimento di produzione:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - OZZANO EMILIA (BO)

Registrazione n. 0666 del 17-2-1972 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO KG**

0667

ISTRUZIONI PER L'USO

Contro la Cercospora della barbabietola si impiegano Kg 1,2-1,8 di Agatal per ettaro e per trattamento, da disperdersi in circa 6 ettolitri di acqua (200-300 grammi per ettolitro).

Il prodotto svolge inoltre un'apprezzabile azione di controllo verso le Nottue della barbabietola.

Metodo di preparazione della poltiglia

Stemperare il quantitativo stabilito di Agatal in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea sufficientemente fluida ed aggiungere successivamente l'acqua rimanente sino a raggiungere la concentrazione richiesta dal mezzo irrorante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

L'Agatal non deve essere usato in miscela con prodotti liquidi emulsionabili e emulsionati.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

I CLASSE

VELENO

FUNGICIDA ORGANICO DI SINTESI IN POLVERE BAGNABILE INDICATO PER LA LOTTA CONTRO LA CERCOSPORA DELLA BARBABIETOLA

COMPOSIZIONE

Fentin idrossido	g 18
Adesivi, bagnanti, coloranti e inerti q. b. a	g 100

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento **BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. - Treviglio (BG)**

Registrazione Ministero della Sanità n. 0667 del 6-6-1972

® Marchio registrato

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Evitare di respirarne i vapori.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).

In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Nocivo per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione

Cefalea occipitale continua o parossistica - ronzii auricolari - iperacusia - vertigini - rachialgia - dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra - ritenzione urinaria - insufficienza respiratoria e di circolo - interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie o paralisi) - dermatosi.

Consigli terapeutici

Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando — in relazione alla via di contaminazione — abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale - terapia sintomatica.

0668

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

TIAZIN® BLU

Polvere anticrittogamica per trattamenti a secco

COMPOSIZIONE

Zineb puro	g 4,4
Zolfo puro (esente da selenio)	g 49,5
Supporti inerti e coloranti	q.b. a g 100

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione - L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati: alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.
In caso di ingestione di Zineb può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in Centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

EUROZOLFI S.p.A. - Catania

Registrazione Ministero della Sanità n. 0668 del 23-8-1972
® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

I trattamenti con TIAZIN BLU dovranno venire effettuati preferibilmente al mattimo presto, quando la vegetazione è bagnata dalla rugiada, al fine di favorire l'adesione della polvere sulla superficie fogliare.

VITE - Contro l'**Oidio** e la **Peronospora** del grappolo impiegare dai 25 ai 40 Kg per ettaro secondo lo sviluppo della vegetazione ed il sistema di allevamento. Iniziare i trattamenti alla fioritura e ripeterli ad intervalli di 15-20 giorni sino alla « invaiatura ».

POMODORO (solo fino alla prima fioritura).
Contro la **Peronospora**, la **Septoria**, l'**Alternaria** e la **Cladosporiosi** in campo: 25-30 Kg per ettaro, alla comparsa del primo grappolo fiorale. Trattare anche prima dell'irrigazione per infiltrazione e dopo l'irrigazione a pioggia.

DIVIETI D'IMPIEGO

- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità - Il TIAZIN BLU è miscibile con i più comuni antiparassitari. È consigliabile però procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti mescolati non presentino incompatibilità tra i coformulanti.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

0673

CLASSE IV

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI FOLPET

COMPOSIZIONE

Folpet puro	g 47,5
Coadiuvanti e inerti	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
Via S. Francesco - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità N. 0673 del 29-2-1972

® Marchio registrato

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il TIOFTAL si usa alle dosi di g 200-250 per ettolitro di acqua contro la muffa grigia e la peronospora della vite, muffa grigia e vaiolatura della fragola, peronospora e alternariosi del pomodoro e della patata, antracnosi delle cucurbitacee (cocomero, melone e cetriolo), marciume da botrite di dette colture.

Preparazione della sospensione

Stemperare il quantitativo stabilito di TIOFTAL in poca acqua in modo da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia nella rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il TIOFTAL è miscibile con tutti i prodotti di comune impiego - non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo.

Avvertenza

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività

È tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti su uve da vino almeno 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti e per le altre colture 10 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto: g 500

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia

Lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro d'acqua) e digitale.

0681

CLASSE III

Fungicida battericida in formulazione liquida per la disinfezione preventiva di terreni, terricciati, serre, cassoni, semenzai, letti caldi

Composizione:
100 gr. di prodotto contengono:
32,7 gr. di METAM SODIO puro
q. b. a 100 di solvente acquoso.

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente: se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni.

Il SARVAP è impiegato per la disinfezione preventiva di terreni, terricciati, serre, cassoni, semenzai, letti caldi, contro le alternariosi, batteriosi, fusariosi, rizoctonie, sclerotinie, tracheomicosi e verticilliosi.
Esso quindi è indicato per combattere il mal del fungo, il mal della rama del garofani, il mal del colletto del garofani, i marciumi radicali e pedali del pomodoro, delle colture ortive, del tabacco, l'avvizzimento del peperone.

Dosi e modalità d'impiego
Prima di effettuare la distribuzione del prodotto, occorre provvedere ad una accurata lavorazione del terreno sino ad ottenere un completo sminuzzamento delle zolle e consentire così una migliore penetrazione del SARVAP nel suolo.
Il SARVAP va impiegato alla dose di kg. 0,5-1, diluito in 30-50 litri di acqua da distribuire su una superficie di 10 mq.
Curare che la temperatura del terreno non sia inferiore a 15°C e che il medesimo non sia eccessivamente umido.
Far seguire al trattamento un'abbondante innaffiatura onde facilitare la penetrazione del prodotto in tutta la fascia di terreno nella quale normalmente si sviluppano le radici (circa 20 cm.).
Dopo 7-10 giorni dal trattamento, occorre effettuare una lavorazione superficiale del terreno per permettere ai gas residui di fuoriuscire. Evitare di rimuovere il terreno sotto la fascia trattata per non riportare in superficie terra infetta.
Si può procedere all'operazione di semina o di trapianto delle colture dopo un ulteriore intervallo di 7-10 giorni. Questo intervallo dovrà essere maggiore quando si tratti di terreni pesanti, argillosi o limosi, ed in particolare se dopo il trattamento si verificassero cadute di pioggia e basse temperature.
Le operazioni di concimazione chimica organica devono essere eseguite con la lavorazione del terreno che precede il trattamento con il SARVAP.
Evitare di effettuare i trattamenti in vicinanza di colture arboree ed erbacee in atto.
Da non applicare con mezzi aerei.
Il prodotto non viene abbinato ad altri principi attivi.
Il prodotto è fitotossico.
Il prodotto è tossico per i pesci. E' nocivo per gli animali domestici ed il bestiame.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

S. p. A.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1
Officina di produzione:
UCB S.p.A. GAND (Belgio)

Registrazione n. 0681 del Ministero della Sanità del 17-2-1972

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso 13!

0691

NATURA DEL RISCHIO: Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Evitare di respirarne i vapori. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo calce viva). — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITÀ

È tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

Del gruppo Imperial Chemical Industries PLC

'SOLTHION' 25 WP

Insetticida in polvere bagnabile a largo spettro di azione

COMPOSIZIONE

Azinphos metile puro . . . . g 25

Bagnanti, disperdenti . . . . q.b.a g 100

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I

VELENO

ICI Solplant S.p.A.

Stabilimento di produzione: S.C.A.M. s.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 0691 del 30-5-1972

'SOLTHION' - Trade Mark ICI Solplant S.p.A.

'SOLTHION' 25 WP è un insetticida in polvere bagnabile che trova impiego in agricoltura per la sua efficacia contro molti tipi di insetti infestanti le colture di viti, peri, meli, peschi, agrumi, fiori, bietole, colture industriali ed orticole.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite a 100 litri di acqua)

Frutticoltura (melo, pero, pesco, susino): g 200-250 contro Psilla del pero, Cocciniglie, Microlepidotteri minatori (Cemiostoma, Nepticula, Lyonetia), larve Ricamatrici (Cacoecia, Capua, Eulia), Carpocapsa, Antonomo, Fillobio, Tignole del pesco (Cydia, Anarsia), Orgia, Cicaline; g 250-300 contro Lithocolletis.

Viticoltura: g 150-200 contro Tignole dell'uva (Clysia, Polychrosis), larve Ricamatrici (Eulia, Cacoecia, Sparganothis), Cicaline.

Bieticoltura: kg 1,25-1,5/ha contro Cleono, Altica, Punteruolo, Lixus, Nottue (Mamestra).

Orticoltura (patata, carciofo): g 200 contro Dorifora della patata.

Fragolicoltura: g 200 contro larve Ricamatrici (Ancylis, Pandemis).

Floricoltura in pieno campo: g 200 contro Tripidi, Tentredini.

Agrumicoltura: g 200 contro Cocciniglie (Cocciniglia cotonosa, Biancarossa, Cocciniglia bianca, Cocciniglia a virgola, Iceria, Saissetia), Tignola, Fetola, Mosca della frutta (adulti).

Pioppicoltura: g 150-300 contro Fitofagi in genere.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

È compatibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra. Una prova preventiva che dia un cambiamento di colore o torbidezza ne sconsiglia la miscela. L'aggiunta di 'Agral' può migliorare la miscibilità; è consigliabile comunque eseguire le miscele solo al momento dell'impiego ed in caso di assoluta necessità.

Non è miscibile con i polisolfuri e con la poltiglia bordolese.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

DA NON VENDERSI SFUSO

g 250

0778

I CLASSE

VELENO

Insetticida di contatto in polvere bagnabile, ad azione secondaria sulle forme mobili degli acari, indicato per la difesa dei fruttiferi, della vite, delle essenze forestali nonché delle colture industriali, orticole e floreali.

COMPOSIZIONE

Endosulfan puro g 32,9

Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento **BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. - Treviglio (BG)**

Registrazione Ministero della Sanità n. 0778 del 9.5.1972

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi per 100 litri di acqua in trattamenti a volume normale.

PERO - MELO

Contro le **Psille, Afide lanigero, Afide verde e cinereo** (avendo cura di effettuare l'irrorazione prima che le foglie comincino ad accartocciarsi), **Cicaline, Litocolleto, Cemiostoma e altre Minatrici, Tentredini, Antonomi, Eriofide del pero, Tignola delle rosacee, Tripide del pero** (Taeniothrips inconsequens), **Tingide del pero, Cimice dei fruttiferi, Maggiolino ed insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore in genere: g 100-150.**

PESCO - SUSINO

Contro l'**Afide farinoso del susino** (Hyalopterus pruni), **Afide sigaraio del pesco** (Myzus varians), **Afide nero del pesco** (Brachycaudus persicae), **Afide bruno del pesco** (Appelia Schwartzi), avendo cura di effettuare l'irrorazione prima che le foglie comincino ad accartocciarsi. **Tentredine delle susine: g 100-150.**
Contro l'**Afide verde del pesco: g 200.**

VITE

Contro **Cicaline e Tripide** (Drepanothrips Reuteri): **g 100-150.**

NOCCIOLO

Contro **Eriofide, Cellode, Balanino, Cimici e Falena: g 100-150.**

FRAGOLA

Contro **Antonomo: g 100-150.**

COLZA

Contro **il Meligete ed il Punteruolo: g 200.**

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Contro **Afidi, Altica, Cleono e Lixo: kg 1,2-1,8** per ettaro, diluiti in 400-800 litri di acqua.

PATATA

Contro **la Dorifora: g 100-150.**

ORTAGGI

CAVOLO E ALTRE CRUCIFERE - Contro **la Cavolaia e Afidi** in genere: **g 100-150.** FAGIOLO e FAVA - Contro l'**Afide nero: g 200.**

FLOREALI, in pieno campo.

Contro gli **Afidi** ed insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore dei fiori in genere: **g 100-150.**

Preparazione della sospensione

Stemperare a parte la dose stabilita di prodotto in poca acqua in modo da ottenere una poltiglia sufficientemente fluida e omogenea e versare poi questa nella quantità di acqua richiesta fino a raggiungere la diluizione voluta, rimescolando accuratamente. Con mezzi irroranti muniti di agitatore, la poltiglia può essere versata direttamente nel serbatoio della pompa previamente riempito con il quantitativo di acqua occorrente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità - L'ENDOMED 35 PB è miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. È consigliabile però procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti mescolati non presentino incompatibilità tra i coformulanti.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti, è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua: il prodotto è tossico per i pesci.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: *vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.*

Consigli terapeutici

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g 25 di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0 1-0,2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloromia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni: *la morfina, l'alcool e, per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina e l'efedrina.*

0817

CLASSE I

VELENO

Pertilam®

Concentrato emulsionabile	**Insetticida per contatto, per ingestione e per asfissia.**

Composizione

100 g di prodotto contengono:

40,0 g di Perthane [1,1-dicloro-2,2-bis-(p-etilfenil)-etano] tecnico al 95% di purezza, pari a 38 g di Perthane p.a. puro:

17,0 g di Metil-parathion (0,0-dimetil 0-p-nitrofenil tiofosfato) tecnico all'80% di purezza, pari a 13,6 g di Metil-parathion p.a. puro.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- — Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- — Conservare la confezione ben chiusa
- — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- — Evitare di respirarne i vapori
- — Non operare contro vento
- — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi
- — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi
- — Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole)
- — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

Informazioni mediche

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

— SINTOMI D'INTOSSICAZIONE

Scialorrea - vomito - dolori - addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg 1-2 per gli adulti e mg 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (g 0,50 ogni 3 ore fino a g 3) o similari.

Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

ALCUNE CONTROINDICAZIONI

Morfina - Vitamina B1 - coramina - latte e grassi

Caratteristiche

Il PERTILAM è un insetticida attivo contro adulti di tortricidi, minatrici, psille, cicaline, mosca delle ciliege, mosca mediterranea della frutta, tignole del pesco, cavolaia, piralide.

Modalità d'impiego

Dosi per 100 litri d'acqua

Contro lepidotteri (minatrici, ricamatrici, tignole): cc 200-250.

Contro mosca mediterranea, mosca delle ciliege, altiche: cc 250-300.

Preparazione della poltiglia

Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

Il PERTILAM è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese). La miscela con certi prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità

Applicato alle dosi e secondo le modalità consigliate il PERTILAM non è fitotossico.

Rischi per la fauna utile

Il PERTILAM è tossico per le api e per gli altri insetti pronubi, nonchè per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 0817 del 19.1.72 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto 1-5-10 lt.

0820

CLASSE TOSSICOLOGICA 3ª

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

TRIMATON

COMPOSIZIONE CHIMICA:
100 gr. del prodotto contengono:

Metam Sodium puro gr. 42
Acqua quanto basta a gr. 100

CARATTERISTICHE:
Il Trimaton è un fumigante liquido che nel terreno si decompone rapidamente in un gas. Il metil isotiocinato, molto efficace per la disinfezione del letto di semina. Il Trimaton è indicato per la lotta contro diverse crittogame (Fusarium, Verticillum, Rhizoctonia, Sclerotinia, Armillaria, Pythium), che provocano marciumi radicali e del colletto, avvizzimenti. Il Trimaton svolge una azione secondaria nematocida efficace per il controllo dei nematodi liberi, diserbante ed insetticida.

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
TERAPIA: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO:
Il Trimaton deve essere distribuito sul terreno 4-8 settimane, prima delle semine o trapianti utilizzando la dose di:
10 cc. (ml.) di prodotto non diluito per iniezioni al terreno che devono essere eseguite a una profondità media di 20 cm. e a distanze intermedie non superiori a 30 cm.
50-100 cc. (mi.) per metro quadrato nel caso si intenda distribuire il prodotto sulla superficie del terreno tramite irrorazione o irrigazione. Nel primo caso (iniezioni) il foro prodotto dalle iniezioni deve essere immediatamente otturato dopo il trattamento, mentre nel secondo caso (irrorazione) il prodotto deve essere immediatamente interrato dopo il trattamento con una leggera erpicatura o aratura alla profondità di circa 20 cm. A distanza di circa 3-4 settimane dopo il trattamento è opportuno eseguire una successiva lavorazione superficiale per favorire la fuoriuscita di residui tossici. Per ottenere i migliori risultati è opportuno che il terreno al momento del trattamento sia umido ma non troppo bagnato e la temperatura si aggiri fra gli 8° C. e i 15° C. Prima di eseguire il trattamento è opportuno sminuzzare finemente il terreno. Si utilizzino le dosi maggiori in caso di forti infestazioni o nei terreni ricchi di sostanza organica.

COMPATIBILITA:
Si usa da solo per la disinfezione dei terreni in presemina.

FITOTOSSICITÀ:
Molto fitotossico per tutte le colture. Prima di seminare o trapiantare accertarsi che non siano rimasti gas tossici del prodotto mediante semina preventiva su una piccola superficie di lattuga a rapida germinazione

NOCIVITÀ:
Il prodotto è tossico per gli uomini, gli insetti, il bestiame, i pesci e gli animali domestici. Evitare pertanto di immettere animali domestici e bestiame nelle zone trattate. Non contaminare mangimi e acque pescose o destinate all'abbeveramento del bestiame.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione N. 0820 del Ministero della Sanità del 21.08.1972

DA NON VENDERSI SFUSO Confezione da kg. **130**

DECCO-RODA S. p. A.
Via Emilia - C.P. 7 - 47032 BERTINORO (Forlì)

Officina di produzione:
IND. CHIMICA DEL TICINO S.p.A.
Via del Porto - MARANO TICINO (NO)

0840

M - 80

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile — Fungicida organico ad alto contenuto di manganese, specifico per combattere le principali malattie crittogamiche e le carenze di manganese in frutticoltura, viticoltura, colture industriali ed ornamentali.

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Maneb (etilenbisditiocarbammato di manganese)
p.a. puro gr. 70
(da p.a. tecnico al 90%)
Zineb (etilenbisditiocarbammato di zinco) p.a. puro gr. 10
(da p.a. tecnico al 90%)
Manganese (Mn ++) gr. 1
(quale elemento micronutritivo sotto forma di sale idrosolubile)
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
- *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
- *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
- *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA:
- In caso di ingestione
  Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;
- per l'irritazione della cute e delle mucose
  Lavaggio, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.
  Controindicate: alcool, olii e grassi.

Modalità e campi d'impiego
Dose per 100 litri d'acqua: g. 150-200.
Pomacee: contro la ticchiolatura, ruggini, corineo, monilia ed altre malattie da funghi.
Vite: contro la peronospora per i trattamenti pre-florali, in fioritura e post-florali.
Pomodoro fino alla prima fioritura: contro peronospora, alternariosi, septoriosi, cladosporiosi, antracnosi.
Garofano: contro la ruggine
Pioppo: contro la Marsonnina brunnea kg. 4-5 per ettaro.
Tabacco: contro la peronospora tabacina (g. 200).
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
NON IMPIEGARE IN SERRA.
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Compatibilità
L'M-80 è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese). La miscela con certi prodotti emulsionabili (es. a base di TEPP, Binapacryl) non è consigliabile.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Su alcune cultivars di pero (Spadona d'estate, Coscia, S. Maria, Butirra d'estate), il prodotto può dar luogo ad alcune manifestazioni fitotossiche e pertanto se ne deve sconsigliare l'uso.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 0840 del 26.6.72 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 25 —1 - 5 -10

1978

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

0849

4

[1] METABROM 980

I CLASSE

numero UN 1062

2 **COMPOSIZIONE** (in peso su 100 g)
Bromuro di metile puro 97,51 g
Cloropicrina quanto basta a 100 g

In caso di emergenza telefonare a: 0031-1150-19000

VELENO

3 Classe tossicologica I

5 **NATURA DEI RISCHI DI INTOSSICAZIONE**
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

6 **NORME PRECAUZIONALI**
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
Conservare la confezione ben chiusa;
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
Evitare di respirarne i vapori;
Non operare contro vento;
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi;
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi (non usare guanti e stivali di gomma);
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
Usare per le bombole vuote le stesse precauzioni relative alla custodia delle bombole piene;
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi d'intossicazione: *Veleno neurotropo: provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico - tempo di latenza: anche parecchie ore - cefalea - vertigini - sonnolenza - stato di ebrezza con disturbi della deambulazione - lesioni cutanee da contatto - disturbi della parola - iperacusia dolorosa - ambliopia - i disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave.*
Consigli terapeutici: *Terapia sintomatica - analettici - antibiotici a scopo profilattico - epatoprotettori - combattere l'acidosi con fleboclisi saline. Impiego di vaso costrittori.*
Controindicazioni: *Evitare sedativi a base di bromo e bevande alcoliche.*

METABROM 980

Fumigante del terreno - impiegato nella lotta contro erbe infestanti - funghi del terreno - orobanche - nematodi - insetti del terreno.

L'utilizzo del prodotto è riservato solo agli operatori autorizzati a norma del R.D. 9-1-1927 n. 147 (e successive modifiche) sull'impiego dei gas tossici.

MODALITA' DI IMPIEGO

a) Il trattamento deve essere effettuato prima della semina o della piantagione. Si prepara il terreno ben lavorato e livellato e con un sufficiente grado di umidità. Prima della fumigazione si devono applicare fertilizzanti organici.
b) La fumigazione deve essere effettuata solo se il terreno ha una temperatura di 8 °C o superiore. NON si deve eseguire il trattamento quando il terreno è troppo bagnato o troppo asciutto.
c) Metodo di applicazione:
Si ricopre la superficie preparata per il trattamento con un foglio di plastica intero ed in perfetto stato (polietilene o PVC dello spessore di 0,1 mm) e si interrano i bordi nel terreno. La superficie da fumigare nei frutteti per la piantagione di piante di sostituzione è di metri 2 x 2.
d) Il prodotto è venduto in bombole di metallo allo stato liquido sotto pressione e si trasforma in gas mediante appositi evaporatori. Il gas è immesso sotto la copertura di plastica a mezzo di un tubo di plastica.
e) Il METABROM 980 può anche essere iniettato nel terreno a mezzo di iniettore pacciamatore portato che contemporaneamente distende il telo e lo rincalza.
f) Il tempo medio richiesto per il trattamento durante la maggior parte dell'anno è di 24 ore. Quando la temperatura del terreno è inferiore a 15 °C occorre lasciare la copertura di plastica per 48 ore.
g) L'intervallo da rispettare prima della messa a coltura (semina o trapianto) va fissato in relazione alla natura del terreno e delle condizioni climatiche e, comunque, non deve essere inferiore a 10 giorni e dopo conveniente arieggiamento del terreno trattato.
h) Terreno destinato alle seguenti colture per le quali il trattamento è possibile:
pomodoro, melanzana, peperone, fragola, zucchino, melone, cocomero, cetriolo, fagiolo, sedano, finocchio, lattuga, cicoria, carota, aglio, cipolla, radicchio, cavolfiore, cavolrapa, spinacio, ravanello, cardo, carciofo, lampone, mirtillo, barbabietola, bietola, patata, vite, pesco, albicocco, arancio, limone, ciliegio, olivo, anemone, azalea, begonia, crisantemo, crocus, ciclamino, dalia, frisia, garofano, geranio, gerbera, gladiolo, ortensia, iris, giacinto, mughetto, narciso, petunia, robinia, rododendro, rosa, tulipano, tabacco. Semenzai e vivai.

Dal trattamento alla semina occorre un intervallo da 10 a 21 giorni a seconda delle colture come segue:

COLTURE	Parassiti e Patogeni Erbe infestanti	Dosi g per m³	Aereazione
TUTTE	Erbe infestanti annuali e poliennali	35-50	10-21
TUTTE	Nematodi	35-50	10-21
TUTTE	Funghi patogeni del terreno	50-120	10-21
POMODORI, MELANZANE IN TERRENI MEDI	Orobanche	50-80	10-15
FRUTTETI Per sostituzione di piante su superfici di mt. 2 x 2	In generale	100-120	14
SEMENZAI DI ORTICOLE FLORICOLE E TABACCO	In generale	35-50	10-14

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Non è compatibile con altri principi attivi.

FITOTOSSICITA': E' fortemente fitotossico e perciò deve essere usato solamente per trattamenti prima della semina o trapianto.

RISCHI DI NOCIVITA': E' tossico per gli animali domestici, i pesci, il bestiame.
E' tossico per gli insetti utili solamente nel caso in cui detti insetti siano rimasti sotto la copertura di plastica che copre il terreno da sterilizzare.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Avvertenza: da usarsi solo per la disinfestazione del terreno.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione: DREYFUS GENTILI S.p.A. - Milano.

Officina di produzione: BROMINE COMPOUNDS LTD. - Beersheva (Israele).

Registrazione n. 0849 del 6-6-1972 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IMBALLO: In bombole di acciaio contenenti Kg. netti.

"123-019"

0857

CLASSE I

VELENO

Lovozal® 40 PB

Polvere bagnabile — **Acaricida a lunga persistenza, specifico per la lotta contro il ragno rosso in frutticoltura.**

Composizione

100 g di prodotto contengono:

41 g di fenazaflor (5-6-dicloro 1-fenossicarbonil-2-trifluorometilbenzimidazolo) tecnico al 97,5% di purezza, pari a 40 g di p.a. puro;

Bagnanti, adesivanti ed inerti: quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Evitare di respirarne i vapori
- Non operare contro vento
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole oppure trattandole con soda o calce viva)
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

Informazioni mediche

Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

SINTOMI D'INTOSSICAZIONE

Stanchezza - debolezza - sonnolenza - profusa sudorazione - sete - iperpiressia - respirazione difficoltosa - confusione mentale nei casi più gravi - coma e morte. Nei casi di cospicua assunzione del tossico possono riscontrarsi anche tachicardia ed ipertensione arteriosa e talora eccitazione dei centri del respiro con conseguente tachipnea.

La morte avviene per collasso cardiocircolatorio, preceduta da ipotensione e da aritmia cardiaca. La sintomatologia è aggravata se l'intossicato si trova in ambiente caldo.

CONSIGLI TERAPEUTICI

Non si conosce ancora un antidoto specifico. Pertanto la terapia di un caso sospetto di intossicazione dovrà essere sintomatica. In considerazione iperpiressia bisogna procedere con le dovute cautele a raffreddare l'intossicato: il paziente dovrà, quindi, essere tenuto in ambiente fresco e gli debbono essere somministrati liquidi freddi. Nei casi in cui si manifesti difficoltà respiratoria dovrà essere somministrato ossigeno. L'insufficienza circolatoria periferica dovrà essere adeguatamente trattata con analettici e cardiotonici.

CONTROINDICAZIONI

Morfina, barbiturici e la cloropromazina.

Caratteristiche

Il LOVOZAL 40 P.B. è un acaricida in polvere bagnabile che ha mostrato di possedere efficacia contro tutte le specie di acari che attaccano le colture di melo e di pero. Ha mostrato di essere efficace anche contro i ceppi di acari resistenti ai fosforganici, al dicofol, al tetradifon, al clorobenzilato ed a varie miscele degli acaricidi noti.

Agisce per contatto e per ingestione sulle larve e sugli adulti degli acari e sulle uova estive degli stessi.

Modalità d'impiego

Frutticoltura (melo e pero): g 100-125 per 100 litri d'acqua.

Sul pero impiegare il LOVOZAL 40 P.B. solo in estate. Il trattamento col LOVOZAL 40 P.B. deve essere effettuato alla prima apparizione degli acari (1-2 acari per foglia) e può essere ripetuto, se necessario, una seconda volta alla distanza di 15-30 giorni dal primo, in relazione all'andamento stagionale ed all'attacco degli acari. Si dovrà aver cura di bagnare accuratamente tutte le parti della pianta.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

Il LOVOZAL 40 P.B. è miscibile in via di massima con le formulazioni in polvere bagnabile dei più comuni insetticidi e fungicidi, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità

Il LOVOZAL 40 P.B. può essere impiegato sul melo anche con alte temperature; sul pero, soprattutto su alcune varietà, nelle fasi iniziali di vegetazione può dar luogo a fenomeni fitotossici sulle foglie.

Rischi per la fauna utile

Il LOVOZAL 40 P.B. è pochissimo tossico per le api e moderatamente tossico per i pesci. L'impiego del LOVOZAL 40 P.B. non comporta rischi per la fauna utile e per gli animali domestici.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 0857 del ... del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto 1 kg.

0873

Sipcaplant®

Fungicida organico in polvere bagnabile ad azione preventiva e curativa per la difesa dei fruttiferi, della vite, fiori e colture ornamentali.

Si impiega in trattamenti liquidi contro Ticchiolatura, Oidio e Gloeosporium del melo e del pero; Botrytis, Peronospora ed Oidio della vite; Oidio, Monilia e Ticchiolatura del pesco, susino, albicocco; Botrytis, Oidio, Sclerotinia, Peronospora, Alternaria, Cercospora, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi, Verticilliosi e Fusariosi rameali di colture floreali.

COMPOSIZIONE:

— Tiofanato-metile (*) puro	g.	18
— Captano puro	g.	50
— Coadiuvanti ed inerti: quanto basta a	g.	100

(*) Sostanza attiva orig. NIPPON SODA Co. Ltd. (Tokyo-Giappone)
[R] Marchio registrato SIPCAM - Milano

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano

Officina di Produzione:
VERCHIM ASTERIAS - SpA
Ozzano Emilia (BO)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 0873 del 30-5-1972 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORAMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarree.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia:

lavanda gastrica con magnesia usta (g. 40 per litro d'acqua e digitale).

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale.

Fruttiferi:

— Ticchiolatura ed Oidio del melo - Ticchiolatura del pero:
trattamenti pre-fiorali e primi post-fiorali **g. 170-200**
trattamenti post-fiorali successivi **g. 120-150.**

Effettuare trattamenti preventivi distanziati di circa una settimana specie durante la fase primaverile delle infezioni di Ticchiolatura, allargando il ritmo dei trattamenti successivamente.
Trattamenti ripetuti ad intervalli non troppo distanziati riducono le popolazioni di Acari parassiti (Ragnetti rossi).
Il prodotto può essere usato in trattamenti curativi entro 60-72 ore dall'inizio delle piogge infettanti od in trattamenti bloccanti contro macchie già manifeste di Ticchiolatura: in tali trattamenti usare una dose di 250 g./hl.

— Gloeosporium del melo e del pero: g. 150-200 - Effettuare un trattamento con abbondante miscela per pianta, qualche settimana prima della raccolta, al più tardi ai primi di settembre.

— Monilia, Ticchiolatura, Oidio del pesco, susino e albicocco: g. 200 - Iniziare precocemente gli interventi specie contro l'Oidio, mentre contro la Monilia e la Ticchiolatura iniziare i trattamenti qualche tempo dopo la fioritura, ripetendo i trattamenti secondo l'andamento stagionale.
Contro la Vaiolatura o gommosi, usare i prodotti specifici (es. Fruttene).

Vite:

— Botrytis, Peronospora ed Oidio della vite: g. 200-250; per la lotta contro la Peronospora effettuare i normali trattamenti sulla base dei calendari comunemente usati in zona contro tale malattia.
Per la lotta contro la Botrytis effettuare trattamenti subito prima e dopo la fioritura ripetendoli almeno 4-5 volte ad opportuni intervalli sino a circa 30 giorni prima della vendemmia, onde evitare che venga ostacolata la fermentazione dei mosti.
Per la lotta contro l'Oidio, nel caso si effettuino trattamenti molto distanziati contro la Peronospora e la Botrytis, intervenire con trattamenti intercalari di zolfi in polvere.
Trattamenti ripetuti e non troppo distanziati riducono le popolazioni di Acari parassiti (Ragnetti rossi, Acari gialli).

FIORI:

— Oidio, Botrytis, Ticchiolatura, Septoria e Fusariosi delle colture floreali (rosa, garofano, crisantemo, bulbose da fiore): g. 250-300: - Effettuare i trattamenti preventivi.

— Verticilliosi, Fusariosi, Marciumi di colture floreali: per trattamenti al terreno usare 6-8 g./mq. di superficie in 5-10 litri di acqua. Ripetere i trattamenti ad opportuni intervalli

Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Avvertenza: l'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile in miscela con gli antiparassitari di uso primaverile-estivo, eccezione fatta per le miscele alcaline come Poltiglia bordolese, polisolfuri. Non usarlo inoltre in miscele con olii e zolfi ed effettuare trattamenti distanti almeno 3 settimane da applicazioni di olii minerali e zolfi.

Attenzione: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute

Fitotossicità: può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Ranetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anjou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

0928

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

ASPOR® U

POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONI MICRONIZZATA E COLORATA

COMPOSIZIONE

Zineb puro	g 70
Bagnanti, coloranti, disperdenti e supporti inerti	q. b. a g 100

USO

Contro la **Peronospora** della vite ed altre malattie crittogamiche.

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento **S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.**
Via S. Francesco - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità N. 0928 del 23-8-1972

® Marchio registrato

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE - Contro **Peronospora** g 200 in trattamenti preventivi da effettuarsi ogni qualvolta le condizioni di temperatura e umidità rendono possibile un'infezione (indispensabili anche uno o due trattamenti a fine agosto-primi di settembre contro eventuali attacchi tardivi). La lotta contro l'Oidio eseguita con Zolfi in polvere, dovrà essere completata aggiungendo alla poltiglia di **Aspor U** g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison per ettolitro.

POMODORO - (solo fino alla prima fioritura)
Contro **Peronospora, Septoriosi, Alternariosi e Ticchiolatura**, g 300 da portare a g 400 in caso di prevedibili forti infezioni; aggiungere ad ogni ettolitro di poltiglia g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison. Contro Vasato g 300.

GAROFANO - Contro **Ruggine, Occhio di pavone o vaiolo, Alternariosi e Septoriosi**, g 300 (con aggiunta di Filofil) sia nei cassoni di radicamento delle talee, che in campo, iniziando i trattamenti 15-20 giorni dopo il trapianto e ripetendoli durante il periodo vegetativo escludendo quello invernale dei forti freddi.

POMACEE - Contro **Ticchiolatura** g 200-300; cominciare i trattamenti all'inizio della schiusura delle gemme (punte verdi) e continuarli sino a quattro settimane prima della raccolta, in relazione alla frequenza delle piogge.

Preparazione della sospensione

Stemperare l'**Aspor U** in poca acqua sino ad avere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua sino ad ottenere la diluizione voluta, agitando.

DIVIETI D'IMPIEGO

— DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
— DA NON IMPIEGARE IN SERRA
— DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità

Ad eccezione dei prodotti a reazione alcalina o acida, l'**Aspor U** è miscibile con i più comuni antiparassitari e particolarmente con:

polveri bagnabili: Panam PB 50, Zolfo colloidale, Zolfo bagnabile; **liquidi emulsionabili:** Carpomon 20, Carposan 20, Fac 20, Ovifac, Rogor L. 20, Rogor L 40, Toxfid.

Preparazione della miscela con formulato polvere bagnabile

Miscelare le due polveri e stemperare con poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea, diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando.

Preparazione della miscela con formulato liquido emulsionabile

Versare lentamente la quantità necessaria del formulato che si vuole miscelare nella sospensione dell'**Aspor U**, preventivamente preparata, agitando accuratamente.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

È fitotossico per le varietà di pero sensibili allo Zineb: Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zocchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto: kg

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione o contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Consigli terapeutici

In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.
In caso di ingestione di Zineb può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfo-deidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in Centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

0930

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZE
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA — Del gruppo Imperial Chemical Industries PLC — ICI

'ALBOLINEUM'

Emulsione insetticida di oli minerali bianchi. Specifico per la lotta contro le Cocciniglie di agrumi, meli, peri, peschi, susini, albicocchi e piante ornamentali sempreverdi. Combatte efficacemente anche le infestazioni di Ragno rosso e Tripidi.
È adatto per trattamenti invernali e primaverili-estivi.

COMPOSIZIONE

Olio di paraffina (con UR minimo 92%)	. . .	g 80
Emulsionanti, diluenti	q.b.a	g 100

MODALITA' DI IMPIEGO
DOSI MEDIE riferite a 100 litri di acqua.
Su pomacee e drupacee:
trattamenti invernali — lt 3-3,5
trattamenti primaverili-estivi — lt 2
Su agrumi:
trattamenti invernali e primaverili-estivi — lt 1,5-2
Su piante ornamentali e sempreverdi in pieno campo:
dosi varianti a seconda dell'epoca di trattamento e della specie.
Dosi medie: — lt 1-1,5
Per la lucidatura: cc 200 in 10 litri di acqua; usare con un batuffolo di cotone.

ISTRUZIONI PER L'USO
Versare dapprima acqua in egual quantità di 'ALBOLINEUM', agitando continuamente la soluzione. Aggiungere poi l'acqua necessaria ad ottenere la diluizione stabilita.
Tenere i recipienti con 'ALBOLINEUM' ermeticamente chiusi.
Conservare il prodotto al riparo dal gelo e da forti calori.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'
'ALBOLINEUM' è miscelabile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi di uso comune, esclusi quelli a reazione alcalina. Non è compatibile con 'Captan', 'Delan', 'Foltapet' e con gli zolfi, 'Zolfo WP' e 'Spersul'. La miscela con 'Sevisol' 50 e 'Fernide' va fatta con precauzione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

'FOLTAPET' - Marchio Registrato - Chevron Chemical Co.
'ZOLFO WP' - 'SEVISOL' - Marchi Registrati - ICI Solplant S.p.A.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

ICI Solplant SpA

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione: CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 0930 del 12-3-1973
'ALBOLINEUM' - 'FERNIDE' - 'SPERSUL' - Marchi Registrati - Imperial Chemical Industries PLC

DA NON VENDERSI SFUSO **CC**

0969

Il **COCCIDOL E** è un olio bianco emulsionato per la lotta primaverile-estiva contro le cocciniglie degli agrumi, dei fruttiferi, dell'olivo, delle piante ornamentali e contro le uova dei ragnetti rossi e gialli, nonchè psile e afidi.

Il **COCCIDOL E** serve ottimamente per esaltare l'azione diserbante dei Triazinici nel diserbo del Mais.

DOSI E MODO D'IMPIEGO

- In frutticoltura (Pomacee e Drupacee):
  a gemma ferma kg 3-4 in 100 l di acqua
  all'ingrossamento delle gemme kg 2-3 in 100 l di acqua
  nel periodo estivo kg 0,8-1 in 100 l di acqua (escluse Drupacee)
- In agrumicoltura e olivicoltura kg 2,5-3 in 100 l di acqua
- In floricoltura (rose, oleandri, ecc.) kg 1,5-2 in 100 l di acqua
- In aggiunta alle Triazine nel diserbo post-emergenza del mais: il **COCCIDOL E** addizionato ai triazinici favorisce la penetrazione del diserbante nelle foglie delle infestanti e ne facilita così l'azione distruttiva senza provocare fitotossicità sulle piantine del mais.
  Il trattamento va eseguito allorchè le infestanti hanno raggiunto un'altezza di circa 10 cm impiegando, oltre alla dose di disorbante, litri 5-10 di **COCCIDOL E** in un volume di acqua di 5-6 Hl ad Ha in maniera da effettuare un'irrorazione uniforme.
  Il quantitativo di **COCCIDOL E** che serve per il trattamento si stempera in poca acqua, poi si aggiunge, poco per volta, la quantità di acqua occorrente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Non è miscibile con gli zolfi bagnabili, i carbammati, il polisolfuro di calcio, il captano, il karathane, il folpet, il dinocap, il diclorofluanide, il dicloran, il chinomelionato e il thioquinox.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenza: Il prodotto deve essere impiegato soltanto dopo che siano passati almeno 15 giorni da un eventuale trattamento a base di Zolfo.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
LITRI 16

COCCIDOL E

Olio bianco emulsionato

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Oli minerali puri (95% U.R.)	g 8/,
Disperdenti, emulsionanti ed acqua	q.b.a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di malessere, ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CAFFARO S.P.A. - MILANO

Prodotto su formula originale e sotto il controllo della CAFFARO S.p.A. nello stabilimento DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
Registrazione n. 0969 del Ministero della Sanità del 27-10 1972

0971

LASSO(R)

Diserbante selettivo [illegible] mais e la Soia. Il prodotto agisce per assorbimento radicale sui semi delle infestanti in via di germinazione.

COMPOSIZIONE

- Alaclor puro ....g 43,2
- Coadiuvanti e solventi: quanto basta a ....g 100
  - contiene Monoclorobenzolo

(R) Marchio registrato Monsanto

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 0971 ....del 14.10.1972.....Ministero della Sanità

Natura di rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici conservare la confezione ben chiusa, non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti, dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali provenienti da seme, soprattutto graminacee (Giavone, Poa) comprese Digitaria, Setaria,Panico americano (Panicum dichotomiflorum) nonché su alcune dicotiledoni (Amaranto, Capsella, Camomilla, Porcellana, Senape, Veronica); il prodotto è poco efficace, senza aggiunta di altro erbicida, su Stellaria, Ortica, Poligonacee ed è inoltre inefficace sulle malerbe perennanti munite di rizomi, bulbi, bulbilli, stoloni (Gramigna, Convolvolo, Sorghetta, Stopplone, Artemisia).
Il diserbo si effettua su tutta la superficie del campo, oppure in forma localizzata su fasce larghe 20-25 cm. lungo le file: in quest'ultimo caso la dose di impiego va rapportata alla effettiva superficie trattata.

- preparare accuratamente il terreno affinché non rimangano zolle e zollette;
- diluire il prodotto in 4-6 o più Hl. di acqua e distribuire la poltiglia uniformemente a mezzo delle comuni irroratrici a mano o meccaniche;
- perché il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che una pioggia di almeno 8-10 mm. cada entro 2 settimane dal trattamento, altrimenti provvedere ad un'irrigazione a pioggia superficiale;
- le eventuali sarchiature che vengono effettuate dopo il trattamento per rompere la crosta o per arieggiare il terreno, devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non contenenti il LASSO.

MAIS

Il prodotto si può distribuire in pre-semina con interramento superficiale; in pre-emergenza, da subito dopo la semina sino a qualche giorno dopo, comunque prima della nascita delle infestanti; in post-emergenza, con sviluppo della coltura inferiore a 10 cm. quando le infestanti graminacee non siano ancora nate e le dicotiledoni non abbiano superato lo stadio di 2 foglie vere.
Evitare di trattare il mais dallo stadio di due prime foglie distese fino all'emissione della 5-6 foglia vera.
Eventuali lievi fenomeni di ustione osservabili in trattamenti di post-emergenza sono comunque senza conseguenze per lo sviluppo della coltura.
Secondo il tipo di infestazione si può intervenire :

- alla dose di 3 lt/ha più 2 Kg/ha di Atrazina 50 quando non vi siano infestanti resistenti, ma per prevenire la loro comparsa.
- alla dose di 4,5 lt/ha più 1,5-2 Kg/ha di Atrazina 50 quando sono presenti Setaria, Digitaria, Giavone americano e biotipi di Giavoni resistenti.
- alla dose di 6 lt/ha più 2 Kg/ha di Atrazina 50 quando sia presente la Sorghetta e si debbono combattere i semi di questa infestante.
  Tale dose di prodotto può essere ridotta a 5 lt/ha nei terreni leggeri ed aumentata a 7-8 lt/ha nei terreni pesanti.

Il prodotto ha un'efficacia parziale e spesso insufficiente nei terreni organici e torbosi.

SOIA

Impiegare il prodotto subito dopo la semina, prima dell'emergenza della coltura e delle infestanti alla dose di 4-5 lt/ha in associazione con 0,8-1,2 Kg/ha di LINURON 50, secondo il tipo di terreno.
Impiegare le dosi più elevate nei terreni argillosi e quelle più basse nei terreni sciolti.

Preparazione della poltiglia: versare il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Avvertenze: le coltivazioni di mais trattate con il prodotto non possono essere consociate ad altre colture. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione della poltiglia erbicida prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità : il LASSO è miscibile con MAIZINA, MAIZINA S e MAIZINA 50 L e con i prodotti a base di Atrazina, Simazina o Linuron. Quando il LASSO si usa con MAIZINA o MAIZINA S, stemperare prima la MAIZINA in un limitato quantitativo di acqua, e poi diluire nel totale quantitativo di acqua; con MAIZINA 50 L, diluire la MAIZINA 50 L nel totale quantitativo di acqua mantenendo sempre la poltiglia in movimento entro la botte irroratrice.
In ogni caso diluire a parte il LASSO nella totale quantità di acqua contenente la MAIZINA precedentemente disciolta. Operare nel medesimo modo per le miscele con prodotti a base di Linuron.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine.
Alle dosi normali d'impiego non si hanno residui dannosi per le colture successive, purché dall'applicazione del diserbante alla semina delle altre colture, intercorrano 3-4 mesi e si proceda ad una buona aratura prima della semina.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto Lt. 20**

SIPCAM

1005

I CLASSE

VELENO

INSETTICIDA GRANULARE PER LA LOTTA CONTRO GLI INSETTI DEL TERRENO

COMPOSIZIONE

g 9,5 di Parathion puro.
q.b. a g 100 di supporti inerti.

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 1005 del 10-10-1972

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

Il MOGRAN è indicato per la disinfestazione del suolo destinato in particolare alle colture orticole ed industriali;

è efficace contro tutti gli insetti del suolo quali Elateridi, Grillo nero, Bacherozzo, Maggiolino, Zabro gobbo, Vespero della vite, Cebrio o Gramignolo, Bibione degli orti, Tipule, Agrotidi, Grillotalpa;

Il MOGRAN viene distribuito con le normali macchine spandigranuli mototrainate od a spalla;

Il MOGRAN va sparso uniformemente sulla superficie da disinfestare, prima della semina o del trapianto della coltura in ragione di 25-35 kg di prodotto per ettaro. Nei trattamenti localizzati alla fila di semina, la dose deve essere dimezzata; per il mais deve essere ridotta a 5-10 kg. Per la barbabietola da zucchero il trattamento localizzato è controindicato;

dopo lo spargimento è necessaria una fresatura od una erpicatura per incorporare l'insetticida negli strati superficiali del terreno.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità - Il MOGRAN è miscibile con i più comuni concimi granulari fatta eccezione per quelli molto alcalini o a granulometria molto diversa da quella del prodotto poichè in quest'ultimo caso la distribuzione risulterebbe disforme.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività - Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Lasciar trascorrere il medesimo periodo prima di far pascolare il bestiame in zone trattate od alimentarlo con prodotti che direttamente o accidentalmente siano venuti a contratto con il formulato.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Intossicazione mortale per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave. In luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli Terapeutici

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2 - 1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza

Consultare un centro antiveleni.

1009

CUPRENOX 50

OSSICLORURO DI RAME MICRONIZZATO ADESIVO

COMPOSIZIONE: Rame metallico		g. 50
	(sottoforma di Ossicloruro tetraramico)	
	Disperdenti, coadiuvanti e supporti	q.b. a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CLASSE III

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: Il CUPRENOX 50 è un ossicloruro di rame micronizzato adesivo. Viene impiegato con successo su Pomacee contro la ticchiolatura; vite, patata e pomodoro contro peronospora; Olivo contro Occhio di pavone; pesco contro Bolla e Corineo; e Bietola contro cercospora.

DOSI DI IMPIEGO: Gr. 300 per 100 litri di acqua ad eccezione della cercospora della bietola che richiede 600-800 gr. per 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: E' miscibile con i comuni antiparassitari a reazione neutra. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco e varietà di melo quale Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgeduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, e di pero quali Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per i pesci.
- Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni.
- **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione Ministero della Sanità n. 1009 del 4-1-1973

Prodotto nello stabilimento CAFFARO S.p.A. di Adria Cavanella Po (RO)

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 5

1022

M - 80 BLEU

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile — **Fungicida organico ad alto contenuto di ferro, specifico per combattere le principali malattie crittogamiche e le carenze di ferro in viticoltura, colture industriali e garofano.**

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:
Maneb (etilebisditiocarbammato di manganese)
p.a. puro gr. 67
(da p.a. tecnico al 90%)
Zineb (etilenbisdiocarbammato di zinco)
p.a. puro gr. 8
(da p.a. tecnico al 90%)
Ferro (Fe^{++-}) gr. 0,8
Bagnanti, coloranti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

- *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
- *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
- *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico

SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA:

- **In caso di ingestione**
  Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;
- **per l'irritazione della cute e delle mucose**
  Lavaggio, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.
  Controindicate: alcool, olii e grassi.

Modalità e campi d'impiego

Dosi per 100 litri d'acqua: gr. 150-200.

Vite: contro la peronospora nei trattamenti pre-florali in fioritura e post-florali.

Garofano: contro la ruggine.
Pioppo: contro la Marssonina brunnea.

Tabacco: contro la peronospora tabacina (g. 200).

Pomodoro fino alla prima fioritura: contro alternariosi, septoriosi, peronospora, cladosporiosi, antracnosi

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON IMPIEGARE IN SERRA.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Compatibilità

L'M-80 BLEU è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 1022 del 3.10.72 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 1-5-10-25

1029

MOLINAM®

72,6 EC

Diserbante liquido emulsionabile per la lotta contro il Giavone delle risaie.
Il prodotto agisce sui semi dei giavoni (Panicum = Echinocloa spp.) dopo la germinazione, per assorbimento radicale e dell'epicotile.

COMPOSIZIONE

- Molinate puro .... g 72,6
- Coadiuvanti ed inerti, quanto basta a .. g 100
- Contiene Xilolo

(R) Marchio registrato SIPCAM - Milano

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di Produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

Registrazione n. 1029 del 7.10.1972 Ministero della Sanità

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchiti, effetto Antabuse (in casi di assunzione di alcool), irritazione della cute e delle mucose in caso di contatto (dermatiti, congiuntiviti, faringiti, ecc.) nonché manifestazioni allergiche cutanee e bronchiali.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Molti dei sintomi tossici possono essere provocati dai solventi organici presenti nel formulato; pertanto la terapia dove tener conto anche dei danni causati da questi.
I solventi possono provocare gravi lesioni epatiche, renali e a carico del sistema nervoso centrale e periferico (particolarmente i distillati del petrolio possono causare polmoniti chimiche); tutte queste forme richiedono idonee terapie sintomatiche.
Il vomito non va provocato. Somministrare grandi quantità di acqua.
Se il paziente vomita spontaneamente, somministrare ancora liquidi, dopo averlo intubato.
Se il paziente é incosciente non somministrare nulla per bocca.
Ricoverare il paziente in un centro di rianimazione. La lavanda gastrica a paziente intubato, va praticata con una soluzione di 200-300 ml di acqua in cui siano stati sciolti 30-60 g di carbone attivo. Purganti salini. Terapie sintomatiche mirate. Per le manifestazioni cutanee e mucose rimuovere gli abiti contaminati, lavaggio con abbondante acqua della pelle e degli occhi per almeno quindici minuti, pomate oftalmiche e dermatologiche.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega secondo la seguente metodologia:
— **pre-semina**: il terreno va lavorato secondo le normali regole, evitando che rimangano grosse zolle; si effettua la distribuzione del prodotto a mano o a macchina alle seguenti dosi:
— nei terreni di medio impasto Kg. 5,5/ha
— nei terreni leggeri Kg. 5/ha
— nei terreni pesanti, argillosi ed organici Kg. 6/ha
— nei terreni torbosi, poiché il prodotto viene parzialmente assorbito o inattivato dalla sostanza organica, si consiglia di aumentare la dose a Kg. 6,5-7/ha

La prestabilita dose di prodotto si diluisce in 3-5 hl di acqua e la poltiglia si distribuisce uniformemente sulla superficie del terreno con le comuni irroratrici.
Subito dopo l'impiego del prodotto, per evitarne l'evaporazione, si effettua l'incorporazione entro poche ore dal trattamento con erpici a dischi o rotanti o con due passaggi di erpici a denti. Laddove si effettua il livellamento del terreno (slottatura e pareggiatura) oppure dove si effettua la compressione della risaia (intasamento, pesto o pesta), la distribuzione del prodotto deve essere effettuata dopo queste operazioni eseguendo, se possibile, l'incorporazione nel terreno con erpici.
Si effettua successivamente la normale inondazione della risaia, dopodiché si procede, subito o qualche giorno dopo, alla semina del riso, preferibilmente a spaglio anziché a righe.
— **post-emergenza**: l'epoca più frequente di impiego può andare dal giorno seguente la semina sino ad un massimo di 30-35 giorni dopo; generalmente si impiega da 5 a 25 giorni dopo la semina, anticipando soprattutto quando si deve combattere il giavone rosso. Le dosi di impiego sono le stesse indicate per il trattamento di pre-semina.

Preparazione della poltiglia: diluire la prestabilita dose di prodotto direttamente nel volume di acqua desiderato agitando con cura.

Avvertenze: affinché il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che dopo il trattamento non si facciano asciutte per almeno 40 giorni e si mantenga un elevato livello dell'acqua, evitando comunque affioramenti del terreno; ciò per evitare la perdita per evaporazione del prodotto.
Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine.
Non usare dosi superiori a quelle prescritte.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i comuni diserbanti ormonici.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

Fitotossicità: il prodotto è dannoso per le viti, gli ortaggi, i fruttiferi ed i pioppi. Occorre evitare che la soluzione diserbante giunga a contatto con tali colture. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e per la distribuzione della poltiglia erbicida prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

1030

MOLINAM®

7,5 G

Diserbante granulare per la lotta contro il Giavone delle risaie.
Il prodotto agisce sui semi dei giavoni (Panicum=Echinocloa spp.) dopo la germinazione, per assorbimento radicale e dell'epicotile.

COMPOSIZIONE

— Molinate puro .... g 7,5
— Coadiuvanti ed inerti, quanto basta a .. g 100

(R) Marchio registrato SIPCAM - Milano

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano

Officina di produzione:
DIACHEM - Spa
Via Tonale,15
Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione n. 1030 del 7/10/1972 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento é avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente é cosciente; se é in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega secondo la seguente metodologia:
— **pre-semina:** il terreno va lavorato secondo le normali regole, evitando che rimangano grosse zolle; si effettua la distribuzione del prodotto a mano o a macchina alle seguenti dosi:

— nei terreni leggeri Kg. 50/ha
— nei terreni di medio impasto Kg. 55/ha
— nei terreni pesanti, argillosi ed organici Kg. 60/ha
— nei terreni torbosi, poiché il prodotto viene parzialmente assorbito o inattivato dalla sostanza organica, si consiglia di aumentare la dose a Kg. 65-70/ha

Subito dopo l'impiego del prodotto, per evitarne l'evaporazione, si effettua l'incorporazione entro poche ore dal trattamento con erpici a dischi o rotanti o con due passaggi di erpici a denti. Laddove si effettua il livellamento del terreno (slottatura e pareggiatura) oppure dove si effettua la compressione della risaia (intasamento o pesta), la distribuzione del prodotto deve essere effettuata dopo queste operazioni eseguendo, se possibile, l'incorporazione del terreno con erpici.
Si effettua successivamente la normale inondazione della risaia, dopodichè si procede, subito o qualche giorno dopo, alla semina del riso, preferibilmente a spaglio anziché a righe.

— **post-emergenza:** l'epoca più frequente di impiego può andare dal giorno seguente la semina sino ad un massimo di 30-35 giorni dopo; generalmente si impiega da 5 a 25 giorni dopo la semina, anticipando soprattutto quando si deve combattere il giavone rosso.
Le dosi di impiego sono le stesse indicate per il trattamento di pre-semina.

Avvertenze: affinché il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che dopo il trattamento non si facciano asciutte per almeno 40 giorni e si mantenga un elevato livello dell'acqua, evitando comunque affioramenti del terreno; ciò per evitare la perdita per evaporazione del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto si usa da solo.

Fitotossicità: il prodotto è dannoso per le viti, gli ortaggi, i fruttiferi, ed i pioppi. Occorre evitare che la soluzione diserbante giunga a contatto con tali colture. Dopo l'impiego lavare accuratamente i recipienti che sono serviti per la distribuzione dell'erbicida, prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

1082

FYDULEX® G

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Granulare — **Diserbante dei canali, delle aree industriali, delle ripe, dei bordi stradali e delle ferrovie.**

Composizione

100 g di prodotto contengono:

8,0 g di dichlobenil (2,6-diclorobenzonitrile) tecnico al 94% minimo di purezza, corrispondenti a 7,5 g minimo di p.a. puro;
16,50 g di dalapon (2,2-dicloropropionato di sodio) tecnico al 91% minimo di purezza, corrispondenti a 15 g minimo di p.a. puro;
Coformulanti, coloranti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

Il FYDULEX G è un erbicida granulare, specifico per la lotta contro le infestanti perenni, difficilmente combattibili con gli altri diserbanti, quali la cannuccia (Phragmites communis), le tife (Typha latifolia e T. angustifolia), il carice (Carex sp.), la gramigna (Agropyron repens), il bottoncino (Cyperus sp.), il giunco (Juncus sp.). Con il FYDULEX G si combattono contemporaneamente anche le graminacee annuali e le più comuni infestanti dicotiledoni.

Modalità d'impiego

Contro una infestazione di carice (Carex sp.), bottoncino (Cyperus sp.), giunco (Juncus sp.), Glyceria maxima, gramigna (Agropyron repens), setaria (Setaria sp.), digitaria (Digitaria sp.), impiegare il FIDULEX G alla dose di kg 100-160 per ettaro. A questo dosaggio si combattono contemporaneamente anche molte infestanti dicotiledoni annuali e perenni, quali Sonchus sp., Taraxacum officinale, Rumex sp., Amaranthus sp., Plantago sp.

Il FYDULEX G può essere applicato in tutti i periodi dell'anno, ma sono preferibili i trattamenti primaverili, all'inizio dello sviluppo vegetativo delle malerbe.

Per il controllo specifico della cannuccia (Phragmites communis) e delle tife (Typha latifolia e T. angustifolia) elevare la dose d'impiego del FYDULEX G a 180-200 kg/ha, effettuando il trattamento prima della ripresa vegetativa primaverile.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Impiegare il FYDULEX G da solo. E' sconsigliabile la miscela con altri antiparassitari granulari e con concimi.

Fitotossicità

Alle dosi d'impiego consigliate il FYDULEX G è fitotossico per tutte le colture.

Non impiegare il FYDULEX G in vicinanza di colture. Nei canali di irrigazione trattati con FYDULEX G non usare l'acqua prima di 20-30 giorni dalla applicazione.

Rischi per la fauna utile

L'impiego del FYDULEX G non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione DU PONT CONIO SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONIO SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 1082 del 14.10.72 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto 5-10-25 kg

® Marchio registrato dalla N.V. Philips-Duphar, Amsterdam

DU PONT DU PONT CONIO SPA AMONN FITOCHIMICA DIVISION

1147

Caratteristiche:
L'associazione dei due sali del 2,4-D e dell'MCPA consente di ottenere un'azione diserbante contro la quasi totalità delle infestanti a foglia larga.
Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico:
Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione:
Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale - ipotensione, dermatiti di contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, fibrillazione ventricolare, convulsioni, coma.

Consigli terapeutici:
Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, uretici. solfato di chinidina. pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni:
È sconsigliata la digitale.

Fitonex Combi®

Diserbante selettivo a vasto spettro d'azione per il diserbo dei frumenti

COMPOSIZIONE su gr 100:

2,4-D puro (sotto forma di sale dimetilamminico)	gr 31
MCPA puro (sotto forma di sale dimetilamminico)	gr 25
Coformulanti q.b. a	gr 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a - Telef. 90.62.07
44042 — C E N T O (Ferrara)

Stabilimento di produzione:
S.C.A.M. srl Via Bellaria, 164 - Modena

Registrazione n. 1147 del 26-4-1973 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO KG.**

Modalità d'impiego:
In condizioni normali il *FITONEX COMBI* si impiega alla dose di Kg 0,750-1,500 per 600 litri di acqua per ettaro, ricorrendo alle dosi più alte per il diserbo di Piantaggine, Farinaccio, Vilucchio, Fiordaliso, Erba ruota, Papavero, Gallio, Centocchi.
Diluire la quantità di *FITONEX COMBI* nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura. Il momento più adatto per il diserbo del frumento va dalla fine della fase di accestimento o figliatura a poco prima della fase di botticella. Eseguire la semina dell'erba medica e del trifoglio dopo 10-12 giorni dall'applicazione del prodotto previa erpicatura del terreno trattato.

DA NON APPLICARSI CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
Il prodotto va impiegato da solo.

Fitotossicità:
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forme di vapori portati dal vento. Le pompe e gli utensili usati per il trattamento diserbante non devono essere impiegati per altri trattamenti antiparassitari se non sono stati ripetutamente lavati con acqua calda e soda.

Rischi di nocività:
Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

Caratteristiche:
Acaricida per la lotta contro Neanidi ed adulti del ragnetti rossi ed acari in genere infestanti fruttiferi (Pomacee e Drupacee) colture orticole e floreali in pieno campo, agrumi e viti.
L'ACARED 40 S possiede efficacia e persistenza d'azione.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.

Consigli terapeutici:
Lavanda gastrica abbondante, somministrazione di purganti salini (25 gr di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grass in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1-0,2 g) contro i tremori muscolari, Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia, dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione del tossico.

Controindicazioni:
La morfina e l'alcool, o per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina e l'efedrina.

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

ACARED 40 S

ACARICIDA EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE su gr 100:

Dicofol puro	gr 34
Emulsionanti, tensioattivi e solventi q.b. a	gr 100

(CONTIENE XILOLO)

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

TERRANALISI s.n.c.
Sede CENTO (FE) - Via Donizetti, 2/A
Telefono 906.207

Stabilimento di produzione:
SCAM S.r.l. - Via Bellaria n. 164 - MODENA

Registrazione n. 1151 del 26-3-1973 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg. 1**

Modalità d'impiego:
L'*ACARED 40 S* si impiega alle dosi di gr 100 per 100 litri di acqua. In caso di forti infestazioni la dose può essere opportunamente aumentata. I trattamenti si effettuano alla comparsa delle forme mobili degli acari e se necessari vanno ripetuti. Diluire il prodotto nel quantitativo totale di acqua rimescolando bene.

DA NON APPLICARSI CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
Il prodotto è miscibile con i più comuni fitofarmaci, eccetto quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).

Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali scritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità:
Il prodotto è fitotossico per le melanzane.

Rischi di nocività:
E' nocivo per gli insetti utili. Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 15 gg.

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

1166

DIMETOL 30 P.B.

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE: su gr 100
Metilparation puro gr 24
Disperdenti, bagnanti e inerti q.b. a gr 100

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I

Caratteristiche: Insetticida in polvere bagnabile per la lotta contro gli insetti nocivi nelle coltivazioni di melo, pero, pesco, ciliegio, olivo, vite, fragole, sedano; pomodoro e in floricoltura in pieno campo.

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (*p. es.:* interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva). in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico: Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, darrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente iposssia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Nono somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni.

Modalità e dosi d'impiego: Il **DIMETOL 30 P-B** si impiega alle seguenti dosi per 100 litri di acqua: gr 130-170 contro Cidia del pesco, Nepticula, Afide verde, Afide laniero ed Afidi in genere, Eulia, Tignole dell'olivo, Tignole e Tignoletta dell'uva; gr 170-250 contro Tortrice o Bega del garofano, Mosca della frutta, Capue, Psille, Tingidi, Tripidi del melo e del pero; Tignole e nottue della fragola, del sedano e del pomodoro. Stemperare il prodotto in poca acqua e, sotto buona agitazione, portare al volume desiderato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il **DIMETOL 30 P-B** è miscibile con i più comuni fitofarmaci, eccetto quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività: Il prodotto, è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni.
« Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali ».

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a — CENTO (Ferrara) — Tel. 906207

Stabilimento di produzione:
ICI SOLPLANT S.p.A. - CRESPELLANO (BO)

Registrazione N. 1166 del 26 aprile 1973 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO Peso kg 1

1167

Caratteristiche:
Il *DIAZOL 20* è un insetticida emulsionabile in acqua efficace contro i più comuni insetti nocivi delle colture arboree, erbacee, fiori e piante ornamentali in pieno campo.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina, finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA:
Consultare un centro antiveleni.

DIAZOL 20

Insetticida emulsionabile per la difesa di colture arborre, erbacee, ornamentali

COMPOSIZIONE su gr 100:

Diazinone puro	gr 18
Emulsionanti, tensioattivi e solventi q.b. a	gr 100

Contiene XILOLO

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizotti, 2/a - Telef. 90.62.07
44042 — C E N T O (Ferrara)

Stabilimento di produzione:
SARIAF S.p.A. - FAENZA (RA)

Registrazione n. 1167 del 15-2-1973 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO KG. 1**

Modalità d'impiego:
Il DIAZOL 20 si impiega in genere alla dose di 150/180 gr per litro di acqua contro Tignola dell'uva, Afidi, Larve di Coccinìglia degli agrumi, Tripidi del melo, del pero e del pesco. Tignole e bruchi del cavolo, sedano, pomodoro, Afidi e bruchi dei fiori e delle colture ornamentali in pieno campo. Per la lotta contro la Mosca delle olive effettuare il primo trattamento con gr 300 per 100 litri di acqua e i trattamenti successivi con 150 gr per 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARSI CON MEZZI AEREI

Non trattare in fioritura perché il prodotto è tossico per le api.

Compatibilità: Il DIAZOL 20 è miscibile con tutti gli antiparassitari in commercio esclusi quelli a reazione alcalina.

Avvertenza:
« In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».
« Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 15 giorni.

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

1168

Caratteristiche:
Il *ROGOTER 40* è un prodotto ad azione citotropica, penetra nei tessuti vegetali eliminando le forme di insetti ed esplica inoltre una azione tossica per contatto. Indicato per la difesa di: OLIVO: contro Mosca e Tignola - CILIEGIO: contro la Mosca - PERO: contro Psilla, Acari e Afidi - MELO: contro Afidi ed Acari - PESCO: contro Mosca e Afidi - BIETOLE: contro Afidi e Nottue.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina, finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA:
Consultare un centro antiveleni.

Rogoter 40

INSETTICIDA EMULSIONABILE PER TRATTAMENTI LIQUIDI

COMPOSIZIONE su gr 100:

Dimetoato puro	gr 37,6
Emulsionanti, tensioattivi e solventi q.b. a	gr 100

Contiene **XILOLO**

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a - Telef. 90.62.07
44042 — C E N T O (Ferrara)

Stabilimento di produzione:
ICI SOLPLANT S.p.A. - CRESPELLANO (BO)

Registrazione n. 1168 del 15-2-1973 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO KG.**

Modalità d'impiego:
Il *ROGOTER 40* si impiega normalmente alla dose di g 75-150 per 100 litri d'acqua: ricorrendo alle dosi più alte in casi di forti infestazioni. Diluire il prodotto nel quantitativo totale di acqua rimescolando bene.

DA NON APPLICARSI CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
Il *ROGOTER 40* è miscibile con i più comuni fitofarmaci, eccetto quelli a reazione alcalina(polisolfuri, poltiglia bordolese).

Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali scritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 gg.

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

1175

MOLINAM® M

Diserbante selettivo liquido emulsionabile per la lotta contro il giavone e le ciperacee delle risaie, a base di Molinate e Mecoprop.
Il prodotto è efficace sia sui semi dei giavoni (Panicum, Echinocloa spp.) sia nei confronti del quadrello (Scirpus mucronatus). Controlla inoltre il cipollino (Scirpus maritimus) ed il cucchiaio (Alisma plantago) anche se non totalmente.

COMPOSIZIONE

– Molinate puro	g	35
– Mecoprop acido puro .... (da estere butossietanolico)	g	14
– Emulsionanti,solventi:quanto basta a .... contiene Xilolo	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

SIPCAM - Soc.It.Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale G.Galeazzo, 3 Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 1175 del 9.2.1973 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali : conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione : Nausea, vomito, diarrea, apatia, astenia, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalee, vertigini, convulsioni, coma.

Terapia consigliata : Se ingerito, provocare il vomito, lavanda gastrica, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, purganti salini, solfato di chinidina. Nel caso di contatto con la cute e le mucose; lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Consultare un Centro antiveleni e nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in Centro di rianimazione.

Controindicazioni : alcool, olii, grassi, digitale.

MODALITA'DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega in post-emergenza, purchè la coltura abbia superato lo stadio vegetativo della 3.a foglia ed esista la presenza delle ciperacee. Durante il trattamento il livello dell'acqua deve essere mantenuto alto. Il prodotto va impiegato alla dose di 8,5–10,5 Kg/Ha che vanno diluiti in 400-500 o più litri di acqua distribuendo tale poltiglia uniformemente sulla superficie da diserbare.

Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua mescolando con cura.
Le pompe usate per la distribuzione del diserbante non debbono essere impiegate per altri trattamenti insetticidi od anticrittogamici, salvo che vengano accuratamente eliminati i residui con lavaggi ripetuti di acqua calda e soda.

Avvertenze: affinchè il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che dopo il trattamento non si facciano asciutte per almeno 40 giorni e si mantenga un elevato livello dell'acqua, evitando comunque affioramenti del terreno; ciò per evitare la perdita per evaporazione del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni diserbanti. E' consigliabile però procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti che si vogliono associare non presentino incompatibilità tra gli eccipienti. La precipitazione di fiocchi abbondanti od un'alterazione del colore sconsiglierà la miscelazione.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

Fitotossicita': il prodotto è dannoso per le viti, gli ortaggi, i fruttiferi, i pioppi e floreali in genere. Occorre evitare che la soluzione diserbante giunga a contatto con tali colture.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

SIPCAM

1182

CLASSE III

ZIRAMIT 90

Fungicida organico per la lotta contro la Bolla e la Gommosi del pesco.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Ziram puro	g 81
Coadiuvanti e bagnanti	q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: *l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).*
Terapia: *nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscenza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.*
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
AVVERTENZA: *consultare un Centro Antiveleni.*

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Contro Bolla e Gommosi del pesco e del mandorlo:

per trattamenti autunno-invernali:	g 300-400/hl
per trattamenti primaverili-estivi:	g 100-150/hl

Sul pesco sospendere i trattamenti nei periodi più caldi.

Contro la Ticchiolatura del pero:
Consigliato su varietà sensibili allo Zineb:

per trattamenti pre-florali:	g 200/hl
per trattamenti post-florali:	g 100-150/hl

Contro crittogame diverse delle colture ortive e ornamentali:

Contro Ruggine del fagiolo, garofano, narciso, crisantemo, rosa, nonché del pisello:	g 100-150/hl
Contro Antracnosi del fagiolo, pisello, lattuga:	g 100-150/hl

Lo ZIRAMIT 90 si stempera in poca acqua e si diluisce poi nella quantità d'acqua voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Lo ZIRAMIT 90 è compatibile con i più comuni antiparassitari in commercio ad eccezione della poltiglia solfocalcica e la poltiglia bordolese.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto è fitotossico per le seguenti varietà di pero: Cannellina, Gentil bianca, Gentilona, Spadona d'estate.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

caffaro S.p.A. - Milano

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 1182 del Ministero della Sanità del 9-2-1973

DA NON VENDERSI SFUSO **CONTENUTO NETTO Kg 1**

1189

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

ERBICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER LA COLTURA DEL MAIS

COMPOSIZIONE

g 22,5 di Atrazina pura
g 36,4 di Simazina pura
q. b. a g 100 di coadiuvanti e supporti inerti.

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento **DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG)**

Registrazione Ministero della Sanità N. 1189 del 9-2-1973

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

Il SIMATRED è un erbicida ad azione radicale indicato per il diserbo del mais dalle infestanti annuali, comprese il Giavone, la Panicastrella e la Sanguinella. Il prodotto non è efficace verso le malerbe già sviluppate e profondamente radicate nonché quelle rizomatose (Stopplone, Convolvolo. Gramigna e Cannarecchia o Melghetta).
Effettuare l'intervento irrorando il SIMATRED su terreno ben lavorato, privo di zollosità e di residui vegetali. Una rullatura che precede il trattamento è pertanto consigliabile;
il SIMATRED va applicato con pompe a volume normale munite di agitatore, al fine di evitare la sedimentazione del preparato nel serbatoio dell'apparato irrorante, e di ugelli con foro avente 1,5-2 mm di diametro;
curare l'uniformità di distribuzione evitando di ripassare più volte sullo stesso posto;
qualunque lavorazione del suolo fosse eseguita dopo l'applicazione dell'erbicida ne annullerebbe l'efficacia.
Il SIMATRED si applica alla dose di 4 kg ad ettaro dispersi in 400-1000 litri di acqua, durante l'operazione di semina oppure nell'intervallo che intercorre tra questa e l'emergenza delle piantine ma non oltre. L'acqua utilizzata per disperdere il SIMATRED deve essere limpida, possibilmente potabile, priva di sostanze organiche che inattiverebbero il prodotto. Per i trattamenti localizzati sulle file di semina, calcolare accuratamente la sospensione occorrente in base alla superficie realmente trattata. In ogni caso, prima del trattamento, si consiglia di fare una « prova in bianco »;
entro le due settimane successive alla distribuzione dell'erbicida, qualora non sopravvenisse una pioggia, è necessario fare ricorso ad una irrigazione affinché il prodotto venga trasportato negli strati superficiali del terreno;
non impiegare il SIMATRED nel diserbo del mais di secondo raccolto e nei terreni torbosi.

Preparazione della sospensione

Stemperare a parte la dose stabilita di prodotto in poca acqua, in modo da ottenere una pasta fluida e omogenea e versare poi questa nella quantità di acqua richiesta fino a raggiungere la diluizione voluta, rimescolando accuratamente.

Avvertenze

« Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento o di almeno 12 mesi per altre colture (es. bietole, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Da impiegare solo su colture specializzate ».
L'erbicida non è infiammabile, né irritante, né volatile, né corrosivo. Tuttavia, dopo l'uso, si lavino accuratamente i recipienti e le pompe irroratrici con acqua prima di destinarli ad altri trattamenti antiparassitari. Ove possibile si destini una sola pompa esclusivamente per la distribuzione dell'erbicida.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità - Il SIMATRED è miscibile con Diserbo C e Diserbo L

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto: kg 1

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

1195

Dodil U.P.

Polvere adesiva a base di Dodina

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Dodina pura	g 4,9
Coformulanti	q.b. a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomatologia: *azione irritante sul tratto gastro intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarree. Eczemi resistenti alle terapie a causa della fotosensibilizzazione. Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmie.*
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: *lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro) e digitale.*

caffaro S.p.A. - Milano

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 1195 del Ministero della Sanità del 26-3-1973

CARATTERISTICHE
Il DODIL U.P. CAFFARO è un fungicida organico in polvere adesiva a base di Dodina per la lotta contro: Ticchiolatura del melo, del pero e del nespolo, Occhio di pavone dell'Olivo, Muffa grigia dell'Uva (Botrytis).
Il DODIL U.P. CAFFARO è inoltre efficace contro: Cilidrosporiosi o Antracnosi del ciliegio, Peronospora della cipolla, Botrytis della fragola, Fusariosi del garofano, nonchè contro la Monilia e il Fusicoccum.
Il DODIL U.P. CAFFARO è indicato per le varietà di pero sensibili allo Zineb: Gentil bianca, Spadona d'estate, Butirra estiva, Scipiona, Curato, Santa Maria, Armella, Giardina, Coscia.
Il DODIL U.P. CAFFARO agisce PREVENTIVAMENTE verso spore e conidi bloccandone le vitali attività enzimatiche e svolge AZIONE CURATIVA disorganizzando le cellule del micelio del fungo parassita.
Il DODIL U.P. CAFFARO è dotato di una proprietà adesivante che prolunga la persistenza d'azione del preparato. Per la sua stessa composizione il DODIL U.P. CAFFARO favorisce la sintesi clorofilliana e la colorazione della frutta.
Il DODIL U.P. CAFFARO assicura la protezione della vegetazione e grazie alla sua formulazione come polvere secca permette una riduzione delle spese di somministrazione. Alla Dodina viene attribuita, inoltre, una certa azione acaricida.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Impiegare kg 25-40 di prodotto per ettaro e per trattamento alle epoche indicate dagli schemi di difesa normalmente in uso.
In olivocoltura impiegare 30-40 Kg di prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con carbaryl, dimetoato e metilazinfos.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dar luogo a scarsa sospensività; evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.

FITOTOSSICITÀ
Per la cultivar Golden Delicious il prodotto può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.

NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per animali domestici, pesci e bestiame.
AVVERTENZE: da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 1

1220

Il DODIL è un anticrittogamico specifico per la lotta preventiva-curativa della **Ticchiolatura del melo, del pero e del nespolo.**
L'azione preventiva interrompe il ciclo delle infezioni contaminanti mentre quella curativa, blocca le infezioni già in atto nella loro fase di incubazione nell'interno degli organi colpiti.
L'azione curativa si svolge anche alcuni giorni dopo il manifestarsi della malattia.

DOSI E MODO DI IMPIEGO

Ticchiolatura del pero, del melo e del nespolo:
Trattamenti preventivi g 60-80 per hl; trattamenti curativi g 120 per hl entro 72 ore dall'inizio della pioggia.
Cilindrosporiosi o Antracnosi del ciliegio:
Trattamenti preventivi g 60 per hl. Effettuare almeno 3 trattamenti iniziando subito dopo la fioritura e intervallando di circa 10-15 gg.
Peronospora della cipolla:
Trattamenti preventivi g 80 per hl; curativi g 150 per hl.
Botrytis della fragola:
Trattamenti preventivi g 100 per hl.
Ticchiolatura della rosa:
Trattamenti preventivi g 60-80 per hl; curativi g 100-120 per hl.
Fusariosi del garofano:
Trattamenti preventivi g 80-100 per hl; curativi g 150 per hl.
Marssonina del pioppo:
Eseguire 3-4 trattamenti a partire da metà aprile, a distanza di 3-4 settimane l'un dall'altro, impiegando g 80-100 di prodotto per hl.
Occhio di pavone o Cicloconio dell'olivo:
Impiegare il DODIL alla dose di g 80-100 in due interventi. Primaverile: alla ripresa vegetativa delle gemme a legno, fra la seconda metà di febbraio nelle zone meridionali ed insulari e la prima metà di marzo in quelle centrali. Autunnale: fra fine settembre e i primi di ottobre.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con carbaryl, dimetoato e metilazinfos.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dar luogo a scarsa sospensività; evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.

FITOTOSSICITÀ
Per la cultivar Golden Delicious il prodotto può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.

NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per animali domestici, pesci e bestiame.
AVVERTENZE: da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 1

Dodil

Anticrittogamico ad azione preventiva e curativa

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
Dodina pura . . . . g 83,7
Coformulanti . . . . q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomatologia: *azione irritante sul tratto gastro intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarree. Eczemi resistenti alle terapie a causa della fotosensibilizzazione. Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmie.*
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: *lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro) e digitale.*

caffaro S.p.A. - Milano

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 1220 del Ministero della Sanità del 7-5-1973

1236

Armex

Diserbante totale in polvere bagnabile per FRUTTETI - MEDICAI - ASPARAGIAIE - ARGINI DI RISAIE

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

DIURON puro	g 78,4
Coformulanti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

caffaro S.p.A. - Milano

0505

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 1236 del Ministero della Sanità del 3-8-1973

L'ARMEX è un diserbante che agisce in prevalenza per assorbimento radicale. L'intervento deve essere attuato su terreno lavorato privo di zolle, prima che le infestanti germinino o per lo meno quando queste si trovino nei primi stadi di vegetazione.
Avvenuta la distribuzione dell'erbicida, non bisogna lavorare il terreno per evitare di annullare l'effetto. L'eventuale caduta di una pioggia, oppure un'irrigazione alcune settimane dopo il trattamento, favoriscono la penetrazione dell'ARMEX.
L'ARMEX elimina le infestanti: Digitaria, Portulaca, Senape, Coda di volpe, Stellaria, Ambrosia, Giavone, Amaranto, Borsa del pastore, Avena, Papavero, Setaria, Ranuncolo, Camomilla.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Diserbo di vite, pero, melo e olivo
Iniziare i trattamenti dal quinto anno dalla messa a dimora, impiegando 4 kg di ARMEX in 800-1000 litri di acqua.
Eventualmente si possono effettuare due trattamenti a metà dose, uno in autunno e l'altro in primavera. Nei trattamenti successivi non è necessario rilavorare i terreni.

Diserbo erba medica
Si può effettuare il diserbo su terreno non lavorato, durante il riposo invernale e prima della ripresa vegetativa a partire dal secondo anno d'impianto utilizzando 1,6 kg di ARMEX per 600-800 litri di acqua ad ettaro.

Diserbo asparago
Si può effettuare il diserbo in pre-emergenza alla dose di 1,6 kg per 600-800 litri di acqua ad ettaro.

Diserbo gladiolo
Kg 0,800-1,200 ad ettaro in 400-600 litri di acqua, in pre-emergenza.

Diserbo argini risaia
Il diserbo può essere effettuato a partire dal momento in cui gli argini vengono sistemati fin quando le infestanti hanno raggiunto i 5 cm di sviluppo in altezza. L'umidità del terreno ed eventuali piogge non pregiudicano la riuscita del trattamento.
Impiegare kg 5 di ARMEX per ha in 10 hl di acqua.

Diserbo totale (aree rurali, industriali, aree ed opere civili)
Si può intervenire in qualunque periodo dell'anno, meglio in primavera prima che le foglie inizino a vegetare. Intervenendo su terreno ricoperto da una vegetazione esuberante bisogna procedere allo sfalcio ed asportare l'erba tagliata.

Dosi di impiego per il diserbo totale:
Kg 20-40 per ha, unitamente ad una quantità di acqua idonea ad assicurare un'omogenea distribuzione del prodotto. Su terreno con vegetazione esuberante impiegare kg 50-60 per ha.

Preparazione della sospensione
Riempire a metà il serbatoio della pompa, introducendo lentamente l'ARMEX agitando costantemente ed infine aggiungendo la rimanente acqua.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ: l'ARMEX è miscibile con i più comuni diserbanti in commercio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. È bene tuttavia, prima di impiegare l'ARMEX associato ad un altro diserbante, effettuare delle prove di miscibilità.

FITOTOSSICITÀ: l'ARMEX può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 1

1237

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con
prudenza

ERBICIDA SELETTIVO IN POLVERE BAGNABILE PER IL DISERBO DELLA COLTURA DEL MAIS

COMPOSIZIONE

g 45 di Atrazina pura
q.b. a g 100 di coadiuvanti e supporti inerti.

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (MI)

Registrazione Ministero della Sanità N. 1237 del 8-8-1973

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

L'ATRED 50 agisce per contatto e per assorbimento radicale sui germinelli delle infestanti annuali. Non è efficace verso le malerbe già sviluppate e profondamente radicate nonché quelle rizomatose (Gramigna, Melghetta, Convolvolo, Stopplone, Artemisia).
Effettuare l'intervento su terreno ben lavorato e rullato, senza zolle e residui vegetali;
impiegare pompe per la distribuzione a volume normale, munite di agitatore e di ugelli con foro di 1,5-2 mm di diametro; utilizzare acqua limpida, meglio se potabile, priva di sostanze organiche;
curare l'uniformità di distribuzione. Per trattamenti localizzati sulle file di semina, calcolare accuratamente la quantità di sospensione occorrente in base alla superficie realmente trattata. In ogni caso prima del trattamento fare una « prova in bianco » solo con acqua;
non lavorare il terreno dopo la distribuzione del prodotto;
l'ATRED 50 si applica nei seguenti modi:

a) **trattamento di pre-emergenza** (subito dopo la semina del mais).
   Kg 4-5 per ettaro dispersi in 600-1000 l di acqua, su infestanti non ancora germinate o nelle prime fasi di sviluppo (4-5 cm di altezza della parte aerea oppure, in condizioni siccitose, di profondità delle radici).
   Adottare la dose inferiore nei terreni sciolti o di medio impasto e la superiore in quelli compatti. Se entro gli 8-10 giorni dopo il trattamento non cade una pioggia è necessario fare una irrigazione.
b) **trattamento di post-emergenza** (dopo la nascita del mais fino allo stadio di 3-4 foglie).
   Kg 5 insieme a Kg 10-15 di olio bianco emulsionato per ettaro, dispersi in 600-1000 l di acqua, su infestanti alte 4-10 cm. Questo tipo di applicazione è consigliabile nei seguenti casi:
   1 - con andamento stagionale asciutto e non disponendo di irrigazione
   2 - nei terreni torbosi ove non sono possibili i trattamenti in pre-emergenza
   3 - nel controllo di alcune graminacee quali il Giavone e la Panicastrella.

Ridurre le dosi indicate a 3 kg/Ha. per il mais di secondo raccolto o nei terreni molto sabbiosi o ghiaiosi. In questi casi è opportuno che l'anno seguente non succedano bietole o tabacco.

Preparazione della sospensione

Stemperare la dose stabilita di prodotto in poca acqua in modo da ottenere una pasta omogenea e, agitando con cura, versare questa nell'acqua richiesta. Per la miscela con olio disperdere separatamente i due prodotti in poca acqua e, sempre agitando, versare le poltiglie ottenute nell'acqua occorrente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità - l'ATRED 50 è miscibile con Diserbo C, Diserbo L ed Oli bianchi emulsionati
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non consociare le coltivazioni di mais e di sorgo trattate ad altre colture
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre rispettare un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi
Prima di far seguire altre colture, effettuare una lavorazione profonda.
Lavare accuratamente le attrezzature usate con acqua prima di destinarle ad altri trattamenti antiparassitari. Ove possibile si destini una sola pompa esclusivamente per la distribuzione dell'erbicida.

Intervallo di carenza - Vedere modalità d'impiego.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto: kg 1

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

1269

Dipet

Fungicida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Folpet puro	g 42,5
Coformulanti . q.b. a	g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione.
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.

caffaro S.p.A. - Milano

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA Cavanella Po (Rovigo)
Registrazione n. 1269 del Ministero della Sanità del 29-9-1973

Il **DIPET** è un formulato Caffaro in polvere bagnabile dotato di caratteristiche simili all'ORTHOFOR CAFFARO, di una più prolungata persistenza d'azione e di proprietà antioidiche. E' raccomandato nel periodo vegetativo a cavallo della fioritura, allorchè i trattamenti rameici non possono essere effettuati in quanto provocherebbero danni ai fiori. In **Viticoltura** il **DIPET** trova impiego contro la **Peronospora** e la **Botrite** (Muffa Grigia).
Inoltre l'uso regolare del **DIPET** impedisce il propagarsi dell'infezione botritica dalla caliptra florale al resto del grappolo.
L'azione antioidica si manifesta in duplice modo: inspessendo i tessuti degli acini determinando così una maggiore difesa naturale nei confronti della crittogama e devitalizzando per contatto le spore che stanno per germinare.
In frutticoltura il **DIPET** è efficace contro la ticchiolatura del pero e del melo.
In ortofloricoltura combatte: vaiolatura e botrite della fragola, peronospora, alternariosi del pomodoro e della patata, cercospora e septoria della carota, antracnosi delle cucurbitacee, marciume del tulipano, gladiolo, giacinto e garofano.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO:

Vite - Effettuare i trattamenti nei seguenti periodi: alla fine della fioritura (alla chiusura del grappolo) e successivamente altri 2-3 trattamenti fino a 40 giorni prima del raccolto, in quanto i **trattamenti effettuati in epoche tardive potrebbero influire negativamente sulla fermentazione del mosto.** Non bisogna trattare con umidità e temperatura elevata.
La dose di impiego è di 150-250 g per hl di acqua.

Pomacee - Contro la ticchiolatura del pero e del melo g 300 per hl di acqua. **E' sconsigliabile trattare peri delle varietà Kaiser Alexander.**

Ortofloricoltura - I trattamenti contro le crittogame sopra descritte devono essere effettuati nelle prime fasi vegetative, proseguendo secondo la gravità delle infezioni, impiegare g 150-250 di prodotto per hl di acqua.

Disinfezione dei bulbi - Mettere a bagno i bulbi nella sospensione acquosa per circa 20 minuti, quindi estrarli e farli asciugare prima di porli a dimora.

Preparazione della poltiglia: stemperare la polvere in poca acqua agitando, indi portare al volume desiderato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il **DIPET** è miscibile con tutti gli antiparassitari ad eccezione delle Poltiglie Bordolesi, dei Polisolfuri e degli Oli bianchi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Far trascorrere 20 giorni da una applicazione con Oli minerali e prodotti a base di Zolfo.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto è fitotossico sulla varietà di pero Butirra d'Anyou, è sconsigliato sulla varietà Kaiser Alexander.

NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
Sulle uve da vino i trattamenti vanno sospesi 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione! da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 4

1291

LUSADON CAFFARO

Insetticida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
ENDOSULFAN puro . . . . g 28,2
Bagnanti e adesivanti . . . . q.b.a g 100

CLASSE II **NOCIVO**

NATURA DEL RISCHIO
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: *vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.*
Consigli terapeutici. *Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 g di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questo insetticida hanno **controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perchè** aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.*
Barbiturici (luminal 0,1-0,2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.
Controindicazioni: *morfina e alcool, e per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina e l'efedrina.*
AVVERTENZA: *consultare un Centro Antiveleni*

CAFFARO S.P.A. - MILANO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 1291 del Ministero della Sanità del 28-7-1973

CARATTERISTICHE
Il **LUSADON CAFFARO** è un insetticida in polvere bagnabile che agisce prevalentemente per ingestione e per contatto. Combatte validamente la Psilla del pero, l'Eriofide del nocciolo, la Dorifora della patata, la Cimice del frumento ed altri insetti come sotto specificato.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
- Frutticoltura
  (melo, pero, pesco, susino, nocciolo):
  Afidi, Psille, Microlepidotteri minatori, Tentredini, Antonomi, Tingidi, Maggiolino, Eriofide, Cellode, Cimice, Balanino . . . . .g 150-200/hl
- Orticoltura
  (asparago, bietola, cavolo, fagiolo, patata):
  Afidi, Dorifora, Maggiolino, Cimici, Antonomi, Tentredini, Aleurodidi, Apion, Criocera . . . . .g 250-300/hl
- Floricoltura in pieno campo.
  (garofano, rosa, gladiolo, crisantemo, tulipano):
  Afidi, Tentredini, Maggiolino, Microlepidotteri minatori, Cimici . .g 250-300/hl
- Frumento
  Cimici . . . . .g 250/hl

Sospendere in poca acqua la dose di prodotto, mescolare e versare nel quantitativo totale di acqua richiesto.
Il **LUSADON CAFFARO** può essere usato anche nella preparazione di esche per la lotta contro le **Agrotidi** (Nottue) di tutte le colture sopra menzionate: mescolare kg 10 di crusca con 100 g di **LUSADON CAFFARO**, inumidire con una quantità sufficiente di acqua. Usare kg 40-50 di esca per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il **LUSADON CAFFARO** è miscibile con la generalità degli antiparassitari. È bene usare precauzioni nella miscelazione con formulati a base di Dinocap.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': Il prodotto è tossico per le api, gli insetti utili. È nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 25 giorni prima del raccolto.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 1

1303

GHER®

CLASSE IV

Polvere bagnabile: Erbicida per il diserbo dei vivai, dei piantonai e dei giovani impianti in frutticoltura e viticoltura, del carciofo, dell'asparago, dell'erba medica, delle piante forestali e delle colture ornamentali.

Composizione: 30 g di Propyzamide pura, 25 g di simazina pura
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche: Il GHER è un erbicida indicato per il diserbo dei vivai, dei piantonai e dei giovani impianti in frutticoltura e viticoltura, del carciofo, dell'asparago, dell'erba medica, delle piante forestali e delle colture ornamentali.
Il GHER agisce per via radicale contro le più comuni e dannose infestanti dicotiledoni e graminacee annuali o comunque ad apparato radicale superficiale, quali: erba porcellana, borsa pastore, persicaria, giavone, setaria, digitaria, poa, erba mazzolina.
Il GHER copre il diserbo delle colture trattate per un periodo di almeno 4-6 mesi.

Modalità d'impiego: **Vivai e piantonai di vite e di fruttiferi** (melo, pero, pesco, albicocco, ciliegio): impiegare Kg. 2,5-3 di prodotto per ettaro in 600-800 litri d'acqua.
Giovani impianti fino a 4 anni (vite, melo, pero, albicocco, ciliegio): usare Kg. 4-5 di prodotto per ettaro in 600-800 litri d'acqua.
Vigneti e frutteti di oltre 4 anni: impiegare Kg. 4-6 di prodotto per ettaro in 600-800 litri di acqua.
Usare le dosi più basse nei terreni leggeri, con porta innesti deboli e per le drupacee (pesco, albicocco, ciliegio); le dosi più alte consigliate sono da impiegare invece per le pomacee (melo e pero), per la vite, in terreni di medio impasto o pesanti e con porta innesti più vigorosi.
In caso di siccità persistente effettuare una leggera irrigazione a pioggia, che favorisca la germinazione delle infestanti.
Eseguire il trattamento possibilmente in primavera, qualche giorno dopo una lavorazione al terreno, quando le infestanti stanno per germinare.
I migliori risultati si ottengono comunque effettuando un trattamento autunnale e uno primaverile, impiegando le dosi più basse consigliate.
Carciofo: impiegare Kg. 3 di prodotto per ettaro in 800-1000 litri di acqua. Effettuare il trattamento dopo l'ultima lavorazione estiva.
Asparago: impiegare Kg. 3-5 di prodotto per ettaro in 600-800 litri di acqua. Applicare il GHER dopo la colmatura in primavera, oppure subito dopo la lavorazione primaverile.
AVVERTENZA: Escludere dal trattamento le carciofaie nei primi 2 anni dall'impianto.
Erba medica: impiegare Kg. 2,5-3 di prodotto per ettaro in 600-800 litri d'acqua. Eseguire il trattamento durante il riposo vegetativo della coltura (novembre-febbraio).
Colture ornamentali ed arbusti da frutto (rose, ligustro, bosso azalee, lampone, rovo, ribes): nei vivai e nei nuovi impianti usare Kg. 2,5-3 di prodotto per ettaro, in 600-800 litri d'acqua, effettuando il trattamento subito dopo la messa a dimora delle piantine.
Negli impianti di più di un anno d'età e su piante a dimora già consolidate, impiegare Kg. 3-4 di prodotto per ettaro, eseguendo il trattamento a fine autunno o subito dopo la lavorazione di fine inverno.
Conifere ed altre piante forestali: nei vivai impiegare Kg. 2,5-3 di prodotto per ettaro, in 600-800 litri d'acqua, subito dopo l'impianto; nei piantonai o sulle piante a dimora, usare Kg. 3-4 di prodotto per ettaro, effettuando il trattamento a fine autunno o subito dopo la lavorazione di fine inverno.
Non trattare i semenzai.
Avvertenza: Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili successive a quelle trattate, occorre rispettare un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per altre colture (es. bietole, tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.

Preparazione della poltiglia: Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi aggiungerlo lentamente e sotto agitazione alla quantità d'acqua necessaria.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: Il GHER per la sua formulazione e lo specifico campo d'impiego non deve essere miscelato con insetticidi, anticrittogamici e con concimi.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dal trattamento erbicida alla eventuale semina di colture successive a quelle indicate in etichetta (Vite, Melo, Pero, Pesco, Ciliegio, Albicocco, Nocciolo, Agrumi, Carciofo, Asparago, Rosa, Ligustro, Bosso) occorre un intervallo di 7 mesi per il Frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture. Impiegare il GHER solo per il diserbo di colture arboree specializzate.

Rischi di nocività: Il GHER è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione: DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione: ROHM & HAAS ITALIA S.p.A. - Stabilimento di Treviglio

Confezionamento: DIACHEM S.p.A. - Stabilimento di Albano S. Alessandro (BG)
Registrazione Nr. 1303 del 16.11.1973 del Ministero della Sanità
DA NON VENDERSI SFUSO.
® Marchio registrato dalla Rohm & Haas Co. - Filadelfia (U.S.A.)
Contenuto Kg. 1-5-10

1326

MOLINAM® MDP

Diserbante selettivo liquido emulsionabile per la lotta contro il giavone e le ciperacee della risaia, a base di Molinate, Diclorprop e Mecoprop.
Il prodotto è efficace sia sui semi dei giavoni (Panicum-Echinocloa spp.) sia nei confronti del quadrello (Scirpus mucronatus). Controlla inoltre il cipollino (Scirpus maritimus) ed il cucchiaio (Alisma plantago) anche se non totalmente.

COMPOSIZIONE

– Molinate puro	g	35
– Diclorprop acido puro (da estere butossietanolico)	g	5
– Mecoprop acido puro (da estere butossietanolico)	g	7
– Emulsionanti, solventi: quanto basta a (contiene Xilolo)	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM - Soc.It.Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale G. Galeazzo, 3 Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

Registrazione n. 1326 del 20.10.1973 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali : conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione : Nausea, vomito, diarrea, apatia, astenia, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

Terapie consigliate : Se ingerito, provocare il vomito, lavanda gastrica, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, purganti salini, solfato di chinidina. Nel caso di contatto con la cute e le mucose; lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Consultare un Centro antiveleni e nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in Centro di rianimazione.

Controindicazioni : alcool, olii, grassi, digitale.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega in post-emergenza, purchè la coltura abbia superato lo stadio vegetativo della 3.a foglia ed esista la presenza delle ciperacee. Durante il trattamento il livello dell'acqua deve essere mantenuto alto. Il prodotto va impiegato alla dose di 8,5–10,5 Kg/Ha che vanno diluiti in 400–500 o più litri di acqua distribuendo tale poltiglia uniformemente sulla superficie da diserbare.

Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua mescolando con cura.
Le pompe usate per la distribuzione del diserbante non debbono essere impiegate per altri trattamenti insetticidi od anticrittogamici, salvo che vengano accuratamente eliminati i residui con lavaggi ripetuti di acqua calda e soda.

Avvertenze: affinchè il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che dopo il trattamento non si facciano asciutte per almeno 40 giorni e si mantenga un elevato livello dell'acqua, evitando comunque affioramenti del terreno; ciò per evitare la perdita per evaporazione del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni diserbanti. E' consigliabile però procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti che si vogliono associare non presentino incompatibilità tra gli eccipienti. La precipitazione di fiocchi abbondanti od un'alterazione del colore sconsiglierà la miscelazione.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

Fitotossicita': il prodotto è dannoso per le viti, gli ortaggi, i fruttiferi, i pioppi e floreali in genere. Occorre evitare che la soluzione diserbante giunga a contatto con tali colture.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

SIPCAM

1328

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Il *FOSFOMAL 50* si usa in agricoltura a dosi varianti da 80 a 150 grammi per ettolitro di acqua contro afidi in genere, tignole, tentredini, larve e adulti di lepidotteri, sulle culture di melo, pero, susini, vite e bietole.

DA NON APPLICARSI CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
Il *FOSFOMAL 50* è miscibile con tutti i prodotti di comune impiego.

Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali scritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.

Intervallo che deve essere rispettato fra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni.

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

FOSFOMAL 50

INSETTICIDA LIQUIDO A BASE DI MALATHION

COMPOSIZIONE: 100 gr di prodotto contengono

Malathyon puro	gr 48
Emulsionanti, tensioattivi e solventi q.b. a	gr 100

(CONTIENE XILOLO)

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a - Telef. 90.62.07
44042 — C E N T O (Ferrara)

Stabilimento di produzione:
SCAM S.r.l. - Via Bellaria n. 164 - MODENA

Registrazione n. 1328 del 6-12-1973 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO KG.**

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina, finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI:
Morfina, teofilline, aminofilline, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA:
Consultare un centro antiveleni.

1330

GRANDOR®

DISERBANTE ORMONICO SELETTIVO PER CEREALI

CARATTERISTICHE: erbicida ormonico selettivo traslocabile per assorbimento fogliare.

INFESTANTI COMBATTUTE: dicotiledoni annuali e perenni quali: erba storna, convolvolo, galinsoga, amaranto, erba morella, chenopodio, plantaggine, taraxaco, ravanello, senecio, gallum, stopplone, romice, fiordaliso, ranuncolo, veccia, capsella, senape selvatica, colza, ederella terrestre, scardaccione, papavero, celidonia, camomilla, veronica, stellaria, vilucchio, fumaria.

COLTURE PROTETTE: cereali (frumento, orzo, segale, avena, panico, miglio, scagliola).

DOSI D'IMPIEGO: gr. 400-1250 ogni 500-700 litri d'acqua/Ha. Con temperature inferiori al 13°C usare dosi prossime alla massima, con temperature superiori ai 17-18°C dosi intermedie. La dose prescelta sarà inoltre sui livelli massimi se prevalgono erbe resistenti quali stellaria, vilucchio, camomilla, fumaria, e se le infestanti sono molto sviluppate e fitte. Se il cereale è vigoroso e se prevale la veccia usare dosi più basse.

EPOCHE D'IMPIEGO: eseguire il trattamento nel periodo compreso tra la fine della fase di accestimento e l'inizio della botticella con temperatura superiore al 10°C.

MODALITA' D'IMPIEGO: eseguire il trattamento su coltura asciutta. Se piove subito dopo l'intervento, ripetere il trattamento il giorno dopo a dosi dimezzate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con gli erbicidi della stessa classe.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi e floreali in genere. Evitare quindi che giunga a contatto con tali colture anche sottoforma di vapori portati dal vento. La semina del trifoglio e dell'erba medica in campi trattati con il prodotto può essere eseguita 10-12 giorni dopo l'applicazione, dopo aver erpicato il terreno.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per animali domestici, pesci e bestiame. E' nocivo per gli insetti utili.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Composizione

2,4 D estere isoottilico . . . . g. 47,5
(corrispondenti ad acido libero g. 31,4)
Coformulanti . . . . . q. b. a g. 100,0
• contiene xilolo •

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61/2 - Telex I 511046

Registrazione N. 1330
del 28-3-1974
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (BO)

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto o fresco.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione: *astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.*

Consigli terapeutici:
Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni: *è sconsigliata la digitale.*

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

VERCHIM ASTERIAS

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

1335

MOLINAM® DP

Diserbante selettivo liquido emulsionabile per la lotta contro il giavone e le ciperacee delle risaie a base di Molinate e Diclorprop.
Il prodotto è efficace sia sui semi di giavoni (Panicum-Echinocloa spp.) sia nei confronti del quadrello (Scirpus mucronatus). Controlla inoltre il cipollino (Scirpus maritimus) ed il cucchiaio (Alisma plantago) anche se non totalmente

COMPOSIZIONE

— Molinate puro	g	35
— Diclorprop acido puro (da estere butossietanolico)	g	10
— Emulsionanti, solventi:quanto basta a	g	100
· contiene Xilolo		

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM - Soc.It.Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale G. Galezzo, 3 Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

Registrazione n. 1335 del 20.10.1973 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali : conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione : Nausea, vomito, diarrea, apatia, astenia, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

Terapia consigliata : Se ingerito, provocare il vomito, lavanda gastrica, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, purganti salini, solfato di chinidina. Nel caso di contatto con la cute e le mucose; lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Consultare un Centro antiveleni e nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in Centro di rianimazione.

Controindicazioni : alcool, olii, grassi, digitale.

MODALITA'DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega in post-emergenza, purchè la coltura abbia superato lo stadio vegetativo della 3.a foglia ed esista la presenza delle ciperacee. Durante il trattamento il livello dell'acqua deve essere mantenuto alto. Il prodotto va impiegato alla dose di 8,5—10,5 Kg/Ha che vanno diluiti in 400—500 o più litri di acqua distribuendo tale poltiglia uniformemente sulla superficie da diserbare.

Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua mescolando con cura.
Le pompe usate per la distribuzione del diserbante non debbono essere impiegate per altri trattamenti insetticidi od anticrittogamici, salvo che vengano accuratamente eliminati i residui con lavaggi ripetuti di acqua calda e soda.

Avvertenze: affinchè il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che dopo il trattamento non si facciano asciutte per almeno 40 giorni e si mantenga un elevato livello dell'acqua, evitando comunque affioramenti del terreno; ciò per evitare la perdita per evaporazione del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni diserbanti. E'consigliabile però procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti che si vogliono associare non presentino incompatibilità tra gli eccipienti. La precipitazione di fiocchi abbondanti od un'alterazione del colore sconsiglierà la miscelazione.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

Fitotossicita': il prodotto è dannoso per le viti, gli ortaggi, i fruttiferi, i pioppi e floreali in genere. Occorre evitare che la soluzione diserbante giunga a contatto con tali colture.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

1360

Erbicida selettivo in pasta liquida per coltura del Mais e del Sorgo

COMPOSIZIONE:

— Atrazina puro	gr. 42,68
— Sospensivanti, bagnanti e coadiuvanti	q.b. a gr. 100

Classe tossicologica III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza.
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
- conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

S.C.A.M. s.r.l. MODENA
Officina di produzione: SCAM - MODENA
Reg. Ministero della Sanità n. 1360 del 24-10-1974

MODALITA' D'IMPIEGO:
Il ZEALIN L è un diserbante in pasta liquida, selettivo per la coltura del Mais e del Sorgo.

Agisce per contatto sulla vegetazione delle infestanti ed ancor più per assorbimento radicale.

La maggior efficacia si ottiene quando il trattamento è preceduto o seguito da una pioggia o in caso di prolungata siccità da opportune irrigazioni.

Il ZEALIN L combatte le malerbe annuali monocotiledoni, la Persicaria, la Veronica, gli Amaranti, i Giavoni, il Farinaccio, le Poe e la Plantaggine.

Il ZEALIN L si impiega in primavera in pre-emergenza durante la semina oppure nell'intervallo tra questa e l'emergenza delle piantine ed anche pochi giorni dopo la fuoriuscita per interventi ritardati dovuti alla stagione avversa.

Il ZEALIN L va impiegato alla dose di Kg. 4/Ha, in 600-1.000 litri di acqua.
Sui terreni molto umidi o sui terreni leggeri la dose deve essere ridotta a Kg. 3/Ha.

Nel diserbo localizzato saranno sufficienti Kg. 1,3-1,5/Ha.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA': è incompatibile con tutti i formulati antiparassitari.

FITOTOSSICITA': si consigliano prove parcellari per le varietà poco note o di recente acclimatazione.

Non contaminare corsi d'acqua.

AVVERTENZE: dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es.: bietole, tabacco).

Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

INDICAZIONI DI IMPIEGO: Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO NETTO KG. 25

1376

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI ZINEB

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono
ZINEB puro gr 65
Disperdenti, bagnanti e inerti q.b. a gr 100

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni.
In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
L'ETAZIN è un prodotto in polvere bagnabile da usarsi per trattamenti liquidi.
Si usa a dosi varianti da gr 200 a gr 300 per ettolitro di acqua contro: Ticchiolatura del melo e del pero; Peronospora della vite; Alternariosi del pomodoro solo fino alla prima fioritura; Ruggine del garofano.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA - NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità: l'ETAZIN è miscibile con tutti i prodotti di comune impiego.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': varietà di pere sensibili allo Zineb: Abate Fetel, Armella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Intervallo che deve essere rispettato fra l'ultimo trattamento e la raccolta: 28 giorni.

« Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. »
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. »
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. »

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a — CENTO (Ferrara) — Tel. 906207

Officina di produzione
SARIAF S.p.A. - FAENZA (RA)
Registrazione N. 1376 del 6 dicembre 1973 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO PESO NETTO KG

1405

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

Polvere bagnabile insetticida per la lotta contro la Carpocapsa delle pomacee e del noce, Tignola orientale del pesco, Tignole dell'uva e Bega del garofano in pieno campo e in serra

COMPOSIZIONE

Carbaryl puro, esente da β-naftolo	g 49
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento **BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.** Treviglio (BG)

Registrazione n. 1405 del 28-1-1974 del Ministero della Sanità.

® Marchio registrato

Modalità e dosi di impiego per litri 100 di acqua in trattamenti a volume normale

MELO E PERO - **Carpocapsa (baco o verme) e i microlepidotteri (Cacoecia, Eulia, Capua):** g. 120-150 iniziando circa 15 giorni dopo la caduta dei petali e ripetendo i trattamenti ogni 10-15 giorni sino a due settimane dalla raccolta.
PESCO - **Tignola orientale:** g 200 ripetendo i trattamenti ogni 15 giorni dalla fine di maggio-primi di giugno sino in prossimità della raccolta.
NOCE - **Carpocapsa:** come per il melo.
MANDORLO - **Bombice gallonato o campa:** g 150-200, alla comparsa delle larve.
VITE - **Tignole:** g 150-200, intervenendo: 1) poco prima della fioritura; 2) ad acini grandi come un pisello ed eventualmente 3) all'invaiatura (inizio della maturazione).
OLIVO - **Tignola:** g 200 quando la maggior parte dei bocci florali sta per aprirsi. **Cocciniglia mezzo grano di pepe:** g 250, intervenendo di norma a fine agosto. In caso di forti infestazioni, trattare due volte rispettivamente all'inizio ed alla fine di agosto.
AGRUMI - su limone - **Tignola,** alla comparsa delle prime larve e ripetendo il trattamento dopo 15 giorni in caso di forti attacchi. **Cocciniglia mezzo grano di pepe:** g 200-250.
MAIS - **Piralide e Sesamia:** g 350-400. Intervenire contro la prima generazione quando le piante di mais ibrido hanno raggiunto un'altezza media di circa un metro. Aver cura di investire le piante dall'alto. Ripetere il trattamento all'incirca dalla fine di luglio-primi di agosto una o due volte a 10-12 giorni d'intervallo contro la seconda generazione che attacca le pannocchie.
PATATA - **Dorifora:** g 200-250.
FORAGGERE
Erba medica e Trifoglio - **Fitonomo, Apioni, Miscurino, Sputacchina, Falene, Oziorrinco:** g 200-250, al primo apparire dell'infestazione dopo lo sfalcio se la coltura è destinata alla alimentazione del bestiame; in ogni periodo se da seme.
ORTAGGI
Carciofo - **Depressaria, Nottua o Idroecia, Altica, Punteruolo o Larino, Cassida:** g 200-250. Asparago - **Criocera, Nottuidi** (Heliothis armigera): g 150-200. Cavoli, Ortaggi a radice: Rapa Ravanello e Navone - **Cavolaia, Mamestra, Punteruoli, Altiche:** g 150-200.
Ortaggi a frutto (Cucurbitacee): Cocomero, Melone, Zucca, Zucchino, Cetriolo - **Altiche:** g 150-200.
GAROFANO (in pieno campo e serra) - **Bega verde:** g 200, iniziando alla prima comparsa delle larve e ripetendo i trattamenti ogni 10-15 giorni in caso di necessità. È bene aggiungere g 30-50 di un bagnante adesivo per migliorare l'efficacia del trattamento.

Preparazione della sospensione

Versare il quantitativo di PANAM PB 50 necessario in poca acqua e quindi, agitando continuamente, aggiungere alla rimanente acqua sino ad ottenere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Il PANAM PB 50 è miscibile con gli insetticidi e fungicidi di uso più comune esclusi i prodotti alcalini in genere (Poltiglia bordolese, polisolfuri).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili e pertanto, non può essere distribuito durante la fioritura. È nocivo per gli animali domestici il bestiame ed i pesci.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione

Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto.
Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al Centro di rianimazione.
Ossigeno - terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni

Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

1414

CUPRENOX 16%

OSSICLORURO AL 16 % DI RAME

COMPOSIZIONE: Rame metallico gr. 16
(sotto forma di Ossicloruro di rame e calcio)
Disperdenti, supporti, coadiuvanti q.b. a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CLASSE III

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: Il CUPRENOX 16 % è un fungicida impiegato su: Vite, Patata e Pomodoro contro peronospora; Bietola contro cercospora, Pesco contro Bolla; Olivo contro occhio di pavone; fruttiferi contro la Ticchiolatura.

EPOCA DI APPLICAZIONE: Le applicazioni sono preventive e vanno effettuate in concomitanza delle condizioni di umidità e temperatura favorevoli all'insorgere delle malattie.

DOSI DI IMPIEGO
Kg. 1 - 1,5 per 100 litri di acqua per trattamenti sulla vegetazione (primavera-estate).
Kg. 2,5-3 per 100 litri di acqua per trattamenti a piante in riposo (autunno-inverno).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: E' miscibile con i comuni antiparassitari a reazione neutra.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco e varietà di melo quale Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, e di pero quali Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne consiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per i pesci.
— Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni.
— Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
— Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione Ministero della Sanità n. 1414 del 29-7-1974

Prodotto nello Stabilimento DIACHEM S.p.A. di Albano S. Alessandro (BG)

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso Kg. 25**

1424

ANTICRITTOGAMICO ORGANICO AD AZIONE PREVENTIVA

MANCOZEB PURO g 80 - BAGNANTI, DISPERDENTI, INERTI QUANTO BASTA A g 100.

CLASSE III

: manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;
— conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;
— in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;
— durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione - Purganti salini - Cure sintomatiche. Per la irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: *alcool, olii e grassi.*

Avvertenza: *consultare un centro antiveleni.*

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il FUNGI MZ è usato per trattamenti liquidi alla dose di g 150-300 per 100 litri di acqua, dose valida per trattamenti con pompa a volume normale.
Il FUNGI MZ è usato nella difesa delle seguenti colture dalle crittogame indicate:

— vite: contro peronospora;
— melo e pero: contro ticchiolatura, gloeosporium;
— pomodoro fino alla prima fioritura: contro peronospora, alternariosi, septoriosi, antracnosi;
— tabacco: contro peronospora tabacina, antracnosi;
— pioppo: contro marssonina, ticchiolatura;
— garofano: contro ruggine, alternariosi, septoriosi;
— cereali in campo: contro ruggine, septoriosi.

DIVIETO D'IMPIEGO

- **divieto d'impiego in serra;**
- **divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.**

Da non applicare con mezzi aerei.

Miscibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio e con tutti quelli di nostra produzione, ad eccezione della poltiglia bordolese. Evitare miscele con concimi fogliari contenenti boro. AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: varietà di pere sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIVAM SOCIETA' ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO S.p.A.
VIA SCARLATTI, 30 - 20124 MILANO - TELEFONO 270 451

Officina di produzione: Diachem S.p.A. - 24061 Albano S. Alessandro (Bg)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 1424 del 28-1-1974 Peso Kg. 1

1467

Dimetiox

Insetticida emulsionabile a base di Metil-Parathion

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Metilparathion puro	g 18
Solventi ed emulsionanti.	q.b.a g 100
Contiene Xilolo	

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I **VELENO**

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es.: interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere, ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: *in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.*

Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzione acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.*

AVVERTENZA

Consultare un centro antiveleni

caffaro S.p.A. - Milano

0505

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 1467 del Ministero della Sanità del 23-12-76

Il **DIMETIOX** è un insetticida in soluzione emulsionabile a base di Metilparathion con azione antiparassitaria propria degli esteri fosforici.

Il **DIMETIOX** agisce prevalentemente per contatto ma anche per ingestione e per asfissia.

Il **DIMETIOX** possiede inoltre la prerogativa di essere parzialmente assorbito dai tessuti vegetali causando la morte degli insetti che succhiano la linfa.

Innocuo per le piante coltivate, è perfettamente miscibile con gli oli minerali e come tale, trova utile impiego anche nei trattamenti di fine inverno.

Il **DIMETIOX** combatte: Mosca delle olive, Bega del garofano, Afidi, Cicaline, Lepidotteri, Tripidi, Psillidi, Cocciniglie, Altiche, Casside, Tignole, Tentredini, Tingidi delle seguenti colture:

- agrumi, vite, olivo, pomacee, drupacee, nocciolo, barbabietola, aglio, asparago, bietola, carciofo, carota, cavolo, cipolla, colza, fragola, rapa, insalate, sedano, zucca, melanzana, patata, peperone, pomodoro, pioppo, colture ornamentali e floreali in campo.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Il **DIMETIOX** si usa disperso in acqua o nelle poltiglie antiparassitarie a dosi variabili da g 40 a 200 in 100 litri a seconda degli insetti da combattere e del grado di infestazione dei medesimi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il **DIMETIOX** è miscibile con tutti gli antiparassitari in commercio, ad esclusione dei polisolfuri di calcio e di bario e del Binapacryl.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il **DIMETIOX** è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto: in caso di miscela con oli minerali elevare tale intervallo a 30 giorni.

Avvertenza: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO NETTO Kg 1

1501

REBEL®

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile — **Fungicida cupro-organico per la lotta contro le principali malattie crittogamiche della vite, delle pomacee, delle colture industriali, floricole ed ornamentali.**

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb p.a. puro gr. 30
(da p.a. tecnico all'80%)
Rame metallo gr. 20
(da ossicloruro di rame tecnico al 50% di rame metallico).
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA:
— **in caso di ingestione**
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;
— **per l'irritazione della cute e delle mucose**
Lavaggio, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.
Controindicate: alcool, olii e grassi.

Modalità e campi d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua:

Pomacee: contro la ticchiolatura del melo e del pero, nei trattamenti pre-florali g. 300.

Vite: contro la peronospora, prima della fioritura g. 250-350 dopo la fioritura g. 250-350 in caso di forti infezioni impiegare la dose massima consigliata ed abbreviare l'intervallo dei trattamenti.

Pomodoro fino alla prima fioritura: contro peronospora, septoriosi ed alternariosi g. 300-400.

Garofano: contro la ruggine g. 300-400.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON IMPIEGARE IN SERRA.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Compatibilità
Il REBEL® è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura.

Sulle varietà di melo (Abbondanza «Belford» - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft-Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel - Buona Luigia d'Avanches - Butirra Clargeau - Passacrassana - B. C. William - Dott. Jules Cuyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 1501 del 10.6.74 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 10

DU PONT
DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

1506

® MAPOSOL

SOLUZIONE FUMIGANTE
NEMATICIDA, FUNGICIDA, INSETTICIDA, ERBICIDA

COMPOSIZIONE: Metam Sodium (N-Metilditiocarbammato sodico anidro) g 32,6, coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- durante l'impiego in serra, in luoghi chiusi e non aerati, usare maschere protettive;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.)
Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: consultare un Centro antiveleni.

Roussel-Hoechst Agrovet S.p.A.
20100 Milano - Casella Postale 1847
Officina di produzione
Baslini Industrie Chimiche S.p.A. - Treviglio (Bergamo)

Registrazione n. 1506 del 21-5-74 del Ministero della Sanità

® Marchio registrato della Procida S.A. - Marsiglia

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente dalla Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s. Meno.

USI PRINCIPALI

MAPOSOL è un fumigante che combatte i funghi parassiti, le erbe infestanti, gli insetti e i nematodi del terreno. Viene impiegato per la disinfezione del terreno prima delle semine o dei trapianti, particolarmente di tabacco, colture ortive e floreali.

DOSI DI IMPIEGO

La dose di impiego varia da 0,5 a 1,8 Kg di prodotto ogni 10 metri quadrati di superficie, diluiti in 30-50 litri di acqua in funzione della struttura del terreno, della temperatura e del tipo di crittogame. Le dosi massime sono consigliate per le applicazioni su terreni compatti o particolarmente soggetti alle crittogame.

METODI DI IMPIEGO

Dopo diluizione nel quantitativo di acqua richiesto, il prodotto viene distribuito su terreno nudo, ben lavorato, giustamente umidificato e con una temperatura non inferiore ai 10°C, mediante comuni innaffiatoi o con apparecchiature apposite. Subito dopo l'intervento occorre effettuare una abbondante irrigazione (10 litri di acqua circa per metro quadrato) per favorire la penetrazione del prodotto nel terreno. Con tempo caldo, secco e ventilato sarà opportuno ripetere l'irrigazione 36-48 ore dopo il trattamento, per evitare una rapida evaporazione del fumigante. Una decina di giorni più tardi o anche più, se l'andamento stagionale è freddo e umido, lavorare superficialmente il terreno (evitando di raggiungere lo strato non disinfettato) allo scopo di favorire la dispersione del gas nell'atmosfera.

EPOCA DEL TRATTAMENTO

MAPOSOL viene impiegato in ogni periodo dell'anno, da 20 a 30 giorni prima delle semine o dei trapianti purché la temperatura del terreno all'atto del trattamento non sia inferiore ai 10°C o superiore ai 30°C.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

MAPOSOL non viene miscelato con altri antiparassitari.

FITOTOSSICITA'

Per le colture da serra si raccomanda di non trattare nelle vicinanze di piante coltivate. In ogni caso assicurarsi che non rimangano tracce di fumigante nella terra prima di procedere all'impianto della coltura. Far trascorrere 20-30 giorni tra il trattamento e la semina o il trapianto. In caso di rilevanti piogge e su terreni compatti tale periodo deve essere prolungato di 1 settimana.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci; è nocivo per gli animali domestici ed il bestiame.

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

15.585

Kg. 5

1515

DUASIL®

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile — **Fungicida cupro-organico per la lotta contro le principali malattie crittogamiche della vite, delle piante da frutto e delle colture industriali e floricole.**

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo p.a. puro gr. 15
(da ossicloruro di rame tecnico al 58,7%)
Zineb (etilenbisditiocarbammato di zinco)
p.a. puro gr. 20
(da p.a. tecnico al 90%)
Bagnanti, disperdenti, coloranti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico

SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA:

— **in caso di ingestione**
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

— **per l'irritazione della cute e delle mucose**
Lavaggio, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.
Controindicate: alcool, olii e grassi.

Modalità e campi d'impiego

Dosi per 100 litri d'acqua:

Vite: contro la peronospora prima della fioritura: g. 300; dopo la fioritura g. 300-400. In caso di forti infezioni impiegare la dose massima consigliata ed abbreviare l'intervallo dei trattamenti.

Pomacee: contro la ticchiolatura del melo e del pero nei trattamenti pre- florali: g. 300.

Pomodoro fino alla prima fioritura: contro peronospora, septoriosi, alternariosi: g. 300-400.

Garofano: contro la ruggine g. 300-400.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON IMPIEGARE IN SERRA.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Compatibilità

Il DUASIL è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Su alcune cultivars di pero (Abate Fetel, Armella, Butirra Morettini, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, S. Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinicarpi) il prodotto può dar luogo ad alcune manifestazioni fitotossiche e pertanto se ne sconsiglia l'uso.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 1515 del 10.6.74 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 5 -1-10-26

DU PONT
DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

1521

Frumidor®

Fungicida organico in polvere bagnabile ad azione preventiva e curativa efficace per la difesa del frumento, oltre che della vite del melo, del pero e del garofano.
Si impiega in trattamenti liquidi come specifico contro le malattie tardive del frumento, (Mal del piede, Oidio, Septoria, Fusariosi, Ruggini) ovvero per la concia delle sementi.
Si può usare anche in irrorazioni liquide contro Peronospora ed Oidio della vite. Ticchiolatura, Oidio e Gloeosporium delle pomacee; Ruggine, Botrytis, Septoria, Marciumi radicali, Verticilliosi e Fusariosi del garofano.

COMPOSIZIONE:

— Tiofanato-metile puro . . . . g.	14
— Maneb puro . . . . g.	60
— Coadiuvanti, inerti: quanto basta a . . . . g.	100

® Marchio registrato SIPCAM - Milano

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A. - Viale G. Galeazzo, 3 Milano - Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 1521 del 28 - 3 - 1974 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento é avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente é cosciente; se é in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO

FRUMENTO

— **Per la lotta contro le malattie tardive** che colpiscono il piede, le foglie, il culmo e la spiga del frumento (Fusariosi, Septoriosi, Mal del piede, Oidio, Ruggine) e che riducono sensibilmente la produzione, effettuare almeno u... orazione al termine della spigatura (inizio fioritura) impiegando una dose di 2,5-3,5 Kg./ettaro di prodotto, distribuito in 400-500 lt. di acqua. Nel caso vi sia una comparsa delle malattie potrebbe essere utile effettuare anche un trattamento durante la levata del frumento, sempre alla stessa dose.

TRATTAMENTO SEMENTI

Per la concia delle sementi prima della semina impiegare il prodotto alle seguenti dosi per ql. di seme.

- Frumento ed Orzo : g 200-300
- Riso : g 300-500
- Bietola da zucchero : g 300-500
- Ortaggi : g 300-500
- Bulbi di fiori e ornamentali : g 400-600

Avvertenza: i semi e bulbi trattati residuati della semina non possono essere destinati all'alimentazione umana né animale.

VITE

— **Peronospora, Oidio, Botrytis della vite: g. 200-300 per 100 litri di acqua irrorati con pompe a volume normale.**
Per la lotta contro la Peronospora effettuare i normali trattamenti sulla base dei calendari comunemente usati in zona contro tali malattie.
Per la lotta contro la Botrytis effettuare trattamenti subito prima e subito dopo la fioritura e successivamente per almeno 3-4 volte ad opportuni intervalli sino a qualche tempo prima della vendemmia.
Per la lotta contro l'Oidio, nei casi si effettuino trattamenti molto distanziati fra di loro contro la Peronospora o la Botrytis, intervenire con trattamenti intercalari di zolfi in polvere o di zolfi bagnabili.

MELO E PERO

Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate per 100 litri di acqua irrorati con pompe a volume normale.
— **Ticchiolatura ed Oidio del melo - Ticchiolatura del pero:**
Trattamenti pre-fiorali o primi post-fiorali: g. 200-250
Trattamenti post-fiorali successivi: g. 150-200.
Effettuare trattamenti preventivi distanziati di 8-10 giorni nella fase primaverile, allargando l'intervallo fra i trattamenti successivamente.
Il prodotto può essere usato in trattamenti curativi entro 60-72 ore dall'inizio delle piogge infettanti ovvero in trattamenti bloccanti contro macchie già manifeste di Ticchiolatura: in tali trattamenti usare una dose di 300-400 g. Trattamenti ripetuti ad intervalli non troppo distanziati riducono le popolazioni di Acari parassiti (Ragnetti rossi).

GAROFANO

— **Ruggine, Botrytis, Septoria e Fusariosi rameali: 250-300 g./hl., irrorati con pompe a volume normale.**
— **Verticilliosi, Fusariosi radicali, Marciumi radicali: 7-10 g./mq. di superficie sciolti in 5-10 litri di acqua, ripetendo i trattamenti ad opportuni intervalli.**

Avvertenza: l'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Da non impiegare in serra.

Da non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari di uso primaverile-estivo eccezion fatta per le miscele alcaline come Poltiglia bordolese e Polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: su alcune cultivar di pero (es. Butirra precoce Morettini, Conference, Curato, Principessa di Gonzaga, Zucchermanna, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona, Spadoncina, Scipiona, Coscia, Mora, Giardina, Spinacarpi, Armella, S. Maria, Decana del Comizio, Abate Fetel) il prodotto può dare luogo a manifestazioni fitotossiche e pertanto se ne sconsiglia l'uso.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta su frumento, 28 giorni sulle altre colture.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Peso 1 Kg.

SIPCAM

1526

MANFOSAR

Classe III

Fungicida organico acuprico, in polvere bagnabile, per trattamenti in viticoltura, frutticoltura (melo e pero) e pomodoro

Composizione
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 36,80 di MANCOZEB puro
gr. 29,40 di FOLPET puro
q.b. a gr. 100 di sostanze bagnanti, disperdenti ed inerti.

ATTENZIONE

manipolare con prudenza

Natura dei rischi di intossicazione:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione, e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari:
— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico:
Intossicazione per ingestione o per contatto.
Sintomi di intossicazione: Azione irritante sul tratto gastrointestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei, nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa.
Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.), eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alla terapia.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica con magnesia usta (30 gr. per litro d'acqua) e digitale; se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini, cure sintomatiche.
In casi gravi o sospetti gravi, ricovero al Centro di rianimazione.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: Alcool, olii, grassi.
AVVERTENZA: consultare un Centro antiveleni.

Modalità e campi d'impiego:
Il MANFOSAR è indicato in:
VITICOLTURA: contro la Peronospora e la Muffa grigia, con trattamenti preventivi a 200-250 gr/hl. Gli ultimi due trattamenti devono essere eseguiti rispettivamente a 8 e 6 settimane dalla raccolta.
FRUTTICOLTURA - melo e pero: contro la Ticchiolatura, con trattamenti preventivi a 200-250 gr/hl.
ORTICOLTURA - pomodoro: contro la Peronospora e l'Alternaria, a 200-250 gr/hl, con trattamenti ogni 7-10 giorni in funzione dell'andamento climatico, solo fino alla prima fioritura.
Per un'omogenea sospensione acquosa, si consiglia di sciogliere la dose scelta di MANFOSAR in metà della quantità totale di acqua necessaria e di agitare accuratamente per qualche minuto. Portare quindi a volume, continuando ad agitare.
E' consigliabile l'impiego di pompe irroranti munite di agitatore.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
NON IMPIEGARE IN SERRA.
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Compatibilità:
Il MANFOSAR è miscibile con la maggior parte degli insetticidi, acaricidi e fungicidi.
Non è miscibile con le poltiglie solfocalciche e le sostanze fortemente alcaline.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
Il MANFOSAR è fitotossico per le seguenti varietà di pero: Abate Fetel, Armella, Butirra d'Anyou, Butirra Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Decana d'Inverno, Gentil bianca, Gentilona, Giardina, Kaiser Alexander, Mora, S. Giovanni, S. Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, William precoce.

Su uve da vino, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta per non compromettere la normale fermentazione alcoolica.
Su uve da tavola e sulle altre colture, sospendere i trattamenti almeno 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

S.p.A.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1
Officina di produzione:
FARMOPLANT S.p.A. - MARINA DI MASSA (MS) - Via Massa-Avenza n. 85

Registrazione N. 1526 del 7-3-1974 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO S.p.A. Peso Kg

1531

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Insetticida a base di Dimetoato, attivo contro Mosca delle olive, delle Ciliegie, della frutta ed insetti parassiti delle colture di seguito indicate

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 20 Dimetoato puro
Sostante solventi ed emulsionanti q.b. a 100.
Contiene Xilolo e Cicloesanone

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi. Consultare un centro antiveleni.

Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Olivo contro: Mosca a gr. 300/hl.
Eseguire i trattamenti all'inizio dell'ovideposizione, cioè, quando si notano le prime punture di mosca sulle olive.
Liotripide a gr. 200/hl.
Tignola a gr. 250/hl.
Oziorrinco e Punteruolo a gr. 300/hl.

Pero contro: Zeuzera a gr. 200/hl.
Eseguire trattamenti distanziati di 12-15 gg. da fine maggio ai primi di settembre.
Psilla a gr. 250/hl.

Ciliege contro: Mosca a gr. 100/hl.

Frutta: Pesco contro Mosca a gr. 250/hl.
Albicocco contro Mosca a gr. 150/hl.

Agrumi contro:
Biancarossa a gr. 250/hl.
Eseguire due trattamenti a distanza di 15-20 gg. l'uno dall'altro dopo la raccolta e prima della fioritura, oppure nel periodo estivo (fine luglio primi agosto).
Cocciniglia cotonosa a gr. 250/hl.
Trattare in settembre-ottobre quando si manifestano le prime colonie.
Mosca a gr. 200/hl.

Carciofo contro:
Depressaria a gr. 150/hl.
Trattare al momento della nascita delle larve, da fine ottobre alla terza decade di novembre.
Nottue a gr. 200/hl.

Pomodoro contro: Vasate a gr. 200/hl.

Asparago contro: Mosca a gr. 150-200/hl.

Sedano contro: Mosca a gr. 100/hl.

Barbabietola e Spinacio contro: Mosca a gr. 200-300/hl.
Garofano contro: Striscino a gr. 150/hl.
Contro Afidi, Acari (non resistenti agli esteri fosforici), Oplocampe, Tingidi alla dose di gr. 150-250/hl.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare, agitando energicamente, la dose necessaria di prodotto nel quantitativo di acqua richiesto per ottenere la concentrazione desiderata.
Effettuare le irrorazioni coprendo uniformemente le varie parti delle piante interessate al trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **DAFENE E** è miscibile con tutti gli antiparassitari aventi reazione neutra e leggermente alcalina. E' compatibile con i prodotti a base di zolfi idrosospensibili, ditiocarbammati, (solo per le colture previste), composti di rame (eccetto poltiglia bordolese) ed esteri fosforici.
« **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare il **DAFENE E** su cedro, limone « interdonato » limone cedrato, arancio amaro, pistacchio, nocciolo e crisantemo.
Non impiegare il **DAFENE E** in trattamenti a basso volume sulle varietà di olivo: Coratina, Simona, Canino, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

RAVIT S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA
V.le degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.78.041 (5 linee)
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68

STAB.: Paganica (L'Aquila)

Reg. n. 1531 Ministero Sanità del 31-7-1975

12/84

1574

DINITIOL

Insetticida emulsionabile a base di Malathion per la lotta contro le varie specie di insetti che infestano le colture arboree e floreali

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
Malathion puro g 50
Emulsionanti, solventi e bagnanti q.b.a g 100
Contiene Xilolo

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare di respirare i vapori.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
***Sintomi di intossicazione:** lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*
***Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:** In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.*
***Controindicazioni:** morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.*
***AVVERTENZA:** Consultare un centro antiveleni.*

CAFFARO S.P.A. - MILANO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)
Registrazione n. 1574 del Ministero della Sanità del 22-4-1974

Il **DINITIOL** è un insetticida efficace nella lotta contro varie speci di insetti quali Emitteri (afidi, cicaline, tingidi), Lepidotteri (tignole), Imenotteri (tentredini), e Tripidi che infestano le seguenti colture: pomacee, drupacee, agrumi, vite, olivo, nocciolo, fragola, ribes, cereali, barbabietola, cotone, canapa, mais, leguminose, colza, ravizzone, ortaggi (bietola, carciofo, carota, cavolo, cucurbitacee, fagiolo, melanzana, peperone, pomodoro, pisello, sedano, zucchino) e colture ornamentali in campo.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Il **DINITIOL** va disperso in dosi variabili da g 80 a g 300 in 100 litri di acqua, secondo i parassiti da combattere ed il grado di infestazione dei medesimi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPA IBILITA'
Il **DINITIOL** è miscibile con tutti gli antiparassitari che si trovano in commercio.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto: nel caso di miscela con oli minerali, olevare tale intervallo a 30 giorni.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO Kg

1608

GARDONA 50 PB

III CLASSE

Attenzione manipolare con prudenza

Insetticida di contatto, in polvere bagnabile.

COMPOSIZIONE IN PESO

Tetraclorvinfos . . . . p.a. g 50,0
Inerti, supporti, bagnanti o disperdenti . . . . q.b. a g 100,0
GARDONA è un marchio Shell.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi, o sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti: 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni.

Shell Italia S.p.A.
DIVISIONE AGRICOLTURA
Via F. Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento:

Registrazione del Ministero della Sanità n. 1608 del 10.6.74.

MODALITA' DI IMPIEGO

In pieno campo:

Coltura	Parassita	Dose/hl
MELO/PERO	- Verme delle mele e delle pere (Carpocapsa pomonella)	
	- Cemiostoma	100 g
PERO	- Psilla	80 g
PESCO	- Mosca della frutta (Ceratis capitata)	100 g
	- Tignola (Anarsia lineatella)	175-200 g
OLIVO	- Mosca (Dacus oleae)	85-90 g
VITE	- Tignola dell'uva (Polychrosis botrana e Conchylis ambiguella)	100 g
MAIS	- Piralide (Pyrausta nubilalis)	400-500 g
CAVOLI	- Cavolaia e Rapaiola (Pieris brassicae e P. rapae)	100-125 g
CRUCIFERE	- Tignola (Plutella maculipennis)	175-200 g
PATATA	- Dorifora (Leptinotarsa decemlineata)	350-375 g

Nei magazzini di tabacco:
Per la lotta contro il tarlo (Lasioderma serricorne) si consiglia di applicare il Gardona 50 PB alla dose di 1,5-2 grammi di principio attivo per metro quadrato, cioè, in pratica, 50-100 grammi di Gardona 50 PB in un litro di soluzione per 15-25 metri quadrati di superficie (pareti, pavimento) del magazzino di tabacco.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il Gardona 50 PB è miscibile con gli antiparassitari di uso più comune ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato l'intervallo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli uccelli e la selvaggina in genere, per le api e i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del formulato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto:

1618

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi.

NOTA BENE
'SANSPOR' può essere irritante per la pelle, per le mucose e per gli occhi. In soggetti particolarmente sensibili si possono verificare manifestazioni anche vistose ma transitorie e non preoccupanti. Evitare tuttavia il contatto con il prodotto puro o diluito ed anche di sollevare polvere nel maneggio del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia. **Terapia:** lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

AVVERTENZE
Su uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti. Su uve da tavola e sulle altre colture sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA — Del gruppo Imperial Chemical Industries PLC — ICI

'SANSPOR'

Fungicida acuprico in formulazione liquida per trattamenti in viticoltura, frutticoltura, olivicoltura, orto-floricoltura

COMPOSIZIONE

Captafol puro	g 39
Disperdenti, adesivanti, inerti . . .	q.b. a g 100

CLASSE IV

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 1618 del 25-6-1974
'SANSPOR' - Marchio registrato Imperial Chemical Industries PLC

'SANSPOR' è un fungicida acuprico in particolare formulazione liquida, che offre i seguenti vantaggi:
omogenea sospensibilità del principio attivo;
completa copertura delle parti trattate;
semplicità di impiego, poichè è già predisposto per la diretta diluizione in acqua.

PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE E DOSI DI IMPIEGO (riferite a 100 litri d'acqua).

ml 160-250: **Ticchiolatura** del melo; **Phomopsis vexans** e **Botrytis** della melanzana; **Crittogame in genere** della lattuga, del fagioli, delle fragole, del luppolo; **Botrytis** dei tulipani; **Ruggine** degli anemoni; **Maculatura fogliare** del ciclamino; **Bolla** del pesco, **Ticchiolatura** del nespolo; **Moniliosi** dei fiori di albicocco.
ml 160-330: **Peronospora** e **Botrytis** (muffa grigia) della vite; **Peronospora** della patata e del pomodoro; **Alternariosi** della patata e del pomodoro.
ml 330-400: **Ruggini** e **Alternariosi** del sedano e della cipolla.
ml 400-500: **Occhio di pavone** e **Antracnosi** dell'olivo.

ISTRUZIONI PER L'USO
Data la formulazione del prodotto, per ottenere una sospensione acquosa uniforme, è sufficiente versare la prescelta dose di 'SANSPOR' nella quantità di acqua necessaria agitando per qualche momento.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ
'SANSPOR' può essere miscelato con la maggior parte degli anticrittogamici ed insetticidi di uso comune, ad eccezione della calce od altri prodotti fortemente alcalini.
Non è miscibile con poltiglia bordolese. Non può essere applicato in associazione con gli olii e fino ad almeno 20 giorni dopo il loro impiego.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

DA NON VENDERSI SFUSO **ml 10**

1624

CASORON® MIX

CLASSE III
ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Diserbante granulare — Erbicida di pre- e di post-emergenza, in forma granulare, specifico per la lotta contro mono- e dicotiledoni, in viticoltura, frutticoltura, agrumicoltura, olivicoltura, erba medica e per il diserbo totale di superfici incolte quali fossi, piazze, strade, aree industriali, campi sportivi, parchi.

Composizione — 100 g di prodotto contengono:
2,5 g di dichlobenil (2,6-diclorobenzonitrile) tecnico al 90% di purezza, (corrispondenti a 2,25 g di p. a. puro)
2,5 g di simazina (2-cloro-4,6-bis-etilammino-s-triazina) tecnica al 95% di purezza, (corrispondenti a 2,37 g di p. a. puro)
Coformulanti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio — Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni per il medico — In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via: Siemens 12

Registrazione Nr. 1624 del 10. 6. 74 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto 25 - 20-10-5

Caratteristiche — Il CASORON MIX è un erbicida di pre- e di post-emergenza con largo spettro d'azione, efficace contro dicotiledoni annuali e rizomatose e contro le graminacee.
Il CASORON MIX può essere distribuito con macchine apposite; non occorre perciò nè trasporto d'acqua, nè costose attrezzature. È però indispensabile che il CASORON MIX venga distribuito uniformemente su tutta la superficie.

Modalità d'impiego — Vite, melo, pero, agrumi, olivo: kg 100-150 per ettaro. Impiegare la dose più alta nel caso di forte infestazione di malerbe rizomatose e graminacee, nonchè su terreni umosi e pesanti.
Fare uso del CASORON MIX solo sulle colture a partire dal secondo anno d'impianto.

Nei trattamenti in viticoltura è consigliabile evitare di colpire i germogli delle viti. Nei vigneti con sistema di allevamento molto basso (tipo alberello, Sylvoz) è pertanto necessario trattare prima che le gemme si gonfino.

Erba medica: kg 25-30 per ettaro. Il periodo utile per l'applicazione coincide con l'intero periodo di riposo vegetativo dell'erba medica (da novembre a fine gennaio). I risultati migliori si ottengono effettuando il diserbo alla fine dell'autunno, quando le infestanti si trovano ancora nei primi stadi di sviluppo.
Evitare i trattamenti nei medicai di nuovo impianto seminati dopo il mese di luglio e quelli con consociazione di altre foraggere.

Diserbo totale (fossi, canali, piazze, strade, aree industriali, campi sportivi, parchi): kg: 250-300 per ettaro. Con CASORON MIX non è possibile combattere le infestazioni di Phragmites e di Typha.
È consigliabile usare il CASORON MIX (che agisce per via radicale) prima o al più tardi all'inizio dello sviluppo delle infestanti su terreno libero da malerbe o lavorato di recente. Per l'attività del prodotto è di grande vantaggio un alto tenore di umidità nel terreno oppure una pioggia dopo il trattamento.
Se vengono osservati attentamente il periodo d'impiego (in autunno dopo la vendemmia — oppure all'inizio della primavera), il dosaggio e la tecnica di distribuzione, l'efficacia del diserbo si protrae per almeno 8 mesi.

Tecnica di applicazione — Distribuire uniformemente il prodotto tal quale con le idonee attrezzature spandigranuli.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità — Il CASORON MIX per la sua formulazione e lo specifico campo d'impiego non deve essere miscelato con fungicidi, insetticidi o concimi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture (es. bietole, tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Da impiegare su colture specializzate.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

1644

PULL®

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

ETICHETTA

Polvere bagnabile — **Diserbante selettivo del grano e dell'orzo per la lotta contro le infestanti a foglia larga e le graminacee.**

Composizione — 100 g di prodotto contengono:
31,2 g di dichlobenil (2,6-diclorobenzonitrile) tecnico al 90% di purezza, corrispondenti a 28,11 g di p.a. puro;
11,2 g di monolinuron [N-(4-clorobenil)-N-metossi-N-metilurea] tecnico al 94% di purezza, corrispondenti a 10,5 g di p.a. puro
29,4 g di MCPA (ac. 4-cloro-2-metilfenossi-acetico) tecnico al 85% di purezza, sotto forma di sale sodico e potassico, corrispondenti a 25 g di p.a. puro
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio — Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- — Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- — Conservare la confezione ben chiusa
- — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- — Non operare contro vento
- — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- — Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni mediche — Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

SINTOMI D'INTOSSICAZIONE
Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO
Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

CONTROINDICAZIONI
E' sconsigliata la digitale.

Caratteristiche — Il PULL è un erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del grano tenero e dell'orzo. L'azione diserbante del PULL distrugge le infestanti a foglia larga in genere, quali ranuncolo, canapaccia, borsa pastore, papavero, vecce e le graminacee come la coda di volpe, le poe, il lollum, l'agrostide.

Modalità d'impiego — Dose d'impiego: 2-3 kg/ha in 600-800 litri d'acqua. Il trattamento è possibile dallo stadio di 4ª foglia fino alla fine dell'accestimento del frumento e dell'orzo. Scegliere il momento più adatto in funzione dello sviluppo delle infestanti da combattere, che dovranno essere in linea di massima negli stadi giovanili; le graminacee non dovranno aver superato le 3-4 foglie.

Raccomandazioni importanti
- — trattare soltanto grano tenero ed orzo
- — non effettuare la trasemina di colture foraggere
- — non effettuare lavori colturali nei 15 giorni che precedono o seguono il trattamento.

Preparazione della poltiglia — Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi aggiungerlo lentamente e sotto agitazione alla quantità d'acqua necessaria.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità — Per la sua formulazione e campo d'impiego il PULL non deve essere miscelato con insetticidi e fungicidi. Il PULL può essere usato in miscela con concimi fogliari (Wuxal) e con altri erbicidi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità — Applicato alle dosi e con le modalità consigliate, il PULL è selettivo per la coltura.
Il PULL è fitotossico per vite, alberi da frutto ed ortaggi; evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con dette colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Non trattare grani destinati alla trasemina di colture foraggere quali trifoglio ed erba medica.

Rischi per la fauna utile — L'impiego del PULL non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione nr. 1644 del 10.6.74 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto 1-2-5-10 kg.

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

1685

USTINEX PD

DISERBANTE TOTALE

In assenza di colture agricole per la lotta contro le infestanti di argini, aree incolte, piazze, viali, impianti sportivi e industriali, strade ferrate

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Ustinex PD contengono:
g 33 di Dalapon puro;
g 37 di Diuron puro;
g 10,5 di MCPA puro (come sale sodico);
bagnanti, sospensivanti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.
Consigli terapeutici: abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia, sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.
Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi e momento d'impiego: 15-20 kg/ha (15-20 g/10 mq) in 1.000 litri d'acqua (1 litro di soluzione ogni 10 mq di superficie), intervenendo dopo la nascita delle infestanti, prima che abbiano superato l'altezza di 5-10 cm. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo, dato il suo campo d'azione contro le infestanti.
Fitotossicità: evitare che il prodotto giunga a diretto contatto con colture sensibili (riso, frumento, ortaggi, vite, alberi da frutta e floreali in genere). Pertanto eseguire il trattamento preferibilmente in giornate senza vento.
A lavoro ultimato, lavare accuratamente con acqua bollente e soda le pompe ed i recipienti usati per la preparazione della soluzione e, quindi, risciacquarli ripetutamente con acqua. In genere è consigliabile di non usare le pompe ed i recipienti (soprattutto quelli di legno) destinati ai trattamenti alle piante da frutto ed alle viti.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: I.R.C.A. - Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione Ministero Sanità n. 1685 del 10-6-1974

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg

1700

DURSBAN* Granulare

Insetticida per la lotta contro gli insetti del terreno all'atto della semina

Composizione (riferita a 100 g):

- **Chlorpyrifos** (0,0-dietil-0-(3,5,6-tricloro-2-piridil)-fosforotioato) puro g 7,5
Coformulanti q. b. a g 100,0

III CLASSE

Attenzione: manipolare con prudenza

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico:

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

Modalità di applicazione:

Caratteristiche — Il Dursban Granulare è un insetticida granulare per la lotta contro gli insetti che vivono nel terreno e sulla sua superficie ed è efficace anche nei terreni umidi ed in quelli irrigui.

Il **Dursban Granulare** non trasmette odori sgradevoli ai vegetali e pertanto, può essere utilizzato anche su terreni destinati a colture sensibili come la Patata, le Bulbose ed il Tabacco. Non impiegare su terreni destinati a colture di barbabietola.

Dosi di impiego — Il Dursban Granulare è consigliato per la disinfestazione del terreno, contro Elateridi, Nottue, Grillotalpa, Maggiolino, Tipule, Bibio, Mosca del cavolo, Formiche, alla dose di 32-40 kg. per ettaro, incorporandolo al terreno con una leggera erpicatura o fresatura.

Nel caso di trattamenti localizzati, il **Dursban Granulare** viene distribuito a 10-16 kg /ha nei solchi preparati per la semina o per il trapianto. In terreni molto leggeri si consiglia la dose minima.

Nella distribuzione del **Dursban Granulare** in miscela con concimi, è necessario che la granulometria dei singoli componenti non sia molto diversa: in caso contrario non si avrebbe una uniforme distribuzione dei prodotti.

«Da non applicare con mezzi aerei»

Compatibilità — Tale prodotto, data la sua formulazione granulare, non si applica in miscela con altri formulati.

Rischi di nocività — Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici ed è altamente tossico per i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

* Marchio registrato - The Dow Chemical Company

Prodotto nello Stabilimento di S. Vincenzo di Galliera (BO) della S.I.A.P.A. S.p.A.

Dow Chemical S.p.A.
Via R. Lepetit, 8 - Milano

Registrazione del Ministero della Sanità N. 1700 del 23-10-1974

DA NON VENDERSI SFUSO

Confezione da Kg. 25

1706

Paramon® E.C.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

ETICHETTA

Liquido emulsionabile — Olio bianco emulsionabile per la lotta contro cocciniglie e ragno rosso.

Composizione

100 g di prodotto contengono:
72 g di olio minerale al 95% di insolfonabile, p.a. puro (100% purezza);
Emulsionanti, tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

Il PARAMON EC offre molti vantaggi:
- azione contro le cocciniglie e le uova invernali del ragno rosso.
- sopportabilità da parte delle piante
- bagnabilità, adesività e buona copertura
- non è velenoso, non irrita la pelle, non macchia e non sporca

Modalità d'impiego:

Dosi per 100 litri d'acqua:

Frutticoltura - Pomacee (melo e pero):

1. Trattamento invernale (prima dell'apertura delle gemme): litri 4 - 4,5.
2. Trattamento di fine inverno (dalle punte verdi alle orecchiette di topo): litri 3,5 - 3.
   Per combattere contemporaneamente lepidotteri, afidi, psillidi aggiungere al PARAMON EC cc 250 di PARAFOS o di METIAMON.
   Contro la ticchiolatura si può aggiungere A 150, ZIRAMON o AZURAM.

Drupacee (pesco, susino, ciliegio): Trattamento di fine inverno (all'ingrossamento delle gemme): litri 3 - 3,5.
Per combattere anche lepidotteri, afidi aggiungere cc 250 di PARAFOS o di METIAMON. Contro la bolla e corineo aggiungere ZIRAMON.

Agrumi: litri 2,5-3. Trattare dalla raccolta a poco prima della fioritura. Durante il periodo vegetativo litri 1,5 - 2,5.
L'epoca più propizia per la lotta contro le cocciniglie cade prima della deposizione delle uova o immediatamente dopo la nascita delle larve.

Piante e arbusti ornamentali a foglia caduca e sempreverdi e con foglia resistente. Trattamenti dall'inizio della ripresa vegetativa: litri 3 - 4; durante il periodo vegetativo litri 1,5 - 2,5.
Su thuya, lauro, oleandro: litri 2,5 - 3, poco prima della ripresa vegetativa. Durante il periodo vegetativo litri 1,5 - 2.
Su bosso, ligustro (contro cocciniglia a virgola), trattare subito dopo la nascita delle larve (da metà maggio ai primi di giugno) con litri 2 - 2,5.
Il PARAMON EC alla dose di litri 0,5-1 pulisce le foglie delle piante ornamentali dalle macchie calcaree.

Preparazione della poltiglia

Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

Il PARAMON EC è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).
Il PARAMON EC non deve essere miscelato con prodotti contenenti calce, zolfo, karathane, captano e loro derivati. Non usare i suddetti prodotti 2 - 3 settimane prima o dopo il trattamento con PARAMON EC; per gli zolfi è sufficiente un intervallo di 1 - 2 settimane.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità

Applicato sulle colture e con le modalità consigliate, il PARAMON EC non è fitotossico.

Rischi per la fauna utile

L'impiego del PARAMON EC non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura . ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 1706 del 19.4.75 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto 0,1 - 0,5 - 1 - 10 litri

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

1727

Bagnante AG N.

Bagnante specifico per l'impiego in miscela con Acido Giberellico e per impieghi con altri fitofarmaci e fitormoni su colture agricole erbacee ed arboree.

COMPOSIZIONE	
Sale sodico dell'acido diottil-solfosuccinico puro	gr. 10
Sequestranti, Inerti: quanto basta a	gr. 100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura - Viale G. Galeazzo, 3 Milano - Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE IV

Registrazione n. 1727 del 21/5/1974 Ministero della Sanità

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche :

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla dose di gr. 100 per 100 litri di acqua, da irrorare con pompe a volume normale.
E' necessario prima sciogliere il prodotto nel totale quantitativo di acqua da impiegare, rimescolando con cura e solo successivamente aggiungere l'Acido Giberellico.
Nel caso di impieghi in miscela con altri fitofarmaci e fitormoni può essere usata una dose di gr. 50 per ettolitro.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Il prodotto è miscibile a tutte le poltiglie antiparassitarie. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità: la fitotossicità è quella del principio attivo a cui il prodotto viene aggiunto.

Rischi di nocività: per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci: sono quelli del principio attivo a cui il prodotto viene aggiunto.

L'intervallo di sicurezza fra l'ultimo trattamento e la raccolta deve essere quello dei principi attivi a cui il prodotto viene aggiunto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per l'uso consentito. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

1746

ATEROX 25 P.B.

ACARICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER IL CONTROLLO DEGLI ACARI DELLE PIANTE DI MELO E PERO

COMPOSIZIONE: gr. 100 di prodotto contengono:

— CYEXATIN puro gr. 23,75
— Coformulanti q.b. a gr. 100

CLASSE II

NOCIVO

Reg.Ministero Sanità n.1746 del 7.11.8

CLASSE II

Natura del rischio:
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione, per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare altre culture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. - Evitare di respirarne i vapori. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti. - Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschehe ed occhiali protettivi. - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva) in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico:
Nocivo per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione:
Cefalea occipitale continua e parassistica, ronzii auricolari, iperacusia, vertigini, rachialgia, dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra, ritenzione urinaria, insufficienza respiratoria e di circolo, interessamento del Sistema Nervoso Centrale (nevralgia e paralisi), dermatosi.
Consigli terapeutici:
Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando, in relazione alla via di contaminazione: abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza.
Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale. Terapia sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.
Modalità d'impiego:
ATEROX 25 P.B. si impiega alle dosi di 80-120 gr. per ettolitro di acqua, a seconda della intensità della infestazione: in ogni caso si dovrà aver cura di bagnare completamente le piante di melo e pero. Normalmente si fanno due trattamenti per stagione, il primo alla comparsa degli acari, il secondo dopo 2-4 settimane.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
Il prodotto è miscibile con la maggior pa te dei fitofarmaci fatta eccezione per quelli
Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività:
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 30 giorni.
« Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi concentiti: ogni altro uso è pericoloso ».
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizzetti, 2/a - CENTO (Ferrara) - Tel. 90.62.07

Stabilimento di produzione:
SILIA S.p.A. – Aprilia (LT)

ATEROX 12

1747

ACARICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER LA DIFESA DEL MELO E DEL PERO

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
— CYEXATIN puro gr. 11,87
— Cooformulanti q.b. a gr. 100

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici, conservare la confezione ben chiusa, non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto, non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua: non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico:
Nocivo per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione:
Cefalea occipitale continua e parossistica, ronzii auricolari, iperacusia, vertigini, rachialgia, dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra, ritenzione urinaria, insufficienza respiratoria e di circolo, interessamento del Sistema Nervoso Centrale (nevralgia e paralisi), dermatosi.
Consigli terapeutici:
Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando, in relazione alla via di contaminazione: abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale. Terapia sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.
Modalità d'impiego:
L'ATEROX 12 si impiega alle dosi di gr. 200-220 per ettolitro di acqua, a seconda della intensità della infestazione: in ogni caso si dovrà avere cura di bagnare completamente le piante di melo e di pero. Normalmente si fanno due trattamenti per stagione, il primo alla prima comparsa degli acari, il secondo dopo 2-4 settimane.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
Il prodotto è miscibile con la maggior parte dei fitofarmaci fatta eccezione per quelli a reazione alcalina.
Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività:
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 30 giorni.

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizzetti, 2/a - CENTO (Ferrara) - Tel. 90.62.07

Stabilimento di produzione:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - OZZANO EMILIA (BO)
Registrazione N. 1747 del 7-9-1974 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

1777

Paramon 80

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Emulsione di olio bianco — Olio bianco emulsionato per la lotta contro cocciniglie e ragno rosso.

Composizione

100 g di prodotto contengono:
80 g di olio minerale (al 95% di insolfonabile) puro.
Emulsionanti, tensioattivi, coformulanti specifici ed acqua quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

Il PARAMON 80 offre i seguenti vantaggi:
— Azione contro la cocciniglie e le uova invernali del ragno rosso.
— Rapida preparazione dell'emulsione.
— Sopportabilità da parte delle piante.
— Giusta bagnabilità, adesività e buona copertura.
— Non è velenoso, non irrita la pelle.

Modalità di impiego

Dosi per 100 litri d'acqua:
Frutticoltura - Pomacee (melo e pero):

1. Trattamento invernale (poco prima dell'apertura delle gemme): litri 3,5 - 4.
2. Trattamento di fine inverno (dalle punte verdi alle orecchiette di topo): litri 2 - 3. Per combattere contemporaneamente lepidotteri, afidi, psillidi, aggiungere al Paramon 80 cc 250 di Parafos o di Metlamon. Contro la ticchiolatura si può aggiungere A 150, Ziramon e Azuram.

Drupacee (pesco, susino, ciliegio): Trattamento di fine inverno (all'ingrossamento delle gemme): litri 2,7 - 3.
Per combattere anche lepidotteri, afidi, aggiungere cc 250 di Parafos o di Metlamon. Contro bolla e corneo aggiungere Ziramon.

Agrumi: litri 2 - 2,5. Trattare dalla raccolta a poco prima della fioritura. Durante il periodo vegetativo: litri 1,5 - 2. L'epoca più propizia per la lotta contro le cocciniglie cade prima della deposizione delle uova o immediatamente dopo la nascita delle larve.

Piante od arbusti ornamentali a foglia caduca o sempre verdi o con foglia resistente:
Trattamenti dall'inizio della ripresa vegetativa: litri 2,5 - 3,5; durante il periodo vegetativo: litri 1,5 - 2.

Su thuya, taxus, lauro, oleandro litri 2 - 2,5 poco prima della ripresa vegetativa. Durante il periodo vegetativo litri 1 - 1,5.
Su bosso, ligustro (contro cocciniglia a virgola), trattare subito dopo la nascita delle larve (da metà maggio ai primi di giugno) con litri 1,5 - 2.
Il PARAMON 80 alla dose di litri 0,5 - 1 pulisce le foglie delle piante ornamentali da macchie calcaree.

Preparazione della poltiglia

Rimescolare bene il PARAMON 80 prima dell'uso e versarlo lentamente, sotto agitazione, nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

Il PARAMON 80 è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).
Il PARAMON 80 non deve essere miscelato con prodotti contenenti calce, zolfo, Karathane, captano o loro derivati. Non usare i suddetti prodotti 2 - 3 settimane prima o dopo il trattamento con PARAMON 80.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività

E' nocivo per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento o per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 1777 del 31.5.1975 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Lt. 50— 5-10-20-23-45-200

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

1782

Paramon® 72

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Emulsione liquida di olio bianco — Il PARAMON 72 è efficace contro cocciniglie in genere, cocciniglie cotonose, acari delle pomacee, delle drupacee, degli agrumi e delle piante ornamentali.

Composizione — 100 g di prodotto contengono:
72 g di olio minerale al 95% di insolfonabile, p.a. puro (100% di purezza)
Emulsionanti, tensioattivi, coformulanti ed acqua quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio — Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico — In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche — Il PARAMON 72 offre alcuni vantaggi:
- Azione contro le cocciniglie e le uova invernali del ragno rosso.
- Rapida preparazione dell'emulsione.
- Sopportabilità da parte delle piante.
- Giusta bagnabilità, adesività e buona copertura.
- Non è velenoso, non irrita la pelle.

Modalità d'impiego — Dosi per 100 litri d'acqua:

Frutticoltura - Pomacee (melo e pero):
1. Trattamento invernale (poco prima dell'apertura delle gemme): litri 4-4,5.
2. Trattamento di fine inverno (dalle punte verdi alle orecchiette di topo): litri 3,5-3.
   Per combattere contemporaneamente lepidotteri, afidi, psillidi, aggiungere al PARAMON 72 cc 250 di Parafos o di Metlamon. Contro la ticchiolatura si può aggiungere A 150, Ziramon e Azuram.

Drupacee (pesco, susino, ciliegio): Trattamento di fine inverno (all'ingrossamento delle gemme): litri 3-3,5.
Per combattere anche lepidotteri, afidi, aggiungere cc 250 di Parafos o di Metlamon. Contro bolla e corineo aggiungere Ziramon.

Agrumi: litri 2,5-3. Trattare dalla raccolta a poco prima della fioritura. Durante il periodo vegetativo: litri 1,5-2,5.
L'epoca più propizia per la lotta contro le cocciniglie cade prima della deposizione delle uova o immediatamente dopo la nascita delle larve.

Piante e arbusti ornamentali a foglia caduca o sempre verdi e con foglia resistente:
Trattamenti dall'inizio della ripresa vegetativa litri 3-4; durante il periodo vegetativo litri 1,5-2,5.

Su thuya, taxus, lauro, oleandro litri 2,5-3, poco prima della ripresa vegetativa. Durante il periodo vegetativo litri 1,5-2.
Su bosso, ligustro (contro cocciniglia a virgola), trattare subito dopo la nascita delle larve (da metà maggio ai primi di giugno) con litri 2-2,5.
Il PARAMON 72 alla dose di litri 0,5-1 pulisce le foglie delle piante ornamentali da macchie calcaree.

Preparazione della poltiglia — Rimescolare bene il PARAMON 72 prima dell'uso e versarlo lentamente, sotto agitazione, nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità — Il PARAMON 72 è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).
Il PARAMON 72 non deve essere miscelato con prodotti contenenti calce, zolfo, Karathane, captano e loro derivati. Non usare i suddetti prodotti 2-3 settimane prima o dopo il trattamento con PARAMON 72.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità — Applicato sulle colture e con le modalità consigliate, il PARAMON 72 non è fitotossico.

Rischi di nocività — L'applicazione del PARAMON 72 se impiegato da solo, come tale, e non miscelato ad altri prodotti, ed usato secondo le istruzioni e con le precauzioni consigliate, non comporta rischi per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. E' nocivo per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 1782 del 12.11.74 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto 20 - 35 - 55 - 100 - 200 litri.

1801

Casoron® G-SR

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Granuli — Erbicida per il diserbo delle aree non coltivate e dei canali.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
22,2 g di dichlobenil (2,6-diclorobenzonitrile) tecnico al 90% di purezza, corrispondenti a 20 g di p.a. puro
Coformulanti, coloranti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Il CASORON G-SR è un erbicida efficace contro le erbe infestanti annuali, biennali e perenni, anche di difficile controllo come equiseto, cirsio, romice, tarassaco, gramigna. Il CASORON G-SR può essere usato tutto l'anno per il diserbo totale delle aree non coltivate, preferibilmente in pre-emergenza delle infestanti o al più tardi all'inizio dello sviluppo di queste. L'epoca più favorevole per il diserbo con il CASORON G-SR è in autunno e in primavera, prima o subito dopo l'inizio della vegetazione.

Modalità d'impiego
Diserbo totale: diserbo di bordi stradali, piazze da gioco, aree di fabbriche o depositi, sedi ferroviarie, spartitraffico di autostrade, argini di canali di irrigazione e drenaggio, ripe, fascie anti-incendio.

Dose d'impiego: 75 - 100 kg/ha, secondo la composizione botanica delle infestanti e del loro sviluppo. L'andamento climatico incide in modo determinante sui risultati ottenibili. E' indispensabile al riguardo, distribuire il CASORON G-SR in periodi di pioggia o almeno limitarne l'uso su terreni umidi. Risulta importante, inoltre, distribuire il prodotto uniformemente e con la massima regolarità sulla superficie da trattare.

Diserbo delle erbe acquatiche: L'impiego del CASORON G-SR è consigliabile anche per l'eliminazione delle erbe acquatiche, indifferentemente se emerse o sommerse. Il CASORON G-SR è pertanto indicato per il diserbo dei canali di bonifica e di irrigazione.

Dose d'impiego: La dose d'impiego va commisurata all'effettiva superficie dell'alveo da trattare e non della superficie calcolata al pelo dell'acqua. I migliori risultati si ottengono prosciugando il canale per 10 - 15 giorni. Attendere almeno 60 giorni dal trattamento per l'utilizzazione dell'acqua di irrigazione. Il CASORON G-SR è praticamente innocuo per i pesci, non altera il contenuto in ossigeno ed il pH dell'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
Impiegare il CASORON G-SR preferibilmente da solo. E' sconsigliabile la miscela con insetticidi granulari e concimi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati dev'essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili, prescritte per i prodotti più tossici.

Rischi per la fauna utile
L'impiego del CASORON G-SR non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti, in assenza di colture agricole; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Pieve 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione nr. 1801 del 23.10.74 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto kg 5 - 10 - 20.

® Marchio e prodotto della Philips - Duphar B. V. Amsterdam (Olanda).

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

1803

Tersanil® Liquido

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Liquido solubile — Fungicida a base di chinosolo per combattere il marciume grigio (Botrytis) e per la disinfezione solo di piantonai e semenzai di colture floricole ed ornamentali.

Composizione — 100 grammi di prodotto contengono:
8,45 g. di Chinosolo puro.

Acqua quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio — Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche — In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche — Il TERSANIL LIQUIDO è un fungicida ad azione curativa e preventiva, specifico per la lotta contro marciumi radicali, mal dello sclerozio, mal del colletto, fusariosi ed altre malattie fungine tipiche dei semenzai e dei piantonai e contro la Botrytis che colpisce le barbabietole di vite innestate.

Modalità d'impiego — Dosi per 10 litri d'acqua:

Botrytis degli innesti di vite: cc 350. Immergere le viti innestate, oppure separatamente i portainnesti e le marze, per un tempo variabile da 2 a 5 ore, a seconda della temperatura dell'acqua.
Per l'immersione delle viti non utilizzare recipienti in metallo o in cemento, ma in legno, in plastica o in cemento vetrificato o plastificato.
Non usare acqua troppo calcarea per la preparazione della poltiglia. Dopo tre successive utilizzazioni, cambiare la poltiglia.

Fusariosi del garofano, del geranio: cc. 5, immergendo le talee per 6 - 8 ore nella soluzione.

Disinfezione dei semenzai e dei piantonai di colture floricole ed ornamentali:
cc 10-30 disinfettando il terreno poco prima della semina o della messa a dimora delle colture.

Preparazione della poltiglia — Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità — Il TERSANIL LIQUIDO è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili, prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione nr. 1803 del 23.10.1974 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto lt. 1-5

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

1883

FOLIOL

III CLASSE

Attenzione: manipolare con prudenza

Antiparassitario estivo - invernale

per frutteti - agrumeti - piante ornamentali

COMPOSIZIONE IN PESO

Olii minerali bianchi con UMR minimo 94% . . . . . g 75,78
Coadiuvanti, emulsionanti, diluenti . . . . q.b. a g 100,00

FOLIOL è un marchio SHELL.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non mangiare e non fumare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Shell Italia S.p.A.
DIVISIONE AGRICOLTURA
Via F. Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento:

Registrazione del Ministero della Sanità n. 1883 del 21-10-1974

ISTRUZIONI PER L'USO

Norme per la preparazione dell'emulsione: Per assicurare una perfetta preparazione dell'emulsione rimescolare preventivamente il contenuto della latta. Versare in un recipiente pulito la quantità di Foliol occorrente assieme ad una eguale quantità di acqua. Rimescolare fino ad ottenere un liquido bianco, cremoso, ben omogeneo e quindi aggiungere altra acqua fino a completare la quantità di liquido insetticida voluto.

Esempio: Per ottenere 100 litri di emulsione insetticida Foliol alla percentuale del 2% si procede come segue: a 2 litri di Foliol si aggiungono rimescolando 2 litri di acqua. In detti 4 litri di liquido si versino, sempre rimescolando, i rimanenti 96 litri di acqua. Si ottengono così 100 litri di emulsione liquida, pronta all'uso, alla percentuale del 2%. Norme per l'applicazione: il Foliol può essere usato sia per trattamenti estivi che invernali. Non fare il trattamento in giornate di gelo, di forte vento e molto umide. Usare pompe a forte pressione curando che la pianta irrorata risulti ben bagnata in ogni sua parte.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

Piante	Epoche del trattamento	Parassiti	Dosi
Agrumi	Si consigliano due trattamenti: uno invernale e da eseguirsi dalla raccolta alla fioritura e uno estivo nel periodo giugno-agosto.	Cocciniglia cotonosa, Iceria, altre cocciniglie	Foliol 3% Foliol 2%
- pero, melo - albicocco, ciliegio, pesco, susino - olivo - vite	Prima dell'apertura delle gemme. Trattamenti al verde nel periodo primaverile.	Cocciniglie Cocciniglie	Foliol 4% Foliol 2-3%
Ornamentali, in pieno campo o in serra	Trattamenti primaverili-estivi.	Cocciniglie	Foliol 1-2%

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il Foliol è miscibile con preparati a base di esteri fosforici (parathion, metilparathion, dimetoato, fentoato), zineb, ziram, ossicloruri di rame.

Il Foliol non può essere miscelato con preparati a base di zolfo e con il solfato di rame.

Nel caso fossero stati eseguiti trattamenti con prodotti a base di zolfo attendere almeno 25 giorni prima di somministrare il Foliol.

Note: La miscela tra Foliol, un anticrittogamico ed un estere fosforico si effettua aggiungendo alla sospensione già preparata dell'anticrittogamico la dose prescritta di estere fosforico e successivamente l'emulsione del Foliol precedentemente dispersa in poca acqua.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili.

INTERVALLO DI SICUREZZA

20 giorni se usato da solo. Tuttavia, per le miscele di Foliol con formulati a base di parathion, il periodo di carenza è elevato ad un minimo di 30 giorni.

Attenzione: « Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso ».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto: litri 30

1920

Korthane® L. C.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Liquido emulsionabile — **Per la lotta contro il mal bianco e gli acari fitofagi in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e su colture di piante ornamentali.**

Composizione
100 g di prodotto contengono:
48 g di Karathane tecnico al 78% di purezza, corrispondenti a 35,04 g di [2,4-dinitro-6- (2',3',4', ottil)-fenil crotonato e 2,6 -dinitro-4 - (2',3',4', ottil),fenil crotonato] e 2,40 g di [nitro ottilfenolo (soprattutto dinitro)].
Emulsionanti, tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

Informazioni per il medico
Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE
Sudorazione, sete, nausea, spossatezza, agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertemia.
Colorazione gialla delle sclere. La morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

CONSIGLI TERAPEUTICI
Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5% - Emetici e catartici se il paziente è cosciente - Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione - Combattere l'ipertemia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri di acqua fredda. Trasfusione o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione - Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale - Ossigeno, respirazione artificiale.

CONTROINDICAZIONI
Atropina

Caratteristiche
Il KORTHANE L. C. è un antioidico con azione preventiva, curativa ed eradicante contro tutte le varie specie di mal bianco che attaccano i fruttiferi, le colture ortensi e le piante ornamentali.
Il KORTHANE L. C. ha pure una buona efficacia contro le forme mobili degli acari (ragno rosso, ragno giallo) che infestano le piante coltivate.
Dosi per 100 litri d'acqua:
Frutticoltura: melo e pero: 45-60 cc.
Effettuare i primi trattamenti nei seguenti stadi fenologici:
- liberazione delle gemme
- boccioli florali
- fioritura
- caduta dei petali

Completare la lotta contro il mal bianco con trattamenti periodici fino alla differenziazione delle gemme apicali dei rami a legno.
Pesco e albicocco: 40-50 cc. Iniziare la lotta alla schiusura delle gemme. Sospendere i trattamenti con KORTHANE L. C. 45 giorni prima della raccolta ed impiegare eventualmente zolfo bagnabile per le ultime irrorazioni.
Viticoltura: 45-60 cc. A partire dalla comparsa dei parassiti effettuare periodi trattamenti distanziati di 10-14 giorni.
Colture ortensi: Cucurbitacee (meloni, zucchini, cetrioli): 20-50 cc. Contro il mal bianco effettuare periodiche irrorazioni ad intervalli di 7-10 giorni.
Piante ornamentali
Rose:
a) In serra: 30-50 cc.
Iniziare la lotta alla prima comparsa della malattia e ripetere i trattamenti a distanza di 5-7 giorni secondo la necessità. Trattare con precauzione quando la temperatura si avvicina ai 30° C.
b) In pieno campo: 30-50 cc.
Iniziare la lotta alla comparsa della malattia e continuarla ad intervalli di 7-10 giorni.

Aster, Begonia e Begonia Rex, Crisantemo, Delphinium
- in serra: 15-25 cc;
- in pieno campo: 20-30 cc.

Iniziare i trattamenti alla comparsa del mal bianco e ripeterli a 7-10 giorni di intervallo secondo la necessità.
Vivai ed arbusti ornamentali: 45-60 cc.
Iniziare la lotta contro l'oidio all'apertura delle gemme, ripetendo successivamente i trattamenti a distanza di 7-10 giorni secondo la necessità.

Preparazione della poltiglia
Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Il KORTHANE L. C. è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri), degli olii minerali invernali ed estivi e dei prodotti oleosi in genere.
Non trattare quando la temperatura ambiente supera i 32° C. Non impiegare il KORTHANE L. C. 30 giorni prima o dopo l'uso di olii minerali.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili, prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità
Applicato sulle colture e secondo le modalità consigliate il KORTHANE L. C. non è fitotossico.

Rischi di nocività
L'impiego del KORTHANE L. C. non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame. E' tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione Nr. 1920 del 1920 del Ministero della Sanità del 19.4.75
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto 0,5 - 1 lt.
® Marchio registrato dalla Rohm & Haas Co. - Filadelfia

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

1944

Classe III

ATTENZIONE manipolare con prudenza

Polvere bagnabile per irrorazioni per la lotta contro la Ticchiolatura delle pomacee, Peronospore del pomodoro (solo fino alla prima fioritura), del tabacco e della vite e Ruggine del garofano

FARMOPLANT S.p.A.

COMPOSIZIONE

Zineb puro	g 80
Bagnanti, disperdenti, e supporti inerti q.b. a	g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento **VISPLANT CHIMIREN S.r.l. - Renazzo di Cento (FE)**

Registrazione Ministero della Sanità N. 1944 del 5-11-1975

® Marchio registrato

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE - Contro peronospora g 200 in trattamenti preventivi, da effettuarsi ogni qualvolta le condizioni di temperatura e umidità rendano possibile un'infezione (indispensabile anche uno o due trattamenti a fine agosto-primi di settembre contro eventuali attacchi tardivi). La lotta contro l'oidio eseguita con Zolfi in polvere, dovrà essere completata aggiungendo alla poltiglia di Tiezene g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison per ettolitro.

POMODORO - (solo fino alla prima fioritura)
Contro peronospora, septoriosi, alternariosi e ticchiolatura, g 300 da portare a g 400 in caso di prevedibili forti infezioni; aggiungere ad ogni ettolitro di poltiglia g 100-150 di Zolfo Colloidale Montedison.

GAROFANO - Contro ruggine, occhio di pavone o vaiolo, alternariosi e septoriosi, g 300 (con aggiunta di Fitofil) sia nei cassoni di radicamento delle talee, che in campo, iniziando i trattamenti 15-20 giorni dopo il trapianto e ripetendoli durante il periodo vegetativo escludendo quello invernale dei forti freddi.

POMACEE - Contro ticchiolatura g 200-300. Cominciare i trattamenti all'inizio della schiusura delle gemme (punte verdi) e continuarli sino a quattro settimane prima della raccolta, in relazione alla frequenza delle piogge.

TABACCO - Contro peronospora g 300-400. In semenzaio 2 trattamenti settimanali ad iniziare dalla 2ª o 3ª foglia con la aggiunta di g 30-50 di Fitofil.
In pieno campo, trattamenti bisettimanali, al primo verificarsi delle condizioni climatiche adatte allo sviluppo del fungo (temperatura non inferiore al 10 °C e non superiore al 20 °C, accompagnata da nebbie o piogge leggere).

Preparazione della sospensione

Stemperare il Tiezene in poca acqua sino ad avere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua sino ad ottenere la diluizione voluta, agitando.

DIVIETI D'IMPIEGO

— DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
— DA NON IMPIEGARE IN SERRA
— DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità

Ad eccezione dei prodotti a reazione alcalina o acida, il Tiezene è miscibile con i più comuni antiparassitari e particolarmente con:
polveri bagnabili: Carposan 30 PB, Panam PB 50, Zolfo colloidale, Zolfo bagnabile; liquidi emulsionabili: Carpomon 20, Carposan 20, Fac 20, Kelted, Ovifac, Rogor L 20, Rogor L 40.

Preparazione della miscela con formulato polvere bagnabile

Miscelare le due polveri e stemperare con poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea, diluire quindi alla concentrazione desiderata con la rimanente quantità di acqua, agitando.

Preparazione della miscela con formulato liquido emulsionabile

Versare lentamente la quantità necessaria del formulato che si vuole miscelare nella sospensione del Tiezene, preventivamente preparata, agitando accuratamente. Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

È fitotossico per le varietà di pero sensibili allo Zineb: Butirra, Giardina, Gentilona, Gentil bianca, Spinacarpi, Spadona, Spadoncina, Scipiona, Armelia, S. Maria, Mora, Coscia, S. Giovanni.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto: kg

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare il luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazione

Alcool, olii, grassi.

Avvertenza

Consultare un Centro Antiveleni.
In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heiz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

1994

VENTUREX D. 65

Fungicida organico in polvere bagnabile ad azione preventiva e curativa specifico ed efficace per la lotta contro la ticchiolatura del melo e del pero

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:

DODINA pura	gr 65
Bagnanti, disperdenti e inerti q.b. a	g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastro esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei resistenti alle terapie a causa della fotosensibilizzazione.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmie.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (gr 30 per litro d'acqua) e digitale.

AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni.

Modalità d'impiego: Il **VENTUREX D. 65** si usa contro la ticchiolatura delle pomacee in dosi varianti da 60 a 120 gr per ettolitro di acqua. In funzione preventiva si usa a gr 60-80 gr per ettolitro intervenendo ogni 6-7 giorni. Alla dose di 90-120 gr per ettolitro, usandolo entro 48-72 ore dall'inizio della pioggia infettante esplica una buona azione curativa.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina;
Non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato, Metilazinfos, D.D.V.P.;
Le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensività;
Evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0° C.

« **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. »

Fitotossicià: Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05 %.

Tossicità: Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.

AVVERTENZE: Da non impiegare durante la fioritura.

Non far pascolare e non alimentare il bestiame comento.
prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattam raccolti trattati direttamente o accidentalmente

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

« **ATTENZIONE:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. »
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. »
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. »

TERRANALISI s.n.c.
VIA DONIZETTI, 2/A — CENTO (FERRARA) — TEL. 906207

Stabilimento di produzione:
MARGESIN Fitofarmaci s.p.a. - LANA D'ADIGE (BZ)
Registrazione N. 1994 del 12 aprile 1976 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO Peso kg

2011

Fungicida per la lotta contro la Cercospora della barbabietola.

COMPOSIZIONE	
— Fentin acetato puro	gr. 18
— Coadiuvanti ed inerti, quanto basta a	gr. 100

(R) Marchio registrato SIPCAM - Milano

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A. - Viale G. Galeazzo, 3 Milano - Officina di produzione: Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE I°

VELENO

Registrazione n. 2011 del 11.11.1975 Ministero della Sanità

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto: non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; evitare di respirare i vapori; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle e gli occhi; durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva); in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Nocivo per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione

Cefalea occipitale continua o parossistica - ronzii auricolari - iperacusia - vertigini - rachialgia - dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra - ritenzione urinaria - insufficienza respiratoria e di circolo - interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie e paralisi) - dermatosi.

Consigli terapeutici di massima e condizionali al caso

Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando - in relazione alla via di contaminazione - abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventuale somministrazione di ossigeno respirazione artificiale. Terapia sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Cercospora della bietola da zucchero: il prodotto si impiega alla dose di Kg. 1,2-1,8 per Ha diluiti in 4-5 o più ettolitri di acqua. Si possono effettuare due trattamenti sulle bietole che vengono raccolte all'inizio della campagna saccarifera e tre trattamenti su quelle da raccogliere alla fine.
Il 1° intervento si effettua alla prima comparsa dell'infezione e gli eventuali altri due ad intervalli diversi a seconda dell'andamento stagionale.

Preparazione della poltiglia: stemperare la prestabilita quantità di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo, ad eccezione dei prodotti alcalini.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto, è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci, il bestiame.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per l'uso consentito. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

2057

CASORON® 133 P. B.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile: Erbicida per il diserbo di vigneti, frutteti (melo e pero), oliveti, aree industriali.

Composizione: 100 g. di prodotto contengono:
50 g. di Dichlobenil (2,6-diclorobenzonitrile) tecnico al 90% di purezza, corrispondenti a 45 g. di p.a. puro.
Bagnanti, disperdenti, coloranti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche: Il CASORON 133 P.B. è un erbicida efficace contro le seguenti erbe infestanti annuali, biennali e perenni, anche di difficile controllo come equiseto, cirsio, romice, tarassaco.
La sostanza attiva del CASORON 133 P.B. viene assorbita facilmente dalle radici delle infestanti.
In pre-emergenza il CASORON 133 P.B. agisce sulle infestanti e su rizomi. All'inizio della vegetazione, le malerbe sono più sensibili all'azione del CASORON 133 P.B.; è perciò molto importante distribuire tempestivamente il prodotto su terreno umido.

Modalità d'impiego:

Epoche d'impiego:
Italia Meridionale: da dicembre a febbraio
Italia Centrale: da gennaio a marzo
Italia Settentrionale: da marzo ad aprile

Campi e dosi d'impiego:

1. Diserbo selettivo

Viticoltura (dopo il 4° anno di impianto)

su terreni leggeri e sabbiosi	12-15 Kg/ha
su terreni pesanti ed argillosi	15-18 Kg/ha
su terreni ricchi di humus	18 Kg/ha

Melo su franco (dopo il 5° anno di impianto)

su terreni leggeri e sabbiosi	12-15 Kg ha
su terreni pesanti ed argillosi	15 Kg/ha
su terreni ricchi di humus	18 Kg/ha

2. Diserbo totale

Diserbo di bordi stradali, piazze da gioco, aree di costruzioni, aree di fabbriche e depositi, sedi ferroviarie, spartitraffico di autostrade, argini di canali di irrigazione e drenaggio, ripe, senza contaminare i corsi d'acqua.

Dose d'impiego: 25-35 Kg/ha a seconda della infestazione e dello sviluppo delle malerbe.

3. Diserbo localizzato

Lotta contro cespi di romice, tussilago. Consigliamo di irrorare la parte centrale del cespo con CASORON 133 P.B. al 5-6% (5-6 kg in 100 litri d'acqua).

La natura del terreno e l'andamento climatico incidono in modo determinante sui risultati ottenibili. E' indispensabile al riguardo distribuire il CASORON 133 P.B. in periodo di pioggia o almeno limitarne l'uso su terreni umidi. Risulta importante, inoltre, distribuire il prodotto uniformemente e con la massima regolarità sulla superficie da trattare.

Per una omogenea distribuzione della poltiglia diserbante impiegare almeno 600-800 litri d'acqua per ettaro.

Preparazione della poltiglia: Stemperare il prodotto e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: Il CASORON 113 P.B. non agisce per via fogliare e perciò non causa alcun danno alle colture nemmeno quando investe gli organi verdi (foglie, rametti).
Il CASORON 133 P.B. può essere usato tutto l'anno in trattamenti di pre- o post-emergenza delle malerbe. L'epoca più favorevole per l'impiego è però la primavera (pre-emergenza), prima o subito dopo l'inizio della vegetazione.
In viticoltura il CASORON 133 P.B. va usato prima dell'inizio della ripresa vegetativa.
Evitare accumuli di prodotto in vicinanza dei fusti delle piante da frutto e dei ceppi delle viti. Sono particolarmente indicati i trattamenti localizzati in forma di strisce o di aiuole.
Il CASORON 133 P.B. non deve essere miscelato con insetticidi, fungicidi e con concimi.
Quando il CASORON 133 P.B. viene usato in miscela con diserbanti della classe I, II o III è obbligatoria l'osservanza delle norme precauzionali prescritte per la classe superiore.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Applicato sulle colture e con le modalità consigliate il CASORON 133 P.B. non è fitotossico.

Rischi per la fauna utile: L'impiego del CASORON 133 P.B. non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione: DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione: DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione Nr. 2057 del 5.11.75 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO. Contenuto 1-5-10-25 Kg.

® Marchio registrato dalla N. V. Philips-Duphar - Amsterdam

2058

BARGREN®

CLASSE IV

Polvere bagnabile **Disinfettante per la concia delle sementi.**

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
15,5 g di idrossi-8-chinolato di rame tecnico al 97% di purezza, corrispondente a 15,0 g. di p.a. puro.
Bagnanti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni per il medico
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Il BARGREN è un fungicida indicato per la concia dei cereali (grano, orzo, avena, mais, riso), della barbabietola da zucchero, delle colture orticole ed industriali in genere. Grazie all'azione combinata dell'ossichinolina e del rame, il BARGREN protegge le piante contro le malattie crittogamiche che si trasmettono per seme (carie del grano, brusone del riso, carbone coperto dell'orzo, carbone nudo dell'avena) e che attaccano le giovani plantule (fusariosi, septoriosi, Pythium).

Modalità d'impiego
Dosi per 100 kg di semente. La concia delle sementi può essere effettuata sia con la polvere a secco, avendo cura di rimescolare bene la massa di sementi da disinfettare, sia irrorando la stessa con un trattamento liquido.

Crittogame combattute
Frumento: **carie** (Tilletia caries), **septoriosi** (Septoria tritici e Septoria nodorum), **fusariosi** (Fusarium nivale e Fusarium roseum). Dose d'impiego: 200 g.
Orzo: **carbone coperto** (Ustilago hordei); **septoriosi e fusariosi.** Dose d'impiego: 200 g.
Avena: **carbone** nudo (Ustilago avenae), **fusariosi e septoria.** Dose d'impiego: 300 g.
Mais: **mal del piede, Giberella** (Giberella zeae), **Pythium.** Dose d'impiego: 200 g.
Riso: **mal del piede, brusone** (Piricularia Oryzae, Helminthosporium Oryzae). Dose d'impiego: 200 g.
Barbabietola da zucchero: **Phoma** (Phoma betae), **mal del piede, Pythium, Alternaria, cercospora.** Dose d'impiego: 400 g.
Colzà: **Phoma, Alternaria, mal del piede.** Dose d'impiego: 150 g.
Leguminose da foraggio (erba medica, trifoglio): **mal del piede, Pythium.** Dose d'impiego: 200 g.
Piselli, fagioli, carote ed altre colture orticole: **fusariosi, septoriosi, antracnosi, Phoma, Pythium.** Dose d'impiego: 150 g.

Applicazione
Trattamenti a secco: impiegare un miscelatore meccanico oppure, in mancanza di questo, una botte montata obliquamente su un'asse. Agitare per 3-5 minuti ed accertarsi che la semente sia perfettamente coperta dal prodotto.
Trattamento per aspersione: stemperare la quantità di prodotto prevista per 100 kg di semente in un po' d'acqua, fino ad ottenere una sospensione omogenea. Aggiungere dell'altra acqua fino ad ottenere 6-8 litri complessivi ed annaffiare omogeneamente la massa delle sementi.

Compatibilità
Il BARGREN è miscibile in via di massima con i più comuni fungicidi ed insetticidi impiegati per la disinfestazione delle sementi. (es. a base di carbosatina, TMTD).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Applicato sulle colture con le modalità consigliate il BARGREN non è fitotossico.

Rischi per la fauna utile
L'impiego del BARGREN non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame. E' tossico per i pesci.
I semi trattati residuati dalla semina non possono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N.2058 del 5.11.75 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 1-5-10-20

2059

TURCAN® COMBI

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile — **Diserbante selettivo del mais da granella e da foraggio e del sorgo in trattamenti di pre-e post-emergenza.**

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
22,3 g di dichlobenil (2,6-diclorobenzonitrile) tecnico al 90% di purezza, (corrispondenti a 20,0 g di p.a. puro).
8,6 g di monolinuron N-(4-clorofenil)-N-metossi-N-metilurea tecnico al 94% di purezza, (corrispondenti a 8,0 g di p.a. puro).
42,2 g di atrazina (2-cloro-4-etilammino-6-isopropilammino-s-triazina) tecnica al 95% di purezza, (pari a 40,0 g di p.a. puro).
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
Irritante per la cute. L'ingestione può provocare bruciori gastroesofagei, vomito, diarrea, subittero, albuminuria ed ematuria.
CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO:
Per le dermatosi pomate curtisoniche od antistaminiche. Non è consigliabile la lavanda gastrica. Si consiglia fleboclisi glucosato, potassio, epatoprotettori.

Caratteristiche:
Il Turcan Combi è un erbicida specifico per il diserbo del mais da granella e da foraggio e del sorgo in trattamenti pre-e post-emergenza. L'azione erbicida del dichlobenil, del monolinuron e dell'atrazina contenuti nel Turcan Combi è indicata per la distruzione non solo delle infestanti a foglie larga in genere, quali amaranto, farinello, persicaria, mercorella, erba morella, stellaria, ma anche per l'eliminazione delle graminacee annuali, quali setaria, poe, digitaria, giavone.
Il Turcan Combi è efficace inoltre contro il giavone americano (Panicum dicotomiflorum).

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

Modalità d'impiego
Dose d'impiego: 3-5 kg per ettaro - 600-800 litri d'acqua.
La dose di 3 kg/ha è sufficiente per infestazioni date provalentemente da malerbe di normale resistenza: amaranto, farinello, persicaria, erba morella, setaria, digitaria, poe e giavone. Solo in caso di massiccia presenza di giavone americano (Panicum dicotomiflorum) elevare la dose a 5 kg/ha.

Il trattamento con Turcan Combi può essere effettuato sia in pre-emergenza, a partire dalla nascita della coltura, compatibilmente con lo sviluppo vegetativo delle infestanti, ed in particolar modo delle graminacee, che devono essere in linea di massima nei primi stadi di sviluppo.
Nelle applicazioni di post-emergenza, l'aggiunta di 7-8 lt. per ettaro di PARAMON 72 (olio bianco emulsionato) alla poltiglia erbicida, migliora l'efficacia del trattamento.
Non effettuare il diserbo su terreni torbosi o comunque molto ricchi di sostanza organica.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi aggiungerlo lentamente e sotto agitazione alla quantità d'acqua necessaria.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
Per la particolare formulazione e lo specifico campo d'impiego, il Turcan Combi non deve essere miscelato con insetticidi, fungicidi e concimi liquidi.
E' possibile la miscela del Turcan Combi con olii bianchi e con erbicidi.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per le altre colture (es. bietola, tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

Fitotossicità
Applicato alle dosi e con le modalità consigliate il Turcan Combi è perfettamente selettivo per la coltura.

Rischi per la fauna utile
L'impiego del Turcan Combi non comporta rischi per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

Registrazione Nr. 2059 del 5.11.75 del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto 1-5 kg.

AMONN FITOCHIMICA SPA

2129

Insetticida in polvere bagnabile per la difesa di Fruttiferi, Vite, Agrumi, Olivo, Ortaggi, Patata, Barbabietola da zucchero, Colture floreali ed ornamentali.
Si impiega in trattamenti liquidi per la lotta contro numerosi insetti parassiti delle colture agricole.

COMPOSIZIONE

- Azinfos metile puro	g 25
- Coadiuvanti ed Inerti; quanto basta a	g 100

(R) Marchio registrato SIPCAM–Milano

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato, munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

SIPCAM–Soc. It. Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

I CLASSE

VELENO

Registrazione n. 2129 del 30/3/1976 Ministero della Sanità

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; evitare di respirare i vapori; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle e gli occhi; durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva); in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni; morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
Avvertenza; consultare un centro antiveleni.

DOSI, MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla dose di 100–200 g in 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale su :

AGRUMI : contro Afidi, Tripidi
DRUPACEE : contro Ricamatrici della frutta, Minatori fogliari, Tripidi, Cicaline, Cimici, Afidi, Tentredini.
POMACEE : contro Psilla, Afidi, Carpocapsa, Minatori fogliari, Antonomi, Cimici, Tentredini.
FRAGOLA : contro Afidi, Tripidi.
VITE : contro Tignole, Tortrici, Cicaline.
OLIVO : contro Tignole, Tripidi, Cocciniglie.
ORTAGGI : (Cavoli, Carciofo, Asparago, Ortaggi a foglia, Zucca, Cetriolo, Solanacee, Legumi, Ortaggi a radice) : contro Afidi, Tripidi.
PATATA : contro Dorifora, Afidi.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO : contro Cleono, Lixus, Altica, Afidi.
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI in pieno campo : contro Afidi, Tripidi, Tentredini, Tortrici del garofano.

Preparazione della poltiglia : stemperare la quantità necessaria di prodotto in poca acqua a parte e portare poi al volume desiderato agitando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità : il prodotto è miscibile con i normali antiparassitari di uso primaverile-estivo; in caso di miscela con Polisolfuri e Poltiglia bordolese distribuire al più presto la poltiglia per evitare degradazioni, aumentando leggermente la dose.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività : non impiegare in fioritura. E' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

2131

AZILON®

I CLASSE

VELENO

Liquido miscibile Estere fosforico con ampio spettro d'azione insetticida ed effetto acaricida.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:
20 g di Azinphos Etil (0,0-dietil-S-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-(4H) il-metil ditiofosfato) tecnico al 95% di purezza corrispondenti a 19 g di p.a. puro.
Emulsionanti e solventi quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio - Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- — Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- — Conservare la confezione ben chiusa.
- — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- — Evitare di respirarne i vapori.
- — Non operare contro vento.
- — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- — Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in buse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva).
- — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

Informazioni per il medico Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione o contatto cutaneo.

— SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
Scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI
Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg. 1-2 per gli adulti e mg. 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (g 0.50 ogni 3 ore fino a g 3) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

ALCUNE CONTROINDICAZIONI
Morfina - Vitamina B1 - coramina - latte e grassi.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 2131 del 20.3.76 del Ministero della Sanità.

Caratteristiche L'AZILON agisce per contatto, per ingestione e per asfissia contro numerosi insetti nocivi: Psille, Afidi, Carpocapsa, Minatrici, Tortricidi, Cimici, Cicaline, Cocciniglie, Falene, Antonomi, Fillobi e altri coleotteri, e alcuni ceppi di Ragno Rosso.

Modalità d'impiego Dosi per 100 litri d'acqua: cc 200-300.
Frutticoltura: contro Acari, afidi, psille del pero, larve dannose alle foglie ed ai frutti (Capua reticulana, tortricidi dei germogli, Cacoecia rosana, falene, tignola del melo, bombici, verme delle mele e delle pere, cidia del pesco, minatrici delle foglie), cocciniglie, tentredini, antonome del melo e del pero, cetonie.
Viticoltura: contro acari (ragnetti rossi, ragnetti gialli), tignole dell'uva, altica, cicaline.
Floricoltura: contro acari (ragnetti rossi del garofano, della rosa), tripidi, larve defogliatrici (tentredini della rosa, bombici), larve minatrici delle foglie.
Agrumicoltura: contro acari (ragnetti rossi, eriofidi come l'acaro delle meraviglie), cocciniglia cotonosa, cocciniglia bianca, cocciniglia mezzo grano di pepe, iceria, biancorossa, cocciniglia nera, cocciniglie a virgola, tignole, afidi, fetola.
Orticoltura: contro ragnetti rossi del pomodoro, dorifora della patata, afidi, mosca del carciofo.

Preparazione della poltiglia Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nelle poltiglie antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità L'AZILON è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).
La miscela con certi prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità Applicato alle dosi e secondo le modalità consigliate l'AZILON non è fitotossico.

Rischi per la fauna utile L'AZILON è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
Contenuto 1 lt.

2132

I CLASSE

VELENO

BENZAFOS®

Polvere bagnabile: Estere fosforico con ampio spettro d'azione insetticida per trattamenti in frutticoltura, viticoltura, floricoltura, colture industriali ed ornamentali.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:
27,7 g di Azinphos-metile (0,0-dimetil-S-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-(4H)-il metil ditiofosfato) tecnico al 90% di purezza, corrispondenti a 25 g di p.a. puro.
Coformulanti specifici, bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio: Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
— Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico: Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione o contatto cutaneo

— SINTOMI D'INTOSSICAZIONE
Scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI
Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg. 1-2 per gli adulti e mg. 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (g 0,50 ogni 3 ore fino a g 3) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

ALCUNE CONTROINDICAZIONI
Morfina - Vitamina B1 - coramina - latte e grassi.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione: DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 2132 del 30.3.76 del Ministero della Sanità.

Caratteristiche: Il BENZAFOS agisce per contatto, ingestione ed asfissia contro insetti nocivi. Agisce particolarmente contro Psille, Afidi, Carpocapsa, Minatrici, Tortricidi, Cimici, Cocciniglie, Falene, Antonomi, Fillobi ed altri Coleotteri.

Modalità d'impiego Dosi per 100 litri d'acqua: 100-200 g.
Frutticoltura: contro la psille del pero, Afidi Cocciniglie, Minatrici, Cimici, Capua reticulana, verme delle mele e delle pere, Falene, Antonomi del melo e del pero, Fillobio del pero ed altri coleotteri, Cydia del pesco, Cicaline.
Viticoltura: contro Tignole, Tortricidi (Eulia politana), Sparganothis pilleriana, Cocciniglie; ha pure una certa azione contro le Cicadelle.
Bieticoltura: Contro Cleono, Punteruolo ed Altica.
Orticoltura: contro Dorifora della patata.

Preparazione della poltiglia: Stemperare il BENZAFOS in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il BENZAFOS è normalmente miscibile con i fitofarmaci in forma di polvere bagnabile (A150, Ziramon, M-70).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Applicato alle dosi e secondo le modalità consigliate il BENZAFOS non è fitotossico.

Rischi per la fauna utile: Il BENZAFOS è tossico per insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 1 - 5

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

2133

NICAMON®

I CLASSE

VELENO

Liquido miscibile — **Insetticida a base di nicotina per la lotta contro afidi, psillidi, tingidi, aleurodidi, larve ed adulti di lepidotteri.**

Composizione

100 g di prodotto contengono:
20 g di Nicotina tecnica al 100% di purezza, corrispondente a 20 g di p.a. puro.
Tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico

Sintomi d'intossicazione:

Veleno del sistema nervoso - violenti dolori addominali - vomito - diarrea - cefalea violenta - vertigini - disturbi della vista e dell'udito - convulsioni tetaniformi - eccitazione - tachicardia con aritmia - seguono astenia - depressione - collasso cardiocircolatorio.

- CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO
  Lavare le superfici contaminate con acqua fredda - riscaldare il malato - borsa di ghiaccio sul capo - in caso di ingestione provocare il vomito - lavanda gastrica con acido tannico 0.5% o permanganato di potassio 1 : 5000 (oppure somministrare infuso concentrato di thé) - ossigenoterapia - cloropromazine - analettici.
- CONTROINDICAZIONI
  Morfina e narcotici.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12
Registrazione Nr 2133 del 30.3.76 del Ministero della Sanità.

Caratteristiche

Il NICAMON è indicato per la lotta contro afidi, psillidi, tingidi, larve ed adulti di lepidotteri.

Modalità d'impiego

Dose per 100 litri d'acqua:
contro afidi in genere, tingidi, larve ed adulti di lepidotteri: cc 250-300;
contro afide lanigero, psille del pero: cc 400-500.
Nella lotta contro gli afidi intervenire alla loro prima apparizione, specialmente per quelli che provocano l'accartocciamento delle foglie.
Non irrorare nelle ore più calde della giornata.

Attenzione: l'impiego del NICAMON è permesso solo sulle pomacee e limitatamente al periodo prefiorale delle stesse.

Preparazione della poltiglia

Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.
Data l'evaporabilità della nicotina, preparare la poltiglia antiparassitaria immediatamente prima dell'uso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il NICAMON è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.). La miscela con certi prodotti non è consigliabile.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Applicato sulle colture con le modalità consigliate il NICAMON non è fitotossico.

Rischi per la fauna utile

Il NICAMON è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.

Trattamenti permessi solo su pomacee nel periodo prefiorale.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Lt. 1 - 10

2162

FACAROL

ACARICIDA

CLASSE 1

Composizione:
100 gr. di prodotto contengono:
29,40 gr. di Fenson puro
19 gr. di Protoato puro
q.b. a 100 gr. di solventi ed emulsionanti.
«Contiene XILOLO»

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Evitare di respirarne i vapori. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. - Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro, cospargendo di calce viva) le confezioni che contenevano il prodotto. - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione, contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Scialorrea, vomito, dolori addominali, spasmi bronchiali, dispnea, lacrimazione, miosi, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici:
Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi, salvo quando vi sia cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, fare iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per adulti e 0,2-1 mg per bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione.
Una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam Chloride, PAM, Contrathion, ecc. per iniezione endovenosa lenta.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersioni con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico. - Terapia sintomatica rianimatoria.

Alcune controindicazioni:
La morfina, l'alcool, sostanze grasse, latte e, per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina e l'efedrina.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

Il FACAROL combatte tutte le specie di acari che infestano: frutteti (melo, pero, pesco), agrumeti, vigneti, coltivazioni di pomodori, fiori in pieno campo.
E' efficace contro tutti gli stadi del parassita e cioè: uovo, larva, ninfa ed adulto.
Combatte l'afide verde.

Dosi e modalità d'impiego:
Gr. 100-150 per 100 lt. di acqua: per combattere gli acari degli agrumi, aumentare la dose. Preparare l'emulsione versando prima in poca acqua ed agitando vigorosamente, diluire poi nel quantitativo di acqua necessario.

Da non applicare con mezzi aerei.

Il FACAROL è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari, ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non trattare le rose nonchè la cv. di melo Golden delicious. Inoltre può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
E' tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

S.p.A.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Officina di produzione e sede amministrativa:
FAENZA - Via S. Silvestro, 1

Registrazione Ministero della Sanità n. 2162 del 12-4-1978

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso 1 kg**

2173

Classe III

ATTENZIONE manipolare con prudenza

POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONI

COMPOSIZIONE

Ziram puro g 85
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
Via S. Francesco - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità N. 2173 del 26-3-76

® Marchio registrato

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO
Bolla, Corineo e Cancro dei rametti: g 400-500 nei trattamenti al «bruno» (fine inverno), g 150-200 in quelli al «verde» (periodo vegetativo). Ticchiolatura o Nerume e Ruggine del pesco: g 200.

MELO
Ticchiolatura (i germi della Ticchiolatura si diffondono nell'atmosfera solo dopo una pioggia — poiché umidità atmosferica e rugiada non bastano — a una temperatura che va da 0° a oltre 32 °C, ottimo 20°. La contaminazione avviene se le foglie rimangono bagnate per alcune ore e la temperatura è sufficiente al suo sviluppo). Bollato od Occhiato (Gloeosporium): g 150-200.

PERO
Ticchiolatura: g 200.

NESPOLO
Ticchiolatura: g 300-400.

OLIVO
Cicloconio: g 300-400.

AGRUMI
Mal secco: g 300 con trattamenti mensili da metà novembre a metà febbraio.

COLTURE ORTICOLE
Ruggine dell'aglio, dell'asparago, della cipolla, dell'insalata, della lattuga, del pisello e del fagiolo; Cercospora della carota; Nerume del cavolo; Antracnosi del cocomero, del fagiolo, della lattuga, del pisello, della zucca: g 200-250.

COLTURE FLORICOLE
Ruggine e Seccume delle foglie di crisantemo, Ruggine e Alternariosi del garofano, Septoriosi del gladiolo, Seccume delle foglie della margherita, Ruggine e seccume delle foglie del narciso, Ruggine e Ticchiolatura (Block spot) delle rose: g 250-300.
Si consigliano le dosi più basse per le varietà di piante particolarmente sensibili ai fitofarmaci.

Preparazione della sospensione

La sospensione si prepara stemperando in poca acqua la dose richiesta di MEZENE, aggiungendola quindi gradualmente, sotto vigorosa agitazione, all'acqua residua fino a raggiungere la concentrazione desiderata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari e consente in tal modo la preparazione di miscele polivalenti con vari insetticidi (olii bianchi semplici o attivati, clorurati organici, esteri fosforici) e con fungicidi (zolfi colloidali e bagnabili).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Varietà di pero sensibili allo ZIRAM: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto g 50

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza, la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

2208

MINITROL® 75

CLASSE I

VELENO

Emulsione di olio bianco e di DNOC — **Insetticida specifico per i trattamenti invernali alle piante da frutto.**

Composizione

100 g di prodotto contengono:
75 g di olio minerale al 65% di insolfonabile p.a. puro (100% di purezza).
3,15 g di DNOC (dinitroortocresolo) tecnico al 95% di purezza, corrispondente a 3 g di p.a. puro.
Emulsionanti, tensioattivi, coformulanti specifici ed acqua quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico

- **Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.**
- **Sintomi d'intossicazione:**
  Sudorazione - sete - nausea - spossatezza o agitazione psicomotoria - tachicardia - dispnea - notevole ipertermia - colorazione gialla delle sclere - la morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI CASO PER CASO

Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5%. - Emetici e catarsici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione. Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda. — trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso ed ipotensione. Metil o propil tiouracile per ridurre il metabolismo basale - Ossigeno, respirazione artificiale. E' controindicata l'atropina.

Caratteristiche

Il MINITROL 75 è un insetticida specifico per i trattamenti invernali alle piante da frutto. Combatte cocciniglie (S. Josè, Cocciniglia grigia del pero, Cocciniglia bianca del gelso, Cocciniglia ovale grigia degli alberi da frutto), uova di afidi e psillidi.

Modalità di impiego

Pomacee: 3-4% - Drupacee: 3-3,5% - Pesco: 3%
Il trattamento va eseguito il più tardi possibile però sempre a completo riposo vegetativo delle piante. Per le pomacee (pero e melo) non ritardare l'applicazione oltre il rigonfiamento delle gemme. In certe zone ed in relazione all'andamento stagionale, alcune varietà di pesco sono sensibili all'azione degli olii gialli, per cui questi dovranno essere impiegati a seconda delle esperienze locali.
In tutti i casi per il pesco non si deve superare la concentrazione del 3%.

Non trattare a temperature inferiori a 0° C.

Preparazione della poltiglia

Rimescolare bene il MINITROL 75 prima dell'uso e versarlo lentamente, sotto agitazione, nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Per la sua formulazione e lo specifico campo d'impiego il MINITROL 75 deve essere usato da solo.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Applicato alle dosi e secondo le modalità consigliate il MINITROL 75 non è fitotossico.

Rischi per la fauna utile

Il MINITROL 75 è tossico per insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 100

Titolare della registrazione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

Registrazione n. 2208 del 10-4-76 del Ministero della Sanità.

2210

CLASSE I

VELENO

Esca avvelenata	**Esca a base di grano avvelenato con tallio, per la lotta contro i topi di campo ed i sorci.**
Composizione	100 g di prodotto contengono: 2,05 g di tallio solfato tecnico al 99,95% di purezza, corrispondenti a 2 g di p.a. puro. Coloranti ed inerti quanto basta a 100 grammi. **ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.**
Natura del rischio	Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.
Norme precauzionali	— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Evitare di respirarne i vapori. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. — Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva). — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Informazioni per il medico	— Sintomi di intossicazione: **Latenza anche di alcuni giorni - violenti dolori nevralgici - paralisi 3° - 4° - 6° paio dei nervi cranici (strabismo, ptosi palpebrale, nevrite ottica, lesioni dell'iride e del cristallino) - distacco della retina - convulsioni - tremori - turbe renali gravi - alopecia tardiva.** CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO **Provocare il vomito - lavanda gastrica con carbone attivo e joduro di potassio - Antidoti: somministrazione endovenosa di joduro di sodio sol. 2,5% g 0,30-1 pro die oppure joduro di potassio sol. 1% g 0,5-1 pro die alternati con tiosolfato di sodio sol. 5% g 0,5-1 pro die - Vitamine B1 e B12 - oppiacei - fleboclisi glucosate.**
Modalità d'impiego	Il SORITOX è un mezzo di facile impiego contro i roditori nocivi. **1-2 grani di SORITOX sono sufficienti per uccidere un topo.** Contro i topi di campo: Questi causano danni tracciando gallerie sotterranee in ogni direzione. Rodono graminacee e leguminose da foraggio; nei campi di cereali si formano chiazze nude. Attaccano tuberi di patata, radici di bietola, di rape e non risparmiano nemmeno la corteccia delle radici e del colletto delle piante da frutto. Anche sotto la coltre di neve continuano la loro azione scavatrice e roditrice. **Si ottiene un buon risultato contro una forte invasione di topi di campo, soltanto effettuando una lotta collettiva su tutta la zona infestata.** L'epoca più propizia per iniziare la lotta cade nell'autunno, prima che i topi si nascondano nelle loro tane, oppure in febbraio-marzo. Il SORITOX va distribuito nelle tane mediante uno speciale fucile o con un cucchiaio. Si usano Kg. 1-1,5 di prodotto per ha secondo l'entità dell'infestazione. Anche quando il terreno presenta molte tane non è necessario introdurre l'esca in ognuna di esse; è sufficiente introdurre 4-8 grani di esca in 2-3 tane per m². DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità	Il SORITOX non è miscibile con altri fitofarmaci.
Fitotossicità	Applicato alle dosi e secondo le modalità consigliate il SORITOX non è fitotossico.
Rischi per la fauna utile	Il SORITOX è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame. **Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.** Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. DA NON VENDERSI SFUSO Contenuto: g . 1000.
Titolare della registrazione	DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2
Officina di produzione	DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12
	Registrazione n. 3310 del 10.4.76 del Ministero della Sanità.

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

2231

ad azione per assorbimento radicale.
INFESTANTI COMBATTUTE: graminacee, Digitaria sanguinalis, Sorghum halepense (solo da seme), Echinochloa crusgalli, Poa annua, Setaria glauca, Alopecurus agrestis, Setaria viridis, Alopecurus myosuroides, Eragrostis cilianensis, Apera spica-venti, Bromus tectorum, Lolium temulentum, Bromus secalinus.
Malerbe a foglia larga: Portulaca oleracea, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare, Papaver rhoeas, Amaranthus retroflexus, Galium aparine, Chenopodium album, Lamium spp, Stellaria media, Veronica spp., Urtica urens, Atriplex patulum, Tribulus terrester, Galeopsis ladanum.
COLTURE PROTETTE, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO:
Pomodoro e peperone da trapianto - indivia, lattuga, scarola e cicoria (radicchio) da trapianto - carota, finocchio, sedano e prezzemolo da trapianto: applicare ed interrare nel periodo tra 6 settimane prima del trapianto, fino ad 1 giorno prima del trapianto stesso. Dose: 1 lt/Ha per terreni leggeri, lt. 1,5 per medio impasto, lt. 2 per pesanti e/o argillosi.
Cavolo, cavolfiore da trapianto - cipolla da trapianto: applicare ed interrare da 3 settimane ad 1 giorno prima del trapianto stesso. Dose: 1 lt/Ha per terreni leggeri, lt. 1,5 per medio impasto, lt. 2 per pesanti e/o argillosi.
Cicoria (radicchio) da semina - fagiolo e fagiolino - carota, finocchio, sedano e prezzemolo da semina - aglio - girasole, cotone, arachide (Arachis hypogea) e soja: applicare ed interrare nel periodo tra 6 settimane prima della semina fino ad 1 giorno prima della semina stessa. Dose: 1 lt/Ha per terreni leggeri, lt. 1,5 per medio impasto, lt. 2 per pesanti e/o argillosi.
Pomodoro da semina: applicare il prodotto irrorando direttamente il terreno tra le file alla base delle piante, all'epoca del diradamento. Interrare immediatamente avendo cura di distruggere con tale operazione le erbe nate prima del trattamento, in quanto il prodotto agisce solo contro le erbe in stadio di germinello o di plantula. Dose 1 lt/Ha per terreni leggeri, lt. 1,5 per medio impasto, lt. 2 per pesanti e/o argillosi.
Pisello: applicare ed interrare nel periodo tra 6 settimane prima della semina fino ad 1 giorno prima della semina stessa. Dose: 1,2 lt/Ha per tutti i tipi di terreno. Può essere impiegato anche in autunno-inverno (2-4 mesi prima della semina). In questo caso applicare ed interrare il prodotto alla dose di 1,5 lt/Ha per tutti i tipi di terreno.
Cavolo, cavolfiore da semina: applicare ed interrare nel periodo da 3 settimane prima della semina fino ad 1 giorno prima della semina stessa. Dose: 1 lt/Ha per terreni leggeri, lt. 1,5 per medio impasto, lt. 2 per pesanti e/o argillosi.
Colza e ravizzone: applicare ed interrare nel periodo tra 3 settimane prima della semina fino ad 1 giorno prima della semina stessa. Dose: 1 lt/Ha per terreni leggeri, lt. 1,5 per medio impasto, lt. 2 per pesanti e/o argillosi.
Piante ornamentali: applicare ed interrare prima del trapianto delle piante (di 1 anno) o irrorare direttamente il terreno tra le piante già radicate interrando immediatamente ed avendo cura di distruggere, con tale operazione, le erbe nate prima del trattamento in quanto il prodotto agisce solo contro erbe in stadio di germinazione o di plantula. Dose: 1 lt/Ha per terreni leggeri, lt 1,5 per medio impasto, lt. 2 per pesanti e/o argillosi.
Gladiolo: applicare ed interrare da 6 settimane ad 1 giorno prima della piantagione. I bulbi di gladiolo devono essere di almeno cm 2,5 di diametro. Dose 1 lt/Ha per terreni leggeri, lt 1,5 per medio impasto, lt. 2 per terreni pesanti e/o argillosi.
Barbabietola: (in post-emergenza della coltura). Applicare su tutta la superficie quando le piante abbiano raggiunto lo stadio delle 4-6 foglie vere o, se viene effettuato il diradamento, almeno una settimana dopo tale operazione. Interrare nell'interfila subito dopo la distribuzione avendo cura di distruggere con tale lavorazione le erbe nate prima del trattamento, in quanto il prodotto agisce solo contro le erbe in stadio di germinello o di plantula. L'attrezzatura impiegata per l'incorporamento del prodotto nel terreno non deve danneggiare le radici della coltura. Dose: 1,2 lt/Ha per terreni leggeri e medio impasto, lt. 1,5 per terreni pesanti e/o argillosi.
Frutteti, agrumeti e vigneti - nuovi impianti: applicare ed interrare prima dell'impianto. Dose: 1 lt/Ha per terreni leggeri, lt. 1,5 per terreni medio impasto, lt. 2 per terreni pesanti e/o argillosi. **Impianti già radicati:** applicare ed interrare alla dose di 2-4 lt. per ettaro a seconda della natura del terreno.
Erba medica (dopo l'ultimo sfalcio del primo anno): deve essere applicato ed interrato durante la stagione di riposo del medicaio. Si deve impiegare un'attrezzatura per l'interramento che danneggi il meno possibile la coltura. Dose 1,5 lt/Ha per terreni leggeri, lt. 2 per terreni medio impasto e pesanti.
Melone, cocomero e cetriolo: applicare al momento del diradamento, quando la coltura ha raggiunto lo stadio vegetativo di 3-4 foglie, irrorando direttamente il suolo alla base della pianta ed interrando il prodotto subito dopo la distribuzione. Dose 1 lt/Ha per terreni leggeri, lt. 1,5 per medio impasto, lt 2 per pesanti e/o argillosi.
Patate: applicare ed interrare dopo la piantagione dei tuberi, nello strato di terreno ad essi sovrastante, avendo cura di non danneggiare i tuberi stessi durante l'operazione di incorporamento del prodotto nel terreno. Dose: 1 lt/Ha per terreni leggeri, lt. 1,5 per terreni medio impasto, lt. 2 per terreni pesanti e/o argillosi.
Frumento, orzo, segale (a semina autunnale): applicare senza incorporazione in qualunque momento da subito dopo la semina in poi, ma prima dell'emergenza delle graminacee annuali e/o prima che le infestanti dicotiledoni annuali abbiano raggiunto lo stadio delle 4 foglie vere. Applicare a dosi da lt. 1,2 a lt. 2 per ettaro.
Usare 1,2 lt/Ha per terreni leggeri e lt. 1,5 per terreni medi e pesanti, quando l'applicazione è fatta prima dell'emergenza delle infestanti graminacee e delle infestanti dicotiledoni. Usare 2 lt/Ha su tutti i tipi di terreno, quando l'applicazione è fatta dopo l'emergenza delle infestanti dicotiledoni.
Per ottenere i migliori risultati, il letto di semina deve essere ben preparato, eliminando le zolle grosse, e tutti i semi devono essere ricoperti dal terreno per assicurare una germinazione uniforme. A questo scopo, in qualche caso può essere utile rullare il terreno dopo la semina e prima del trattamento. Evitare comunque di lavorare il terreno con qualsiasi attrezzatura nel periodo del trattamento all'emergenza della coltura.
MODALITA' D'IMPIEGO: deve essere incorporato nel terreno (eccetto quando è usato sui cereali precisati) ad una profondità di 5-10 cm subito dopo l'applicazione (entro 30 minuti in estate fino a 3-4 ore in periodi freddi o piovosi nelle altre stagioni) per evitare perdite di efficacia. L'attrezzatura impiegata deve frantumare le zolle più grosse e mescolare il FLURAN accuratamente nel terreno. Un uniforme interramento può essere consentito con frese, erpici a dischi, motocoltivatori e motozappe. Impiegando l'erpice a dischi, è opportuno operare in due diverse direzioni e ad una velocità di 6-10 km/h.
ISTRUZIONI SPECIALI: qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del FLURAN e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.), nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. Non deve essere applicato in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità: si sconsigliano miscele con altri presidi sanitari comunque, prima di effettuare eventuali miscele con altri erbicidi, interpellare il personale tecnico della Società. **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

FLURAN®

ERBICIDA SELETTIVO

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione:

TRIFLURALIN puro	. .	gr. 45,8
Coformulanti	q.b. a	gr. 100,0

- Contiene Xilolo -

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61/2 - Telex 511046

Registrazione N. 2231
del 9-4-1976
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
SOCIETE CHIMIQUE
FRANCAISE, S.A.R.L.
Zone Industriélle
Rue du Colonel Lilly
67640 FEGERSHEIM (France)

® Marchio depositato della
ELI LILLY & Co.
Indianapolis/Indiana
Divisione ELANCO

Fitotossicità: può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Se il prodotto viene impiegato in post-emergenza, sospendere i trattamenti 30 GIORNI prima del raccolto.
Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco. Evitare il congelamento conservandolo in locali a temperatura non inferiore a 5°C.

NATURA DEL RIS
sostanza pericolos
ingestione, per inal
e contatto con la

NORME PRECAUZI

Conservare quest
dotto chiuso a chi
luogo inaccessibil
bambini ed agli
domestici • Conser
confezione ben ch
Non fumare e nor
giare durante l'i
del prodotto • Non
minare alimenti e
de o corsi d'acqua
operare contro ve
Evitare il contatto
pelle, gli occhi e gl
menti • Dopo la n
lazione ed in caso
taminazione, lavars
ratamente con acqu
pone • Non cons
presso sorgenti di
o fiamma • Non re
ne i vapori

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossic
chiamare il medic
consueti interven
pronto soccorso.

VERCHIM ASTERIAS

DA NON VENDERSI SFUSO
Litri

2319

CARATTERISTICHE

Il **DOZIR** è un anticrittogamico misto in polvere adesiva a base di Ziram e Dodina per trattamenti a secco.
Lo Ziram e la Dodina svolgono una funzione **ANTITICCHIOLANTE su pero, melo, nespolo e rose.**
Il **DOZIR** è inoltre efficace contro: OCCHIO DI PAVONE DELL'OLIVO, CILINDROSPORIOSI o ANTRACNOSI DEL CILIEGIO, PERONOSPORA DELLA CIPOLLA, BOTRYTIS DELLA FRAGOLA, FUSARIOSI DEL GAROFANO, nonchè contro la MONILIA e il FUSICOCCUM.
Il **DOZIR** non presenta rischi di assuefazione da parte dei funghi che combatte.
Il **DOZIR** è indicato per le varietà di pero sensibili allo Zineb: Butirra estiva - Scipiona - Curato - Santa Maria - Armella - Giardina - Coscia - Decana del Comizio - Kaiser - Mera - William precoce.
Il **DOZIR** agisce contro spore e conidi bloccandone le vitali attività e svolge **AZIONE CURATIVA** disorganizzando le cellule del micelio del fungo parassita.
Il **DOZIR** è dotato di proprietà adesivante valida a prolungare la persistenza d'azione del preparato.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Impiegare kg 25-30 di **DOZIR** per ettaro e per trattamento alle epoche indicate dagli schemi di difesa normalmente in uso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con carbaryl, dimetoato e metilazinfos.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto è fitotossico per le seguenti varietà di pero: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona e Spadona d'estate
Per la cultivar di melo Golden Delicious il prodotto può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per animali domestici, pesci e bestiame.
AVVERTENZE: da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg

Dozir

Anticrittogamico misto Dodina Ziram per trattamenti polverulenti

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Ziram puro	g 10,80
Dodina pura	g 1,96
Coformulanti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, sonnolenza, irritazione nervosa nonchè del tratto gastrointestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei.
Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.), eczemi resistenti alle terapie a causa della fotosensibilizzazione.
Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: in caso in ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica. Il vomito e la lavanda gastrica possono essere praticati solo se il paziente è cosciente; se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata soltanto dopo intubazione. La lavanda gastrica non va praticata se il paziente ha lesioni esofagee e gastriche Cure sintomatiche.
Nei casi gravi ricovero in centro di rianimazione.
Per l'irritazione della cute e delle mucose. lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni.

caffaro S.p.A. - Milano

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)
Registrazione n. 2319 del Ministero della Sanità del 23-12-1976

2323

A - 150 BLU

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile — **Fungicida organico per combattere le principali malattie crittogamiche della vite, del pomodoro e del garofano.**

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:
Zineb (etilenbisditiocarbammato di zinco) p.a. puro gr. 65
(da p.a. tecnico al 90%)
Bagnanti, disperdenti, coloranti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

- *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
- *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico

SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA:

- in caso di ingestione
  Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;
- per l'irritazione della cute e delle mucose
  Lavaggio, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.
  Controindicate: alcool, olii e grassi.

Modalità e campi d'impiego

Dosi per 100 litri d'acqua: g. 200-300.
Vite: contro la peronospora.
Pomodoro fino alla prima fioritura: contro la peronospora.
Garofano: contro la ruggine.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON IMPIEGARE IN SERRA.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Compatibilità

L'A-150 BLU è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 2323 del 30.9.76 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 1

2327

CLASSE I

VELENO

Polvere bagnabile **Fungicida per la lotta contro la Cercospora della barbabietola.**

Composizione

Contenuto Kg. 10

100 g di prodotto contengono:
30 g di Fentin idrossido tecnico al 90% di purezza corrispondenti a 27 g di p.a. puro.
Coformulanti specifici, bagnanti, disperdenti, coloranti ed inerti: quanto basta a 100 grammi.

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico

Nocivo per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

— **Sintomi di intossicazione:**

Cefalea occipitale continua o parossistica - ronzii auricolari - iperacusia - vertigini - rachialgia dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra - ritenzione urinaria - insufficienza respiratoria e di circolo - interessamento del Sistema Nervoso Centrale (nevralgie e paralisi) - dermatosi.

— **Consigli terapeutici:**

Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando in relazione alla via di contaminazione abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale.
Terapia sintomatica.

Titolare della registrazione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

• Marchio registrato dalla Philips-Duphar N.V. - Amsterdam

Registrazione Nr. 2327 del 6.10.76 del Ministero della Sanità

Caratteristiche

Il DU-TER S. è un nuovo fungicida studiato per la lotta contro la Cercospora della barbabietola (Cercospora beticola).

Modalità d'impiego

Contro la Cercospora della barbabietola impiegare g 800-1200 di DU-TER S. per ettaro, diluito in circa 400-600 litri d'acqua.

La dose massima si usa solamente con attacchi gravi.

Il DU-TER S. nella lotta contro la Cercospora della barbabietola si usa generalmente per 2-3 trattamenti, alla distanza di non più di 3 settimane, a seconda dell'andamento stagionale.

Le dosi unitarie, le concentrazioni ed il numero dei trattamenti vanno pertanto adeguati alla precocità della coltura, alla suscettibilità delle varietà, alla virulenza degli attacchi. I trattamenti devono avere carattere relativamente preventivo e vanno iniziati a cominciare da metà giugno, comunque non prima della comparsa dei sintomi d'infezione della malattia (macchie sulle foglie).

Il DU-TER S. si può distribuire con normali mezzi meccanici quali pompa a pressione (a mano, a spalla, a motore), idropneumatici ed atomizzatori.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

Il DU-TER S. non è miscibile con prodotti emulsionabili o emulsionati, né con concimi fogliari. Il DU-TER S. è miscibile con AFIDAMON.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi per la fauna utile

Il DU-TER S. è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 10-1

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

2329

ARLITOX® - G

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA!

Granuli — Antilumaca a base di metaldeide

Composizione
100 di prodotto contengono:
5 g di Metaldeide al 100% di purezza.
Coadiuvanti, adesivanti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni il medico
SINTOMI D'INTOSSICAZIONE

Violenti dolori addominali - diarrea - vomito biancastro (aspetto di latte cagliato) - shock - midriasi - ipotermia - convulsioni - obnubilazione del sensorio.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO:

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (gr 5 per litro di acqua) - riscaldare il paziente - cardiotonici - fleboclisi clorurate o glucosate con noradrenina - diuretici - barbiturici-neuroplegici - anfetamina o derivati in caso di torpore.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione Nr. 2329 del 20.12.76 del Ministero della Sanità.

Caratteristiche
L'ARLITOX - G è un'esca pronta per l'uso contro tutte le specie di lumache che infestano campi e serre.
Le lumache di campo hanno costumi notturni; esse compaiono soltanto in giornate piovose e nuvolose. Di giorno si nascondono sotto terra, sassi, cespugli, foglie.
Alle specie a costume notturno più diffuse e più dannose appartengono le limacce, le quali sono sprovviste di conchiglia.
In annate molto umide queste possono apparire in grande numero. Una lumaca depone fino a 500 uova che schiudono dopo 3-4 settimane. Esse si nutrono preferibilmente di tessuti di piante erbacee succose e tenere, sulle quali lasciano tracce caratteristiche: tessuti erosi, muco e residui fecali.

Modalità di impiego
Nei giardini, negli orti, nelle serre ed anche sui piccoli appezzamenti coltivati, l'ARLITOX-G si distribuisce a spaglio su tutta la superficie o a mucchietti fra le piante, servendosi di un cucchiaio. Il miglior effetto si ottiene su terreno umido, perciò spargere l'esca subito dopo la pioggia o dopo una buona irrigazione. Asportare le lumache morte e spargere altra esca dopo una lunga pioggia. Su colture di pieno campo l'ARLITOX-G si sparge molto fitto su una striscia marginale larga 1,5 - 2 m. lungo il perimetro del campo da trattare.
Internamente a questa striscia si sparge molto più rado.

Dosi di impiego
Colture di pieno campo 6-7 Kg. per ettaro. In orticolture 2-4 mucchietti o circa 10 granuli per m². Se dopo alcuni giorni si nota che l'esca è stata mangiata, bisognerà spargerne altra per ottenere un successo completo. Nelle colture di tabacco non spargere l'ARLITOX-G sulle foglie.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
Per la sua particolare conformazione l'ARLITOX-G non deve essere distribuito assieme ad altri prodotti granulari.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi per la fauna utile
L'ARLITOX-G è nocivo per i pesci, gli animali domestici ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 1 - 5.

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

2330

Classe III

ATTENZIONE manipolare con prudenza

LINURON 50

ERBICIDA UREICO PER IL DISERBO SELETTIVO DELLA CAROTA, DELLA PATATA, DEL SEDANO E DEL FINOCCHIO

COMPOSIZIONE

Linuron puro	g 47,5
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti	q.b. a g 100

CAMPO D'AZIONE

Combatte le più diffuse infestanti annuali quali: Poligono, Portulaca, Matricaria, Amaranto, Chenopodio, Ranuncolo, Papavero, Capsella. Meno sensibili sono Giavone, Digitaria e Setaria. Non controlla le erbe perenni.

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. - Treviglio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2330 del 23-10-1976

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO AD ETTARO PER 600-800 LITRI DI ACQUA

Prima dell'applicazione lavorare bene il terreno fino a che sia privo di zollosità ed effettuare una prova in « bianco » con sola acqua per poter eseguire poi una uniforme distribuzione del prodotto.
Dopo il trattamento il terreno non deve essere lavorato per non annullare l'effetto erbicida.

Non nebulizzare troppo finemente la miscela e tenerla in costante agitazione.

Evitare i trattamenti in periodi molto caldi e su terreno estremamente sabbioso o secco.

Lavare accuratamente il macchinario usato per la distribuzione del prodotto.

carota

a) in pre-emergenza, nell'intervallo che intercorre fra la semina fino a due-tre giorni prima dell'emergenza della coltura, ponendo il seme a circa 2 centimetri di profondità:

su terreni sciolti	kg 1,5
su terreni di medio impasto	kg 2
su terreni compatti	kg 2,5

b) in post-emergenza della coltura, prima che le piante infestanti abbiano raggiunto 2-3 centimetri di altezza e preferibilmente quando la carota ha 2-3 foglie vere:

su ogni tipo di terreno	kg 1,5-2

patata

In pre-emergenza, nell'intervallo che intercorre fra la semina e l'inizio dell'emergenza della coltura:

su terreni sciolti	kg 1,5
su terreni di medio impasto	kg 2
su terreni compatti	kg 2,5-3

sedano e finocchio

dopo la posa a dimora delle piante non appena superata la crisi del trapianto:

su terreni sciolti	kg 1
su terreni di medio impasto e compatti	kg 2

Avvertenze

Il Linuron 50 agisce per assorbimento radicale e per contatto e presenta efficacia erbicida e relativamente rapida decomposizione nel terreno (3-4 mesi) si da evitare pericoli alle colture che succedono a quella diserbata.
Il Linuron 50 non è volatile, nè corrosivo, nè infiammabile.
Il prodotto deve essere conservato in luogo lontano da insetticidi, anticrittogamici, concimi, sementi.

Preparazione della sospensione

Stemperare il prodotto in poca acqua e raggiungere il volume desiderato agitando energicamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità - Il prodotto può essere miscelato con altri diserbanti a base di Diuron, Paraquat e Diquat.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

Irritante per la cute. L'ingestione può provocare bruciori gastroesofagei, vomito, diarrea, subittero, albuminuria ed ematuria.

Consigli terapeutici

Per le dermatosi pomate cortisoniche od antistaminiche. Non è consigliabile la lavanda gastrica.

Si consigliano fleboclisi glucosate, potassio, epato-protettori.

FARMOPLANT S.p.A.

2335

Insetticida granulare per la lotta contro gli insetti del terreno parassiti di colture orticole, floreali ed agricole in genere.

COMPOSIZIONE:	
Parathion puro	g 10
Stabilizzanti, inerti: quanto basta a	g 100

(R) Marchio registrato SIPCAM - Milano

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentito di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura - Viale G. Galeazzo, 3 Milano - Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

I CLASSE

VELENO

Registrazione n. 2335 del 20/12/1976 Ministero della Sanità.

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; evitare di respirare i vapori; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle e gli occhi; durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva); in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione;

Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.

Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.

Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni; morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olii e grassi.

Avvertenza; consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il TETRAFOS 10 G si distribuisce almeno una settimana prima della semina o del trapianto su tutta la superficie da disinfestare o localizzato lungo le file delle colture nelle seguenti dosi:

- contro elateridi, melolontidi, scarabeidi, tipulidi, bibionidi, grillotalpa: Kg. 30-40/Ha di superficie interrando per 10-15 cm.
- Contro ditteri terricoli (mosca della cipolla, del cavolo, delle radici) Kg. 20-25/Ha nel solco.
- Contro agrotidi ed altri lepidotteri del terreno: Kg. 30-50/Ha interrando leggermente.

Il TETRAFOS 10 G non trasmette odori e sapori alle colture trattate anche se le parti commestibili sono sotterranee.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto si usa da solo.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere il trattamento 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

2336

L'ATOMOL CAFFARO è un prodotto indicato per combattere le cocciniglie (Aspidiotus, Diaspis leperii) che svernano sulle piante da frutto e soprattutto le uova di: Afidi, Psillidi, Geometridi, Tortricidi.

DOSI E MODO D'IMPIEGO

L'ATOMOL CAFFARO va applicato unicamente durante il riposo vegetativo invernale. I meli e i peri si possono trattare fino a poco prima della schiusura delle gemme. I peschi e le altre piante a nocciolo solo nel periodo di completo riposo vegetativo. Eseguire i trattamenti in giornate soleggiate e non molto fredde.

Per DRUPACEE (Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio) 4-5%
Per POMACEE (Melo, Pero) 5-8%

PREPARAZIONE DELL'EMULSIONE

Rimescolare bene prima dell'uso il contenuto della latta o del fusto; versare la quantità occorrente di ATOMOL CAFFARO in un recipiente ed aggiungervi, rimescolando, una uguale quantità di acqua fino ad ottenere un'emulsione omogenea; aggiungere altra acqua, sempre mescolando, fino a portare l'emulsione alla concentrazione voluta.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: l'ATOMOL CAFFARO è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari che si trovano in commercio ad eccezione dell'Ethion, del Protoato, del Chinometionato, del Captano, del Dicloran, del Dinocap, del Metiram e degli Zolfi Bagnabili.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: l'ATOMOL CAFFARO può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITÀ: l'ATOMOL CAFFARO è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg

Atomol Caffaro

A base di oli minerali bianchi e dinitro-orto-cresolo per i trattamenti invernali ai fruttiferi

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Oli minerali puri (95% U.R.)	g 70
DNOC puro	g 2
Coformulanti	q.b.a g 100

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I VELENO

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es.. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psico-motoria, tachicardia, dispnea, ipertemia, colorazione gialla delle sclere.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di intossicazione acuta ricorrere alla lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5% (non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago, molto frequenti in caso di ingestione). Emetici e catartici se il paziente è cosciente, combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature di alcool, clisteri d'acqua fredda. Analettici (tipo simpatolo, veritolo e coramina) somministrati per via parenterale, se esiste una lieve sindrome ipotensiva; qualora questa fosse di grado elevato il paziente va ricoverato in reparto di rianimazione per trattamento più idoneo. Trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche in caso di collasso ed ipotensione grave. Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale.
Controindicazioni: atropina.

caffaro S.p.A. - Milano

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)
Registrazione n. 2336 del Ministero della Sanità del 6-10-1976

2340

DISERBANTE LIQUIDO
PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI
GRAMINACEE E DICOTILEDONI

Presidio Sanitario
Registrazione Min. Sanità n. 2340 del 5-10-1978

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

— Pendimetalin (ex Penoxalin) puro	g 31.7
— Coformulanti (emulsionanti e solventi) (contiene Xilolo)	q.b. a 100

* Marchio depositato AMERICAN CYANAMID CO., Wayne, N.J. (U.S.A.)

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

AVVERTENZE

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici — Conservare la confezione ben chiusa — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto — Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua — Non operare contro vento — Evitare di respirarne i vapori, il nebulizzato e le polveri — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E GAMMA D'AZIONE

Lo STOMP 330-E è un diserbante da distribuire sul terreno ove svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle più importanti infestanti annuali sia graminacee che dicotiledoni. Le infestanti sono anche controllate nello stato di plantula a condizione che le graminacee non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 foglia e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere.

GRAMINACEE: Alopecurus, Apera, Digitaria, Echinochloa, Lolium, Panicum, Poa, Setaria, Sorghum hal. (da seme).

DICOTILEDONI: Ajuga, Amaranthus, Anagallis, Atriplex, Capsella, Cardamine, Cerastium, Chenopodium, Euphorbia, Fumaria, Galium, Heliotropium, Lamium, Linaria, Matricaria, Mercurialis, Myosotis, Papaver, Polygonum, Portulaca, Ranunculus, Sinapis, Solanum, Sonchus, Spergula, Stachys, Stellaria, Thlaspi, Urtica, Veronica, Viola.

SETTORI E MODALITA' D'IMPIEGO

Attenendosi alle suggerite modalità d'impiego lo STOMP 330-E è idoneo per il diserbo selettivo delle seguenti colture:
AGLIO: 4-5 Kg/Ha pre-emergenza. ARACHIDE: 4 Kg/Ha pre-emergenza. CAROTA: 5 Kg/Ha pre-emergenza. CIPOLLA: 4-5 Kg/Ha pre-emergenza o pre-trapianto (fino a un giorno prima). GIRASOLE: 5-6 Kg/Ha pre-emergenza. GRANO e ORZO: 5-6 Kg/Ha pre-emergenza. MAIS: 5 Kg/Ha pre-emergenza (aumentando a 6 Kg/Ha in zone fortemente infestate da Panicum d. e Sorghum h.). PATATA: 5 Kg/Ha pre-emergenza. PISELLO: 5-6 Kg/Ha pre-emergenza (impiegando la dose più alta su colture a semina autunnale). SOIA: 5 Kg/Ha pre-semina (incorporato) o pre-emergenza. TABACCO: 5-6 Kg/Ha pre-trapianto.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA E ISTRUZIONI PER L'USO

Al fine di permettere allo STOMP 330-E di esplicare al meglio la sua attività diserbante e la sua selettività verso le colture suggerite attenersi alle seguenti modalità operative:

— effettuare una buona preparazione del letto di semina in modo da operare su terreno perfettamente livellato e privo di zolle, tale da formare una massa uniforme e compatta, provvedendo altresì ad una irrigazione se non sopravviene una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento in modo da favorire la penetrazione del prodotto nello strato superficiale del terreno;
— effettuare le semine in maniera uniforme e regolare ad una profondità di almeno 3 cm per carota e cipolla e di 4 cm per le altre colture, avendo altresì cura di evitare che alcuni semi rimangano scoperti o a pelo di terra;
— stemperare in poca acqua la necessaria dose di STOMP 330-E e poi, continuando ad agitare la miscela, aggiungere il quantitativo di acqua (oscillante da 300 a 800 litri/Ha a seconda del tipo di pompa usata) sufficiente ad assicurare una completa bagnatura del terreno;
— distribuire la miscela senza incorporarla (ad eccezione della Soia in pre-semina) ed operando uniformemente in modo da evitare lacune e sovrapposizioni;
— dopo la distribuzione lavare accuratamente con acqua e sapone attrezzature, utensili e recipienti adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto.

AVVERTENZE

— Dal trattamento erbicida far trascorrere almeno 6 mesi prima di seminare nuove colture.
Nessun rischio esiste invece per le successive colture da trapianto.
— In caso di forzate risemine sui terreni già trattati con STOMP 330-E evitare il contatto dei nuovi semi con il diserbante riseminando alle profondità suggerite senza rimuovere il terreno oppure effettuando un'aratura profonda almeno 20 cm., la quale è altresì necessaria se anziché riseminare la coltura trattata si preferisce seminare barbabietola da zucchero.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con atrazina, chlortoluron, linuron, methabenzthiazuron e neburon.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto svolge la sua azione a carico di semi e germinelli localizzati nello strato superficiale del terreno. Pertanto, ai fini della selettività verso le suggerite colture da seme è indispensabile attenersi alle consigliate modalità e profondità di semina. In caso di semine superficiali ed irregolari la selettività può essere ridotta specialmente se forti piogge sopravvengono dopo il trattamento. Il prodotto può essere fitotossico verso le colture non indicate in questa etichetta.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il podotto è responsabile dei danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

VIETATA LA VENDITA ALLO STATO SFUSO

CONTENUTO Kg. 20

CYANAMID ITALIA S.p.A. - Divisione Fitofarmaci - Roma
Sussidiaria dell'AMERICAN CYANAMID COMPANY, WAYNE, New Jersey (USA)
Officina di produzione: CYANAMID ITALIA S.p.A. - Zona Industriale CATANIA

Codice

Lotto

2354

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

OSSICLORURO DI RAME SOLPLANT

Fungicida in polvere bagnabile a base di Ossicloruro di rame

COMPOSIZIONE

Rame metallico (sotto forma di ossicloruro)	g 50
Disperdenti, diluenti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione:
ICI SOLPLANT S.p.A. - CRESPELLANO (BO)
Confezionato presso:
SICOPA S.n.c. - Pianello Val Tidone (PC)
Registrazione Ministero della Sanità n. 2354 del 13-12-1976

CAMPI DI IMPIEGO
E' indicato per la lotta contro le seguenti malattie crittogamiche:
Peronospora della vite - Peronospora della patata - Malattie crittogamiche varie degli alberi da frutta - Cercospora della bietola - Malattie crittogamiche dell'olivo - Crittogame delle colture ortive e floreali.

DOSI CONSIGLIATE (per 100 litri di acqua)

Ticchiolatura del melo e del pero	g 200- 750
Peronospora della vite	g 4[illegible] - 500
Peronospora della patata	g [illegible]00- 750
Peronospora della bietola	g 400
Peronospora del pomodoro	g 400- 600
Bolla e corineo delle foglie del pesco	g 750-1000
Occhio di pavone dell'olivo	g 300- 500
Antracnosi delle fragole	g 500- 750
Cercospora delle bietole	g 400
Marciume radicale delle piantine di tabacco	g 400- 500
Batteriosi del tabacco	g 250
Alternaria del tabacco e del pomodoro	g 400
Alternaria del garofano	g 250
Septoriosi del garofano e del crisantemo	g 250
Ticchiolatura delle rose	g 200

Le dosi sopra indicate sono orientative e pertanto possono essere aumentate o diminuite a seconda dello stato della coltura da trattare, delle condizioni climatiche e della zona.

Preparazione della miscela
E' consigliabile stemperare prima in un po' di acqua la dose di OSSICLORURO DI RAME SOLPLANT che si deve usare, aggiungendo poi la quantità di acqua voluta e mescolare energicamente.
La miscela rimane attiva anche dopo diversi giorni: è sufficiente rimescolarla per ottenere uniformità di sospensione.

Importante: ricordiamo che OSSICLORURO DI RAME SOLPLANT, al pari di tutti i fungicidi rameici, agisce preventivamente; pertanto sarà bene effettuare i trattamenti tempestivamente, onde far sì che la sospensione rameica ricopra tutte le parti della pianta con uno strato protettivo, evitando in tal modo che le crittogame penetrino nei tessuti vegetali.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'
E' miscibile con tutti i fungicidi e gli insetticidi di uso comune; la miscela con Sevisol 50, Acarkil e Fernide va fatta con precauzione.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg

PARAFOS® G-10%

CLASSE I

VELENO

Insetticida granulare — Estere fosforico per la disinfestazione del terreno da elateridi, melolontini, scarabei, tipulidi, bibionidi.

Composizione

100 g di prodotto contengono:
10,2 g di Parathion (0,0-dietil-0-p-nitrofenil tiofosfato) tecnico al 98,5% di purezza (pari a 10 g. di p. a. puro). Coformulanti specifici ed inerti quanto basta a 100 grammi.

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- — Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- — Conservare la confezione ben chiusa.
- — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- — Evitare di respirarne i vapori.
- — Non operare contro vento.
- — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva).
- — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione o contatto cutaneo.

— SINTOMI DI INTOSSICAZIONE

Scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg. 1-2 per gli adulti e mg. 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (g. 0,50 ogni 3 ore fino a g. 3) o similari. Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

ALCUNE CONTROINDICAZIONI

Morfina - Vitamina B1 - coramina - latte e grassi.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 2355 del 23.10.76 del Ministero della Sanità.

Caratteristiche

Il PARAFOS G-10% è un insetticida granulare per la disinfestazione del terreno da elateridi, melolontini, scarabei, tipulidi, bibionidi.

Modalità d'impiego

Il PARAFOS G-10% si distribuisce su tutta la superficie da disinfestare o viene localizzato lungo le file delle colture nelle seguenti dosi:

- — contro elateridi, melolontini, scarabei, tipulidi, bibionidi, grillotalpe: kg. 20-40/ha in superficie prima della semina o del trapianto, interrando poi a 10-15 cm. di profondità;
- — contro ditteri terricoli (mosca della cipolla, del cavolo, delle radici) kg. 20-25/ha nel solco al momento della semina o del trapianto;
- — contro agrotidi ed altri lepidotteri del terreno kg. 30-40/ha interrando leggermente a pochi centimetri di profondità;
- — contro miriapodi kg. 40-50/ha prima della semina o del trapianto, interrando il prodotto leggermente a 10-15 cm.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

Per la sua conformazione il PARAFOS G-10% non deve essere distribuito assieme ad altri prodotti granulari o simili.

Rischi per la fauna utile

Il PARAFOS G-10% è tossico per le api e per gli animali pronubi, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 10

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

2356

CLASSE I

VELENO

METIAMON®

Concentrato emulsionabile	**Il METIAMON agisce per contatto, per ingestione e per asfissia contro i più dannosi insetti in frutticoltura, colture industriali e piante ornamentali.**
Composizione	100 g. di prodotto contengono: 20 g. di Metil-parathion (0,0-dimetil-0-p-nitrofenil-tiofosfato) tecnico al-l'80% di purezza (pari a 16 g. di p. a. puro). Emulsionanti e solventi quanto basta a 100 grammi. **ATTENZIONE:** data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.
Natura del rischio	Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.
Norme precauzionali	— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Evitare di respirarne i vapori. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva). — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Informazioni per il medico	**Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione o contatto cutaneo.** — SINTOMI DI INTOSSICAZIONE Scialorrèa - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare. CONSIGLI TERAPEUTICI Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg. 1-2 per gli adulti e mg. 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (g. 0,50 ogni 3 ore fino a g. 3) o similari. Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico. ALCUNE CONTROINDICAZIONI Morfina - Vitamina B1 - coramina - latte e grassi.
Titolare della registrazione	DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Pieve 2
Officina di produzione	DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12
	Registrazione N. 2356 del 23.10.76 del Ministero della Sanità.
Caratteristiche	Il METIAMON ha un'efficacia citotropica, uccide cioè i parassiti penetrati nei tessuti vegetali (verme delle mele, delle pere, delle susine, minatrici, mosca dell'olivo, del garofano, bega verde); uccide inoltre le uova di diversi insetti (Carpocapsa, Afidi, Psillidi). Il METIAMON può essere impiegato anche sulle varietà di melo sensibili al parathion (Rosa di Caldaro, Carla, Rosa Mantovana).
Modalità d'impiego	Dosi per 100 litri d'acqua: Contro tignole dell'uva: cc 80; afidi in genere, Afide rosa del melo e farinoso del pesco, Psillidi, Tignola dell'uva, Carpocapsa, Capua ed altri Lepidotteri, Tentredini, Coleotteri, Tripidi, Afide verde del melo, Afide lanigero, larve di S. José; Fleotripide, Tignola e Rinchite dell'olivo, Cydia molesta, Minatrici, Coccinglie: cc. 200; Mosca e Bega del garofani, Mosca dell'olivo e della frutta, Coccniglie degli agrumi: cc 250-300.
Preparazione della poltiglia	Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata. DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
Compatibilità	Il METIAMON è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese). **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi per la fauna utile	Il METIAMON è tossico per le api e per gli animali pronubi, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame. Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto. Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. DA NON VENDERSI SFUSO. Contenuto 10 - 1 lt

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

2438

CLASSE I

VELENO

Insetticida emulsionabile — **Olio bianco attivato al parathion per trattamenti alle piante da frutto, agrumi, alberi ed arbusti ornamentali.**

Composizione

100 g di prodotto contengono:
85 g di olio minerale bianco al 95% di insolfonabile.
3,56 g di Parathion (0,0-dietil 0-p-nitrofenil tiofosfato) tecnico al 98,5% di purezza, corrispondente a 3,5 g di p.a. puro.
Tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi. (contiene xilolo).

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico

Avvelenamento per ingestione, inalazione o contatto cutaneo.

— SINTOMI DI INTOSSICAZIONE

Scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg. 1-2 per gli adulti e mg. 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (g 0,50 ogni 3 ore fino a g 3) o similari. Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

ALCUNE CONTROINDICAZIONI

Morfina - Vitamina B1 - coramina - latte e grassi.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N.2438 del 14.2.77 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto lt. 20

Caratteristiche

L'OLPAR 90 è un prodotto emulsionabile preparato con olio bianco ad alto grado di raffinazione e con parathion. L'OLPAR 90, per le sue specifiche caratteristiche, ha un'azione spiccatamente anticoccidica, larvicida ed ovicida.

Modalità d'impiego

Dosi per 100 litri d'acqua:

Fruttiferi: contro uova di Afidi, di Psillidi, cocciniglie in genere, Diaspini, forme svernanti di Lepidotteri: litri 1,5.

Epoca del trattamento: dallo stadio delle gemme gonfie allo stadio delle punte verdi. Tener presente che i peschi e le varietà di melo sensibili al parathion (Rosa di Caldaro, Carla, Rosa Mantovana) non si devono trattare oltre lo stadio delle gemme gonfie.

Agrumi, alberi ed arbusti ornamentali: contro Cocciniglia biancorossa, Saissetia e Cocciniglie in genere, Cocciniglia virgola, Cocciniglia cotonosa ed Iceria: lt. 1,5.

Epoca del trattamento: tutto l'anno fino a 30 giorni dalla raccolta dei frutti. Non usare l'OLPAR 90 su piante in fioritura.

Preparazione della poltiglia

Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

L'OLPAR 90 è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina, polisolfuri, poltiglia bordolese). La miscela con certi prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile.

E' assolutamente sconsigliabile la miscelazione con prodotti contenenti calce, zolfo, Karathane, captan. Non usare i prodotti suddetti 2-3 settimane prima e dopo il trattamento con olio bianco.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi per la fauna utile

L'OLPAR 90 è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

2443

DIANTIN

CLASSE III
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Concentrato emulsionabile — **Fungicida specifico per combattere la ruggine del garofano. L'impiego è limitato alle colture di garofani in impianti stabili, non soggetti a rotazione con colture edibili.**

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

11,2 g di ossicarbossina (2,3-diidro-6-metil-5-fenil-carbamoil-1,4-oxatiin-4,4-diossido) tecnica al 96% di purezza, (pari a 10,7 g di p. a. puro).

Emulgatori, cosolventi e solventi quanto basta a 100 grammi.
(contiene xilolo)

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE

Disturbi gastro-intestinali dopo ingestione; temporanea irritazione agli occhi dopo contatto.

CONSIGLI TERAPEUTICI

A seguito di ingestione lavaggio gastrico e, se il soggetto è cosciente, provocare il vomito. A seguito di contatto agli occhi sciacquare abbondantemente con acqua corrente.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N.2443 del 31.1.77 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Lt. 1

Caratteristiche

Il DIANTIN è un fungicida sistemico efficace contro la ruggine del garofano (Uromyces caryophyllinus).
Grazie alla sua sistemicità il DIANTIN penetra nella circolazione linfatica della pianta, proteggendola dagli attacchi della crittogama (azione preventiva). Inoltre il DIANTIN riesce a bloccare le infezioni già in corso; infatti le pustole già formatesi sulle foglie e sullo stelo si riducono di dimensione, fin quasi a scomparire completamente.
Il DIANTIN non macchia i fiori, le foglie e lo stelo delle piante trattate, neppure di quelle a colori più delicati, quali i garofani rossi delle varietà americane e mediterranee.

Modalità d'impiego

Dose per 100 litri d'acqua: 200 cc. Seguire i seguenti intervalli fra i singoli trattamenti:

— **trattamenti curativi in caso di forte infezione già in atto: ogni 5 giorni.**
— **trattamenti curativi in caso di lievi attacchi già in atto: ogni 7 giorni.**
— **trattamenti preventivi in assenza di malattia: ogni 9-10 giorni.**

In caso di forte infezione, dopo 3-4 trattamenti effettuati a scadenza di 5 giorni, la malattia sarà già bloccata, per cui si potrà passare al calendario settimanale ed infine si procederà sulla nuova vegetazione esente da pustole, con trattamenti ad intervalli di 9-10 giorni.
Per le cultivar di garofano molto sensibili alle ruggini come il Sim rosso, sono consigliabili 300 cc di prodotto per 100 litri d'acqua, effettuando i trattamenti, nella lotta preventiva, ogni 7 giorni.

Preparazione della poltiglia

Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria ed agitare energicamente prima dell'uso per favorire la dispersione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

Si consiglia di impiegare il DIANTIN da solo. Per eventuali miscele con altri prodotti antiparassitari è opportuno effettuare prove preliminari di miscibilità.
Il DIANTIN è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina. La miscela con prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile. AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente su colture floricole - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

2444

DIANTIN® 20 E

CLASSE III
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Liquido emulsionabile — Fungicida specifico per combattere la ruggine del garofano. L'impiego è limitato alle colture di fiori e piante ornamentali, in impianti stabili, non soggetti a rotazione con colture edibili.

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

20,8 g di ossicarbossina (2,3-diidro-6-metil-5-fenil-carbamoil-1,4-oxatiin-4,4-diossido) tecnica al 96% di purezza, (pari a 20,0 g di p. a. puro).

Emulgatori, cosolventi e solventi quanto basta a 100 grammi. (contiene xilolo)

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE

Disturbi gastro-intestinali dopo ingestione; temporanea irritazione agli occhi dopo contatto.

CONSIGLI TERAPEUTICI

A seguito di ingestione lavaggio gastrico e, se il soggetto è cosciente, provocare il vomito. A seguito di contatto agli occhi sciacquare abbondantemente con acqua corrente.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 2444 del 31.1.77 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Lt. 1

Caratteristiche

Il DIANTIN 20 E è un fungicida sistemico efficace contro la ruggine del garofano e di altri fiori e piante ornamentali. Grazie alla sua sistemicità il DIANTIN 20 E penetra nella circolazione linfatica della pianta, proteggendola dagli attacchi della crittogama (azione preventiva). Inoltre il DIANTIN 20 E riesce a bloccare le infezioni già in corso; infatti le pustole già formatesi sulle foglie e sullo stelo si riducono di dimensione, fin quasi a scomparire completamente.
Il DIANTIN 20 E non macchia i fiori, le foglie e lo stelo delle piante trattate, neppure di quelle a colori più delicati, quali i garofani rossi delle varietà americane e mediterranee.

Modalità d'impiego

Garofano: contro la ruggine (Uromyces caryphyllinus).
Dose per 100 litri d'acqua: cc 125-150.
Seguire i seguenti intervalli fra i singoli trattamenti:
— trattamenti curativi in caso di forte infezione già in atto: ogni 5 giorni.
— trattamenti curativi in caso di lievi attacchi già in atto: ogni 7 giorni.
— trattamenti preventivi in assenza di malattia: ogni 9-10 giorni.
In caso di forte infezione, dopo 3-4 trattamenti effettuati a scadenza di 5 giorni, la malattia sarà già bloccata, per cui si potrà passare al calendario settimanale ed infine si procederà sulla nuova vegetazione esente da pustole, con trattamenti ad intervalli di 9-10 giorni.
Per le cultivar di garofano molto sensibili alle ruggini come il Sim Rosso, sono consigliabili 150 cc di prodotto per 100 litri d'acqua, effettuando i trattamenti, nella lotta preventiva, ogni 7 giorni.
Rosa, crisantemo, geranio, bocca di leone ed altri fiori: Contro le ruggini. Dose per 100 litri d'acqua: cc 125-150. Iniziare i trattamenti alla comparsa delle prime pustole e ripeterli ad intervalli di 10-12 giorni per 3-4 volte fino alla scomparsa della malattia.
Piante ornamentali (Mahonia, Berberis, bosso). Contro le ruggini. Dose d'impiego per 100 litri d'acqua: cc 125-150. Trattare alla comparsa delle pustole ogni 10-12 giorni fino alla definitiva scomparsa della malattia.

Preparazione della poltiglia

Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria ed agitare energicamente prima dell'uso per favorire la dispersione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

Il DIANTIN 20 E è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina. La miscela con prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente su colture floricole - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

2445

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

FITOGAMMA INODORO® G 3

INSETTICIDA GRANULARE PER LA DISINFESTAZIONE DEL TERRENO DESTINATO ALLA COLTURA DELLE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO ALL'EPOCA DELLA SEMINA

COMPOSIZIONE

Lindano puro	g 2,97
Sostanze inerti	q.b. a g 100

GRUPPO MONTEDISON
FARMOPLANT
Fitofarmaci Montedison

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento: J & A MARGESIN S.p.A. Lana d'Adige (BZ)

Registrazione Ministero della Sanità, n. 2445 del 29-1-1977

® Marchio registrato

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Il FITOGAMMA INODORO G 3 è un insetticida per la disinfestazione del terreno destinato alla coltura delle barbabietole da zucchero, per la lotta contro gli insetti Elateridi, Atomarie, Maggiolini, Tipule e Grillotalpa.

Il prodotto si impiega alla dose di Kg 30-35 per ettaro e va distribuito prima della semina a tutto campo seguito da un'opportuna incorporazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il prodotto si impiega da solo oppure miscelato con i concimi.

Rischi di nocività

È nocivo per gli animali domestici, il bestiame e i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg 1

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione

Vomito diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Consigli terapeutici

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (g 25 di solfato di sodio).
Per la liposolubilità di questo insetticida hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.
Barbiturici (luminal 0,1 - 0,2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.
Controindicazioni: la morfina e l'alcool, e, per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina e l'efedrina.

2454

DIMILIN®

CLASSE IV

Polvere bagnabile — Insetticida per ingestione per la difesa di piante di melo e pero, floricole, forestali ed ornamentali.

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

5 g. di diflubenzuron (N-(4-clorofenil)amino-carbonil-2,6-diflurobenzamide) puro (da p.a. tecnico al 95%).

Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 2454 del 31.1.77 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 5 - 1

® Marchio e prodotto della Philips-Duphar B.V. - Amsterdam (Olanda)

Caratteristiche

Il DIMILIN appartiene ad un gruppo di insetticidi di sintesi che inibiscono la deposizione della chitina negli insetti, con conseguente morte in fase di muta.
Il DIMILIN è efficace sulle colture agrarie, contro i microlepidotteri minatori ed i lepidotteri ricamatori del melo, la Carpocapsa, l'Orgya e la Psilla del pero.
In foresta combatte: Thaumetopea pityocampa (Processionaria del pino), Lymantria dispar, Rhyacionia buoliana e Pristiphora abietina.

Modalità d'impiego

Dosi per 100 litri d'acqua:
Frutticoltura (meli e peri) contro i microlepidotteri minatori (Lithocolletis, Cemiostoma) gr. 200-300. Effettuare il trattamento durante la fase di volo degli adulti, in corrispondenza della ovideposizione.
Contro i lepidotteri ricamatori (Capua, Archips), Carpocapsa, Orgya: gr. 400. Trattare durante la deposizione delle uova o in prossimità della loro schiusura.
Contro la Psilla del pero: gr. 400. Effettuare il trattamento alla schiusura delle uova.
Piante forestali: contro Thaumetopoea pityocampa, Lymantria dispar, Rhyacionia buoliana, Pristiphora abietina: gr. 250-350.
Su tutte le colture effettuare il trattamento, in linea di massima durante la ovideposizione o quando le uova stanno per schiudere.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Il DIMILIN è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

2455

Classe III

ATTENZIONE manipolare con prudenza

Polvere bagnabile fungicida

COMPOSIZIONE

Maneb puro g 80

Bagnanti, disperdenti e supporti inerti q. b. a g 100

Principali usi

Contro Peronospora del tabacco, Marssonina brunnea o bronzatura del pioppo, Peronospora della vite, Peronospora e Alternaria del pomodoro (solo fino alla prima fioritura).

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento di **Massa (MS)**

Registrazione Ministero della Sanità N. 2455 del 29-1-1977

® Marchio registrato

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

TABACCO - **Peronospora** - In semenzaio: g 65 con 2 trattamenti settimanali ad iniziare dalla 2ª o 3ª foglia (stadio della crocetta) con l'aggiunta di g 30-50 di Fitofil, usando in media un litro di liquido per 4-6 mq.
In pieno campo: g 150-200 oppure 2-3 Kg/ha in trattamenti bisettimanali, al primo verificarsi delle condizioni climatiche adatte allo sviluppo del fungo (temperatura non inferiore al 10 °C e non superiore al 20 °C, accompagnata da nebbie o piogge leggere), distribuendo da 5 a 10 ettolitri di sospensione per ettaro a seconda dello sviluppo delle piante.

PIOPPO - **Bronzatura** (Marssonina brunnea) - g 400-500, con 2-4 trattamenti da aprile a maggio; Kg 4-5, diluiti in 50 litri di acqua per ettaro, in trattamenti a basso volume.

POMODORO - (solo fino alla prima fioritura).
Peronospora, Septoriosi, Alternariosi, Antracnosi e Cladosporiosi: g 150-300, in trattamenti preventivi e ripetuti, ogni 7-10 giorni, distribuendo 800-1000 litri di sospensione acquosa per ettaro.

VITE - **Peronospora** - g 150-350, in trattamenti preventivi da effettuarsi ogni volta che le condizioni di temperatura e umidità rendano possibile un'infezione.

POMACEE - **Ticchiolatura:** g 200 prima della fioritura e g 150 dopo la fioritura, in trattamenti preventivi.

GAROFANO - **Ruggine:** g 250-350.

Preparazione della sospensione

Versare il prodotto in poca acqua stemperando accuratamente, aggiungere poi alla rimanente acqua sempre agitando

DIVIETI D'IMPIEGO

— DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
— DA NON IMPIEGARE IN SERRA
— DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità

Il NESPOR PB 80 è miscibile con gli anticrittogamici e gli insetticidi di uso comune.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Non impiegare il NESPOR PB 80 sulle varietà di pero Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto: g

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare il luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni

Alcool, olii, grassi.

Avvertenza

Consultare un Centro Antiveleni.

2486

Quinolate® Amonn

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile **Disinfettante delle sementi di frumento, orzo ed avena.**

Composizione 100 g di prodotto contengono:
50 g di carboxin (diidro-5,6-metil-2-carboxanilido-3-oxatiina, 1,4) tecnica al 97% di purezza, corrispondente a 48,5 g di p.a. puro;
15 g di ossichinolato di rame tecnico al 97% di purezza, corrispondente a 14,6 g di p.a. puro.
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Durante la manipolazione del prodotto si dovranno usare occhiali protettivi.

Informazioni per il medico **In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 2486 del 19.3.77 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto 1 kg.

® Marchio registrato da La Quinoleine - Paris (Francia)

Caratteristiche Il QUINOLATE AMONN grazie all'azione della carbossina e dell'ossichinolato di rame in esso contenuti, permette di combattere le principali malattie fungine dei cereali, quale il carbone volante, le carie, le fusoriosi e le septoriosi del grano; il carbone volante, il carbone coperto e l'elmintosporiosi dell'orzo e dell'avena.

Modalità d'impiego: Dose d'impiego: 200 g per quintale di semente.
La concia delle sementi può essere effettuata sia con la polvere a secco, avendo cura di rimescolare bene la massa di sementi da disinfettare, sia irrorando la stessa con un trattamento liquido.

Crittogame combattute:

Frumento: Carbone volante (Ustilago tritici), carie (Tilletia caries), septoriosi (Septoria tritici e Septoria nodorum), fusariosi (Fusarium nivale e Fusarium roseum).

Orzo: carbone volante (Ustilago nuda), carbone coperto (Ustilago hordei), elmintosporiosi (Helminthosporium gramineum).

Avena: carbone volante (Ustilago avenae), carbone coperto (Ustilago levis), elmintosporiosi (Helminthosporium avenae).

Compatibilità Il QUINOLATE AMONN è miscibile con i più comuni insetticidi impiegati per la disinfestazione delle sementi.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività Il prodotto è tossico per i pesci.

I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana né del bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DU PONT
DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

2499

CLASSE I

VELENO

Granuli — Insetticida, nematocida ed acaricida sistemico granulare. Prodotto da impiegare al momento della semina di barbabietole da zucchero e solo con seminatrice meccanica.

Composizione — 100 g di prodotto contengono:
5 g di Aldicarb [2-metil-2-(metil tio) propinaldeide o -(metil carbamoil) oxine] tecnico all'87% di purezza, (corrispondente a 4,35 g di p.a. puro).
95 g di coadiuvanti ed inerti.
ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio — Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico — Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO:
Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini. Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12
Registrazione n. 2499 del 13.4.77 del Ministero della Sanità.

Caratteristiche — L'ALDICARB AMONN è un fitofarmaco sistemico, in forma granulare, per applicazione al terreno. Il prodotto viene assorbito dalle radici della bietola e si trasloca in ogni organo della pianta stessa, proteggendola dagli attacchi di insetti, acari e nematodi.
L'ALDICARB AMONN agisce contro molti parassiti: Afidi, Tripidi, Cicadelle, Minatrici, Mosche, Acari, Nematodi del tipo: Meloidogyne spp., Pratylenchus spp., Rotylenchus spp., Radopholus spp., Xiphinema spp., Criconemoides spp., Heterodera spp.

Modalità d'impiego — Barbabietola da zucchero contro
- insetti in genere 60-100 Kg/ha
- nematodi in genere 100-150 Kg/ha

Il prodotto deve essere interrato mediante seminatrice meccanica.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità — Per la sua formulazione e lo specifico campo d'impiego l'ALDICARB AMONN deve essere usato da solo.

Rischi per la fauna utile — L'ALDICARB AMONN è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per l'uso consentito - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 25

2517

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA — Del gruppo Imperial Chemical Industries PLC — ICI

'FOSFERNO'

Insetticida liquido emulsionabile a base di Parathion. Combatte: afidi, carpocapsa, cydia, psilla, cocciniglie.

COMPOSIZIONE

Parathion puro	g 19,4
Emulsionanti e disperdenti (Contiene Xilolo)	q.b. a g 100

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255

CLASSE I

VELENO

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione: ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 2517 del 16-6-1977
'FOSFERNO' - Marchio registrato Imperial Chemical Industries PLC

'FOSFERNO' si usa in frutticoltura, viticoltura, floricoltura, agrumicoltura. Agisce per contatto, ingestione ed asfissia.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite a 100 l di acqua)
Frutticoltura (melo, pero, pesco, ciliegio): ml 120-150 contro: Carpocapsa, Mosca delle ciliegie, Cocciniglie, Larve minatrici delle foglie, Afidi, Tingidi, Psilla, Cecidomia, Perrisia del pero; ml 170-200 contro Tignole del pesco.
Viticoltura: ml 120-150 contro: Tignole dell'uva, Pseudococco, Sigaraio della vite.
Floricoltura di pieno campo: ml 120-150 contro: Tripidi, Tentredini, Afidi.
Orticoltura (brassicacee, solanacee, cucurbitacee): ml 120-150 contro: Cavolaia, Punteruolo del cavolo; ml 200-250 contro Agrotidi.
Agrumicoltura: ml 200-250 contro: Cocciniglie, Tripidi.
Olivicoltura: ml 120-150 contro: Fleotripide, Tignola, Fleotribo, ml 170-200 contro: Cotonello.
Pioppicoltura: ml 600 contro: Saperda e gli altri insetti parassiti del pioppo.
La poltiglia si prepara versando direttamente la stabilita dose di 'FOSFERNO' nella totale quantità di acqua, ed agitando bene per qualche secondo.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILIÀ
È compatibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi. Non è compatibile con la poltiglia bordolese, il polisolfuro di calcio e il Delan. La miscela con polisolfuro di bario va fatta con precauzione. La miscela con 'Fernide' e con 'Folpet' va fatta aggiungendo anche il bagnante 'Agral'.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
È tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

It 1

2521

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione; per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In locali chiusi, data la sua volatilità, è consigliabile indossare una maschera antipolvere che, in caso di scarsa ventilazione e prolungato trattamento, va sostituita con una per carbammati (o esteri fosforici) indossando indumenti protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA Del gruppo Imperial Chemical Industries PLC

ICI

'ACTELLIC' 25

Insetticida-acaricida fosforganico in emulsione concentrata, ad ampio spettro di azione, rapida efficacia, limitata persistenza sulle piante viventi e lunga persistenza su superfici inerti. Agisce per contatto, asfissia e per effetto translaminare.

COMPOSIZIONE

Pirimifos-metil puro	g 25
Diluenti, coadiuvanti, occipienti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione:
ICI SOLPLANT S.p.A. - CRESPELLANO (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n° 2521 del 13-4-1977
'ACTELLIC' - Marchio registrato - **Imperial Chemical Industries PLC**

CAMPI DI APPLICAZIONE
MAGAZZINI: contro Calandra, Silvano, Cappuccino, Tignola, Acarus siro.
Trattamento preventivo dei magazzini vuoti, alle pareti ed al pavimento:
Preparare una soluzione di Actellic 25 al 2-5% (2-5 kg di prodotto in 100 l di acqua) ed impiegarla nella misura di 100 g ogni mq. di superficie.
Avvertenze: 1. Pulire bene le superfici prima di irrorarle.
2. Bagnare bene le superfici
3. Impiegare la dose più alta quando è presente una forte infestazione o quando le superfici sono alcaline.
Trattamento diretto ai cereali: la dose per 1 q.le di cereali è 1,6-3,2 cc di Actellic 25 diluiti in una quantità media di 100 cc di acqua. Il prodotto va applicato con idoneo apparecchio distributore all'atto dell'immagazzinamento, su cereali già sottoposti alla consueta pulitura. Prima di introdurre i cereali è sempre consigliabile procedere ad una pulizia a fondo degli ambienti, seguita da un trattamento preventivo come consigliato sopra.
Prima della molitura, i cereali destinati all'alimentazione umana e del bestiame devono essere sottoposti ad idonea pulitura.
Trattamento diretto a sacchi di cereali: preparare una soluzione di Actellic 25 al 2-5% (2-5 kg di prodotto in 100 l di acqua) ed impiegarla nella misura di 50 g ogni mq. di superficie.
FRUTTICOLTURA (melo, pero, susino), **VITICOLTURA, AGRUMICOLTURA** (arancio, limone), **COLTURE INDUSTRIALI** (barbabietola da zucchero, mais, riso), **COLTURE ORTIVE** (cavolini di Bruxelles, cavoli, cavolfiori, cetrioli, fragole, sedano, spinaci, lattuga, cocomero, peperone, pomodoro, fagiolo, fagiolino, carota, cipolla, patata, pisello), **COLTURE FLOREALI** (solo in pieno campo): 300-400 g ogni 100 l di acqua, contro: afidi, tripidi, antonomo, carpocapsa, cydia, anarsia, minatori delle foglie, cocciniglie, tortricidi, insetti terricoli, tignola e tignoletta, mosca della frutta, della bietola, delle colture ortive, limantria, dorifora, meligete, cavolaia, acari gialli delle serre e acari fitofagi in genere.
Avvertenze: 1. Bagnare bene le piante
2. Non applicare durante la fioritura.
Non impiegare in olivicoltura.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'
È miscibile con la maggior parte dei fungicidi ed insetticidi di uso comune. Non è compatibile con prodotti aventi reazione spiccatamente acida od alcalina.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può causare lieve rugginosità su mele e pere, a seguito di ripetuti trattamenti.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci. È nocivo per il bestiame.
Per tutte le colture sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO **g 100**

2550

MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI

Il *TERFOS 20* si usa a dosi varianti da 100 a 200 gr per ettolitro di acqua contro: Carpocapsa, Cydia molesta, Larve minatrici, Antonomo, Tendredine. su melo, pero pesco, ciliegio, susino.

DA NON APPLICARSI CON MEZZI AEREI

Compatibilità:

Il *TERFOS 20* è miscibile con tutti gli antiparassitari in commercio esclusi quelli a reazione alcalina.

Avvertenza:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali scritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Rischi di nocività:

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DELla raccolta. In miscela con olii minerali, tale periodo è di 30 giorni.

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali »

Insetticida liquido emulsionabile a base di parathion per trattamenti contro i parassiti dei frutteti

COMPOSIZIONE:
gr 100 di prodotto contengono:

Parathion puro gr. 19,7
emulsionanti – tensioattivi
solventi q. b. a gr. 100

(CONTIENE XILOLO)

CLASSE Iª

VELENO

CLASSE I

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Caratteristiche: Il TERFOS 20 si usa contro: carpocapsa, cydia molesta, larve minatrici, antonomo, tendredine.
E' un liquido emulsionabile in acqua.

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a - Telef. 90.62.07
44042 — C E N T O (Ferrara)

Stabilimento di produzione:
ICI SOLPLANT S.p.A. - CRESPELLANO (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2550 del 13 aprile 1977
DA NON VENDERSI SFUSO **PESO KG**

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili, dopo l'uso e con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionali al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina, finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA:
Consultare un centro antiveleni.

2564

Insetticida granulare destinato alla disinfestazione insetticida del terreno destinato alla coltura di barbabietola da zucchero all'epoca della semina.
Il prodotto si impiega per la lotta contro elateridi, maggiolini, tipule.

COMPOSIZIONE		
— Lindano puro	g	2,97
— Inerti : quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM - Milano

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 2564 del 16/6/1977 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:

Vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questo insetticida hanno controindicazione assoluta: il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.
Barbiturici (Luminal 0,1-0,2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia.
Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni: la morfina, l'alcool e per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla dose di 30-35 Kg./ettaro e va distribuito a tutto campo, prima della semina, seguito da opportuna incorporazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo.

Rischi di nocività: il prodotto, è nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

2583

Carbopan

Diserbante liquido selettivo per agrumi

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Propanil puro	g 22,5
Carbaryl puro (Beta-naftolo assente)	g 4,72
Coformulanti	q.b. a g 100

Contiene xilolo e cicloesanone

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterosi).
Sintomi di intossicazione: *nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.*
Consigli terapeutici di massima e condizionali al caso: *lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.*
Controindicazioni: *le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.*

AVVERTENZE
Consultare un centro antiveleni.

caffaro S.p.A. - Milano

0405

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 2583 del Ministero della Sanità del 2-7-1977

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Il **CARBOPAN** è un erbicida Caffaro ad azione selettiva nei confronti degli agrumi. L'azione erbicida si svolge per contatto disseccando in breve tempo le infestanti presenti (Amaranto, Portulaca, Convolvolo, Cipero, Digitaria, Alopecuro) con una selettività totale nei confronti delle specie di agrumi più coltivate come: Arancio, Mandarino, Limone, Clementino.
Il **CARBOPAN** si può perciò impiegare sia per il diserbo di agrumeti adulti sia per il diserbo di piante giovani e di vivai.

Impiego del CARBOPAN in agrumeti adulti
Quando le erbe infestanti hanno raggiunto un'altezza di 30-40 cm fare un trattamento con **CARBOPAN** alla dose di 20-30 l/ha. Il volume d'acqua necessario varia da 400 a 600 litri secondo lo sviluppo delle infestanti.

Impiego del CARBOPAN in agrumeti giovani e in vivaio
Il trattamento erbicida va effettuato quando le erbe infestanti hanno raggiunto uno sviluppo di 10-20 cm di altezza alla dose di 15-20 l/ha in un volume di acqua di 750 l. Effettuare il trattamento in giornate prive di vento, onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture limitrofe sensibili: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti o altre.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il **CARBOPAN** è miscibile con i più comuni antiparassitari in commercio e miscele degli stessi, purchè non a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il **CARBOPAN** è selettivo per gli agrumi: è fitotossico per tutte le altre colture sia per azione di contatto che per assorbimento radicale.

NOCIVITÀ: il **CARBOPAN** è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 10

2620

CARATTERISTICHE
Il CONTROCARIE è un coformulato fungicida-insetticida che consente la concia delle sementi per la difesa contro la carie e contro gli insetti terricoli che insidiano le plantule nelle prime fasi vegetative.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
g 500 di formulato per q.le di seme.
Mescolare accuratamente le dosi di prodotto alla semente con ausilio di pale o di macchine miscelatrici. L'operazione può essere effettuata anche preventivamente all'atto dell'immagazzinamento o durante le operazioni di selezione delle sementi.

AVVERTENZA
I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana nè del bestiame.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il CONTROCARIE va applicato da solo.

NOCIVITÀ: il CONTROCARIE è nocivo verso gli animali domestici ed il bestiame. È tossico per i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 1

Controcarie

Polvere secca per la concia delle sementi

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Rame metallo (sotto forma di ossicloruro triramico)	g 6
Lindano puro	g 0,495
Coformulanti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto, per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
***Sintomi di intossicazione:** vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.*
***Consigli terapeutici di massima e condizionali al caso:** intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 g di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questo insetticida, hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.*
Barbiturici (luminal 0,1-0,2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.
***Controindicazioni:** la morfina e l'alcool, e per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina e l'efedrina.*

caffaro S.p.A. - Milano

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)
Registrazione n. 2620 del Ministero della Sanità del 7-9-1977

2621

LIQUIFOS 20

Insetticida liquido a base di parathion

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Parathion puro . . . . g 19

Solventi, emulsionanti e additivi . q.b.a g 100

Contiene Xilolo

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n 1255.

CLASSE I

VELENO

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto cutaneo.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione inalazione e contatto cutaneo.

***Sintomi di intossicazione:** lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

***Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:** in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.*
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

***Controindicazioni:** morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.*

***AVVERTENZA:** consultare un centro antiveleni*

CAFFARO S.P.A. - MILANO

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2621 del 2-7-1977

Il LIQUIFOS 20 è un insetticida che agisce per contatto, ingestione ed asfissia.
Si emulsiona facilmente mescolando con acqua.
Per la sua azione penetrante colpisce anche gli insetti nelle foglie accartocciate e dentro i tessuti fogliari.
E' indicato contro: Emitteri (afidi, psillidi, cicaline, tingidi, coccinigile), Lepidotteri (tignole, minatori, bega, tortricidi), Coleotteri (fillofagi, punteruoli, xilofagi), Ditteri (mosca delle olive, delle ciliege e mediterranea, cecidomie), Tripidi ed Imenotteri parassiti delle seguenti colture:
- pomacee, drupacee, vite, olivo, agrumi, barbabietola, frumento, mais, riso, ortaggi (bietola, carota, cavolo, cipolla, cucurbitacee, fava, insalate, melanzana, patata, pomodoro), pioppo, colture ornamentali e floreali in campo.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Da 60 g per 100 l si può salire, ove necessario, anche fino a 140 g per 100 l di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Il **LIQUIFOS 20** è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

COMPATIBILITA': Il **LIQUIFOS 20** è miscibile con tutti gli antiparassitari in commercio, ad esclusione dei polisolfuri di calcio e di bario del Binapacryl.

Avvertenza: In caso di miscela con altri prodotti deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO Kg ˙

2649

DOSI E MODO D'IMPIEGO

L'esca viene distribuita da sola, sul terreno destinato a colture di barbabietole da zucchero prima della semina in ragione di Kg 25-30 per ettaro oppure localizzata a mucchietti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il VERDERIN E si usa da solo.

NOCIVITÀ: Il VERDERIN E è nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 0,200

Verderin E

Insetticida granulare per la lotta contro il grillotalpa nei terreni destinati alle colture di barbabietole da zucchero, all'epoca della semina

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

LINDANO (isomero gamma dell'esaclorocicloesano) puro .	g 0,49
Sostanze granulari	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
***Sintomi di intossicazione:** vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.*
***Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:** intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 g di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questo insetticida hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1-0,2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.*
***Controindicazioni:** controindicata la morfina e l'alcool e per evitare la fibrillazione ventricolare, controindicati l'adrenalina e l'efedrina.*
***AVVERTENZA:** consultare un centro antiveleni.*

caffaro S.p.A. - Milano

CAFFARO

Prodotto su formula originale e sotto il controllo della CAFFARO S.p.A. nello stabilimento DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
Registrazione n. 2649 del Ministero della Sanità del 19-10-1977

2650

I CLASSE

VELENO

Polvere bagnabile	**Fungicida per la lotta contro la Cercospora della barbabietola.**
Composizione	100 g. di prodotto contengono: 20 g di Fentin idrossido tecnico al 90% di purezza, corrispondente a 18 g. di p.a. puro. Coformulanti specifici, bagnanti, disperdenti ed inerti: quanto basta a 100 grammi. ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.
Natura del rischio	Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.
Norme precauzionali	— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Evitare di respirarne i vapori. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. — Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva). — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Informazioni per il medico	— Sintomi di intossicazione: Cefalea occipitale continua o parossistica - ronzii auricolari - iperacusia - vertigini - rachialgia - dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra - ritenzione urinaria - insufficienza respratoria e di circolo - interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie o paralisi) - dermatosi. — Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando — in relazione alla via di contaminazione — abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale - terapia sintomatica.
Caratteristiche	Il DU-TER è un fungicida studiato per la lotta contro la cercospora della barbabietola (cercospora bieticola).
Modalità d'impiego	Contro la Cercospora della barbabietola impiegare Kg. 1,2 - 1,8 di DU-TER per ettaro: la dose massima si utilizza solamente per attacchi gravi. Il DU-TER nella lotta contro la Cercospora della barbabietola si usa generalmente per 2-3 trattamenti alla distanza di non più di 3 settimane, a seconda dell'andamento stagionale. Le dosi unitarie, le concentrazioni ed il numero dei trattamenti vanno pertanto adeguati alla precocità della coltura, alla suscettibilità delle varietà, alla virulenza degli attacchi. I trattamenti devono avere carattere relativamente preventivo e vanno iniziati a cominciare da metà giugno, comunque non prima della comparsa dei sintomi d'infezione della malattia (macchie sulle foglie). Il DU-TER si può distribuire con i normali mezzi meccanici, quali pompa a pressione (a mano, a spalla, a motore), idropneumatiche ed atomizzatori.
Preparazione della poltiglia	Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene. DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
Compatibilità	Il DU-TER non è miscibile con prodotti emulsionabili o emulsionati, né con concimi fogliari. Il DU-TER è miscibile con AFIDAMON. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi per la fauna utile	Il DU-TER è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame. **Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto.** **Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.** Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Titolare della registrazione	DU PONT CONIO SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2
Officina di produzione	DU PONT CONIO SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12 Registrazione Nr. 2650 del 12.1.78 del Ministero della Sanità DA NON VENDERSI SFUSO. Contenuto Kg. 10 - 1 ® Marchio registrato dalla Philips-Duphar N.V. - Amsterdam

DU PONT CONIO SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

2678

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE MICRONIZZATA

COMPOSIZIONE

— Captafol puro	gr. 25
— Folpet puro	gr. 55
— Bagnanti, disperdenti ed inerti	q. b. a gr. 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi. Evitare il contatto diretto con il prodotto puro o diluito ed anche di sollevare polvere nel maneggio del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: Azione irritante sul tratto gastro intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi e aritmia.

Terapia: Lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua) e digitale.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

L'ABOTRIL OP 80 è un fungicida di origine organica che agisce per contatto inibendo la germinazione delle spore. E' dotato principalmente di proprietà preventive nei confronti di varie crittogame parassite delle colture agrarie.

Viticoltura: gr. 150-200/hl contro Peronospora, Rossore parassitario, Antracnosi e Marciume nero; gr. 150-200/hl contro la Muffa grigia intervenendo: alla fine della fioritura, prima della chiusura del grappolo e all'invaiatura. Nelle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima dell'inizio della vendemmia. Gr. 200-250/hl contro l'Escoriosi. Eseguire due trattamenti: il primo tra lo stadio di «gemme cotonose» o «punte verdi» ed il secondo all'emissione delle prime foglioline.

Drupacee (Pesco, Susino, Ciliegio e Albicocco) gr. 300/hl contro Corineo, Bolla, Nerume o Ticchiolatura del pesco, Ruggine, Cancri rameali (Fusicoccum e Cytospora) intervenire alla caduta delle foglie, in pieno inverno e ai bottoni rosa. Nei casi più gravi proseguire la lotta in fioritura e alla caduta dei petali alla dose di gr. 200/hl di ABOTRIL OP 80.

Pomacee (Melo e Pero) gr. 100-150/hl contro la Ticchiolatura; gr. 200-250/hl contro l'Alternariosi del pero (generi Alternaria e Stemphylium) ogni 15 giorni circa a partire dai primi d'aprile a tutto agosto.

Olivicoltura: gr. 200/hl contro l'Occhio di pavone e l'Antracnosi.

Orticoltura: gr. 150-200/hl con interventi preventivi
Pomodoro: Peronospora, Alternaria, Septoria e Ticchiolatura.
Patata: Peronospora e Alternaria.
Cipolla: Peronospora, Alternaria e Muffa grigia o Botrytis.
Cocomero, Melone, Zucca, Zucchino e Cetriolo: Peronospora e Antracnosi.
Sedano: Cercospora e Septoria.
Lattuga: Peronospora.
Fagiolo: Fagiolino e Pisello: Antracnosi.
Melanzana: Muffa grigia o Botrytis.
Fragola: Vaiolatura.

Floricoltura solo in pieno campo: gr. 150-200/hl con interventi preventivi
Rosa: Peronospora e Ticchiolatura.
Crisantemo: Septoria, Muffa grigia o Botrytis.
Gladiolo e Tulipano: Muffa grigia o Botrytis.

Tabacco gr. 150-200/hl contro la Muffa grigia o Botrytis.

"Da non applicare con mezzi aerei"

Compatibilità: Non è miscibile con Poltiglia Bordolese, Polisolfuri ed Olio bianco.

Avvertenza: Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con oli minerali e polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto è fitotossico sulle varietà di pero: Butirra d'Anjou e sul melo è da non usarsi dopo la fioritura perchè può manifestarsi fitotossicità.

Nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta e 40 giorni prima della raccolta nel caso di uva da vino per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".
"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

ENOTRIA S.p.A.

SS 193 Km. 8 Melilli (SR)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione N. 2678 del 17 - 10 - 1977 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg. *

2688

LINDANE G-3

CLASSE III:
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Settore d'impiego: Insetticida granulare per la disinfestazione del terreno destinato alla coltura di barbabietole da zucchero all'epoca della semina.

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 3 di Lindano tecnico (con purezza minima 99% di isomero gamma dell'esaclorocicloesano).
Sostanze inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- — Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- — Conservare la confezione ben chiusa.
- — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- — Non operare contro vento.
- — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico: Avvelenamento acuto, per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE

Vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO.

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 g. di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questo insetticida, hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.
Barbiturici (luminal 0,1 - 0,2 g.) contro i tremori e le contrazioni muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

CONTROINDICAZIONI

Controindicata la morfina e per evitare la fibrillazione ventricolare, controindicati l'adrenalina, l'efedrina e l'alcool.

Titolare della registrazione: DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione: DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 2688 del 4.10.78 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 1 - 10

Caratteristiche: Il Lindane G-3 è un insetticida per la disinfestazione del terreno destinato alla coltura di barbabietole da zucchero per la lotta contro gli insetti: atomarie, elateridi, maggiolini, tipule, grillotalpa.

Dosi e modalità d'impiego: Il prodotto si impiega alla dose di Kg. 30-35 per ettaro e va distribuito prima della semina a tutto campo seguito da una opportuna incorporazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: Il Lindane G-3 si impiega da solo oppure miscelato con concimi.

Rischi di nocività: E' nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

2692

GIAVONEX G

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Erbicida granulare: diserbante selettivo per il controllo del giavone nelle risaie.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
7,2 g di Molinate p.a. puro.
Inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA:
- **In caso di ingestione provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.**
- **Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.**
Controindicati: alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

Caratteristiche
Il GIAVONEX G è un erbicida granulare specifico per il controllo del giavone del riso. Si può impiegare sia in pre-semina o in pre-trapianto, che in post-emergenza del riso.

Modalità d'impiego
Dosi d'impiego: Kg. 50-65 per ettaro.
Effettuare il trattamento possibilmente in pre-semina o in pre-trapianto a partire da due settimane fino al giorno stesso della semina o del trapianto.
La dose minima indicata si riferisce ai terreni leggeri, quella massima ai terreni pesanti.
Data l'estrema volatilità del GIAVONEX G è necessario che esso venga subito interrato o coperto con un leggero strato d'acqua.
Qualora non sia stato possibile effettuare il diserbo in pre-semina, si può intervenire in post-emergenza, a partire da quando il riso ha differenziato la 3ª-4ª foglia, fino all'accestimento, impiegando Kg. 50 di prodotto per ettaro.
A seguito del trattamento in post-emergenza si può notare un leggero arresto nello sviluppo del riso, che però scompare dopo poco tempo.

Tecnica d'impiego
Distribuire il GIAVONEX G da solo misto a sabbia, in modo uniforme su tutta la superficie da diserbare.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
Per la sua particolare formulazione il GIAVONEX G deve essere impiegato da solo.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12
Registrazione n. 2692 del 23.11.1977 del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO.
Contenuto Kg. 25

980

DU PONT
DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

2693

GANON "S"

DISERBANTE SELETTIVO

per la lotta contro le erbe infestanti della barbabietola da zucchero e dello spinacio

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Ganon "S" contengono:
g 80 di benzthiazuron puro;
bagnanti, sospensivanti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche: diserbante selettivo per barbabietola da zucchero e per spinacio per la lotta contro le erbe infestanti e in modo particolare: Mercurialis annua, Anagallis arvensis, Diplotaxis erucoides, Capsella bursa-pastoris, Spergula arvensis, Poa annua, Stachis sp., Rapistrum rugosum, Sinapis alba.

ISTRUZIONI PER L'USO

Trattamenti alla semina - spinacio: 4-6 kg/ha diluiti in 500-800 litri d'acqua a seconda del tipo di pompa. Se si desidera trattare solo le file, le dosi dovranno essere proporzionalmente ridotte. Impiegare la dose maggiore nei terreni di medio impasto e pesanti.
Trattamenti in pre-semina - barbabietola da zucchero a semina primaverile: 6-7 kg/ha in terreni di medio impasto, 8-9 kg in terreni pesanti, diluiti in 500-800 litri d'acqua a seconda del tipo di pompa. **Eseguire il trattamento in autunno in terreni definitivamente preparati per la semina primaverile.**
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

AVVERTENZE

Non impiegare meno di 500 litri di soluzione per ettaro. Eseguire il trattamento preferibilmente in giornate senza vento avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare.
Prima di procedere all'impianto di una nuova coltura eseguire una profonda aratura.
A lavoro ultimato lavare accuratamente la pompa ed i recipienti usati per la preparazione della soluzione.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il Ganon "S" si impiega senza l'aggiunta di altri prodotti.
Fitotossicità: non impiegare in terreni leggeri (ghiaiosi, sabbiosi). Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: I.R.C.A. - Albano S. Alessandro (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. 2693 del 23-11-1977

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

1 Kg

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

2701

TCA BAYER

95% di Tricloroacetato di sodio puro (TCA)

DISERBANTE SPECIFICO
contro graminacee e piante acquatiche

CLASSE IV

COMPOSIZIONE

g 100 di TCA Bayer contengono:
g 95 di TCA puro;
eccipienti quanto basta a 100.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Durante la manipolazione e l'impiego del prodotto si dovranno indossare abiti ed occhiali protettivi ed eventualmente respiratori (o semi maschere). Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Canali: 200-300 kg/ha, diluiti in 2000-3000 litri d'acqua, contro canna palustre (Phragmites communis), intervenendo in autunno quando la canna emette le pannocchie e dopo aver portato l'acqua a basso livello; contro giunchi e carici intervenire su terreno umido, ma non coperto d'acqua.
Strade, canali di scolo, fossi, aeroporti, campi da gioco, aree industriali: 200 kg/ha diluiti in 800-1000 litri d'acqua.

Bietola: 7-10 kg/ha, diluiti in 400-800 litri d'acqua, intervenendo in presemina o pre-emergenza.

Medica: 7-10 kg/ha, diluiti in 400-800 litri d'acqua, intervenendo in autunno-inverno su medicai di vecchio impianto.

N.B. - Il diserbo con TCA Bayer può essere effettuato anche a dosi superiori e precisamente a 30 kg/ha in terreni leggeri e 50 kg/ha in terreni pesanti, diluiti in 800-1000 litri d'acqua, purchè si lascino trascorrere 6 settimane prima della semina di patate, medica e bietola e 8 settimane prima della semina di fave e piselli.

Vigneti e frutteti: 30-50 kg/ha diluiti in 800-1000 litri d'acqua, mantenendo il getto ad una distanza di 2-3 m dalle piante.

Avvertenze: affinchè l'intervento sulle graminacee e sulle piante rizomatose sia efficace, è consigliabile:

a) arare preventivamente il terreno, onde portare i rizomi alla superficie o almeno a pochi cm di profondità;
b) intervenire in autunno su terreno umido possibilmente dopo una pioggia o un'irrigazione eseguendo 2 trattamenti alla dose di 20-30 kg/ha (I trattamento) e di 15-25 kg/ha (II trattamento), diluiti in 800-1000 litri d'acqua, con un intervallo di 4-6 settimane l'uno dall'altro.

N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: Il TCA Bayer è miscibile con diserbanti specifici contro le dicotiledoni (infestanti a foglia larga).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: DIACHEM - Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione Ministero Sanità n. 2701 del 23-11-1977

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

2707

RÈBEL® BLU

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

POLVERE BAGNABILE: Fungicida cupro-organico per la lotta contro le principali malattie crittogamiche della vite, delle pomacee, del pomodoro e garofano.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb p. a. puro gr. 30.
Rame metallo (sottoforma di ossicloruro di rame) gr. 20.
Bagnanti, disperdenti, coloranti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
— Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. — Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore. — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. — Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
— SINTOMI DI INTOSSICAZIONE
L'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
— TERAPIA
In caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicazioni alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO
Dosi per 100 litri d'acqua:
Pomacee: contro la ticchiolatura del melo e del pero, nei trattamenti pre-florali gr. 300.
Vite: contro la peronospora, prima della fioritura gr. 250-350; dopo la fioritura gr. 250-350. In caso di forti infezioni impiegare la dose massima consigliata ed abbreviare l'intervallo dei trattamenti.
Pomodoro: solo fino alla prima fioritura: contro peronospora, septoriosi ed alternariosi gr. 300-400.
Garofano: in pieno campo contro la ruggine gr. 300-400.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
NON IMPIEGARE IN SERRA.
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

COMPATIBILITÀ
Il REBEL® BLU è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura.
Sulle varietà di melo (Abbondanza «Belford» - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft-Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Clairgeau - Passacrassana - B. C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N. 2707 del 2-2-1979 del Ministero della Sanità
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto Kg. 25 -1-5-10

2780

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

®

Aficida sistemico con azione acaricida secondario

®marchio registrato della

Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc Paris

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 37,5 Vamidothion puro.
Solventi ed emulsionanti quanto basta a 100.
Contiene Cicloesanone

Natura del rischio:

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione

Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarree, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.

Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni

Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza:

Consultare un centro antiveleni.

RAVIT S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA
V.le degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.78.041 (5 linee)
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68

STAB.: Paganica (L'Aquila)

Reg. n. 2780 Ministero Sanità del 29-4-1978
12/84

CARATTERISTICHE

Il KILVAL è un insetticida sistemico dotato di una persistenza superiore a tre settimane (e molto spesso a quattro o cinque settimane).
Il KILVAL è efficace:

- Contro varie specie di ragnetti rossi parassiti delle Pomacee, Drupacee, Vite, Barbabietola da zucchero, Patate, Colture floricole e ornamentali in pieno campo e contro l'Acaro giallo della vite.
- Contro tutti gli afidi particolarmente l'afide lanigero.

DOSE D'IMPIEGO PER 100 LT. D'ACQUA

Alberi fruttiferi: Pomacee e Drupacee con pompe irroratrici a vol. normale: 125 cc.; con atomizzatori a basso volume aumentare in rapporto alla minor quantità di acqua impiegata.

Vite, ornamentali: con pompe irroratrici a vol. normale: 100-125 cc.; con atomizzatori a basso volume circa un litro per ettaro.

Bietole, patate: con pompe irroratrici a vol. normale: 125-150 cc.; con atomizzatori a basso volume circa un litro per ettaro.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Diluire la quantità sopra indicata di KILVAL in pochi litri d'acqua. Versare in seguito, sempre agitando, nella botte della pompa irroratrice precedentemente riempita d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Non miscelare con sostanze alcaline (poltiglia bordolese, polisolfuri, permanganato di potassio).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette o animali domestici o bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto litri

GIAVONEX

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Concentrato emulsionabile: diserbante selettivo per il controllo del giavone nelle risaie.

Composizione
100 gr. di prodotto contengono:
78,5 g. di Molinate (1-esametilen-immino-carbotiolato di etilene) tecnico al 95% di purezza (corrispondenti a 72,7 g. di p.a. puro).
Emulsionanti, tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi.
Contiene xilolo

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile al bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo.
Sintomi d'intossicazione: nausea - vomito - diarrea - scialorrea - dispnea - lacrimazione - tremori - convulsioni - miosi - bradicardia - edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio - lavaggio cutaneo se vi fu contatto — atropina (2 mg. ogni quarto d'ora per via endomuscolare fino a comparsa di fenomeni di atropinizzazione) - ossigenoterapia se vi è cianosi - PAM (g. 0,50 ogni 3 ore per via endovenosa) e similari.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 3827 del 26.5.78 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 20 - 5

Caratteristiche
Il GIAVONEX è un erbicida selettivo che agisce per assorbimento radicale sui semi del giavone in germinazione.

Modalità d'impiego
Pre-semina: dosi d'impiego Kg. 3-6,5 per ettaro in 400-600 litri d'acqua, interrandolo con due erpicature incrociate.
Effettuare il trattamento a partire da due settimane prima fino al giorno stesso della semina o del trapianto. La dose minima indicata si riferisce ai terreni leggeri, quella massima ai terreni torbosi. Data la grande volatilità del prodotto è necessario che esso venga subito interrato o coperto da un leggero strato d'acqua.

Post-emergenza: il GIAVONEX può essere impiegato dalla semina fino al massimo a circa 30-35 giorni dopo; l'impiego principale cade fra il quinto ed il venticinquesimo giorno dopo la semina, anticipando nel caso di lotta al giavone rosso. Le dosi d'impiego sono le stesse indicate per il trattamento in pre-semina.

Preparazione della poltiglia
Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
Per la sua formulazione e lo specifico campo d'impiego il GIAVONEX deve essere usato da solo.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

2730

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Il DIMETOL 20 si impiega a dosi varianti da 100 a 200 grammi per ettolitro di acqua nei trattamenti alle piante da frutto e alle altre colture agricole per combattere: psilla del pero, carpocapsa del melo e del pero, afidi del melo e del pesco, larve minatrici e larve ricamatrici del melo e del pero, cydia molesta e tignole del pesco e del susino.

DA NON APPLICARSI CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il DIMETOL 20 è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio esclusi quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

« **ATTENZIONE:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. »

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. »

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. »

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO kg

DIMETOL 20

Insetticida per uso agricolo ad azione polivalente liquido emulsionabile

COMPOSIZIONE:
Gr 100 di prodotto contengono:

Metilparathion puro	gr 16
Emulsionanti, tensioattivi e solventi q.b. a	gr 100

(CONTIENE XILOLO)

CLASSE Iª

CLASSE I

VELENO

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Caratteristiche: Il DIMETOL 20 è un insetticida per uso agricolo efficace contro psille, carpocapsa, cydia molesta, larve minatrici, afidi, tignole.

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a - Telef. 90.82.07
44042 — C E N T O (Ferrara)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 2730 del 19-4-78.
Stabilimento di produzione:
SCAM S.r.l. - Via Bellaria n. 164 - MODENA

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabile dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.

Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.

Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

2767

CARATTERISTICHE
Il KITION «E» è un insetticida emulsionabile a base di Azinphos-etile in grado di agire contro gli insetti di varie colture come sotto indicato.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Le dosi del KITION «E» variano da 150 a 250 g/hl per tutti i seguenti campi d'impiego.
- **Frutticoltura** (pero, melo, pesco, susino, albicocco, ciliegio, mandorlo)
  contro: Cidia, Carpocapsa, Afidi, Psille, Acari, Tentredini, microlepidotteri minatori (Cemiostoma, Nepticula, Litocollete) Tortrici ricamatrici (Capua, Cacoecia, Eulia, Pandemis) Cocciniglie, Antonomi, Fillobio, Cicaline, Tripidi, Tingidi.
- **Viticoltura**
  contro: Tignole, Cicaline.
- **Olivicoltura e Agrumicoltura** (arancio, limone, mandarino)
  contro: Cocciniglie, Acari, Tripidi, Afidi, Tignole, Fetola.
- **Bieticoltura**
  contro: Cleono, Altica, Lixo, Afidi.
- **Orticoltura** (patata, peperone, pomodoro, pisello, fagiolo, melanzana, carciofo, cetriolo)
  contro: Dorifora, Afidi, Mosca del carciofo, Cassida, Aleurodidi, Tripidi.
- **Floricoltura** (solo in pieno campo)
  contro: Bega del garofano.

Versare lentamente la dose di KITION «E» nel quantitativo di acqua richiesto. Operando con pompe a volume ridotto le dosi vanno proporzionalmente aumentate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il KITION «E» è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio, ad eccezione di quelli aventi reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: Il KITION «E» è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 10

Kition «E»

Insetticida emulsionabile per trattamenti liquidi

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Azinphos etile puro		g 19
Emulsionanti e adesivi	q.b. a	g 100
Contiene Xilolo		

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I **VELENO**

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es.: interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: *in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.*
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.*

AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni

caffaro S.p.A. - Milano

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)
Registrazione n. 2767 del Ministero della Sanità del 19-4-1978

2783

INSETTICIDA

per trattamenti antiparassitari in frutticoltura, viticoltura e floricoltura in pieno campo

COMPOSIZIONE:

100 gr. di prodotto contengono Polisolfuro di Bario tecnico minimo gr. 99 (corrispondente a gr. 45 di zolfo attivo)

NATURA DEI RISCHI:

INTOSSICAZIONE GRAVE PER INGESTIONE, PER INALAZIONE E PER CONTATTO CON LA PELLE.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi più idonei (bruciare all'aperto) le confezioni che contenevano il prodotto.

In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto orale

Sintomi di intossicazione: nausea - vomito - coliche addominali - diarrea profusa - crampi muscolari - convulsioni - bradicardia - dispnea.

(La morte avviene in piena coscienza per paralisi respiratoria).

Consigli terapeutici: lavanda gastrica con solfato di sodio o magnesio - Analettici cardiorespiratori - Spasmolitici - Fleboclisi con aspartato di potassio (1-3 MEq.: Kflebo).

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

Registrazione Ministero della Sanità del 10-3-1980 n. 2783

II CLASSE

APPLICAZIONE:

Viene usato contro i seguenti parassiti:
- Aspidioto (Cocciniglia) delle: drupacee, pomacee.
- Eriofide del nocciolo

Svolge azione secondaria su:
- Oidio della vite
- Ticchiolatura delle pomacee e drupacee
- Monilia dell'albicocco e del pesco
- Fumaggine dell'olivo e delle pomacee

DOSI:

POLIBAR kg. 1 + Acqua l. 99 = Bè 1,4
POLIBAR kg. 2 + Acqua l. 98 = Bè 2,5
POLIBAR kg. 3 + Acqua l. 97 = Bè 3,8
POLIBAR kg. 4 + Acqua l. 96 = Bè 5,–
POLIBAR kg. 5 + Acqua l. 95 = Bè 6,2
POLIBAR kg. 6 + Acqua l. 94 = Bè 7,3
POLIBAR kg. 7 + Acqua l. 93 = Bè 8,2

TRATTAMENTI:

Invernali: sulle pomacee soluzione da Bè 5 a Bè 8 sui peschi ed altre drupacee soluzione da Bè 3 a Bè 5

Primaverili ed estivi: Bè 0,2 a Bè 1.

PREPARAZIONE:

Versare il POLIBAR direttamente nell'acqua mescolando fino ad ottenere la densità voluta.

AVVERTENZE: Per l'esecuzione dei trattamenti con Polibar è consigliabile non fare uso di pompe irroratrici di rame, ma soltanto di pompe irroratrici di ottone, di bronzo o di rame rivestite di piombo. Qualora non si abbiano disponibili che pompe di rame, queste devono essere lavate più volte al termine dei trattamenti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

MISCIBILITA': Il Polibar è miscibile con prodotti a base di esteri fosforici; in tal caso è necessario aumentare di 1/3 le dose di questi prodotti. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenze più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Deve essere rispettato un intervallo di 30 giorni tra l'ultimo trattamento e il raccolto.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

contenuto kg. 25

Società Bario e Derivati - SABED - spa - LIVORNO - Via del Tempio, [illegible]

Stabilimento di produzione: S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via S. Francesco - Cotignola (RA)

2860

CARATTERISTICHE

Il BIFOS è un insetticida a base di monocrotophos preparato in forma liquida emulsionabile. La sua attività si esplica per contatto diretto o attraverso la penetrazione nei tessuti vegetali (azione citotropica) soprattutto nei confronti di: Psille, Tentredini, Cicaline, Fillominatori, Nottuidi, Piralidi, Tortrici, Afidi, Acari.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Psilla del pero . . . . g 100-150/hl
Tignola della vite, Tignola degli agrumi (arancio, limone, mandarino, clementine), Tignola delle olive, Tignola orientale del pesco, Carpocapsa, Cicaline, Fillominatori, Ricamatrici . . . . . g 150-180/hl
Piralide del Mais, Rodilegno, Larve di Nottuidi, Afidi, Acari . . . . . g 200/hl
Cleono della barbabietola da zucchero . . . . . g 300/hl
Criptorrinco del pioppo . . . . . g 400/hl
(a mezzo di pennellature dei tronchi)

Diluire la dose di prodotto in poca acqua.
Agitare e versare questa prediluizione nel quantitativo totale di acqua richiesto, mescolando accuratamente.
Per consentire maggiore potere bagnante al trattamento è consigliabile l'aggiunta di g 50 di **BAGNANTE CAFFARO** per 100 litri di preparazione acquosa.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il **BIFOS** è compatibile con la generalità degli antiparassitari ad eccezione di quelli aventi reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il **BIFOS** è fitotossico sulla cultivar di melo «Golden Delicious» e su alcune varietà di ciliegio.

NOCIVITÀ: il **BIFOS** è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto, su agrumi 75 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 1

Bifos

Insetticida emulsionabile a base di monocrotophos

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
Monocrotophos puro . . . . . g 15
Coformulanti . . . . . q.b.a g 100
Contiene Xilolo

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I

VELENO

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es.: interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Non immagazzinare per lunghi periodi a temperatura inferiore a 5°C o superiore a 30°C.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: *in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.*
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.*

AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni

caffaro S.p.A. - Milano

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)
Registrazione n. 2860 del Ministero della Sanità del 9-8-1978

2886

Diserbante selettivo in polvere bagnabile di impiego in pre-semina, pre-emergenza e post-emergenza su bietola da zucchero, da foraggio e da orto.

COMPOSIZIONE

– Cloridazon puro	g	67,2
– Coadiuvanti, inerti: quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM–MILANO

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE IV

Registrazione n. 2886 del 4.8.1978 Ministero della Sanità

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali e viene assorbito sia per via radicale che per via fogliare dal semi in germinazione o dalle plantule appena spuntate dal terreno purchè al momento del trattamento presentino le foglie cotiledonari e non più di 1-3 foglie vere; il prodotto è selettivo per la bietola in quanto viene da questa rapidamente trasformato in metaboliti non dannosi.
Infestanti molto sensibili sono: Matricaria chamomilla, Veronica sp., Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Lamium sp., Stellaria media, Thlaspi arvense, Chenopodium album, Atriplex sp., Galinsoga parviflora, Solanum nigrum, Urtica urens, Capsella bursa pastoris, Linaria sp., Polygonum convolvulus, Polygonum lapathifolium; **Sono mediamente sensibili:** Euphorbia sp., Fumaria officinalis, Galium aparine, Papaver rhoeas, Poa sp., Senecio vulgaris, Mercurialis annua, Polygonum aviculare; **Sono mediamente resistenti:** Alopecurus sp., Anagallis arvensis, Avena fatua, Lolium sp., Rumex sp., Vicia sp., Ajuga sp.; **Sono resistenti:** invece tutte le malerbe perenni quali Cirsium arvense, Agropyrum repens, Cynodon dactilon, Convolvulus sp., Equisetum sp., Sorghum halepense, Cyperus sp.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega in pre-semina e pre-emergenza a dosi variabili di 3-6 Kg/ha in funzione della natura del terreno:
in terreni leggeri : 3 Kg/ha
in terreni di medio impasto : 4 Kg/ha
in terreni pesanti : 5-6 Kg/ha
Il prodotto si impiega anche in post-emergenza, con infestanti nella fase di plantula alla dose di 3-4 Kg/ha. Nei terreni torbosi il diserbante viene bloccato dalla sostanza organica e difficilmente si riesce ad ottenere una azione erbicida soddisfacente; si può tuttavia intervenire in post-emergenza dopo la nascita delle infestanti.
Stemperare la prestabilita quantità di prodotto in 4-6 o più ettolitri di acqua per ettaro, irrorando con pompa a volume normale.
Il prodotto si può impiegare anche localizzato, riducendo la dose di impiego alla effettiva superficie di terreno trattato.
Il prodotto si impiega dal momento della semina fino a quando le infestanti si trovano alla fase di plantula: su infestanti più sviluppate (4 o più foglie) si ha un'azione soltanto parziale.
Il trattamento in post-emergenza si può anche effettuare dopo una zappatura o dopo il diradamento purchè le infestanti non siano presenti, oppure si trovino al massimo alla fase di 1-3 foglie.
Preparare il terreno perfettamente affinato effettuando il diserbo su terreno fresco e umido ovvero assicurandosi che a breve distanza cada una pioggia per permettere al prodotto di distribuirsi uniformemente sullo strato superficiale del terreno e di venire così assorbito dalle radici delle infestanti.
Qualora si debba operare su terreno asciutto e non si abbiano successive piogge, è necessario procedere ad un'irrigazione entro 8-10 giorni dal diserbo.

Preparazione della poltiglia : stemperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità : il prodotto è miscibile con erbicidi ed insetticidi previsti per allargare l'azione contro le malerbe e per la lotta contro gli insetti.
Non sono miscibili in genere gli insetticidi in formulazione liquida emulsionabile.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : si sconsiglia il trattamento nel periodo che va dall'emergenza della bietola fino alla emissione della seconda foglia vera. La selettività del prodotto può essere compromessa da attacchi di insetti o di malattie fungine che determinano lesioni sulle radici o sulle foglie aprendo vie alla penetrazione del prodotto. Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture sensibili vicine.
Se è necessaria una ricoltivazione è sconsigliabile la semina o il trapianto di pomodoro, colza, ravizzone, cavoli e cavolfiori.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

SIPCAM

2938

Utacaffaro

Polvere adesiva a base di Rame

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Rame metallo . . . . g 12
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)

Disperdenti . . . . q.b. a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

caffaro S.p.A. - Milano

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 2938 del Ministero della Sanità del 22-10-1979

CARATTERISTICHE

L'UTACAFFARO è un prodotto in polvere secca a base di rame, appositamente studiato per trattamenti polveruenti contro: Peronospora della vite, Cercosporiosi della barbabietola, Occhio di Pavone dell'olivo, Bolla e Corineo del pesco, Peronospora, Septoriosi della patata e del pomodoro.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

La dose normale è di 30-40 Kg/ha e per trattamento a seconda dello sviluppo vegetativo delle piante.
Legare i sacchetti dopo l'uso per proteggere il restante contenuto dall'umidità.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'UTACAFFARO è compatibile con la generalità degli antiparassitari in formulazione polverulenta.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 25

2940

LIMACIDE pellets

ELIMINA CHIOCCIOLE E LUMACHE

COMPOSIZIONE

Metaldeide pura	g 5
Supporto proteico	q b a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione. per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione:

Violenti dolori addominali - diarrea - vomito biancastro (aspetto latte cagliato) - shock - midriasi - ipotermia - convulsioni - obnubilazione del sensorio.

Consigli terapeutici:

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (g 5 per litro di acqua) - riscaldare il paziente - cardiotonici - fleboclisi clorurate o glucosate con noradrenalina - diuretici - barbiturici - neuroplegici - anfetamina e derivati in caso di torpore.

AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni.

Esca avvelenata gia' pronta per l'uso, per la lotta contro chiocciole, lumache, limacce e gasteropodi in genere. LIMACIDE PELLETS non viene asportato dal vento e non ammuffisce. Trova impiego negli orti, nei giardini e in pieno campo.

E' molto appetito dai gasteropodi, che sono attratti dalle proteine contenute nell'esca e muoiono entro breve tempo.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Distribuire il prodotto preferibilmente la sera in ragione di grammi 100 per 20-30 metri quadrati a seconda del grado di infestazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Dato il particolare impiego del prodotto non e' richiesta alcuna miscelazione.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DARIO BAVICCHI & FIGLIO - PERUGIA

Registrazione Ministero della Sanita' n° 2940 del 23/4/1979

Stab.: SIMEX S.p.A. - ISOLA VICENTINA (Vicenza)

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso netto g.**

2946

...bagnabile micronizzato per trattamenti liquidi

...puro (esente da selenio) . .	g 60
...venti e disperdenti	q.b. a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

— ... questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— ... contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il MICROZOLFO 60 è un anticrittogamico in polvere bagnabile caratterizzato da particelle di zolfo che consentono sospensibilità e bagnabilità.

Il MICROZOLFO 60 è indicato per la lotta preventiva e curativa di tutte le forme di Oidio o Mal bianco delle pomacee, delle drupacee, della vite, delle colture orticole e floricole.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

	per 100 litri d'acqua
Viticoltura	
Contro il Mal bianco della vite:	
— alla ripresa vegetativa	400-500 g
— durante le successive fasi fenologiche	250-350 g
Per la lotta contemporanea contro Oidio e Peronospora aggiungere al MICROZOLFO 60 prodotti antiperonosporici come ANTIR, POLVERE RUMIANCA, DITIAMINA.	
Frutticoltura	
Contro tutte le forme di Mal bianco dei fruttiferi:	
— trattamenti pre-florali	500-600 g
— trattamenti post-florali	300-400 g
Orticoltura	
Contro il Mal bianco delle colture orticole, quali p. es. pisello e cucurbitacee (meloni, zucchini, cocomeri)	400-500 g
Quando la temperatura oltrepassa i 25° C dimezzare la dose di impiego.	
Floricoltura	
Contro il Mal bianco delle colture floricole, quali p. es. rosa, ortensia, crisantemo	400-500 g

Le dosi maggiori sono relative ai primi trattamenti: esse poi diminuiranno con lo sviluppo della vegetazione e con l'innalzarsi della temperatura; comunque con temperature superiori ai 25° C si useranno sempre le dosi più ridotte.

Stemperare il prodotto in poca acqua e mescolare sino ad ottenere una pasta omogenea. Lasciar riposare pochi minuti, indi aggiungere la poltiglia così ottenuta gradualmente sotto continua agitazione nel resto dell'acqua sino a conseguire la concentrazione voluta.

Quando il MICROZOLFO 60 si impiega in combinazione con altri prodotti è opportuno preparare la poltiglia in poca acqua e versarla, agitando, nelle dispersioni acquose già pronte degli altri prodotti.

Le dosi sopra consigliate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA': Il MICROZOLFO 60 non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, Diclofluanide.

Avvertenza: Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

Melo: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden Delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.

Pero: Buona Luisa d'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.

Vite: Sangiovese.

Cucurbitacee: può essere fitotossico.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

EniChemAgricoltura S.p.A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione: VISPLANT-CHIMIREN s.r.l.
Stabilimento di Renazzo di Cento - Ferrara

Registrazione del Ministero della Sanità n. 2946 del 4 Giugno 1979

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg. 1**

2979

IV CLASSE

(POLVERE BAGNABILE)

ANTICRITTOGAMICO RAMEICO

Marchio depositato

Registrazione Ministero della Sanità n. 2979 del 22-12-1978

COMPOSIZIONE		
100 grammi di prodotto contengono:		
— Rame metallo (sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata)	g	13,5
— Inerti, bagnanti o disperdenti	q.b. a g	100

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è il risultato di una ricerca tendente ad ottenere un composto rameico simile alle caratteristiche della poltiglia bordolese.

SETTORI DI IMPIEGO

Il SIARAM è efficace contro la Peronospora del pomodoro, della cipolla, delle insalate, della patata, ed in particolare contro quella della vite. Impiegato in chiusura della lotta contro la Peronospora della vite, determinando l'irrobustimento della buccia degli acini, ha una qualche azione collaterale contro la Botrytis della vite (Muffa grigia). E' inoltre efficace contro Ticchiolatura del Melo e del Pero dopo la ripresa vegetativa; Sclerotinia, Marciume bruno, Corineo e Bozzacchioni dell'Albicocco; Sclerotinia, Corineo e Scopazzi del Ciliegio; Bolla, Corineo e Cancro dei rametti del Pesco nei trattamenti invernali; Brusone del Nespolo; Ruggine, Ticchiolatura e Peronospora della Rosa; Peronospora del Carciofo, del Cardo, del Cavolo, della Cicoria, delle Cucurbitacee e dello Spinacio; Occhio di Pavone o Lebbra dell'Olivo; Allupatura e Mal secco degli agrumi; Alternaria della Patata; Septoria, Botrytis, Ticchiolatura, Alternaria del Pomodoro; Septoriosi del Sedano; Antracnosi del Pisello; Cercospora della Barbabietola.

Il SIARAM svolge anche una qualche azione complementare contro tutte le forme di Oidio e Mal Bianco.

Il SIARAM può essere impiegato sia per irrorazione che per impolveramento.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il SIARAM si impiega normalmente alla dose di kg. 1-2 ogni 100 lt. di acqua, ed intervalli di tempo di 8-12 giorni tra un trattamento e l'altro, a seconda dell'andamento climatico ed a queste dosi non è fitotossico per nessuna coltura. Si dovranno impiegare kg. 2-3 ogni 100 lt. di acqua nei trattamenti autunno-invernali alle pomacee ed alle drupacee.

In caso di forti infezioni le dosi suddette devono essere aumentate analogamente a quanto si usa fare con tutti i composti rameici.

Per la preparazione della miscela si consiglia di sciogliere la giusta dose di SIARAM in poca acqua e di agitare fino ad ottenere una poltiglia cremosa; aggiungere poi il resto dell'acqua continuando ad agitare fino a raggiungere la concentrazione desiderata.

Il SIARAM, oltre che per irrorazione, può essere impiegato come una polvere secca, sia tal quale che in unione agli zolfi per la lotta contemporanea antiperonosporica ed antioidica.

I rapporti tra SIARAM e zolfi sono quelli in uso nelle varie zone viticole italiane che, mediamente, si orientano sui 15-20 kg. di anticrittogamico rameico a titolo 15-16% di rame metallico e gli 85-90 kg. di zolfo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con gli insetticidi clorurati o carbammati (ad esempio Sialan 35 EC, Sialan 35 PB, Pomex) mentre riduce lievemente l'efficacia dei fosforganici (Fostox, Fostox Metil). Pertanto, volendo miscelare con questi ultimi prodotti il SIARAM, occorrerà aumentare la loro dose del 15-20% ed avere cura di impiegare la miscela entro poche ore dalla preparazione.

AVVERTENZA:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo e, inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico sul Pesco e sul Susino durante la vegetazione e, pertanto, se ne sconsiglia l'impiego dopo la ripresa vegetativa. Il SIARAM può anche essere fitotossico su alcune varietà di Melo e Pero sensibili ai prodotti cuprici: Abbondanza « Belford » - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winecap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canada - Rosa Mantovana - Imperatore - Abate Fetel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Clargeau - Passacrassana - B. C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard - Commercio - Butirra d'estate - Gentil Bianca - Spinacarpi - Spadone d'estate - Giardina - Scipiona - Armella - S. Maria - Mora - Coscia.

Non trattare durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

SILIA S.p.A. - APRILIA (LATINA)

Contenuto Kg. 25

2983

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Oltre alle consuete norme igieniche, proteggere gli occhi quando si maneggia il prodotto concentrato, o lo si applica in ambienti chiusi.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

"NIMROD OIDIUMSTOP"

Fungicida liquido emulsionabile ad azione diretta per la difesa di melo, melone, pesco e rosa in pieno campo contro il mal bianco (oidio).

COMPOSIZIONE

Bupirimate puro . . . . g 25,6
Emulsionanti, diluenti, bagnanti . . . . q. b. a g 100
(contiene mesitilene)

CLASSE III

Attenzione: MANIPOLARE CON PRUDENZA

p. p. *ICI* SOLPLANT s.p.a.

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione:
ICI Plant Protection Division - Yalding, Kent (Inghilterra)
Registrazione Ministero della Sanità n. 2983 del 13-11-1978
'NIMROD' - Marchio registrato Imperial Chemical Industries PLC
'OIDIUMSTOP' - Marchio depositato ICI Solplant S.p.A.

Il 'NIMROD OIDIUMSTOP' è un fungicida specifico contro l'oidio. Ha azione preventiva e curativa; manifesta attività fumigante. Si diffonde entro la lamina fogliare irrorata, verso l'apice e i margini. L'assorbimento dei depositi del prodotto presenti sui germogli in accrescimento concorre alla difesa delle nuove foglie che si sviluppano su di essi. Stante la sua azione specifica il 'NIMROD OIDIUMSTOP' può essere preso in considerazione nei programmi di lotta integrata.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite a 100 l di acqua)

Melo : ml 30 - 60
Melone: ml 50 - 100
Pesco : ml 50 - 100
Rosa : ml 150 - 300

N.B. - salvo che nell'impiego su melo, si consiglia di unire all'emulsione pronta il bagnante 'Agral' in ragione dello 0,1%. Bagnare abbondantemente. Impiegare la dose più alta nel caso di forte infestazione.

EPOCA DI INTERVENTO

Melo : prefioritura (orecchiette di topo)
Rosa, Melone, Pesco : inizio comparsa della malattia

Successivamente: ad intervalli di 7-10 giorni a seconda dell'andamento della malattia.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

È compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi impiegati in frutticoltura. **È compatibile anche con olio bianco.**

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare il melo Imperatore (Morgenduft). Può risultare fitotossico anche per le cv. di melo Gravenstein e Idared.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA:

melo, pesco, melone: 21 giorni

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO **ml 30**

2985

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

CUPROSSINA® PB 50

COMPOSIZIONE

Rame metallico g 51,3
(sottoforma di rame ossicloruro)

Bagnanti, disperdenti e supporti inerti, q.b. a g 100

GRUPPO MONTEDISON
FARMOPLANT
Fitofarmaci Montedison

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento: CAFFARO S.p.A. Adria Cavanella Po (RO)

Registrazione Ministero della Sanità N. 2985 del 14.7.1979

® Marchio registrato

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA

Contro l'Occhio di pavone e la lebbra dell'olivo: g 300-500.
Contro la Peronospora della vite, patata, pomodoro, fagiolo, fragola, pisello: g 300-500.
Contro la Peronospora del carciofo, cardo, cicoria, cipolla, cocomero, melone, rapa, cavolo, spinacio, zucca e della rosa: g 200-300.
Contro la Peronospora e la Cercospora della barbabietola: g 900-1000.
Contro il Mal secco degli agrumi: g 300-400.
Contro la Ticchiolatura delle pomacee: gr 250-300.
Contro bolla e corineo del pesco: g 1000-1200 nei trattamenti autunno-invernali e g 800-1000 nei trattamenti di fine inverno.
Le epoche di intervento contro ogni parassita sopra indicato sono fissate dai normali calendari di lotta.

Preparazione della sospensione

Stemperare il prodotto in poca acqua e versarlo poi nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

La Cuprossina PB 50 è miscibile con i più comuni insetticidi, esclusi quelli a base di polisolfuri di calcio o bario.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Non si deve trattare durante la fioritura.
Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione su pesco, susino e varietà cuprosensibili di Melo (Abbondanza «Belford», Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, Williams, Dott Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard): in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg 1

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFOMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i conseguenti interventi di pronto soccorso.

2992

Insetticida in polvere bagnabile a base di Carbaril, per la difesa dei fruttiferi, vite, agrumi, olivo, ortaggi, fiori, colture ornamentali, vivai, colture erbacee ed arboree, agricole ed industriali. Si usa per trattamenti liquidi contro Tignola e Tignoletta della vite. Tignola e Cocciniglia dell'olivo e degli agrumi, Dorifora della patata, Carpocapsa, Capua, Eulia, Cacoecia ed altre tortrici, Cidia ed Anarsia del pesco, Bega o Tortrice del garofano, Lepidotteri e Coleotteri in genere.
Il prodotto agisce nei confronti dei vari parassiti per contatto e per ingestione.

COMPOSIZIONE

— Carbaril puro (esente da beta-naftolo)	g	47,5
— Coadiuvanti ed Inerti: quanto basta a	g	100

SIPCAM—Soc.It.Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA
Montalcino frazione Torrenieri (SI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 2992 del 30-1-1979 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi)

Sintomi d'intossicazione

Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici:

Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini. Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.
Ossigenoterapia se vi è cianosi

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto è un insetticida per la lotta contro i vari lepidotteri e Coleotteri nocivi alle colture agrarie e forestali e va impiegato alle seguenti dosi per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale.

— Contro Tignola e Tignoletta della vite g. 150-200.
— Contro Tignola e larve di Cocciniglie dell'olivo e degli agrumi: g. 150-200.
— Contro Dorifora della patata: g. 200-250.
— Contro Altica e Mamestra della bietola, Fitonomo e Misurino del medica: g. 200-250.
— Contro Carpocapsa del melo, pero, noce: g. 120-150.
— Contro Cidia del pesco, Anarsia, Capua, Archips, Eulia ed altre Tortrici: g. 200-250.
— Contro Cavolaia e Lepidotteri o Coleotteri di colture orticole e floreali: g. 150-250.
— Contro Bega o Tortrice del garofano: g. 200-250.

Si impiega comunemente durante la stagione primaverile-estiva o comunque quando si ha la necessità di combattere i parassiti.

Preparazione della poltiglia: impastare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo ad eccezione dei prodotti alcalini quali Polisolfuri, Poltiglia bordolese, calce.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: non irrorare in fioritura perché tossico per le api; il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per l'uso consentito. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

2999

®DICARBAM 50

Insetticida organico in polvere bagnabile.

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Carbaryl puro (esente da β naftolo)	g	49
Coformulanti	q.b. a	100

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza.

Distribuzione e vendita in Italia:

BASF-Agritalia S.p.A. - Milano

Prodotto originale fabbricato dalla:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen/Rhein (Germania Federale)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2999 del 6-4-1979

® = marchio registrato BASF

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Avvelenamento acuto per ingestione e contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici: Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini. Controindicate le ossime (PAM, Contration, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

Il Dicarbam 50 è un carbammato insetticida che agisce per contatto e per ingestione. Il Dicarbam 50 è specifico per la lotta contro il Verme delle pomacee, le Tignole ed i Lepidotteri in genere. Il Dicarbam 50 può essere impiegato fino a 7 giorni prima della raccolta. Il Dicarbam 50 non conferisce sapori o odori sgradevoli al raccolto.

Dosi ed epoche d'impiego (dosi per 100 l di acqua)

Melo e Pero: Carpocapsa o Verme delle mele — 150-200 g
Iniziare i trattamenti ai primi sfarfallamenti degli adulti (2ª decade di maggio) e ripeterli ogni 10-15 giorni sino alla fine di agosto.
Cacoecia Eulia, Capua — 150-200 g
Queste specie sono controllate con i normali trattamenti contro Carpocapsa.

Pesco e Susino: Tignole — 200-250 g
Iniziare i trattamenti prima della fioritura.

Olivo e agrumi: Tignola, Cocciniglia mezzo grano di pepe — 200-250 g
2-3 trattamenti distanziati di circa 10 giorni, a partire dalla schiusura dei boccioli florali.

Vite: Tignole — 200-250 g
Iniziare i trattamenti prima della fioritura.

Colture orticole: Dorifora della patata, Cassida e Depressaria del carciofo, Cavolaia, Nottue degli ortaggi (insalate, pomodoro, peperone) — 200-250 g
Iniziare i trattamenti alla prima comparsa delle infestazioni e ripeterli ogni 10-20 giorni.

Colture floricole: Bega del garofano in pieno campo — 250-300 g
Trattamenti ripetuti ogni 10-15 giorni.

Modalità d'impiego

Stemperare il prodotto in poca acqua fino ad ottenere una pasta omogenea, diluire ulteriormente la poltiglia e versare il tutto nel serbatoio della irroratrice mantenendo in funzione l'agitatore.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità con altri prodotti nell'impiego agricolo. Il Dicarbam 50 è compatibile con gli antiparassitari di più comune impiego. Non è miscibile invece con olii bianchi o con prodotti a reazione alcalina quali la poltiglia bordolese.
« AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta ».

Eventuale fitotossicità. Evitare di intervenire su melo nei giorni successivi alla caduta dei petali poichè, su alcune varietà può provocare il diradamento dei frutticini.
Rischi di nocività. Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame. Il Dicarbam è tossico per le coccinelle e le api; evitare pertanto i trattamenti durante il periodo della fioritura. Il Dicarbam 50 è tossico anche sui pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

3013

ARVIN®

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile — **Insetticida a largo spettro d'azione che agisce per contatto ed ingestione.**

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
49,5 g di Carbaryl (1-naftil-N-metilcarbammato) puro (esente da β- naftolo) (da p.a. puro al 99%).
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto (inibitore della colinesterasi).
Sintomi d'intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici:
lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini. Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

Caratteristiche
L'ARVIN è un insetticida efficace contro: verme delle mele, pere, susine, albicocche e noci; tignole della vite, degli olivi e degli agrumi, bega del garofano, dorifora della patata, cavolaia, cydia.
Saissetia (mezzo gran di pepe) degli agrumi e dell'olivo. Altica, Cassida, Mamestra della bietola.

Modalità d'impiego
Dosi d'impiego per 100 litri d'acqua:
Contro verme delle pomacee e delle noci, Capua, Cacoecia, Eulia: g 100-150; contro tignole della vite, delle olive, degli agrumi, del garofano, bega verde, verme delle susine, delle albicocche, campa del mandorlo, cavolaia, dorifora della patata: g 200-300.
Contro tignola orientale del pesco, Cydia, Anarsia, Depressaria del carciofo: g 200-250.
Contro Altica, Cassida e Mamestra della barbabietola: g 150-300.
Contro Saissetia (mezzo grano di pepe) su agrumi ed olivo g 300.
Su piante di difficile bagnabilità aggiungere alla poltiglia insetticida cc 30 di Bagnante Amonn.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
L'ARVIN è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese) e degli olii minerali.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non trattare i meli nei 30 giorni che seguono la caduta dei petali, perchè il prodotto può causare, su alcune varietà, il diradamento dei frutti.

Rischi di nocività
L'ARVIN è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 3013 del 19.4.79 del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO.
Contenuto Kg. 1-10.

3014

METILFOS® 50

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Insetticida emulsionabile — Per la lotta contro numerosi parassiti delle piante coltivate.

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
47,5 g. di Malathion (0,0-dimetilditiofosfato del dietilmercaptosuccinato) p.a. puro (da p.a. tecnico al 95%).
Emulsionanti, tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi.
Contiene xilolo.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg. per i bambini) ogni 10 minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.
La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

Caratteristiche
IL METILFOS 50 è un preparato organico fosforato efficace contro gli insetti e gli Acari.
Per queste sue caratteristiche trova applicazione contro numerosi parassiti delle piante coltivate (Ragno rosso, Afidi, Psille, Carpocapsa).

Modalità d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua:
Afide lanigero, Psillidi, Aleurodidi, Afidi in genere: cc. 130-150.
Afide nero del melo, Yezabura malifoliae, Carpocapsa, larve di cocciniglie e di Lepidotteri: cc. 170-200.
Effettuare uno o più trattamenti secondo la necessità.

Preparazione della poltiglia
Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
Il METILFOS 50 è compatibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese). La miscela con certi prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONIO SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 3014 del 30.4.79 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Lt. 10 - 1

DU PONT CONIO SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3022

KELTHANE® E. C.

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA.

Acaricida emulsionabile — **Specifico per la lotta contro gli acari fitofagi in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, colture industriali ed ornamentali.**

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Dicofol (1,1-bis-[p-clorofenil]-2,2,2-tricloroetanolo) puro gr. 18,5 (da p. a. tecnico all'82%).

Emulsionanti, tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi. Contiene xilolo.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo. Sintomi d'intossicazione: vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g. 25 di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1 - 0,2 g.) contro i tremori e le contrazioni muscolari, fleboclisi di soluzione fisiologica contro ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni: la morfina e per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

Modalità d'impiego

Dosi per 100 litri d'acqua:

Contro Ragno rosso e Ragno giallo cc. 250; Tarsonema ed altri acari cc. 250-280.

Bagnare bene la pagina inferiore e superiore delle foglie.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Preparazione della poltiglia

Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

Compatibilità

Il KELTHANE E. C. è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese). La miscela con certi prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il prodotto è fitotossico per le melanzane.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione

DU PONT CONIO SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione

DU PONT CONIO SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 3022 del 30.4.79 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Lt. 1 - 10

® Marchio registrato dalla Rohm & Haas Co. Filadelfia.

DU PONT CONIO SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3023

II CLASSE

NITRILON®

Concentrato emulsionabile - Insetticida con ampio spettro d'azione.

Composizione — 100 grammi di prodotto contengono:
Fenitrothion puro gr. 50
(da p.a. tecnico al 95%)
Emulsionanti, tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi.
«Contiene xilolo».

Natura del rischio — Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere innocue con i mezzi più idonei(per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva) le confezioni che contenevano il prodotto.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico — Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti; 0,2-1 mg. per i bambini) ogni 10 minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.

La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

Caratteristiche — Il NITRILON è un estere fosforico caratterizzato da un vasto spettro d'azione, buona efficacia iniziale e lunga persistenza.

Modalità d'impiego — Dosi per 100 litri d'acqua: cc. 100-200.

In frutticoltura, colture ornamentali e di pieno campo, contro Afidi, Psillidi, Cimici, Tingidi, Ditteri (mosca della frutta, delle ciliege), Lepidotteri(Tignole, Carpocapsa, Microlepidotteri minatori), Coleotteri (Antonomo del melo e del pero), Tripidi.

Preparazione della poltiglia — Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

Lavare accuratamente la pompa prima dell'uso, soprattutto se contiene residui di calce o di altri prodotti alcalini.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità — Il NITRILON è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese). La miscela con certi prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità — Il NITRILON è fitotossico per le crucifere. Il prodotto non va quindi impiegato su Cavoli, Cavolfiori, Broccoli, Colza.

Rischi di nocività — Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 3023 del 8.4.79 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Lt. 1

DU PONT
DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISIC

3046

CLASSE II

NOCIVO

POLISOLFURO DI CALCIO AMONN

Soluzione acquosa **Specifico per i trattamenti invernali alle piante da frutto.**

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Polisolfuro di calcio tecnico al 100% gr. 32
(corrispondenti a gr. 22-24 di zolfo attivo)
Calcio tiosolfato tecnico al 100% gr. 2,5
Acqua quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico
Sostanza nociva per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione
Eritemi - congiuntiviti - irritazioni delle mucose - vomito - coliche addominali - diarrea - crampi muscolari - dispnea - disturbi cardiocircolatori.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO.

Lavanda gastrica con solfato di magnesio e carbone attivo - analettici - cardiorespiratori - spasmolitici - ossigenoterapia - lobelina.

CONTRONDICAZIONI

Colliri a base di cortisone.

Caratteristiche
Il POLISOLFURO DI CALCIO AMONN è efficace contro le Cocciniglie in genere (S. Josè), contro diverse malattie crittogamiche (ticchiolatura, oidio), come pure contro muschi e licheni.

Modalità d'impiego
Meli e peri: al 25-30%, cioè 75-70 litri d'acqua e 25-30 kg. di POLISOLFURO DI CALCIO AMONN, a seconda del grado di infestazione delle cocciniglie.
Effettuare il trattamento a fine inverno, fino a poco prima dell'apertura delle gemme.

Preparazione della poltiglia
Preparare la soluzione di POLISOLFURO DI CALCIO AMONN nel giorno stesso in cui effettuano i trattamenti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
Il POLISOLFURO DI CALCIO AMONN si può miscelare in via di massima, e solo al momento dell'uso, con esteri fosforici ed altri insetticidi di uso normale.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA-DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 3046 del 6.4.79 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 200

DU PONT

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3078

CLASSE II

NOCIVO

BARIZOL® 45-47

Polvere solubile Anticrittogamico e insetticida.

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:
Disolfuro di Bario tecnico al 99% gr. 55
Zolfo elementare gr. 28,7
(corrispondenti a gr. 48,03 di zolfo attivo).
Disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere innocue e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
— Nocivo per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Informazioni per il medico

Avvelenamento acuto orale - nausea - vomito - coliche addominali - diarrea profusa - crampi muscolari - convulsioni - bradicardia - dispnea (la morte avviene in piena coscienza per paralisi respiratoria).
CONSIGLI TERAPEUTICI: lavanda gastrica con solfato di sodio o magnesio - analettici cardiorespiratori - spasmolitici - fleboclisi con aspartato di potassio (1-3 mEq: K flebo).

Modalità d'impiego

Contro i parassiti vegetali ed animali delle piante ed in particolare:
— Aspidiotus perniciosus ed altre cocciniglie.
— Ticchiolatura del melo e del pero.
— Mal bianco del melo e del pesco.
— Mal della bolla del pesco.

Dosi

BARIZOL kg 1 + acqua litri 99 = Bé 1,4
BARIZOL kg 2 + acqua litri 98 = Bé 2,5
BARIZOL kg 3 + acqua litri 97 = Bé 3,8
BARIZOL kg 4 + acqua litri 96 = Bé 5
BARIZOL kg 5 + acqua litri 95 = Bé 6,2
BARIZOL kg 6 + acqua litri 94 = Bé 7,3
BARIZOL kg 7 + acqua litri 93 = Bé 8,2

Verificare con un densimetro che la densità sia pari a quella indicata.
Trattamenti
Invernali: sulle pomacee soluzione da Bé 5 a Bé 6; sui peschi ed altre drupacee soluzione da Bé 5 a Bé 6.
Primaverili-estivi: da Bé 0,2 a Bé 1.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Preparazione della poltiglia

Versare lentamente il BARIZOL in un volume d'acqua pari a tre - quattro volte circa il peso del prodotto agitando energicamente. Lasciare a riposo per circa 10 minuti, affinché si completi la reazione chimica e riportare poi a volume, oppure versare il tutto nella quantità d'acqua per ottenere la concentrazione voluta.

Compatibilità

Il BARIZOL è di norma miscibile con esteri fosforici ed altri insetticidi di uso normale.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività

Il prodotto è nocivo per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle anche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 3078 del 30.4.79 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 10-50.

3082

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nel casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

INSETTICIDA EMULSIONABILE
A BASE DI OLIO BIANCO E PARATHION

COMPOSIZIONE:

Olio bianco puro al 95 % di R.I.	gr. 85
PARATHION puro	gr. 3,5
Solventi, emulsionanti e tensioattivi q.b. a gr. 100.	

CONTIENE XILOLO

CLASSE I

I CLASSE

VELENO

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a - CENTO (Ferrara)
Tel. 906207
~~officina di produzione~~: TERRANALISI s.n.c. RENAZZO DI CENTO (FE)

Registraz. ministero sanità n. 3082 del 4-5-79
DA NON VENDERSI SFUSO lt. 25

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il **TERFOS OLIO** si impiega in frutticoltura e agrumicoltura contro cocciniglie, uova durevoli di afidi e di acari, crisalidi di cemiostoma.

Le dosi variano da Kg. 1 a 2 per 100 litri di acqua e i trattamenti si eseguono a fine inverno all'inizio della fase vegetativa delle piante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il **TERFOS OLIO** è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio esclusi quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: Il prodotto a seguito dei trattamenti è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere il trattamento 30 giorni prima della raccolta

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. »

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. »

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. »

3084

ARVIN® 85

CLASSE II

NOCIVO

Polvere bagnabile Insetticida agricolo.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
84,15 g di Carbaryl esente da β-naftolo (1-naftil-N-metilcarbammato) p.a. puro (da p.a. tecnico al 99%).
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere innocue con i mezzi più idonei (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva) le confezioni che contenevano il prodotto.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto (inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione:
Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici:
Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.

Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini. Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.
Ossigenoterapia se vi è cianosi.

Caratteristiche
Insetticida efficace contro i più nocivi fitofagi dei fruttiferi, delle colture orticole, industriali, ornamentali, foraggere e forestali.

Modalità d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua:
Fruttiferi. Contro Tortricidi (Carpocapsa, Capua, Eulia), Tignole (T. Orientale, T. dell'olivo, T. degli agrumi, Anarsia) altri Lepidotteri e Cocciniglie in genere (larve) g. 100-150.

Colture orticole. Contro Agrotidi, Nottue, Depressaria, Idroecia, Tignole, Piralidi e altri Lepidotteri, Dorifora, Casside, Altiche, Crisomelidi ed altri coleotteri g. 100-150.

Piante ornamentali e da fiore (Garofano). Contro Bega verde, Nottue, altri bruchi di Lepidotteri, Tentredini, Tripidi, Cetonie e Cocciniglie (larve) g. 100-150.

Barbabietola e Granoturco. Contro Mamestre, Altiche, Casside, Piraustra, Sesamia, Heliothis, Nottua g. 120-150.

Pioppo. Contro larve defogliatrici (Crisomela, Stilpnotia), Tortricidi g. 120-150.

Colture foraggere (Erba medica, trifoglio, erbai). Contro Fitonomi, Apion, Misurino, Sputacchine, Piralide, Crisomela g. 120-150.

Su piante di difficile bagnabilità aggiungere alla poltiglia 30 g. di Bagnante Amonn.

Preparazione della poltiglia
Impastare il prodotto in poca acqua mescolando con cura e poi versare il tutto nel quantitativo di acqua necessario.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
L'ARVIN 85 è compatibile con i più comuni antiparassitari primaverili-estivi, fatta eccezione per quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese) e per gli olii minerali.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non trattare i meli nei 30 giorni che seguono la caduta dei petali, perchè il prodotto può causare, su alcune varietà, il diradamento dei frutti.

Rischi di nocività
L'ARVIN 85 è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Interrompere le irrorazioni durante la fioritura per non danneggiare le api.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 3084 del 19.4.79 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 1-10.

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3094

AKREL*

Diserbante ad assorbimento fogliare e radicale per il diserbo dei cereali

Composizione (riferita a gr. 100):

- Acido 3,6 - dicloropicolinico puro gr. 1,6
- Diclorprop puro gr. 41,4
- Coformulanti q.b. a gr. 100,0

III CLASSE

Attenzione: manipolare con prudenza

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

N.B. - Usare occhiali e guanti nella preparazione ed impiego della soluzione diserbante.

Informazioni per il medico:

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione:

Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.

Consigli terapeutici:

Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni:

È sconsigliata la digitale.

Modalità d'impiego:

Caratteristiche:

— AKREL è selettivo per frumento, orzo, segale ed avena.

— combatte efficacemente le infestanti dicotiledoni appartenenti ai generi: **Matricaria, Polygonum, Bifora, Galium, Veronica, Stellaria, Papaver, Cirsium, Chenopodium, Sonchus, Anagallis.**

Dose di impiego:

3,5 - 4,5 litri di AKREL/Ha. Disperdere il prodotto in 500 - 600 litri d'acqua/Ha.

Epoca del trattamento:

Il trattamento si esegue dalla fase di accestimento fino alla fase di botticella dei cereali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità:

Può essere miscelato con gli erbicidi fenossiacetici quali: 2,4-D, MCPA, MCPP, per ampliare lo spettro di azione.

«AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta».

Fitotossicità:

Il prodotto è fitotossico per la maggior parte delle colture dicotiledoni; in particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi, floreali in genere, ecc. Evitare pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

* Marchio registrato - The Dow Chemical Company

Prodotto nello stabilimento della SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. di Palazzolo Milanese (Milano)

Dow Chemical S.p.A.
Via R. Lepetit 8 - Milano
Registrazione del Ministero della Sanità N. 3094 del 5-4-1979

DA NON VENDERSI SFUSO

Confezione da Kg.

3103

CUPROSAN® 20 M

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile — **Fungicida cupro-organico per combattere le malattie crittogamiche delle pomacee, della vite, del pomodoro (solo fino alla prima fioritura) e floricole.**

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
30 g di Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)
13 g di Zineb puro
Coformulanti specifici, bagnanti, coloranti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA:
— In caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
— Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati: alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.
— In caso di ingestione di Zineb può manifestarsi sulfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

Modalità e campi d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua:
Vite: contro la peronospora nei trattamenti pre-fiorali: g. 350; nei trattamenti post-fiorali: g. 350-400.
In caso di forte pericolo di infezione aumentare la dose a g. 500 ed abbreviare l'intervallo dei trattamenti.
Pomacee: contro la ticchiolatura del melo o del pero nei trattamenti pre-fiorali: g. 300-350.
Pomodoro: solo fino alla prima fioritura: contro peronospora ed alternariosi: g. 350-500.
Garofano: contro la ruggine: g. 300-500.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
NON IMPIEGARE IN SERRA.
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Compatibilità
Il CUPROSAN® 20-M è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Si sconsiglia l'impiego del prodotto su alcune varietà di pere sensibili allo Zineb: Abate Fetel, Armella, Butirra d'estate, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S. Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi e Zecchermanna.
Non si deve trattare durante la fioritura le varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili. Il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento o per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Pieve 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 3103 del 25.5.79 del Ministero della Sanità.
Contenuto Kg. 1 - 5 - 10 - 25

3113

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

SOFRIL 80

Zolfo bagnabile micronizzato per la lotta contro l'Oidio della vite, dei fruttiferi, delle piante ortive e ornamentali

ESENTE DA SELENIO

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 80 Zolfo puro micronizzato
Sostanze bagnanti e sospensive q.b. a 100.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande e corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRINCIPALI IMPIEGHI

IN VITICOLTURA:
Contro l'Oidio o Mal Bianco dalla ripresa vegetativa al raccolto gr. 200-300 per hl. d'acqua.

IN FRUTTICOLTURA:
Melo: contro l'Oidio: gr. 500-600 per hl. d'acqua nei trattamenti pre-florali; gr. 200-300 nei trattamenti post-florali.
Albicocco: contro l'Oidio; gr. 300 per hl. d'acqua durante il periodo vegetativo.
Pesco: contro l'Oidio; dalla fine della fioritura gr. 200 per hl. d'acqua più gr. 70 di etaldyn. Se la temperatura decorre calda preferire gr. 70-80 di Karathane.

IN ORTICOLTURA E FLORICOLTURA:
Pomodoro, Peperone, Melanzana: contro l'Oidio e Mal Bianco: gr. 200-300 per hl. d'acqua più gr. 50 di Etaldyn.

RAVIT S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
V.le degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.78.041 (5 linee)
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40139 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.69

Stabilimento: Quassolo (To)

Reg. n. 3113 Ministero Sanità del 25-5-1979

12/84

MODALITA' D'IMPIEGO

Diluire bene il SOFRIL 80 in una piccola quantità d'acqua (poco più di mezzo lt. per kg. di prodotto) e poi aggiungere il volume d'acqua totale agitando accuratamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il SOFRIL 80 è miscibile con tutti gli anticrittogamici ed insetticidi della nostra gamma. Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, Captano, DDVP, Bynapacryl, diclofluanide.

E' raccomandata la miscela con l'R6 Erresei S Blu in quanto costituisce una combinazione per combattere contemporaneamente la Peronospora e l'Oidio della vite.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il SOFRIL 80, come tutti gli zolfi colloidali, va usato con molta oculatezza. Effettuare i trattamenti nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio. Distanziare i trattamenti di ZOFRIL 80 da quelli a base di Captano o di olii minerali di almeno tre settimane.

Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.

PERE: Buona Luisa D'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.

In alcune varietà di meli (Stayman, Commercio e sulla Golden Delicious dopo la fioritura) sostituire il SOFRIL 80 con gr. 80-90 di Karathane PB.

Con prodotti ftalmidici il SOFRIL 80 può produrre fitotossicità nelle Delicious rosse, Stayman e Winesap.

AVVERTENZE

Nel caso di trattamenti misti mescolare preferibilmente il SOFRIL 80 alla polvere insetticida o fungicida e poi procedere come per la preparazione di una poltiglia semplice.

Se gli insetticidi sono liquidi, essi vanno aggiunti alla poltiglia di SOFRIL 80 già pronta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

3115

Nebutrin®

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile Diserbante selettivo di pre-emergenza per il frumento.

Composizione 100 grammi di prodotto contengono:
15 g. di Terbutrin puro
40,5 g. di Neburon puro
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche Il NEBUTRIN è un erbicida specifico per il diserbo del frumento in pre-emergenza della coltura e delle infestanti. Il NEBUTRIN combatte efficacemente infestanti graminacee e dicotiledoni quali Alopecurus, Apera spica venti, Poa, Echinocloa, Atriplex, Ambrosia, Capsella, Oxalis, Papaver, Polygonum, Portulaca, Sonchus, Chamomilla, Stellaria, Veronica, Lamium, mantenendo una perfetta selettività.

Modalità e dosi d'impiego Frumento autunnale - dose media Kg. 4-5 per ettaro, distribuiti con almeno 500 lt. d'acqua per ettaro. Usare la percentuale più bassa nei terreni sciolti.
Il trattamento con NEBUTRIN va effettuato dopo la semina del frumento prima della emergenza del frumento e delle infestanti. Non ripetere il trattamento prima di 6 mesi.
L'efficacia erbicida è migliore su terreno ben lavorato, privo di zolle, con elevato grado di umidità del suolo al momento del trattamento o dopo la sua esecuzione.

Preparazione della poltiglia Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità Il NEBUTRIN è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 3115 del 4.6.1979 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 1-5

1980

3117

KELTHANE® W 35

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA.

Polvere bagnabile — Acaricida selettivo per la lotta contro gli acari fitofagi in frutticoltura, viticoltura e colture ornamentali.

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Dicofol (1,1-bis-[p-clorofenil]-2,2,2-tricloroetanolo) puro gr. 35

Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo. Sintomi d'intossicazione: vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g. 25 di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1 - 0,2 g.) contro i tremori e le contrazioni muscolari, fleboclisi di soluzione fisiologica contro ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni: la morfina e per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

Modalità d'impiego

Frutticoltura: g. 120-150 per 100 litri d'acqua.
Trattare accuratamente e completamente le piante in modo da assicurare una completa copertura di tutte le foglie. Sulle foglie di difficile bagnabilità aggiungere alla poltiglia di KELTHANE W 35 30-40 cc. di BAGNANTE AMONN.

Viticoltura: g. 120-130 per 100 lt. d'acqua.
Può essere usato in combinazione al CUPROSAN 20 M, DITHANE M-45, AZURAM, THIAMON micronizzato e colloidale.

Piante ornamentali: g. 120-150 per 100 litri d'acqua.
Per il controllo degli acari su rose, azalee; astri, ciclamini, crisantemi e varie altre piante ornamentali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Compatibilità

Il KELTHANE W 35 è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese). La miscela con certi prodotti emulsionabili non è consigliabile.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 3117 del 25.5.79 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 5 - 0,5 - 1

® Marchio registrato dalla Rohm & Haas Co. Filadelfia.

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3157

Classe III

ATTENZIONE manipolare con prudenza

POLVERE INSETTICIDA PER TRATTAMENTI POLVERULENTI

COMPOSIZIONE

Carbaryl puro, esente da ß-naftolo	g 4,9
Supporti inerti	q.b. a g 100

USO

Per combattere gli insetti nocivi alle piante. Per la lotta contro: Dorifora della patata, Cavolaia, Tignole della vite, Misurino del medical, Mamestra della barbabietola ed altri lepidotteri nella dose di kg 15-18 per ettaro di superficie.

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 3157 del 15-6-1979

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

CONTRO GLI INSETTI DANNOSI ALLE PIANTE

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti e ripetuti eventualmente nel corso della stagione.

È necessario trattare uniformemente la vegetazione per assicurare una perfetta difesa delle piante da proteggere.

Il **PANAM P 5** si impiega servendosi dei soffietti o dei solforatori a mano o meccanici; questo insetticida agisce nei confronti dei vari parassiti per contatto e per ingestione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Volendo eseguire contemporaneamente la lotta contro le tignole dell'uva, l'oidio e la peronospora larvata dei grappoli, mescolare il **PANAM P 5** con zolfi ventilati o ramati o asporizzati (kg 25 zolfo ventilato o kg 1 Aspor).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione, e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione e contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione

Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente ai bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al Centro di rianimazione. Ossigeno-terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni

Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.), che potrebbero essere nocive.

3169

Insetticida in polvere bagnabile micronizzata a base di CARBARYL

CLASSE II

NOCIVO

Composizione

gr. 85 di Carbaryl puro - esente da β-naftolo
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

Natura del rischio

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Union Carbide Italia S.p.A.
Via Durini 28
20122 Milano
Tel.: 77571
Telex: 311 068 UCIMI

SEVIN® è un marchio depositato della Union Carbide Corporation, USA.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto, interrandole in buche lontane da corsi d'acqua.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico

- Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
- Sintomi di intossicazione:
  nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
- Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
  lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno.
  Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al Centro di Rianimazione.
  Ossigenoterapia se vi è cianosi.
- Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.
- **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

Modalità di impiego

Colture protette	Parassiti combattuti	Dosi di impiego	
		g/hl	%
Olivo	Saissetia oleae Tignola	140 - 180 90 - 120	0.14 - 0.18 0.09 - 0.12
Vite	Tignole-Eulia	90 - 120	0.09 - 0.12
Agrumi	Saissetia oleae Tignola	140 - 180 90 - 120	0.14 - 0.18 0.90 - 0.12
Pomacee	Carpocapsa pomonella Tortrici *(Eulia, Cacoecia)*	70 - 90 90 - 120	0.07 - 0.09 0.09 - 0.12
Drupacee	Cydia molesta, Anarsia lineatella Campa del mandorlo	120 - 150 90 - 120	0.12 - 0.15 0.09 - 0.12
Colture ortive	Dorifora, Cavolaia Nottue in campo ed in serra	90 - 120 90 - 120	0.09 - 0.12 0.09 - 0.12
Pioppo	Stilpnozia, Crisomela	120	0.12

Versare il quantitativo necessario di SEVIN 85S in poca acqua, agitando; aggiungere, in seguito, acqua sino al volume desiderato, sempre rimescolando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il SEVIN 85S è miscibile con gli antiparassitari di uso comune, non però con quelli alcalini, come poltiglia bordolese. Per la preparazione delle poltiglie miste, approntare prima la poltiglia con l'antiparassitario prescelto sino a ¾ circa del volume previsto, poi aggiungere alla stessa, sempre mescolando, il SEVIN 85S dopo averlo sospeso, a parte, in poca acqua.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Per evitare la morte delle api non eseguire irrorazioni durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, persone ed agli animali.

Officina di produzione:
Central Chemicals Company
Elkton, Maryland, USA

DA NON VENDERSI SFUSO

Registrazione N. 3169 del 15/6/79 del Ministero della Sanità

Contenuto: 25 kg

84708

3176

TMTD 50 bianco

Fungicida acuprico in polvere bagnabile a base di TMTD per la difesa del Melo, Pero, Pesco, Drupacee, Ortaggi, Fiori e Colture arboree.
Si impiega in trattamenti liquidi contro la Ticchiolatura delle Pomacee, Bolla e Corineo delle Drupacee ed altre crittogame.

COMPOSIZIONE
- Thiram puro ....g 49
- Coadiuvanti e Inerti: quanto basta a...............g 100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di Produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 3176 del 6/7/1979 Ministero della Sanità.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, laringite, ecc.).

Terapia:
Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento é avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente é cosciente; se é in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini.
Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per 100 litri di acqua. Irrorati con pompe a volume normale:

— **contro Bolla e Corineo del pesco:** g. 600-700 nel trattamento autunnale (dopo la caduta delle foglie); g. 500-600 nel trattamento invernale (gennaio-febbraio): g. 150-200 nei trattamenti primaverili-estivi.

— **contro la Ticchiolatura del melo e del pero:** g. 300 nei trattamenti che si effettuano prima, durante e dopo la fioritura: g. 150-200 nei trattamenti successivi.

— **contro le crittogame delle colture ortive e floreali** (Alternaria, Septoria, Ruggine, Ticchiolatura, Botrytis): g. 150-300 ripetendo i trattamenti secondo l'andamento delle infezioni.

Preparazione della poltiglia: stemperare la prestabilita dose di prodotto in pochissima acqua in modo da ottenere una pastetta densa ed omogenea e versare poi nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Il prodotto può essere associato a tutte le comuni poltiglie antiparassitarie escluse quelle a base di rame, di arseniati e di mercurio.
Dovendo associare prodotti liquidi emulsionabili è necessario aggiungere, ad ogni ettolitro di poltiglia di TMTD BIANCO, g. 50 di Bagnante EMULSOL.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 1

3190

(ANTIGERMOGLIO PER TABACCO)

Composizione qualitativa e quantitativa:
Nonil-fenil etere di poliossietilenglicole . . . . . . gr 0,5
Miscela di acidi grassi saturi ed insaturi (solventi) quanto basta a 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. - Dopo la manipolazione, in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare subito il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità d'impiego:
Il prodotto deve essere costantemente tenuto ad una temperatura superiore ai 18 °C cosa questa che si può ottenere facilmente lasciando i recipienti esposti al sole prima dell'uso. L'effettuazione del trattamento antigermoglio può essere fatta in qualsiasi ora del giorno evitando l'irrorazione per almeno due giornate. La quantità occorrente per ogni mille piante è di litri 1,5/2.

Da non applicare con mezzi aerei.
Il prodotto è compatibile con qualsiasi principio attivo d'impiego agricolo comune.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE: Usare i guanti: il prodotto è irritante
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TERRANALISI s.n.c.
Sede CENTO (FE) - Via Donizetti, 2/A
Telefono 906.207

Prod. Stab. **TERRANALISI** - RENAZZO (FE) - Via IV Novembre
Registrazione N. 3190 dell' 1-8-1979 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO Contenuto lt. 5

3193

CLASSE III

MALADUST 25 POLVERE BAGNABILE

Insetticida - Acaricida

Composizione :
100 gr. di prodotto contengono:
gr. 25 di Malathion puro
q. b. a 100 di supporti e coadiuvanti.

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

Natura del rischio :
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali :
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico :
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione :
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso :
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

Il MALADUST 25 polvere bagnabile è un insetticida, con attività anche acaricida, utilizzabile su: fruttiferi, barbabietola da zucchero, cereali, foraggere leguminose, tabacco, floreali e ornamentali in pieno campo, pioppo, ma - comunque - ad esclusione degli ortaggi.

Dosi e modalità d'impiego :
Diluire il prodotto in ragione di gr. 300-600 per ettolitro di acqua, in relazione alla resistenza degli insetti ed all'entità dell'infestazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Può essere miscelato con qualsiasi altro insetticida od anticrittogamico, purchè a reazione neutra.

Avvertenza : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività :
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

S.p.A.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Officina di produzione e sede amministrativa:
FAENZA - Via S. Silvestro, 1

Registrazione Ministero della Sanità n. 3193 del 6-7-1979

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso 10 kg**

SARIAF S.p.A.

3228

DERAMON

CLASSE IV

Antideriva-antievaporante obbligatorio per trattamenti con mezzi aerei in vigneti e pioppeti.

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:
gr. 30 di idrossietilcellulosa pura.
gr. 20 di alcool laurilico etossilato.
Coformulanti quanto basta a 100 grammi.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico dei prodotti usati per la miscela mostrandogli le etichette.

Istruzioni per l'uso

Generalità: Il DERAMON è un antideriva-antievaporante da impiegarsi per la preparazione di sospensione antiparassitaria idonea per i trattamenti con i mezzi aerei.

Tale sospensione, a seconda delle apparecchiature di distribuzione, dello stadio vegetativo e di sviluppo della coltura, varia da 30 a 80 litri/ettaro.

Dosi d'impiego:
Impiegare Kg. 0,6-1 di DERAMON ogni 100 litri di sospensione antiparassitaria tenendo presente che le dosi per ettaro e per coltura degli antiparassitari sono le seguenti:

VITE

— Kg./Ha 3-4 di formulati a base di Mancozeb, Metiram, Propineb, Ziram, Zineb al 70-80% di p.a. (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in p.a.) o loro miscele.

oppure

— Kg/Ha 4-5 di formulati a base di composti rameici al 40-50% di rame metallo (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in p.a.);

oppure

— Kg/Ha 4-5 di formulati misti a base di rame e prodotti organici sopra menzionati, al 40-50% come somma totale delle percentuali dei p.a. puri (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in p.a.).

I prodotti sopra menzionati possono essere eventualmente impiegati associati con:

— Kg/Ha 2-3 di zolfo bagnabile micronizzato all'80-90% (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in p.a.);

oppure

— Kg/Ha 1-1,5 di zolfo bagnabile colloidale all'80% (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in p.a.).

PIOPPO

— Kg/Ha 4-5 di formulato a base di Maneb, Mancozeb all'80% di p.a.

Preparazione della sospensione

Il DERAMON viene disperso versandolo lentamente sotto buona e continua agitazione in circa il 50% dell'acqua necessaria al trattamento, nel restante 50% si disperde l'antiparassitario e quindi si miscelano le due sospensioni sempre sotto continua agitazione.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato quando si effettuano trattamenti con mezzi aerei in miscela con fungicidi a base di Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, rameici, Zineb, Ziram, zolfi bagnabili e miscele dei suddetti principi attivi, previo consenso delle Autorità locali agricole e sanitarie nel quadro delle istruzioni impartite al riguardo e solo per trattamenti con mezzi aerei in vigneti e pioppeti. Nel caso di miscela con più fungicidi devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico.

E' vietato l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non addette ai lavori ed agli operatori non adeguatamente equipaggiati e protetti durante l'intervallo di agibilità.

Intervallo di agibilità nell'appezzamento trattato: 48 ore.

Intervallo di sicurezza: quello del principio attivo con intervallo di sicurezza più lungo.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura (vigneti e pioppeti) nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per cautelarsi da danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 3228 del 1.8.79 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 25-5-10

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3242

KINOL

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Fungicida specifico per la prevenzione delle malattie della frutta, il cancro del melo e del pero e per disinfettare le ferite causate dalla grandine.

Composizione — 100 grammi di prodotto contengono:
ossichinoleato di rame (idrossi-8-chinolato di rame) puro gr. 20
Bagnanti, disperdenti, stabilizzanti ed acqua quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio — Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche — **In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**

Caratteristiche — Il KINOL, grazie all'azione combinata dell'ossichinolina e del rame, esplica un'azione considerevole nei confronti dei parassiti fungini quali ticchiolatura tardiva, bollato dei frutti.
Il KINOL è inoltre indicato per combattere e prevenire gli attacchi di Nectria galligena sulle piante di melo e di pero, nonché per disinfettare e favorire la cicatrizzazione delle ferite provocate dalla grandine, sia sui frutti che sugli organi legnosi.

Modalità d'impiego — **Pomacee (melo e pero): contro la ticchiolatura tardiva ed il bollato dei frutti** (Gloesporium album) cc. 250-300 per 100 litri d'acqua. Effettuare un trattamento in pre-raccolta, avendo cura di bagnare bene i frutti.
Contro il cancro del melo e del pero (Nectria galligena) cc. 300-350 per 100 litri d'acqua.

Effettuare il primo trattamento quando circa un terzo delle foglie è caduto e ripeterlo dopo due settimane. Qualora non tutte le foglie non fossero ancora cadute, eseguire un terzo trattamento dopo altri 15 giorni.

Disinfezione e cicatrizzazione delle ferite causate dalla grandine e per prevenire la formazione di marciumi (Monilia sp., Botrytis sp.): cc. 350 per 100 litri di acqua.

Effettuare il trattamento con alto volume d'acqua, subito dopo la caduta della grandine.

Drupacee: (pesco, albicocco, susino): contro il marciume dei frutti (Monilia Fusarium) ed il marciume molle (Botrytis sp.): cc 250-300 per 100 litri di acqua.

Effettuare un trattamento in pre-raccolta, avendo cura di bagnare bene i frutti.

Preparazione della poltiglia — Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità — Il KINOL è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del prodotto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione Nr. 3242 del 28.11.79 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Lt. 1 - 5 - 10

Preservare il prodotto dal freddo

DU PONT — DU PONT CONID SPA AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3248

® Marchio registrato della ROHM AND HAAS COMPANY, Filadelfia, USA

Acaricida selettivo per frutti-orticoltura

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:
Principio attivo:
DICOFOL (1.1 bis (clorofenil) 2,2,2 tricloroetanolo) puro . . gr. 35,0
Sostanze inerti e coadiuvanti q.b. a gr. 100

Classe III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi d'intossicazione:
Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.
Consigli terapeutici:
Intossicazinoe acuta: *lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g. 25 di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insotticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1-0,2 g.) contro i tremori e le contrazioni muscolari; fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.*
Controindicazioni:
La morfina e l'alcool, e per evitare la fibrillazione ventricolare: l'adrenalina, l'efodrina.
Avvertenza: *Consultare un centro antiveleni.*

MODALITÀ D'IMPIEGO

Generalità - Il KELTHANE W-35 è una formulazione che assicura una più uniforme distribuzione del prodotto su fogliame e su frutti ed una più efficace attività. Ha una rapida azione di controllo ed una lunga azione residua contro le specie di acari più dannose (Ragno rosso, Ragno giallo, Eriofidi, Phyllocoptes che attaccano le colture agrarie.

DOSI ED EPOCHE DEI TRATTAMENTI

DOSI PER 100 LITRI DI ACQUA

FRUTTICOLTURA - Melo e Pero: gr. 120-150 - In primavera iniziare i trattamenti prima e dopo la fioritura quando la maggior parte delle uova si sono schiuse. Il prodotto offre un sostanziale vantaggio in tale epoca specialmente per le varietà sensibili agli acaricidi emulsionabili (Golden delicious). Trattare accuratamente e completamente le piante in modo da assicurare una completa copertura su tutte le foglie. Ripetere i trattamenti quando necessario in estate per un adeguato controllo.

ORTAGGI VARI - gr. 120-150 - Su fagiolo, cetriolo, melone, anguria, pomodoro, peperone, fragola iniziando i trattamenti al primo apparire degli acari.

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI - 120-150 gr. su rose, azalee, astri, ciclamini, crisatemi e varie altre piante ornamentali quando iniziano le infestazioni degli acari.
Per ottenere i migliori risultati con il KELTHANE W-35 si dovrà irrorare abbondantemente la chioma delle piante in modo da ottenere una perfetta copertura della vegetazione. Su fogliame difficilmente bagnabile aggiungere 40-50 gr. per ettolitro di un buon bagnante quale TRITON® B 1956.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il KELTHANE W-35 è compatibile con tutti gli anticrittogamici ed insotticidi di usuale impiego. Non deve essere usato in combinazione con materiali fortemente alcalini (polisulforo di calcio e bario).
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI FITOTOSSICITÀ - Non impiegare il KELTHANE W-35 sulla melanzana: detta coltura può essere danneggiata.

RISCHI DI NOCIVITÀ - Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Registrazione Ministero della Sanità N. 3248 del 25-9-1979
DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO KG. 1

3263

Caratteristiche: anticrittogamico misto.

Campi d'impiego e dosi: ogni 100 lt. d'acqua:
— **Vite:** gr. 350-500 per peronospora, antracnosi, marciume nero.
— **Pomacee:** gr. 350-500 per ticchiolatura, septoria, ruggine, alternaria.
— **Pomodoro fino alla prima fioritura:** gr. 350-500 per peronospora, alternariosi, septoriosi, cladosporiosi, antracnosi.

Divieto d'impiego: divieto d'impiego in serra. Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Epoche d'impiego: usare il prodotto a scopo preventivo, a seconda del calendario d'incubazione delle malattie.

Modalità d'impiego: bagnare bene le colture da proteggere e ripetere i trattamenti ad ogni necessità. Si consiglia di aggiungere, ogni 100 litri di miscela, g. 100 di bagnante ASTROL.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura. Su alcune varietà di melo e pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia pertanto l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. **Cultivars di melo sensibili al rame:** Abbondanza Belfort, Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Renetta del Canada, Rome Beauty (Morgenduft), Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap. **Cultivars di pero sensibili al rame ed allo Zineb:** Abate Fêtel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Passacrassana, Trionfo di Vienna, Butirra Estiva, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Giardina, Kaiser, Mora, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, William, William precoce. Sulle nuove varietà e sulle varietà locali di melo e di pero, prima dell'applicazione a pieno campo, saggiare la selettività del formulato su alcune piante.

Nocività a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima della raccolta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AMPELOSAN® R

FUNGICIDA CUPRORGANICO

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione:

ZINEB puro	gr.	9,75
RAME METALLO (sottoforma di Ossicloruro) puro	gr.	35,00
Coformulanti q.b. a	gr.	100,00

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. fitofarmaci
Via Tolara di Sotto 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61 - 79.94.62
Telex 511046

Registrazione N. 3263
del 10-10-1979
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bologna)

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Conservare la confezione ben chiusa • Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto • Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua • Non operare contro vento • Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti • Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi d'intossicazione: *l'ingestione provoca nausea - conati di vomito - sonnolenza - turbe nervose - bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).*

Terapia: *Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.*

Controindicazioni: *alcool, olii, grassi.*

AVVERTENZA: *consultare un Centro antiveleni.*

In caso di ingestione di Zineb può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz ed anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in Centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

VERCHIM ASTERIAS

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

3264

® Marchio registrato della ROHM AND HAAS COMPANY, Filadelfia, USA

Acaricida agricolo

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:
Principio attivo:
DICOFOL (1.1 bis (clorofenil) 2,2,2 tricloroetanolo) puro . . . . . . gr. 18,50
Sostanze inerti e coadiuvanti q.b. a gr. 100

Classe III^a

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi d'intossicazione:
Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.
Consigli terapeutici:
Intossicazinoe acuta: *lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g. 25 di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1-0,2 g.) contro i tremori e le contrazioni muscolari; fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.*
Controindicazioni:
La morfina e l'alcool, e per evitare la fibrillazione ventricolare: l'adrenalina, l'efedrina.
Avvertenza: *Consultare un centro antiveleni.*

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il KELTHANE AP è una formulazione (polvere bagnabile) raccomandata specialmente nella lotta contro gli acari del melo e del pero. Grazie al progresso della tecnica di produzione, è un prodotto che possiede migliorate proprietà fisiche che consentono una distribuzione più uniforme sulle foglie e sui frutti, un più accentuato deposito iniziale e una aumentata resistenza al dilavamento, che assicurano un più rapido e completo controllo della maggior parte delle specie di acari più dannose al melo ed al pero, ed una più lunga attività residua. Il KELTHANE AP esercita una maggiore efficacia su foglie di melo e pero quando applicato dopo la caduta dei petali.

DOSI ED EPOCHE DEI TRATTAMENTI
DOSI PER 100 LITRI DI ACQUA
FRUTTICOLTURA - Melo e Pero: gr. 250-300 - Per eliminare le principali specie di acari (Ragno rosso, Ragno giallo, Ragno allungato, Phyllocoptes), impiegare il KELTHANE AP in post-allegagione iniziando i trattamenti quando compaiono gli acari (2-3 per foglia). Ripetere il trattamento secondo necessità in estate. Su varietà di pero sensibili quali Butirra d'Anjou e Comice è consigliabile effettuare il trattamento non prima di 30 giorni dalla fioritura. Per una maggior sicurezza d'impiego, sotto ogni condizione, il KELTHANE AP viene raccomandato dal tempo dell'allegagione dei frutticini in poi.

ALTRE COLTURE - gr. 250 - Per combattere i ragnetti delle altre colture frutticole, degli ortaggi e dei fiori, impiegare il KELTHANE AP al primo comparire degli adulti. Ripetere se necessario.
Per ottenere i migliori risultati è necessario effettuare una copertura completa ed uniforme del fogliame e soprattutto della parte inferiore delle foglie. Evitare ogni danno e l'accartocciamento delle foglie ad opera di insetti o oidio, perché ciò renderebbe più difficile la copertura ed il controllo degli acari.
Per migliorare la copertura sul fogliame difficilmente bagnabile e per evitare il formarsi di depositi su mele e pere in maturazione aggiungere 30-50 gr. di adesivante-bagnante TRITON® B-1956 per 100 litri di soluzione o l'equivalente per le concentrazioni a volume ridotto

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il KELTHANE AP è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi. Non deve essere usato in combinazione con materiali fortemente alcalini, le poltiglie solfocalciche, i polisolfuri.
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI FITOTOSSICITÀ - Non impiegare il KELTHANE AP sulla melanzana: detta coltura può essere danneggiata.

RISCHI DI NOCIVITÀ - Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Registrazione Ministero della Sanità N. 3264 del 10-10-1979
DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO KG. 5

3268

CLASSE IV

MISAN® 50

Anticrittogamico in polvere bagnabile per la lotta contro le malattie fungine in frutticoltura, viticoltura, orto-floricoltura

COMPOSIZIONE

Captan puro	g 50
Bagnanti, disperdenti e inerti	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Treviglio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità N. 3268 del 25-10-1979

® Marchio registrato

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il MISAN 50 si usa alla dose di g 200-300 per ettolitro di acqua contro le seguenti malattie: ticchiolatura del melo e del pero, gommosi delle drupacee (pesco, albicocco, susino, ciliegio), marciume bruno delle pomacee (melo e pero) e delle drupacee (mandorlo, ciliegio e albicocco), muffa grigia (Botrytis) dell'uva, marciume della fragola, peronospora e septoriosi del pomodoro, vaiolo e antracnosi del fagiolo e delle cucurbitacee (melone, cocomero, zucca), malattie fungine dei fiori (seccume delle foglie del crisantemo; septoriosi del gladiolo; ruggine, occhio di pavone e alternariosi del garofano; ruggine, ticchiolatura e peronospora della rosa), vaiolatura e marciume grigio della fragola.

Preparazione della sospensione

Stemperare la dose stabilita di MISAN 50 in poca acqua a parte in modo da formare una pasta omogenea e versare poi nella quantità di acqua rimanente, mescolando con cura, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri), con olii e con zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi. In miscela con ZOLFO produce fitotossicità anche su: Starking (gruppo Delicious rosso), Stayman, Winesap.

Avvertenza

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark Delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anjou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta per frutta e ortaggi e 40 giorni prima per le uve da vino.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia

Lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro d'acqua) e digitale.

3279

CARATTERISTICHE

L'ORTHOFOR è un anticrittogamico CAFFARO in polvere bagnabile ad azione preventiva curativa, per la lotta contro la Ticchiolatura delle pomacee (Melo, Pero), la Peronospora della vite, la Bolla ed il Corineo delle drupacee (Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio), il Marciume della frutta, le crittogame delle piante ortensi (Pomodoro, Patata, Fragola, Cipolla, Carota, Sedano, Lattuga, Spinacio, Fagiolo, Melone, Cocomero, Zucca) ed ornamentali in pieno campo.
L'ORTHOFOR trova inoltre utile impegno nella disinfezione di bulbi, tuberi, patate da seme, terreni per semenzai, terricci per vasi.

DOSI E MODI D'IMPIEGO

L'ORTHOFOR si impiega alla dose di 200-250 g ogni 100 litri di acqua, avendo cura di stemperare il prodotto in poco liquido, riportando quindi a volume desiderato.
Nel caso della disinfezione di bulbi, tuberi, rizomi, radici, provvedere all'immersione degli stessi, per circa un'ora, in una soluzione contenente kg 1 di prodotto in 100 litri di acqua.
Per le patate da seme l'operazione deve essere effettuata prima dell'interramento, utilizzando una soluzione preparata con 500 g di prodotto in 100 litri di acqua e con un tempo di immersione di 4-5 minuti.
Per la disinfezione dei terreni e dei terricci, usare 1 litro per mq di una soluzione contenente 300-350 g di prodotto in 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio ad eccezione dei prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), degli oli e degli zolfi.
La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di oli o zolfi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap -Stayman - Renetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anjou - Butirra Clairgeau -Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Il suo impiego deve essere sospeso 15 giorni prima della raccolta ma per le uve destinate alla vinificazione tale arco di tempo dovrà rispettare i 40 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 25

Orthofor

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

— Captano puro . . . . g 50
— Adesivanti e disperdenti . . . . q.b. a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale

caffaro S.p.A. - Milano

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 3279 del Ministero della Sanità del 10-10-1979

3294

CLORIMID® 50

CLASSE IV

Polvere bagnabile — **Fungicida organico per combattere le malattie crittogamiche in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, floricoltura, agrumicoltura, colture industriali e per la disinfezione del terreno.**

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:
50 g di Captan (triclorometiltiotetraidroftalimmide) p.a. puro
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro d'acqua e digitale).

Modalità d'impiego

In frutticoltura il CLORIMID 50 è efficace contro la Ticchiolatura (anche di magazzino) e il Gloeosporium: può essere usato anche in viticoltura contro la peronospora.

Dosi per 100 litri di acqua:

Frutticoltura: g. 200-250 contro Ticchiolatura e macchie grigie del pero.
Non usare il CLORIMID 50 su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) sensibili al Captan.

Drupacee: g. 200-250 durante il periodo vegetativo, contro la bolla ed il corineo.

Viticoltura: g. 200-300 contro la Peronospora.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per le uve da vino.

Orticoltura: g. 200-300 contro Fitoftora, Alternariosi, Cladosporiosi, Septoriosi e Antracnosi del pomodoro; Fitoftora e Alternariosi della patata; Cercosporiosi, Septoriosi della carota; Septoriosi del sedano, Antracnosi o ruggine del fagiolo; Peronospora, Antracnosi delle Cucurbitacee; Peronospora, Ruggine della lattuga; Peronospora della cipolla e dello spinacio.

Floricoltura: g. 250-300 contro Alternariosi, Eterosporiosi, Ruggine del garofano; Ticchiolatura, Ruggine delle rose.

Altri impieghi del CLORIMID 50

In orticoltura e floricoltura il CLORIMID 50 si usa pure per la disinfezione di bulbi, tuberi, rizomi all'1% in acqua.
Il trattamento (da praticare prima della messa a dimora) si effettua in modo molto semplice, immergendo nella poltiglia bulbi tuberi e lasciandoveli per un tempo variabile da mezz'ora ad un'ora in modo che anche le parti più interne possano venire a contatto con l'anticrittogamico.

Dopo l'immersione e prima dell'interramento asciugare all'aria bulbi e tuberi.
Per la disinfezione di semenzai, terricci e terricciati in genere, si usano invece g. 250-300 innaffiando, il terreno subito dopo la semina o la messa a dimora delle piantine con 1 litro di poltiglia per m².

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Compatibilità

Il CLORIMID 50 è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), olii e zolfi.
La miscela con certi prodotti emulsionabili non è consigliabile. Il trattamento con CLORIMID 50 deve distare almeno 3 settimane da quello con olio minerale e con zolfo.

AVVERTENZE:
In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il CLORIMID 50 può risultare fitotossico su alcune cultivars di melo (Stark delicious - Winesap - Staymann - Renetta del Canada) e di pero (Buttirra d'Anyou - Buttirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna).

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 3294 del 27.11.79 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 25 - 10 - 1

3304

ETAZIN R

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI RAME E ZINEB

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono

Rame metallico (sotto forma di ossicloruro)	gr 32,5
ZINEB puro	gr 16
Disperdenti, bagnanti e inerti q.b. a	gr 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.

Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni.

In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

L'ETAZIN R è indicato nella lotta contro la peronospora della vite; Ticchiolatura del melo e del pero; Peronospora del pomodoro fino alla prima fioritura. Si usa a dosi varianti da gr 350 a 500 per ettolitro di acqua eseguendo i trattamenti alla distanza di 8-10 giorni l'uno dall'altro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA - NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità: l'ETAZIN R è miscibile con tutti i prodotti di comune impiego.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Varietà di pere sensibili allo ZINEB: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA

Su varietà di melo (*) e pero (**) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein Jonatham, Rome Beauty, Morgenduft Stayman Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana.

(**) Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Intervallo che deve essere rispettato fra l'ultimo trattamento e la raccolta: 28 giorni.

« Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. »

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. »

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. »

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a — CENTO (Ferrara) — Tel. 906207

Stabilimento di produzione:
SCAM S.r.l. - Via Bellaria n. 164 - MODENA

Reg. n. 3304 del 7/1/1980 del Ministero della Sanità

3321

PHYTOX RAME BLU

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO COLORATO

COMPOSIZIONE:	Zineb puro	gr. 16
	Rame metallico (sotto forma di Ossicloruro tetraramico)	g. 30
	Disperdenti, supporti e coadiuvanti	q.b. a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA — **CLASSE III**

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: Alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni.
In caso di ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazioni di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

CARATTERISTICHE: Il PHYTOX RAME BLU è un fungicida misto a base di Zineb e rame che trae la propria efficacia dalla razionale proporzione dei principi attivi, combatte la peronospora della vite, la ticchiolatura delle pomacee, la peronospora, alternariosi e septoriosi del pomodoro sino alla prima fioritura, la ruggine del garofano.

DIVIETO DI IMPIEGO: Divieto di impiego in serra; divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.

EPOCA DI APPLICAZIONE: Gli interventi si eseguono, analogamente ai comuni sali di rame, secondo i calendari di incubazione delle diverse malattie.

DOSI DI IMPIEGO:

— Pomacee (Ticchiolatura)	g. 300/400 per 100 litri di acqua
— Vite (contro le Peronospora)	g. 350/500 per 100 litri di acqua
— Pomodoro (contro la Peronospora, alternariosi e septoriosi solo fino alla prima fioritura)	g. 350/500 per 100 litri di acqua
— Garofano (contro la ruggine)	g. 350/500 per 100 litri di acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari a reazione neutra.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Su varietà di melo quali Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosr Mantovana, e di pero quali: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, Arnella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per i pesci.
- Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 28 giorni.
- **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione Ministero della Sanità n. 3321 del 10-10-1979

Prodotto nello Stabilimento CAFFARO S.p.A. di Adria Cavanella Po (RO)

DA NON VENDERSI SFUSO — **Peso Kg. 25**

3341

UTAZIN S CAFFARO

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere adesiva a base di zineb e zolfo

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Zineb (etilenbisditiocarbammato di zinco) puro	g 16
Zolfo puro (esente da Selenio)	g 12,5
Coformulanti	q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla umidità e calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: *L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).*
Terapia: *In caso di ingestione provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza, la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.*
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.
In caso di ingestione di Zineb può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in Centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

MODALITÁ E CAMPI D'IMPIEGO
Vite
Peronospora, Oidio . . . kg 20-30/ha
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)
Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi . . . kg 20-30/ha
Garofano
Ruggine . . . kg 20-30/ha

DISTRIBUIRE IL PRODOTTO UNIFORMEMENTE CON POLVERIZZATORI.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÁ
L'UTAZIN S CAFFARO è miscibile con i più comuni antiparassitari in polvere secca.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÁ : può arrecare danno alla varietà Sangiovese.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

S.p.A. - Milano

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 3341 del Ministero della Sanità del 20-11-1979

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO Kg**

3364

Fungicida cupro-organico in polvere bagnabile micronizzata per la difesa della vite, pomodoro, garofano. Si impiega in trattamenti liquidi contro la Peronospora della vite e le crittogame delle altre colture.

COMPOSIZIONE

- Rame metallo .... g. 30 (sotto forma di ossicloruro tetraramico)
- Zineb puro .... g. 13
- Coadiuvanti, coloranti ed inerti: q.b.a .... g. 100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano

Officina di Produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 3364 del 14.1.1980 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanze pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.
In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusione di sangue.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla dose variabile di g 350-500 per 100 litri di acqua. Irrorati con pompe a volume normale, sulle colture di seguito indicate:

Vite: contro la Peronospora

Pomodoro: solo fino alla prima fioritura: contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi.

Pomacee: contro la ticchiolatura del melo e del pero.

Garofano: contro la Ruggine
Le irrorazioni vanno effettuate secondo i consueti calendari dei trattamenti adottati per le poltiglie rameiche oppure alla prima comparsa delle malattie e ripetendo le applicazioni ad opportuni intervalli a seconda dell'andamento stagionale e dell'intensità delle infezioni da combattere. In caso di forti infezioni la dose maggiore può essere opportunamente aumentata.
Alla poltiglia del prodotto si possono aggiungere g. 200-400 di TIOSOL B (zolfo bagnabile) o g. 80-100 di TIOKOLL 80 (zolfo colloidale) per la lotta contemporanea contro tutte le forme di oidio o mal bianco.

Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto in poca acqua a parte ed aggiungere il tutto al totale quantitativo di acqua. Il prodotto è già neutro e pertanto non si deve aggiungere calce idrata.

Da non applicare con mezzi aerei.

Da non impiegare in serra.

Da non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità: alla poltiglia di prodotto possono essere associati tutti i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo ad eccezione delle sostanze alcaline quali polisolfuro e calce.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: su alcune cultivar di pero sensibili allo Zineb (Butirra Precoce Morettini, Conference, Curato, Principessa di Gonzaga, Zucchermanna, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona, Spadoncina, Scipiona, Coscia, Mora, Giardina, Spinacarpi, Armella S. Maria, Decana del Comizio, Abate Fètel). Il prodotto può dare luogo a manifestazioni fitotossiche e pertanto se ne sconsiglia l'uso; ciò vale pure per le seguenti varietà di Melo (Abbondanza - Belford -, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio) e di Pero (Abate Fètel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot,Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) durante il periodo vegetativo perché sensibili al rame.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere il trattamento 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO Peso Kg.

SIPCAM

3365

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Il DACOL-5-U P è un insetticida in polvere per trattamenti a secco. Il formulato possiede una persistenza all'aria di 15-20 giorni ed agisce contro i parassiti per contatto e per ingestione; possiede azione citotropica, questo consente al DACOL-5-U P di combattere anche i parassiti annidati e protetti.
Il DACOL-5-U P è attivo contro: **mosca dell'olivo; mosca della frutta e delle ciliege; mosca degli ortaggi** (aglio, asparago, carciofo, carota, fagiolo, fava, cipolla, pisello, pomodoro, sedano, spinacio); **tignola dell'olivo.**
Il DACOL-5-U P si impiega alla dose di 15-30 Kg di formulato tal quale ad ettaro per ogni trattamento. Il prodotto va distribuito uniformemente sulla vegetazione da difendere con apparecchi polverizzatori alle epoche indicate dagli schemi di difesa antiparassitaria in uso nelle diverse zone agrarie.
Il principio attivo contenuto nel DACOL-5-U P è solubile nell'acqua e non nei grassi. Per questo motivo, durante la lavorazione delle olive, esso - se presente in tracce -viene allontanato con le acque di vegetazione e non passa quindi nell'olio. Il prodotto inoltre non conferisce odori o sapori estranei ai frutti trattati.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il DACOL-5-U P è miscibile con tutti gli antiparassitari purchè siano anch'essi in polvere.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il DACOL 5-U P è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 25

Dacol-5-U P

Insetticida in polvere a base di Dimetoato per trattamenti a secco

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Dimetoato puro	g 4,7
Coformulanti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: *in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.*
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.*

AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni

caffaro S.p.A. - Milano

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)
Registrazione n. 3365 del Ministero della Sanità del 26-10-1979

CLASSE III

3382

Insetticida fosforganico

Composizione:
100 gr. di prodotto contengono:
gr. 19 di DIMETOATO (N-monometilammide dell'acido 0,0 dimetilditiofosforil acetico) puro
(« Rogor » brev. Montecatini N. 561701)
q. b. a 100 gr. di solventi, emulsionanti e coadiuvanti.
Contiene Xilolo e Cicloesanone.

ATTENZIONE

manipolare con prudenza

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

Usi fitofarmaci:
L' RL 20 è particolarmente adatto per la lotta contro i parassiti dell'olivo: Mosca, Tignola, Tripide, Punteruolo, Oziorrinco; contro: Mosca delle ciliege e delle frutta, Cemiostoma, Depressaria, Nottua del carciofo, Afidi, Tripidi, Tingidi, Psille.

Dosi e modalità d'impiego per 100 lt. d'acqua:
Mosca delle olive: 300 gr. nel periodo giugno-ottobre, sia come trattamento curativo che preventivo.
Tignola dell'olivo: 200-300 gr. contro le 3 generazioni, dal marzo al giugno.
Mosca delle ciliege: 100 gr. al cambiamento di colore del frutto.
Mosca delle frutta: 150 gr. per le albicocche, 250 gr. per le pesche, quando i frutti cominciano a prendere colore.
Depressaria del carciofo: 150 gr. da fine ottobre a fine novembre.
Cemiostoma: 150 gr. circa ai primi di giugno quando le mine hanno raggiunto il mezzo centimetro di diametro.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Non è compatibile con i pesticidi aventi reazione alcalina, per esempio poltiglia bordolese, polisolfuro di calcio, ecc.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
Non impiegare l' RL 20 in irrorazioni a basso volume sulle varietà di olivo: Coratina, Simona, Canino, Vernina, Marsella, Frantolo, Itrana, Bosana ed eventuali altre sensibili.
Non trattare gli albicocchi delle varietà Beccuccia ed Alessandrina, l'arancio amaro, i cedri, i limoni della varietà Interdonato ed il crisantemo.

Nocività:
Tossico per gli insetti utili: nocivo per gli animali domestici, i pesci, gli uccelli ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

S.p.A.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1
Officina di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A.
MONTALCINO fraz. TORRENIERI (SI) - Via Pian d'Asso

Registrazione Ministero della Sanità n. 3382 del 7-1-1980

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso 1 kg**

SARIAF S.p.A.

CLASSE III

3383

Insetticida fosforganico

Composizione:
100 gr. di prodotto contengono:
38 gr. di DIMETOATO (N-monometilammide dell'acido 0,0 dimetilditiofosforil acetico) puro
(« Rogor » brev. Montecatini N. 561701)
q. b. a 100 gr. di solventi, emulsionanti e coadiuvanti.
Contiene Xilolo e Cicloesanone.

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

Usi fitofarmaci:
L' RL 40 è particolarmente adatto per la lotta contro i parassiti dell'olivo: mosca (Dacus oleae), punteruolo (Coenorrhinus cribripennis), tignola (Prays oleaellus), tripide (Liothryps oleae), oziorrinco (Otiorrynchus); contro la mosca delle ciliege (Rhagoletis cerasi), la mosca delle frutta (Ceratitis capitata), il cemiostoma, la nottua del carciofo, gli afidi, tripidi, tingidi, psille.

Dosi e modalità d'impiego per 100 lt. d'acqua:
Mosca delle olive: 150 gr. nel periodo giugno-ottobre, sia come trattamento curativo che preventivo.
Tignola dell'olivo: 100-150 gr. contro le tre generazioni, dal marzo al giugno.
Mosca delle ciliege: 50 gr. al cambiamento di colore del frutto.
Mosca delle frutta: 75 gr. per le albicocche, 125 gr. per le pesche, quando i frutti cominciano a prendere colore.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Non è compatibile con i pesticidi aventi reazione alcalina, per esempio poltiglia bordolese, polisolfuro di calcio, ecc.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
Non impiegare l' RL 40 in irrorazioni a basso volume sulle varietà di olivo: Coratina, Simona, Canino, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana ed eventuali altre sensibili.
Non trattare gli albicocchi delle varietà Beccuccia ed Alessandrina, l'arancio amaro, i cedri, i limoni della varietà Interdonato ed il crisantemo.

Nocività:
Tossico per gli insetti utili: nocivo per gli animali domestici, i pesci, gli uccelli ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: **da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.**

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Officina di produzione e sede amministrativa:
FAENZA - Via S. Silvestro, 1

Registrazione Ministero della Sanità n. 3383 del 7-1-1980

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso 1 kg

SARIAF S.p.A.

3408

MANCAP

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile — **Fungicida organico per combattere le malattie crittogamiche delle pomacee, della vite e del pomodoro.**

Composizione — 100 grammi di prodotto contengono:

Mancozeb p.a. puro gr. 32
Captan (triclorometiltiotetraidroftalimmide) p.a. puro gr. 22,5
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio — Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

- *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
- *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
- *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico

SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA:

- In caso di ingestione
  Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;
- per l'irritazione della cute e delle mucose
  Lavaggio, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.
  Controindicate: alcool, olii e grassi.

Modalità e campi d'impiego — Dosi per 100 litri d'acqua:

Pomacee: contro la ticchiolatura g. 200.

Vite: per le uva da tavola contro la peronospora g. 300.

Pomodoro fino alla prima fioritura: contro peronospora, alternariosi, cladosporiosi e septoriosi g. 300-400.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON IMPIEGARE IN SERRA.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Preparazione della poltiglia — Impastare con poca acqua il MANCAP ed aggiungerlo mescolando fortemente alla quantità d'acqua necessaria per ottenere la concentrazione voluta.

Compatibilità — Il MANCAP è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese) e gli olii minerali. Non usarlo 3 settimane prima o dopo i trattamenti con olii.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità — Si sconsiglia l'impiego del prodotto su alcune varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentilona, Gentil Bianca, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna; nonché sulle seguenti varietà sensibili al Captano: pere - Butirra d'Anyoy, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna; melo - Stark Delicious, Winesap.

In miscela con Zolfo il Captano produce fitotossicità anche su: Starking (gruppo Delicious rosso), Stayman Winesap.

Rischi di nocività — Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 3408 del 7.1.80 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 10-5-25

3409

A-SPECIAN

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile Fungicida organico per combattere le principali malattie crittogamiche della vite, delle pomacee, delle colture orticole e floricole.

Composizione 100 grammi di prodotto contengono:

Zineb (etilenbisditiocarbammato di zinco) p.a. puro gr. 35
Captan (triclorometiltiotetraidroftalimmide) p.a. puro gr. 25
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
- *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
- *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
- *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
l'ingestione provoca nausea conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA:
- in caso di ingestione
  Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;
- per l'irritazione della cute e delle mucose
  Lavaggio, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.
  Controindicate: alcool, olii e grassi.

Modalità e campi d'impiego Dosi per 100 litri d'acqua:

Pomacee: trattamenti pre-florali, in fioritura e post-florali contro la ticchiolatura: g. 200.

Vite: per le uve da tavola contro la peronospora g. 300.

Pomodoro fino alla prima fioritura: contro peronospora, alternariosi, cladosporiosi e septoriosi g. 300-400.

Garofano: contro la ruggine g. 300.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
NON IMPIEGARE IN SERRA.
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Preparazione della poltiglia Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Compatibilità L'A-SPECIAN è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese) e gli olii minerali.
Non impiegare l'A-SPECIAN 2-3 settimane prima o dopo un trattamento con olii minerali.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità Si sconsiglia l'impiego su alcune varietà di pere sensibili allo Zineb, quali: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilone, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinocarpi, Zecchermanna; e sulle seguenti varietà sensibili al Captano: pere - Butirra d'Anyoy, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna; mele - Stark delicious, Winesap.

In miscela con Zolfo il Captano produce fitotossicità anche su: Starking (gruppo Delicious rosso), Stayman Winesap.

Rischi di nocività Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 3409 del 4.12.79 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 1

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3410

DIKAMON® 65

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile **Anticrittogamico contro la ticchiolatura delle pomacee.**

Composizione 100 grammi di prodotto contengono:

Mancozeb p.a. puro	gr. 52
Dinocap p.a. puro	gr. 6,4
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi	

Natura del rischio Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA:
— in caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;
— per l'irritazione della cute e delle mucose
Lavaggio, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.
Controindicate: alcool, olii e grassi.

Modalità e campi d'impiego Dosi per 100 litri d'acqua:
Pomacee: contro la ticchiolatura a partire dalla caduta dei petali in poi g. 250.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON IMPIEGARE IN SERRA.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Preparazione della poltiglia Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Compatibilità Il DIKAMON 65 è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione basica ed alcalina (Poltiglia bordolese, Polisolfuri), con Endosulfan, Promecarb, Carbofenothion, Ethion, Binapacryl, Dimeton-metile, Triclorfon, Olii minerali, T.M.T.D., Urea.
Per l'applicazione a piante di melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e prima della fioritura non deve essere miscelato con Parathion.
Avvertenze: Il DIKAMON 65 deve essere impiegato a distanza di 3 settimane dalla distribuzione di olii minerali e di qualunque formulato emulsionabile.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità Si sconsiglia l'impiego del prodotto su alcune varietà di pere sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
In condizioni ambientali particolari e su determinate varietà di melo sensibili al Dinocap il prodotto può causare delle piccole necrosi sulle foglie ed una leggera filloptosi.
ATTENZIONE: Il DIKAMON 65 non deve essere distribuito durante la fioritura.

Rischi di nocività Il prodotto è tossico per i pesci e per alcuni artropodi utili (Fito seidi, Anthocoris sp.).
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 3410 del 28.11.79 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 10 - 1

DU PONT
DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3467

Molinam® G.

Diserbante granulare per la lotta contro il Giavone delle risaie.
Il prodotto agisce sui semi dei giavoni (Panicum=Echinocloa spp.) dopo la germinazione, per assorbimento radicale e dell'epicotile.

COMPOSIZIONE

— Molinate puro .... g	7
— Coadiuvanti ed inerti: quanto basta a .... g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM - Milano

CLASSE III

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Officina di produzione:
DIACHEM - SpA
Via Tonale, 15 -
Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione n. 3467 del 14/1/1980 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega secondo la seguente metodologia:
— **pre-semina:** il terreno va lavorato secondo le normali regole, evitando che rimangano grosse zolle; si effettua la distribuzione del prodotto a mano o a macchina alle seguenti dosi:

— nei terreni leggeri	Kg. 50/ha
— nei terreni di medio impasto	Kg. 55/ha
— nei terreni pesanti, argillosi ed organici	Kg. 60/ha
— nei terreni torbosi, poiché il prodotto viene parzialmente assorbito o inattivato dalla sostanza organica, si consiglia di aumentare la dose a	Kg. 65-70/ha

Subito dopo l'impiego del prodotto, per evitarne l'evaporazione, si effettua l'incorporazione entro poche ore dal trattamento con erpici a dischi o rotanti o con due passaggi di erpici a denti. Laddove si effettua il livellamento del terreno (slottatura e pareggiatura) oppure dove si effettua la compressione della risaia (intasamento o pesta), la distribuzione del prodotto deve essere effettuata dopo queste operazioni eseguendo, se possibile, l'incorporazione del terreno con erpici.
Si effettua successivamente la normale inondazione della risaia, dopodiché si procede, subito o qualche giorno dopo, alla semina del riso, preferibilmente a spaglio anziché a righe.

— **post-emergenza:** l'epoca più frequente di impiego può andare dal giorno seguente la semina sino ad un massimo di 30-35 giorni dopo; generalmente si impiega da 5 a 25 giorni dopo la semina, anticipando soprattutto quando si deve combattere il giavone rosso.
Le dosi di impiego sono le stesse indicate per il trattamento di pre-semina.

Avvertenze: affinché il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che dopo il trattamento non si facciano asciutte per almeno 40 giorni e si mantenga un elevato livello dell'acqua, evitando comunque affioramenti del terreno; ciò per evitare la perdita per evaporazione del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto si usa da solo.

Fitotossicità: il prodotto è dannoso per le viti, gli ortaggi, i fruttiferi, ed i pioppi. Occorre evitare che la soluzione diserbante giunga a contatto con tali colture. Dopo l'impiego lavare accuratamente i recipienti che sono serviti per la distribuzione dell'erbicida, prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg

SIPCAM

3491

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

Erbicida liquido emulsionabile per la lotta contro le infestanti graminacee e dicotiledoni del frumento tenero e duro, dell'orzo, della segale e dell'erba medica da foraggio.

COMPOSIZIONE

Trifluralin puro		g 23,5
Linuron puro		g 11,75
Solventi ed emulsionanti	q.b. a	g 100

(Contiene xilolo)

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 3491 del 8.2.1980

® Marchio registrato.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il NEMINFEST è un diserbante residuale per applicazione al suolo che agisce sulle infestanti graminacee e dicotiledoni allo stadio di seme germinante o di piantula. Esso non è attivo sulle malerbe già sviluppate e profondamente radicate.
Effettuare l'intervento su terreno ben lavorato e privo di zollosità.
Dopo il trattamento il suolo non deve essere in alcun modo lavorato onde evitare l'annullamento dell'effetto erbicida.
Curare l'uniformità di distribuzione evitando di lasciare fallanze o di ripassare più volte sullo stesso posto.
Per l'irrorazione usare un'attrezzatura a bassa pressione (2,5-5 atmosfere) munita di agitatore al fine di evitare la sedimentazione del prodotto nel serbatoio. Preparare l'emulsione immediatamente prima dell'uso.
Il NEMINFEST va applicato per irrorazione dopo la semina o prima della emergenza della coltura, senza interramento.

Diserbo del frumento tenero e duro, dell'orzo e della segale a seme invernale. Le dosi d'impiego sono di 3-4 kg per ettaro diluiti in 300-800 litri di acqua. La dose superiore è indicata in caso di elevate temperature e nei terreni compatti, e l'inferiore in quelli sciolti. Non usare questo erbicida nei terreni con elevato contenuto di sostanza organica (superiore all'8%).
Per evitare danni alla coltura il seme deve essere incorporato almeno a 3 cm di profondità giacchè la selettività è di natura stratigrafica.

Il NEMINFEST è efficace contro le seguenti malerbe: Alopecurus myosuroides, A. pratensis (da seme), Apera spica venti, Bifora radians, Briza minor, Lolium multiflorum, L. perenne (da seme), Poa annua, Alchemilla arvensis, Anagallis arvensis, Arabidopsis thaliana, Atriplex patula, Capsella bursa-pastoris, Cardamine hirsuta, Cerastium spp., Chenopodium album, Fumaria officinalis, Juncus bufonius, Lamium spp., Lithospermum arvense, Matricaria spp., Myosotis arvensis, Myosurus minimum, Papaver spp., Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Sonchus asper, Specularia speculum, Spergula arvensis, Stellaria media, Thlaspi arvense, Valerianella rimosa, Veronica hederifolia, V. persica, Polygonum aviculare, P. convolvulus, Ranunculus sardous. Sono mediamente sensibili Avena spp., Galium aparine, Ranunculus arvensis, Viola tricolor.

Diserbo della erba medica da foraggio dalle malerbe a foglia larga e parzialmente dalle graminacee.
Kg/ha 3,5 nei terreni sciolti, 4 in quelli di medio impasto e 4,5 in quelli compatti, dispersi in 800-1000 litri d'acqua. L'applicazione può essere effettuata durante tutto il periodo invernale, ma allo scopo di selezionare le buone graminacee foraggere, è preferibile trattare subito, prima che abbiano inizio i ricacci della coltura.

Preparazione dell'emulsione
Versare il prodotto nella quantità di acqua necessaria, agitando con cura.

ISTRUZIONI SPECIALI

Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Trifluralin in miscela con Linuron e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalate, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio.
Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.), nella primavera successiva all'applicazione del prodotto.
La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Non sono consigliabili miscele con altri antiparassitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto, per l'erba medica.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, Ogni uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione
Irritante per la cute. L'ingestione può provocare bruciori gastroesofagei, vomito, diarrea, subittero, albuminuria ed ematuria.

Consigli terapeutici
Per le dermatosi pomate cortisoniche od antistaminiche. Non è consigliabile la lavanda gastrica.
Si consigliano fleboclisi glucosate, potassio, epato-protettori.

AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni.

3499

Molinam®

Diserbante liquido emulsionabile per la lotta contro il Giavone delle risaie.
Il prodotto agisce sui semi dei giavoni (Panicum=Echinocloa spp.) dopo la germinazione, per assorbimento radicale e dell'epicotile.

COMPOSIZIONE

- Molinate puro	g	70
- Coadiuvanti ed inerti: quanto basta a	g	100
contiene Xilolo		

(R) Marchio registrato SIPCAM - Milano

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di Produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

Registrazione n. 3499 del 7/2/1980 Ministero della Sanità

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchiti, effetto Antabuse (in casi di assunzione di alcool), irritazione della cute e delle mucose in caso di contatto (dermatiti, congiuntiviti, faringiti, ecc.) nonché manifestazioni allergiche cutanee e bronchiali.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Molti dei sintomi tossici possono essere provocati dai solventi organici presenti nel formulato; pertanto la terapia dove tener conto anche dei danni causati da questi.
I solventi possono provocare gravi lesioni epatiche, renali e a carico del sistema nervoso centrale e periferico (particolarmente i distillati del petrolio possono causare polmoniti chimiche); tutte queste forme richiedono idonee terapie sintomatiche.
Il vomito non va provocato. Somministrare grandi quantità di acqua.
Se il paziente vomita spontaneamente, somministrare ancora liquidi, dopo averlo intubato.
Se il paziente é incosciente non somministrare nulla per bocca.
Ricoverare il paziente in un centro di rianimazione. La lavanda gastrica a paziente intubato, va praticata con una soluzione di 200-300 ml di acqua in cui siano stati sciolti 30-60 g di carbone attivo. Purganti salini. Terapie sintomatiche mirate. Per le manifestazioni cutanee e mucose rimuovere gli abiti contaminati, lavaggio con abbondante acqua della pelle e degli occhi per almeno quindici minuti, pomate oftalmiche e dermatologiche.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega secondo la seguente metodologia:
— **pre-semina**: il terreno va lavorato secondo le normali regole, evitando che rimangano grosse zolle; si effettua la distribuzione del prodotto a mano o a macchina alle seguenti dosi:

— nei terreni di medio impasto	Kg. 5,5/ha
— nei terreni leggeri	Kg. 5/ha
— nei terreni pesanti, argillosi ed organici	Kg. 6/ha
— nei terreni torbosi, poiché il prodotto viene parzialmente assorbito o inattivato dalla sostanza organica, si consiglia di aumentare la dose a	Kg. 6,5-7/ha

La prestabilita dose di prodotto si diluisce in 3-5 hl di acqua e la poltiglia si distribuisce uniformemente sulla superficie del terreno con le comuni irroratrici.
Subito dopo l'impiego del prodotto, per evitarne l'evaporazione, si effettua l'incorporazione entro poche ore dal trattamento con erpici a dischi o rotanti o con due passaggi di erpici a denti. Laddove si effettua il livellamento del terreno (slottatura e pareggiatura) oppure dove si effettua la compressione della risaia (intasamento, pesto o pesta), la distribuzione del prodotto deve essere effettuata dopo queste operazioni eseguendo, se possibile, l'incorporazione nel terreno con erpici.
Si effettua successivamente la normale inondazione della risaia, dopodiché si procede, subito o qualche giorno dopo, alla semina del riso, preferibilmente a spaglio anziché a righe.
— **post-emergenza**: l'epoca più frequente di impiego può andare dal giorno seguente la semina sino ad un massimo di 30-35 giorni dopo; generalmente si impiega da 5 a 25 giorni dopo la semina, anticipando soprattutto quando si deve combattere il giavone rosso. Le dosi di impiego sono le stesse indicate per il trattamento di pre-semina.

Preparazione della poltiglia: diluire la prestabilita dose di prodotto direttamente nel volume di acqua desiderato agitando con cura.

Avvertenze: affinché il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che dopo il trattamento non si facciano asciutte per almeno 40 giorni e si mantenga un elevato livello dell'acqua, evitando comunque affioramenti del terreno; ciò per evitare la perdita per evaporazione del prodotto.
Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine.
Non usare dosi superiori a quelle prescritte.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i comuni diserbanti ormonici.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

Fitotossicità: il prodotto è dannoso per le viti, gli ortaggi, i fruttiferi ed i pioppi. Occorre evitare che la soluzione diserbante giunga a contatto con tali colture. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e per la distribuzione della poltiglia erbicida prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

3515

CHILDION®

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Acaricida emulsionabile — Specifico per la lotta contro gli acari (Ragno rosso, Ragno giallo) nocivi alle colture frutticole, viticole, floreali, ornamentali.

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Dicofol puro g 13,60
Tetradifon puro g 5,64
Emulsionanti, tensioattivi e solventi q.b. a g 100
Contiene XILOLO

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione:
Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso.
Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio). Barbiturici (luminal 0,1 - 0,2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni
Morfina e per evitare la fibrillazione ventricolare l'adrenalina, efedrina e alcool. Data la liposolubilità di questi prodotti hanno controindicazione assoluta latte, olio di ricino e grassi in genere, perchè aggraverebbero la situazione facilitandone l'assorbimento.

Caratteristiche
Il CHILDION® per l'azione combinata delle materie attive contenute, offre le seguenti caratteristiche:
- Un'azione contro tutte le forme mobili degli acari.
- Una lunga azione ovolarvicida.
- Un potere penetrante che consente di distruggere le uova e le larve anche sulle lamine fogliari opposte a quelle trattate.

Modalità di impiego
Dosi per 100 litri di acqua
Frutticoltura (melo, pero): dose normale d'impiego cc 200-250; contro i ragnetti rossi (Panonychus ulmi e Tetranychus urticae) nei periodi di infestazione iniziale cc 250; contro l'Eriofide del pero ed altri acari di particolare resistenza cc 250 - 300.

Viticoltura: contro i ragnetti rossi e contro il ragno giallo della vite cc 250.

Colture orticole e floricole: contro gli acari fitofagi (ragnetti rossi, eriofidi, tarsonemidi): cc 250.

Come tutti gli acaricidi di contatto, il CHILDION® si deve irrorare con la massima cura bagnando bene e sufficientemente le piante.
Per l'efficacia iniziale e la lunga azione residua, il prodotto si può usare in qualsiasi fase di attacco degli acari.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Preparazione della poltiglia
Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità di acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

Compatibilità
Il CHILDION® è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese). La miscela con certi prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

Registrazione N 3515 del 10.3.80 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto lt. 10 - 5 - 1

3518

CLORTOSIP(R)

Fungicida organico in polvere bagnabile ad ampio spettro di efficacia e con alta persistenza di azione, attivo per la difesa di Ortaggi, Patata, Tabacco, Melo, Pero, Drupacee, Vite, Fiori e Colture ornamentali.
Si impiega in trattamenti liquidi contro: Botrytis, Peronospora, Ticchiolatura, Alternaria, Septoria, Antracnosi delle colture orticole, floreali e ornamentali; Ticchiolatura del Melo e Pero; Botrytis e Sclerotinia, Rhizopus, Gloeosporium, Penicillium delle drupacee; Peronospora e Botrytis della vite.

COMPOSIZIONE

— Clorotalonil puro	g	75
— Coadiuvanti ed inerti:quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM—Milano

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE IV

Registrazione n. 3518 del 10/3/1980 Ministero della Sanità

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate per 100 litri di acqua distribuiti con pompe a volume normale (pari a 600—1000 l/ha di colture erbacee, secondo il loro sviluppo vegetativo).

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA: contro Peronospora, Septoria, Ticchiolatura, Alternaria, Antracnosi e Botrytis: g 150-200.

CETRIOLO, COCOMERO, MELONE: contro Antracnosi e Botrytis: g 150.

SEDANO, CAROTA: contro Alternaria e Septoria: g 150-200

COLTURE FLORICOLE (**Rosa, Garofano, Gladiolo e Crisantemo**) **e ORNAMENTALI** : contro Botrytis, Peronospora, Ticchiolatura, Alternaria, Septoria: g 150-250

PATATA: contro Peronospora e Alternaria: g 150-200 (= 1—1,5 Kg/ha).

TABACCO: contro la Peronospora: g 200-250 (= 1,5-2 Kg/ha).

MELO, PERO : contro la Ticchiolatura : g 100-150

DRUPACEE : in trattamenti in vegetazione, contro Botrytis, Sclerotinia, Rhizopus, Gloeosporium, Penicillium: g 150-200; in trattamenti pre-raccolta: g 150-200.

VITE : contro la Peronospora e la Botrytis: g 150 (aggiungere Zolfo bagnabile od altro antioidico per combattere anche tale malattia).

Per tutti gli impieghi sopra indicati, intervenire principalmente con trattamenti preventivi secondo i normali calendari dei trattamenti.

Preparazione della poltiglia: stemperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in polvere bagnabile di uso primaverile-estivo eccezione fatta per le miscele alcaline come Poltiglia bordolese e Polisolfuri.
Qualora si desiderasse effettuare miscele con liquidi emulsionabili,normalmente sconsigliate, controllare la compatibilità degli stessi con prove preliminari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: stante l'elevato numero di varietà delle specie orticole, floreali e frutticole si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici, prima di passare al trattamento di superfici più ampie.
Non impiegare su uve bianche, specie da tavola.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO 1 Kg.

3532

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Antiperonosporico per vite, tabacco, pomodoro e patata

Composizione:
gr 100 di prodotto contengono
gr 4,2 di Cymoxanil puro
gr. 39,75 di Rame puro
Sostanze inerti quanto basta a 100

® Marchio registrato E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
— Conservare la confezione ben chiusa
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
— Non operare contro vento
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il CURZATE R è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata, del pomodoro e del tabacco
Il CURZATE R agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Per evitare interferenze nella fecondazione o rallentamenti dello sviluppo vegetativo, si consiglia di non applicare il CURZATE R in concomitanza con la fioritura. In tale periodo sono consigliate le miscele di CURZATE, con ZINEB, con MANCOZEB, con FOLPET

Stabilimento di produzione
AMONN Filochimica SpA
Stabilimento di Bolzano · Via Siemens 12

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A.
20093 COLOGNO MONZESE (MI) · Via A. Volta 16

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di CURZATE R in poca acqua, indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione

MODALITÁ D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare gr 200-300 di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino al persistere delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura
Peronospora della patata e pomodoro: usare gr 300 di prodotto ogni 100 litri d'acqua

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

COMPATIBILITÁ

Il CURZATE R è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida
Si sconsiglia di usare il CURZATE R in associazione ad antiparassitari a reazione alcalina

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

NOCIVITÁ

Il prodotto è tossico per i pesci

ATTENZIONE

Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO.

Registrazione n. 3532 Ministero Sanità del 20.2.1980

Contenuto netto Kg. 1

3554

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

Antiperonosporico per vite, tabacco, pomodoro e patata

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 8,4 di Cymoxanil puro
gr. 63,99 di Folpet puro
Sostanze inerti quanto basta a 100.

® Marchio registrato E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastro esofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua), digitale.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il CURZATE F è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata, del pomodoro e del tabacco.
Il CURZATE F agisce sia penetrando nella foglia che per contatto diretto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.
Il CURZATE F può essere impiegato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione non producendo fenomeni di fitotossicità o rallentamenti e riduzioni vegetativi.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di CURZATE F in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 100-150 gr. di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti preventivi non appena la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire per il resto della stagione.
Peronospora della patata e del pomodoro: usare 100 gr. di prodotto per 100 lt. d'acqua.
Peronospora del tabacco: usare 150-180 gr. di prodotto per 100 litri d'acqua.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

COMPATIBILITÀ

Non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco.
Il CURZATE F è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra e acida.
Si sconsiglia di usare il CURZATE F in associazione a prodotti con reazione alcalina ed olii minerali. I trattamenti con CURZATE F devono essere distanziati di almeno 20 giorni dai trattamenti con prodotti a base di olii minerali e prodotti a base di zolfo.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto per le uve da tavola, patate, pomodoro, tabacco.
Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

ATTENZIONE

Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Prodotto dalla E.I. du Pont de Nemours & Co (Inc.)
Wilmington, Delaware, U.S.A.

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A.
20093 COLOGNO MONZESE (MI) - Via A. Volta, 16

Registrazione n. 3554 Ministero Sanità del 20.2.1980

Contenuto netto Kg. 1

3555

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

CURZATE® M

Antiperonosporico per vite, tabacco, pomodoro

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono
gr. 4 di Cymoxanil puro
gr. 40 di Mancozeb puro
Sostanze inerti quanto basta a 100

® Marchio registrato E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

turbe

Sintomi di intossicazione:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, tube nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.)
Terapia:
Nei casi gravi ricovero urgente nei centri di rianimazione. Negli altri casi, se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni:
Alcool, olii, grassi.
Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
— Conservare in luogo fresco e asciutto lontano dall'umidità e dal calore
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta
— Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

TEMPO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Stabilimento di produzione:
AMONN Filochimica SpA
Stabilimento di Bolzano - Via Siemens 12

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A.
20093 COLOGNO MONZESE (MI) - Via A. Volta, 16

CARATTERISTICHE

Il CURZATE M è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite, del tabacco e solo sino alla prima fioritura del pomodoro
Il CURZATE M agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti Il CURZATE M può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di CURZATE M in poca acqua, indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione

MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 200-300 gr. di prodotto ogni 100 litri d'acqua I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia
Peronospora del pomodoro: solo sino alla prima fioritura usare 250-300 gr. di prodotto ogni 100 litri d'acqua Usare la dose di 300-350 gr. ogni 100 litri di acqua in presenza di attacchi di Peronospora e di Alternaria
Peronospora del tabacco: usare 300-350 gr. di prodotto ogni 100 litri di acqua Usare la dose più alta in situazione di forte attacco su varietà particolarmente sensibili

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

DIVIETO DI IMPIEGO

— Divieto d'impiego in serra.
— Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITÀ

Il CURZATE M è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida
Si sconsiglia di usare il CURZATE M in associazione a prodotti con reazione alcalina

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta
Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici ed il bestiame

ATTENZIONE

Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Registrazione n. 3555 Ministero Sanità del 20.2.1980

Contenuto netto Kg. 1

3591

CHILDION® E.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Acaricida emulsionabile — Specifico per la lotta contro gli acari (Ragno rosso, Ragno giallo) nocivi alle colture frutticole, viticole, floreali, ornamentali.

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:
Dicofol puro g 20,40
Tetradifon puro g 7,50
Emulsionanti, tensioattivi e solventi q.b. a g 100
Contiene XILOLO

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti o bevande o corsi di acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione:
Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso.
Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio). Barbiturici (luminal 0,1 - 0,2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni

Morfina e per evitare la fibrillazione ventricolare l'adrenalina, efedrina e alcool. Data la liposolubilità di questi prodotti hanno controindicazione assoluta latte, olio di ricino e grassi in genere, perché aggraverebbero la situazione facilitandone l'assorbimento.

Caratteristiche

L'efficacia iniziale e la persistenza dei componenti attivi del CHILDION® E., che si sono già affermati nella pratica con pieno successo, fanno di questo prodotto un acaricida di fiducia.
Il CHILDION® E. infatti, per l'azione combinata delle materie attive contenute, offre le seguenti vantaggiose caratteristiche:
- Un'azione contro tutte le forme mobili degli acari.
- Una lunga azione ovolarvicida.
- Un potere penetrante che consente di distruggere le uova e le larve anche sulle lamine fogliari opposte a quelle trattate.

Modalità di impiego

Dosi per 100 litri di acqua
Frutticoltura (melo, pero): dose normale di impiego cc 200, contro i Ragnetti rossi (Panonychus ulmi e Tetranychus urticae) nei periodi di infestazione iniziale cc 200; contro l'Eriofide del pero ed altri acari di particolare resistenza cc 250.

Viticoltura: contro i ragnetti rossi e contro il ragno giallo della vite: cc 200 - 250.

Colture orticole e floricole: contro gli acari fitofagi (Ragnetti rossi, eriofidi, tarsonemidi): cc 200 - 250.

Come tutti gli acaricidi di contatto il CHILDION® E. si deve irrorare con la massima cura bagnando bene e sufficientemente le piante.
Per l'efficacia iniziale e la lunga azione residua, il prodotto si può usare in qualsiasi fase di attacco degli acari.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Preparazione della poltiglia

Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità di acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

Compatibilità

Il CHILDION® E. è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese). La miscela con certi prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 3591 del 4.4.80 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto lt. 1-5

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3602

Acaricida liquido emulsionabile per la difesa di vite, agrumi, fragola, melo, pero, pesco, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo, noce, nocciolo, pomodoro, peperone, insalate, cavoli e cavolfiore, spinacio, bietole da orto, legumi da granella, fagiolino, carota, sedano, finocchio, prezzemolo, cipolla, aglio, porro, carciofo, cetriolo, melone, cocomero, fiori, colture ornamentali, vivai.

Si impiega per trattamenti liquidi contro adulti, larve ed uova di ragnetti rossi ed acari delle colture indicate in etichetta e del ragnetto giallo della vite.

COMPOSIZIONE	
— Dicofol puro	g. 16
— Tetradifon puro	g. 6
— Coadiuvanti e solventi quanto basta a	g. 100
contiene Xilolo	

® Marchio registrato SIPCAM - Milano

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano

Officina di Produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 3602 del 4/4/1980 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gl' indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:

vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Consigli terapeutici:

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g 25 di solfato di sodio).
Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.
Barbiturici (Luminal 0,1 - 0,2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari, fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni: la morfina e l'alcool e, per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla dose normale di g. 200 per 100 lt. di acqua, irrorati con pompe a volume normale; in caso di gravi infestazioni e per combattere gli acari più resistenti la dose può essere opportunamente aumentata.
Si impiega comunemente durante la stagione primaverile-estiva e comunque quando si ha necessità di combattere i parassiti.

Preparazione della poltiglia: versare la prestabilita dose di prodotto direttamente nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci di impiego primaverile-estivo ad eccezione di quelli alcalini quali poltiglia bordolese, calce.
Volendo associare FRUTTENE, TMTD 50 SIPCAM, approntare queste poltiglie aggiungendo g. 50 di BAGNANTE EMULSOL o di Bagnante Antischiuma "S" prima di versare il KT 22.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto è fitotossico per la melanzana.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 1

3603

Caratteristiche: erbicida di pre-emergenza ad azione antigerminello e per assorbimento radicale.

Infestanti combattute: mono e dicotiledoni annuali quali ad esempio: Poa, Agrostis, Alopecurus, Lolium, Apera, Fumaria, Papavero, Raphanus, Sonchus, Veronica, Stellaria, Matricaria, Ranunculus, Myosotis, Sinapis, Polygonum, Cerastium, Capsella, Chenopodium, Solanum, Anagallide, Lamium, Spergola, Thlaspi.

Colture protette, dosi d'impiego ed epoche d'impiego:
- — **Cereali invernali** (frumento duro e tenero, orzo, segale) lt. 3-4/Ha in 400-800 litri d'acqua. Eseguire il trattamento dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura.
- — **Carciofo** lt. 3-4/Ha in 400-800 litri d'acqua. Eseguire il trattamento in primavera od autunno, dopo un'accurata lavorazione del terreno.

Modalità d'impiego: livellare e sminuzzare accuratamente il terreno e distribuire il prodotto con la massima uniformità su tutta la superficie da diserbare. Non applicare il prodotto su terreni torbosi o troppo ricchi di sostanza organica. Non incorporare il prodotto nel terreno.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: dato l'ampio spettro d'azione nei confronti delle infestanti, non si ritiene utile miscelarlo con altri erbicidi. **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il TRINULAN 12 può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del TRINULAN 12 e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio. Non seminare barbabietola da zucchero, da foraggio, da orto ecc. nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

Sospendere i trattamenti 60 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

TRINULAN® 12

ERBICIDA PRE-EMERGENZA PER CEREALI

III CLASSE

Composizione:	
TRIFLURALIN puro	gr. 23,50
LINURON puro	gr. 11,75
Coformulanti . . . . q.b. a	gr. 100,00

• contiene xilolo e cicloesanone •

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61/2 - Telex I 511046

Registrazione N. 3603
del 28-1-1981
Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso, nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

® Marchio depositato della
ELI LILLY & Co.
Indianapolis/Indiana
Divisione ELANCO

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bologna)

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici ● Conservare la confezione ben chiusa ● Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto ● Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua ● Non operare contro vento ● Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti ● Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Irritante per la cute. L'ingestione può provocare bruciori gastroesofagei, vomito, diarrea, subittero, albuminuria ed ematuria.

Terapia: *per le dermatosi pomate cortisoniche od antistaminiche. Non è consigliabile la lavanda gastrica. Si consigliano fleboclisi glucosate, potassio, epatoprotettori.*

DA NON VENDERSI SFUSO

Litri

3613

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia

ROHM AND HAAS ITALIA S.P.A.

Fungicida antioidico

COMPOSIZIONE: ogni 100 gr. di prodotto contengono:

Principio attivo:
DINOCAP tecnico - costituito da 78% di Dinitro (1-metil-eptil) fenil crotonato, e dal 22% di altri prodotti di reazione, principalmente Dinitro (1-metil-eptil) fenolo . . . gr. 25

Sostanze inerti e coadiuvanti q.b. a gr. 100

Classe III'

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.

Sintomi di intossicazione
Sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertemia. Colorazione gialla delle sclere. La morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

Consigli terapeutici
Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5% - Emetici e catartici se il paziente è cosciente - Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione - Combattere la ipertemia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri di acqua fredda. Trasfusione o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione - Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale - Ossigeno, respirazione artificiale.
Controindicazione: atropina.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il KARATHANE FN è un prodotto a formulazione migliorata che combatte l'oidio con possibilità contro i ragnetti che attaccano i fruttiferi, la vite, gli ortaggi e le piante ornamentali. Contro l'oidio svolge contemporaneamente attività **preventiva, curativa ed eradicante**, anche a temperature relativamente basse.

DOSI ED EPOCHE DEI TRATTAMENTI
Melo, Pero - Su varietà molto sensibili all'oidio e nei frutteti già infettati, usare da 100 a 120 grammi di KARATHANE FN per 100 litri di acqua, iniziando i trattamenti prima della fioritura (mazzetti o bottoni rosa) e continuando ad intervalli di 7-14 giorni fino alla fine dell'accrescimento dei rametti. Dopo tale stadio vegetativo riprendere i trattamenti qualora la malattia riappaia. Nei frutteti attaccati dall'oidio per la prima volta usare da 90 a 120 grammi di prodotto per 2-4 trattamenti ad intervalli di 6-7 giorni. Assicurarsi che le parti terminali infette siano accuratamente bagnate dalla soluzione fungicida.

Pesco, Albicocco - Sul pesco, per la difesa del frutto dell'oidio, effettuare 3-4 trattamenti a partire della scamiciatura ad intervalli di 7-8 giorni impiegando 80-120 grammi per 100 litri di acqua; riprendere i trattamenti se sarà necessario per la difesa delle foglie.
Su albicocco trattare alla stessa dose quando il frutto ha la grossezza di una nocciola e ripetere 10-15 giorni dopo, all'occorrenza effettuare una terza applicazione. Usare le dosi più elevate nei trattamenti primaverili.

Vite - Impiegare da 90 a 120 grammi di prodotto per ettolitro. La dose più elevata è da riservarsi ai trattamenti prefiorali e curativi. Per combattere anche la peronospora, miscelare il KARATHANE FN con il DITHANE (R) Bleu o altro fungicida acuprico. Il KARATHANE FN non modifica assolutamente le qualità organolettiche del vino.

Ortaggi - Contro l'oidio dei cetrioli, zucche, meloni, anguria, del carciofo, della carota, del cardo, delle insalate, coltivati **in pieno campo** impiegare 60-100 grammi di prodotto per 100 litri di acqua trattando alla prima comparsa della malattia e intervallando i trattamenti di 7-10 giorni. Sulle cucurbitacee allevate **sotto serra** usare da 30 a 60 grammi di KARATHANE FN intervallando i trattamenti di 5-7 giorni.

Tabacco - Per la lotta contro l'oidio impiegare 60-100 grammi per ettolitro di acqua, iniziando alla prima comparsa della malattia e continuando ogni 8-10 giorni o secondo necessità.

Rose
- **In serra**: al primo apparire dell'oidio trattare con 30-60 grammi di KARATHANE FN per 100 litri di acqua e ripetere ad intervalli di 5-7 giorni o secondo la necessità. Usare le dosi inferiori e applicare, con precauzione quando la temperatura si avvicina ai 30°C.
- **In piena aria**: impiegare il KARATHANE FN alla dose di 60-100 grammi per 100 litri di acqua aggiungendo, se necessario, DITHANE ® M-45 per combattere la ruggine o altre malattie fungine. Iniziare i trattamenti al primo apparire dell'oidio e ripetere ogni 3-5 giorni, avendo cura di bagnare accuratamente le piante e di irrorare anche la pagina inferiore delle foglie.

Fiori - In particolare Aster, Begonia, Crisantemo, Dalia, ed altri fiori, impiegare in serra da 30 a 50 grammi ed in pieno campo da 50 a 80 grammi di KARATHANE FN per ettolitro di acqua. Iniziare il trattamento all'apparire dell'oidio e ripetere ogni 7-10 giorni o secondo necessità.

Vivai di fruttiferi e piante ornamentali - Impiegare 90-120 grammi di KARATHANE FN per ettolitro di acqua alla schiusura delle gemme o al primo comparire della malattia.

Nota - Per il successo nella lotta contro l'oidio è indispensabile bagnare accuratamente il micelio del fungo che forma un feltro bianco sulla vegetazione. Al fine di ottenere una buona penetrazione della soluzione in tale feltro e una perfetta copertura degli organi trattati, si consiglia di usare elevati quantitativi di acqua e un buon bagnante quale il TRITON ® B-1956 alla dose di 40-50 grammi per ettolitro di soluzione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità - Il KARATHANE FN è compatibile con quasi tutti i fungicidi ed insetticidi di uso comune. Può essere usato insieme ai DITHANE ® M-45, DITHANE ® Z-78, DITHANE (R) Bleu i quali agiscono contro la ticchiolatura, la peronospora, le ruggini.
Il KARATHANE FN non è miscibile con formulati a reazione basica od alcalina (es. Poltiglia bordolese e polisolfuri), con oli minerali (estivi ed invernali), con formulati oleosi (Carbophenothion, Parathion) e Binapacryl. E' miscibile invece con cautela con Urea e, in quanto possono verificarsi fenomeni di flocculazione fitotossici, con: Endosulfan, Ethion, Chinomethionate, Dicloran, Zolfo. Per l'applicazione sul melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e la fioritura, usare il Parathione separatamente. Nel caso di impiego di oli non trattare con KARATHANE FN a distanza inferiore di tre settimane.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità - Non impiegare con temperature superiori a 32°C. Su cultivar di uve sensibili quali Nebiolo, Schiava e Traminer, impiegare i dosaggi più bassi.

Rischio di nocività - E' tossico per alcuni artropodi utili (Fitoseidi, Anthocoris sp.) e per i pesci.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta: Cucurbitacee 7 giorni - altre colture 20 giorni.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRODOTTO DA:

ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

Registrazione Ministero Sanità N. 3613 del 15.9.1980

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO NETTO KG.

3615

KARATHANE® WD

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia

Fungicida antioidico

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:

Principio attivo:
Dinocap-puro . . . . gr. 25,00

Sostanze inerti e coadiuvanti q.b. a gr. 100

Classe III'

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.

Sintomi di intossicazione
Sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psicomotoria, techicardia, dispnea notevole ipertemia. Colorazione gialla delle sclere. La morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

Consigli terapeutici
Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5% - Emetici e catartici se il paziente è cosciente - Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione - Combattere la ipertemia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri di acqua fredda. Trasfusione o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso di ipotensione - Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale - Ossigeno, respirazione artificiale.
Controindicazione: atropina.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il KARATHANE WD è un prodotto che combatte l'oidio con possibilità contro i ragnetti rossi, gialli, ecc. che attaccano i fruttiferi, la vite, gli ortaggi e le piante ornamentali. Contro l'oidio svolge contemporaneamente attività preventiva, curativa, ed eradicante, anche a temperature relativamente basse.

DOSI ED EPOCHE DEI TRATTAMENTI

Melo, Pero - Su varietà molto sensibili all'oidio e nei frutteti già infestati, usare da 100 a 120 grammi di KARATHANE WD per 100 litri di acqua iniziando i trattamenti prima della fioritura (mazzetti fiorali o bottoni rosa) e continuando ad intervalli di 7-14 giorni fino alla fine dell'accrescimento dei rametti. Dopo tale stadio vegetativo riprendere i trattamenti qualora la malattia riappaia. Nei frutteti attaccati dall'oidio per la prima volta usare da 90 a 120 grammi di prodotto per 3-4 trattamenti ad intervalli di 6-7 giorni. Assicurarsi che le parti terminali infette siano accuratamente bagnate dalla soluzione fungicida.

Pesco, Albicocco - Sul pesco, per la difesa del frutto dall'oidio, effettuare 3-4 trattamenti a partire dalla scamiciatura ad intervalli di 7-8 giorni impiegando 80-120 grammi per 100 litri di acqua, riprendere i trattamenti se sarà necessario per la difesa delle foglie.
Su albicocco trattare alla stessa dose quando il frutto ha la grossezza di una nocciola e ripetere 10-15 giorni dopo; all'occorrenza effettuare una terza applicazione. Usare le dosi più elevate nei trattamenti primaverili.

Vite - Impiegare da 90 a 120 grammi di prodotto per ettolitro cominciando i trattamenti all'inizio dell'allungamento del germoglio o alla comparsa della malattia. La dose più elevata è da riservarsi ai trattamenti prefiorali e curativi. Per combattere anche la peronospora, miscelare il KARATHANE WD con il DITHANE® Bleu o altro fungicida acuprico. Il KARATHANE WD non modifica assolutamente le qualità organolettiche del vino.

Ortaggi - Contro l'oidio dei cetrioli, zucche, meloni, anguria, del carciofo, della carota, del cardo, delle insalate, coltivati **in pieno campo** impiegare 60-100 grammi di prodotto per 100 litri di acqua trattando alla prima comparsa della malattia e intervallando i trattamenti di 7-10 giorni. Sulle cucurbitacee allevate **sotto serra** usare da 30 a 60 grammi di KARATHANE WD intervallando i trattamenti di 5-7 giorni.

Tabacco - Per la lotta contro l'oidio impiegare 60-100 grammi per ettolitro di acqua, iniziando alla prima comparsa della malattia e continuando ogni 8-10 giorni o secondo necessità.

Rose

- **In serra:** al primo apparire dell'oidio trattare con 40-60 grammi di KARATHANE WD per 100 litri di acqua e ripetere ad intervalli di 5-7 giorni o secondo la necessità. Usare le dosi inferiori e applicare con precauzione quando la temperatura si avvicina ai 30°C.
- **In piena aria:** impiegare il KARATHANE WD alla dose di 60-100 grammi per 100 litri di acqua aggiungendo, se necessario, DITHANE M-45 per combattere la ruggine o altre malattie fungine. Iniziare i trattamenti al primo apparire dell'oidio e ripetere ogni 3-5 giorni, avendo cura di bagnare accuratamente le piante e di irrorare anche la pagina inferiore delle foglie.

Fiori - In particolare Aster, Begonia, Crisantemo, Dalia, ed altri fiori, impiegare in serra da 30 a 50 grammi ed in pieno campo da 50 a 80 grammi di KARATHANE WD per ettolitro di acqua. Iniziare il trattamento all'apparire dell'oidio e ripetere ogni 7-10 giorni o secondo necessità.

Vivai di fruttiferi e piante ornamentali - Impiegare 90-120 grammi di KARATHANE WD per ettolitro di acqua alla schiusura delle gemme o al primo comparire della malattia.

Nota - Per il successo nella lotta contro l'oidio è indispensabile bagnare accuratamente il micelio del fungo che forma un feltro bianco sulla vegetazione. Al fine di ottenere una buona penetrazione della soluzione in tale feltro e una perfetta copertura degli organi trattati, si consiglia di usare elevati quantitativi di acqua e un buon bagnante quale il TRITON® B-1956 alla dose di 40-50 grammi per ettolitro di soluzione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità - Il KARATHANE WD è compatibile con quasi tutti i fungicidi ed insetticidi di uso comune. Può essere usato insieme al DITHANE® M-45 e al DITHANE® Bleu i quali agiscono contro la ticchiolatura, le peronospora, le ruggini.
Il KARATHANE WD non è miscibile con formulati a reazione basica od alcalina (es. Poltiglia bordolese e polisolfuri), con oli minerali (estivi ed invernali), con formulati oleosi (Carbophenothion, Parathion) e Binapacryl.
E' miscibile invece con cautela con Urea e, in quanto possono verificarsi fenomeni di flocculazione fitotossici, con: Endosulfan, Ethion, Chinomethionate, Dicloran, Zolfo.
Per l'applicazione sul melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e la fioritura, usare il Parathione separatamente. Nel caso di impiego di oli non trattare con KARATHANE WD a distanza inferiore di tre settimane.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità - Non impiegare con temperature superiori a 32°C. Su cultivar di uve sensibili quali Nebiolo, Schiava e Traminer, impiegare i dosaggi più bassi.

Rischio di nocività - E' tossico per alcuni artropodi utili (Fitoseidi, Anthocoris sp.) e per i pesci.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta: Cucurbitacee 7 giorni - altre colture 20 giorni.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Prodotto da:

ROHM AND HAAS ITALIA S.P.A.

Stabilimento di Mozzanica (Bergamo)

Registrazione Ministero della Sanità No. 3615 del 15.9.1980

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Netto Kg 5

3647

MICROZOLFO BAGNABILE 90

Zolfo bagnabile micronizzato per trattamenti liquidi

COMPOSIZIONE

— Zolfo micronizzato puro (esente da selenio) . . . . g 90,8
— Bagnanti, sospensivanti e disperdenti . . . . q.b. a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il MICROZOLFO BAGNABILE 90 è un anticrittogamico in polvere bagnabile caratterizzato da particelle fini di zolfo che consentono sospensibilità e bagnabilità. Dotato di azione pronta, il MICROZOLFO BAGNABILE 90 è indicato per la lotta preventiva e curativa di tutte le forme di Oidio o Mal bianco delle pomacee, delle drupacee, della vite, delle colture orticole e floricole. Manifesta altresì una attività secondaria nei confronti di eriofidi (Eriofide del nocciolo, Erinosi della vite).

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Viticoltura: per 100 litri d'acqua

contro il Mal bianco della vite
— alla ripresa vegetativa 250-300 g
— durante le successive fasi fenologiche 150-250 g
Per la lotta contemporanea contro Oidio e Peronospora aggiungere al MICROZOLFO BAGNABILE 90, prodotti antiperonosporici come ANTIR, POLVERE RUMIANCA, DITIAMINA.

Frutticoltura:

contro tutte le forme di Mal bianco del melo, pero, pesco, albicocco, nocciolo
— trattamenti pre-florali 300 g
— trattamenti post-florali 200-300 g

Orticoltura:

contro il Mal bianco delle colture orticole quali pisello, melone, zucchino, cocomero, peperone, melanzana 250-350 g
Quando la temperatura oltrepassa i 25° C dimezzare la dose d'impiego.

Floricoltura:

contro il Mal bianco delle colture floricole, quali p. es. rosa, ortensia, crisantemo 250-350 g

Le dosi maggiori sono relative ai primi trattamenti; esse poi diminuiranno con lo sviluppo della vegetazione e con l'innalzarsi della temperatura; comunque con temperature superiori ai 25° C si useranno sempre le dosi più ridotte.

Stemperare il prodotto in poca acqua e mescolare sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea. Lasciar riposare pochi minuti, indi aggiungere la poltiglia così ottenuta, gradualmente e sotto continua agitazione, nel resto dell'acqua sino a conseguire la concentrazione voluta.

Quando il MICROZOLFO BAGNABILE 90 s'impiega in combinazione con altri prodotti è opportuno preparare la poltiglia in poca acqua e versarla, agitando, nelle dispersioni acquose già pronte degli altri prodotti.

Le dosi sopra consigliate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA': Il MICROZOLFO BAGNABILE 90 non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, Diclofluanide.

Avvertenza: Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
Mele: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden Delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.
Pere: Buona Luisa d'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese.
Cucurbitacee: può essere fitotossico.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Reg. Ministero Sanità
n. 3647 del 30.10.85 RUMIANCA

3649

MILDIN® 5P

Fungicida in polvere secca a base di Folpet

®Marchio registrato ANIC AGRICOLTURA S.p.A.

COMPOSIZIONE

– Folpet puro . . . . g 5
– Disperdenti, inerti . . . . q.b. a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

– Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
– Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
– Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
TERAPIA: Lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro d'acqua) e digitale.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **MILDIN 5P** è un fungicida a base di Folpet, formulato in polvere secca, per trattamenti polverulenti. La sua applicazione è consigliata per la lotta contro la Peronosfora del grappolo della vite (Plasmopara viticola) e, con parziale efficacia, contro la Muffa grigia (Botrytis cinerea), nel periodo finale della lotta antibotritica, vale a dire quando ai trattamenti liquidi iniziali è consigliabile sostituire trattamenti polverulenti che a "grappolo chiuso" riescono a far penetrare maggiormente il prodotto fra gli acini e la vegetazione. Questi dovranno essere alternati ai tradizionali trattamenti antiperonosporici.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora e Muffa grigia della vite: kg 25-30 di formulato per ettaro di coltura.
Marciume dei bulbi dovuto a Botrytis spp. Sclerotium spp.: impolverare uniformemente i bulbi prima dell'impianto o dell'immagazzinamento, impiegando 500-800 gr. di prodotto per quintale di materiale da trattare.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: Il **MILDIN 5P** non è compatibile con altri antiparassitari.
Nell'esecuzione dei trattamenti, occorre distanziare di almeno 2 giorni le applicazioni di **MILDIN 5P** da quelle con olii minerali e con prodotti a base di zolfi.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto e 40 giorni prima della vendemmia per le uve da vino, per non ostacolare la fermentazione del mosti.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA
EniChemAgricoltura S.p.A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO
Officina di Produzione: SARIAF S.p.A.
Stabilimento di Faenza - Ravenna

Registrazione del Ministero della Sanità n. 3649 del 30/5/1980

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

3652

3652

Utamit K Caffaro

Polvere adesiva a base di DICOFOL e CHLORBENSIDE. Acaricida per trattamenti polverulenti contro adulti, neanidi e uova estive dei ragnetti rossi in genere e del ragnetto giallo della vite.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Dicofol puro	g 2
Chlorbenside puro . . .	g 2
Adesivanti e disperdenti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Consigli terapeutici:

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g 25 di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1 - 0,2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Diete prive di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni: la morfina e l'alcool, e per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina e l'efedrina.

AVVERTENZA

Consultare un centro antiveleni.

caffaro S.p.A. - Milano

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 3652 del Ministero della Sanità del 30-5-1980

CARATTERISTICHE

L'UTAMIT K CAFFARO è un prodotto appositamente studiato per trattamenti polverulenti a secco contro adulti, neanidi e uova estive dei ragnetti rossi in genere e del ragnetto giallo della vite.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

AGRUMI (arancio, clementine, limetta, limone, mandarino);
POMACEE (melo, pero);
DRUPACEE (pesco, albicocco, ciliegio, susino);
VITE;
ORTAGGI (pomodoro, fagiolo, fagiolino, fragola);
FLORICOLTURA;
La dose di impiego da applicare è di kg 30-40/ha a seconda dello sviluppo vegetativo delle piante e dell'intensità delle infestazioni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ: non trattare gli alberi da frutto durante la fioritura.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 10

3659

FUNGICIDA A BASE DI BENOMYL * E FOLPET - POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE: g 100 DI PRODOTTO CONTENGONO: g 10 DI BENOMYL PURO e g 40 DI FOLPET PURO - INGREDIENTI INERTI: QUANTO BASTA A g 100.

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei da foto-sensibilizzazione resistenti alla terapia.

Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi ed aritmia.

Terapia: *lavanda gastrica con magnesia « Usta » (gr 30 per litro d'acqua) e digitale.*

Avvertenza: *consultare un centro antiveleni.*

* Benomyl è prodotto dalla E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.) - Wilmington - Delaware (U.S.A.).

DA NON VENDERSI SFUSO

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il SIVAMIL F è un fungicida organico a base di Benomyl e di Folpet, formulato per la lotta contro la Botrytis, l'Oidio e la Peronospora della vite. Il prodotto può essere anche usato per la lotta contro altre malattie fungine quali la Ticchiolatura e l'Oidio delle mele, delle pere e di colture floreali.
L'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

Vite: Uva da tavola: Botrytis, Peronospora, Oidio. Impiegare il SIVAMIL F alla dose di g 200-250/100 litri di acqua secondo il normale calendario antiperonosporico dall'inizio fino a luglio-agosto. I successivi trattamenti per la difesa antibotritica devono essere effettuati con SIVAMIL F alla dose di 300 gr/Hl. I trattamenti possono essere prolungati fino a 15 giorni dal raccolto.

Uva da vino: Botrytis. Impiegare il SIVAMIL F alla dose di g 250-300/100 litri di acqua secondo il normale calendario antibotritico.

Attenzione: data la presenza di Folpet nella formulazione, ad evitare effetti nocivi nella fermentazione dei mosti, i trattamenti vanno sospesi ad almeno 40 giorni dal raccolto.

Melo - Pero: Ticchiolatura, Oidio. Usare gr 150-200/100 litri di acqua. Trattare ad intervalli fissi di 8 giorni fino ai primi trattamenti post-florali, allungando in seguito gli intervalli a 10-12 giorni.

Colture floreali: Ticchiolatura, Peronospora, Septoriosi, Botrytis. Usare g 200-250/100 litri di acqua.

Preparazione della poltiglia. Per la preparazione della poltiglia, formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di SIVAMIL F in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo la rimanente acqua tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità. Il SIVAMIL F è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi, a reazione neutra, attualmente in commercio. Non è miscibile con Poltiglia Bordolese, Polisolfuri e Olio Bianco.

Avvertenze. Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità. Pere: il prodotto è fitotossico per la Butirra D'Anjou. Mele: da non usarsi dopo la fioritura perché può manifestare fitotossicità.

Nocività. Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci. Si consiglia di tenere gli animali domestici e bestiame lontani durante i trattamenti.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto per le uve da tavola e 40 giorni per quelle da vino.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Impedire che il SIVAMIL F diventi umido durante l'immagazzinamento; ciò può provocare alcune trasformazioni chimiche che riducono l'efficacia fungicida del prodotto. Quando il prodotto non è impiegato, tenere la confezione ben chiusa ed in locale asciutto. Bruciare la confezione dopo l'uso.

SIVAM **SOCIETA' ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO S.p.A.**
20124 MILANO - VIA SCARLATTI, 30 - TELEFONO 270 451

Registrazione n. 3659 del Ministero della Sanità del 17-VI-1980 — Officina di produzione: Stab. Diachem S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG) — PESO: Kg 1

3663

Utacaffaro RS

Polvere adesiva a base di RAME e ZOLFO.
Anticrittogamico per trattamenti polverulenti contro la Peronospora e l'Oidio della vite, la Ticchiolatura e il Mal Bianco delle pomacee.

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Rame metallo puro (sottoforma di ossicloruro)	g 12
Zolfo puro (esente da selenio)	g 12,5
Coformulanti	q.b. a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

caffaro S.p.A. - Milano

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 3663 del Ministero della Sanità del 30-5-1980

CARATTERISTICHE
L'UTACAFFARO RS è un anticrittogamico per trattamenti polverulenti contro la Peronospora e l'Oidio della vite, la Ticchiolatura e il Mal Bianco del Melo e del Pero. **L'UTACAFFARO RS** è un prodotto studiato per i trattamenti polverulenti a secco.

DOSI E MODO DI IMPIEGO
La dose normale di impiego è di 30-40 kg/ha e per trattamento a seconda dello sviluppo vegetativo delle piante.
Distribuire il prodotto uniformemente con polverizzatori alle epoche indicate dagli schemi di difesa normalmente in uso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
L'UTACAFFARO RS non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.) con oli minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, con Diclofluanide.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Avvertenza: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.

FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) Meli cupro-sensibili: Abbondanza «Belfort» - Commercio - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - King David - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana.
(**) Peri cupro-sensibili: Abate Fetel - Buona Luigia D'Avranche - Butirra Clairgeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard.

NOCIVITÀ: l'UTACAFFARO RS è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 25

3671

Disinfestante per il terreno ad azione polivalente contro funghi parassiti, nematodi, malerbe e insetti terricoli.

Si impiega per la difesa di colture floreali ed ornamentali, orticole (cavoli, spinaci, insalate, bietole, fagiolo, fagiolino, carota, finocchio, sedano, prezzemolo, ravanello, cipolla, aglio, porro, asparagi, carciofi, patate, pomodori, peperoni, melanzane), tabacco.

COMPOSIZIONE:

— Dazomet puro	g. 85
— Coadiuvanti ed inerti: quanto basta a . . .	g. 100

® Marchio registrato SIPCAM - Milano

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A. - Viale G. Galeazzo, 3 Milano - Officina di produzione: Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 3671 del 16/10/1980 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto è efficace contro:
— **funghi** parassiti del terreno che causano avvizzimenti, morie, imbrunimenti e marciumi delle radici;
— **nematodi** delle radici che vivono in forma libera nel terreno e nematodi galligeni delle radici (Meloidogyne sp.); è efficace inoltre a dosi più elevate contro nematodi incistati del genere Heterodera e pure contro le larve delle anguillule degli steli che vivono nel terreno;
— **insetti** che vivono nel terreno tipo larve di elateridi, larve di maggiolino, agrotidi, a diversi stadi di sviluppo.
Il prodotto possiede un'elevata azione erbicida nei confronti dei semi delle erbe infestanti mono e dicotiledoni in fase di germinazione e contro le malerbe che non abbiano superato lo stadio di plantula; inoltre è attivo anche verso bulbi e rizomi.
Il prodotto si impiega alle seguenti dosi **per mq. di superficie:**
— **40-50 g.** per la lotta contro funghi del terreno, semi di infestanti in germinazione, nematodi liberi nel terreno e galligeni, insetti terricoli;
— **50-60 g.** per la lotta contro nematodi incistati, larve di anguillule degli steli.
Le dosi indicate sono valide per una profondità di incorporamento di 20 cm.; volendo interessare strati di terreno più profondi, è necessario aggiungere alle dosi sopra indicate 15-20 g./mq. per ogni 10 cm. di maggior profondità.
Incorporare sempre il prodotto in modo uniforme immediatamente dopo il trattamento e su tutta la superficie da trattare sia in serra che in pieno campo alla profondità desiderata, impiegando se possibile, apparecchiature fresanti; nel caso di terreno irregolare e molto soffice è utile livellare e rullare la superficie.
Far seguire un'irrigazione dopo il trattamento da ripetere dopo 3-4 giorni per le colture in serra o per i trattamenti all'aperto se non si hanno pioggie dopo qualche giorno dal trattamento.
La conservazione del terreno in condizioni di sufficiente umidità dopo il trattamento e temperature del terreno non troppo basse (es.: non inferiori a 5-8°C) sono condizioni essenziali per assicurare il successo del trattamento ed evitare rischi di fitotossicità residua.
Dopo 7 giorni dal trattamento lavorare il terreno ed attendere due settimane prima di piantare o seminare la coltura se la stagione è stata normale, se il terreno è sempre rimasto abbastanza umido e se la temperatura del terreno è stata superiore a 15°C. Attendere più a lungo (es.: 3-4 settimane) con basse temperature del terreno (5-15°C), ovvero con terreni secchi, nel qual caso è utile un'ulteriore lavorazione del terreno onde arieggiarlo ulteriormente almeno 7 giorni prima di seminare o di trapiantare colture.

Avvertenze: Non somministrare al terreno immediatamente prima, durante o dopo l'impiego del prodotto, letame o calciocianamide. Nelle serre, e nei cassoni, prima di impiegare il prodotto provvedere ad allontanare le colture ed a chiudere le fessure attraverso le quali i gas che si sviluppano potrebbero penetrare nei locali adiacenti che ospitano colture in atto.
Per l'applicazione del prodotto in pieno campo, osservare una fascia di rispetto verso radici di alberi, cespugli, arbusti e siepi di almeno 50 cm. Non applicare con temperature inferiori ai 5-8°C.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Il prodotto si usa da solo.

Fitotossicità: A causa del numero particolarmente elevato di varietà e specie floreali, ornamentali ed orticole aventi eventuali diverse sensibilità, si consiglia di effettuare una prova su limitata superfice, prima di passare ad applicazioni su larga scala.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO Kg 20

SIPCAM

3692

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Contro gli insetti che danneggiano le colture floro-orto-frutticole (Afidi, Mosche, Moscerini, Psille, Tripidi, Tingidi).
Contiene Piretro africano

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 2 Piretrine pure
gr. 8 Piperonyl Butossido puro
gr. 0,5 Antiossidante per Piretro
Solventi ed emulsionanti q.b. a 100.
Contiene XILOLO

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il PIRENYL è un insetticida che può essere impiegato in qualsiasi stagione.
Il PIRENYL è un insetticida di contatto, dotato di forte potere abbattente con persistenza di azione di 3-5 giorni per la presenza nel formulato di sostanze antiossidanti del Piretro.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

- Carciofo, crisantemo, fagiolo, fave, fragole, garofano, lattuga, rose, susino: contro afidi a gr. 140-160/hl. d'acqua;
- Asparago, cipolle, carota, cavolo, ciliegie: contro mosca a gr. 140-160/hl. d'acqua;
- Melo: contro afide verde a gr. 140-160/hl. d'acqua;
- Pero: contro Psilla a gr. 140-160/hl. d'acqua;
- Melanzana, tabacco: contro Cavolaia, Bemisia (Aleurodidi) a gr. 160-200/hl. d'acqua;
- Pomodoro: contro moscerino a gr. 160/hl. d'acqua.

I trattamenti alle colture dovranno essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante al manifestarsi delle infestazioni ed in giornate di tempo buono.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

E' generalmente miscibile con i prodotti della nostra gamma.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 2 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

RAVIT S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA
V.le degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.78.041 (5 linee)
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.69

STAB.: Paganica (L'Aquila)

Reg. n. 3692 Ministero Sanità del 30-5-1980

12/84

3713

TRINET

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Soluzione emulsionabile	Diserbante selettivo di pre- e post- emergenza per cereali, colture orticole, foraggere.
Composizione	100 grammi di prodotto contengono: Trifluralin puro g 42,06 Emulsionanti e solventi q.b. a g 100 Contiene «XILOLO»
Natura del rischio	Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Norme precauzionali	— Conservare il prodotto chiuso sotto chiave in un luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Informazioni mediche	In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Caratteristiche	Il TRINET è un diserbante attivo contro le infestazioni in fase di germinazione. L'interramento del prodotto evita la dispersione della sostanza attiva per via gassosa aumentando l'efficacia contro le infestanti, anche in caso di assenza di piogge. L'azione erbicida del TRINET è indicata per la distruzione di infestanti graminacee a foglia larga quali Alopecurus, Apera spica venti, Bromus, Digitaria, Echinochloa, Eragrostis, Lolium, Poa, Setaria, Sorghum, Portulaca, Polygonum, Amaranthus, Chenopodium, Stellaria, Urtica, Tribulus, Galium, Lamium, Papaver, Veronica, Atriplex, Galeopsis.
Istruzioni per l'interramento	Per evitare perdite di efficacia è necessario interrare il TRINET nel terreno ad una profondità di 5 - 10 cm subito dopo l'applicazione (entro 30 minuti in estate e fino a 3-4 ore in inverno-primavera). Un interramento uniforme può essere eseguito con frese, motocoltivatori, motozappe ed erpici a dischi.
Istruzioni speciali	Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del TRINET e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo o piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.), nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. La miscela non deve essere incorporata nel terreno o non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.
Modalità di impiego	Frumento: pre-emergenza - applicare il TRINET dopo la semina, fino all'emergenza della coltura senza incorporamento. Dose di impiego: 1,2 l/ha per terreni leggeri o di medio impasto; 1,5 l/ha per terreni pesanti. Post-emergenza - applicare il TRINET allo stadio vegetativo di 2-3 foglie del frumento; in ogni caso prima dell'emergenza delle infestanti graminacee. Dose di impiego: 1,5 l/ha per terreni leggeri e di medio impasto; 2 l/ha per terreni pesanti. Colture orticole da trapianto: pomodoro, peperone, insalata, lattughe, finocchio, sedano, cavolo, cavolfiore, cipolla: incorporare il TRINET nel periodo da 2 settimane fino ad 1 giorno prima del trapianto della coltura. Dose di impiego: 1 l/ha in terreni leggeri; 1,5 l/ha in terreni di medio impasto; 2 l/ha in terreni pesanti. Colture orticole da semina: insalata, fagiolo, fagiolino, carota, finocchio, sedano, aglio, girasole, soia, cavolo, cavolfiore: incorporare il TRINET nel periodo da 2 settimane fino ad un giorno prima della semina della coltura. Dose di impiego: 1/ha in terreni leggeri, 1,5 l/ha in terreni di medio impasto, 2 l/ha in terreni pesanti. Colture foraggere: colza e ravizzone: interrare il TRINET nel periodo tra 3 settimane prima della semina fino a 1 giorno prima della semina stessa. Dose d'impiego: 1 l/ha in terreni leggeri, 1,5 l/ha in terreni di medio impasto, 2 l/ha in terreni pesanti.
Preparazione della poltiglia	Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità di acqua necessaria. DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità	Il TRINET è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci. AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità	Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto se usato in post-emergenza. Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Titolare della registrazione	DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2
Officina di produzione	DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 3713 del 2.7.80 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto lt 0,5 - 1 - 5

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3726

Solfobario Romagna® 46%

(POLVERE SOLUBILE)
POLISOLFURO DI BARIO
AD AZIONE ANTICRITTOGAMICA ED INSETTICIDA

Registrazione Ministero della Sanità n. 3726 del 16.11.80
® Marchio depositato n. 136251

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Polisolfuro di bario tecnico al 95% minimo (corrispondente a gr 46 di zolfo attivo)	g. 69
Coformulanti	q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profondo più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto orale.
Sintomi d'intossicazione: nausea, vomito, coliche addominali, diarrea profusa, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea. (La morte avviene in plena coscienza per paralisi respiratoria).
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: lavanda gastrica con solfato di sodio o magnesio - analettici cardio-respiratori - spasmolitici - fleboclisi con aspartato di potassio (1-3 MEq.: K flebo).

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il SOLFOBARIO ROMAGNA 46% si impiega nei trattamenti invernali e primaverili-estivi alle drupacee, alle pomacee ed all'olivo contro la generalità dei parassiti vegetali ed animali ed in particolare contro: Aspidiotus perniciosus (Cocciniglia di San Josè), Diaspis pentagona (Cocciniglia bianca del pesco), Diaspis leperii (Cocciniglia grigia del pero), Saissetia oleae (Cocciniglia grande dell'olivo) e le forme ibernanti delle Cocciniglie e delle Tignole in genere; Venturia inaequalis e Venturia pirina (Ticchiolatura del melo e del pero); Podosphaera leucotricha (Mal bianco del melo); Sphaerotheca pannosa (Mal bianco del pesco); Exoascus deformans (Bolla del pesco); Marciume bruno; Muffa e circoli dei fruttiferi e Fumaggine.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Preparazione: versare il prodotto direttamente nell'acqua e mescolarlo fino a formare la soluzione.

Dosi di impiego:

POMACEE (melo e pero):
— trattamenti invernali a gemme chiuse od appena ingrossate: Kg. 3,5-6 per ettolitro;
— trattamenti primaverili-estivi: gr. 350-450 per ettolitro.

DRUPACEE (pesco, susino, albicocco, ciliegio):
— trattamenti invernali a gemme chiuse od appena ingrossate: Kg. 2,5-3,5 per ettolitro;
— trattamenti primaverili-estivi: gr. 250-350 per ettolitro.

OLIVO:
— prima della fioritura: Kg. 4-5 per ettolitro.
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con gli olii. Qualora fossero stati eseguiti trattamenti con olii, l'applicazione del SOLFOBARIO ROMAGNA 46% deve essere distanziata di almeno 15 giorni.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Evitare le irrorazioni nei frutteti dove siano coltivati ortaggi e specialmente piselli, insalate, finocchi, spinaci che verrebbero danneggiati.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A. **Contenuto Kg. 30**

prodotto nello stabilimento di

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
Via San Francesco - Cotignola (Ravenna)

3771

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Fungicida organico di contatto
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 Iprodione puro
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il ROVRAL è un fungicida organico ad azione di contatto, particolarmente indicato per la lotta contro le malattie crittogamiche delle colture di seguito indicate e per la concia delle sementi del frumento e dell'orzo.

APPLICAZIONI E DOSI

— VITICOLTURA: contro la Botrite a kg. 1,5/2 per ettaro, distribuiti con 10-15 ettolitri d'acqua. Trattare alla sfioritura, prima della chiusura del grappoli, all'inizio dell'invaiatura, e 2-3 settimane dopo l'invaiatura.

Per le varietà sensibili alla Botrite del peduncolo, effettuare un trattamento anche in pre-fioritura.

Il prodotto non ostacola la fermentazione dei mosti; esplica inoltre azione frenante sullo sviluppo del mal bianco.

Il prodotto può essere impiegato anche per effettuare trattamenti polverulenti in miscela con zolfo ventilato, alle stesse dosi sopra indicate.

— FRAGOLA: contro la Botrite a kg. 1,5/2 per ettaro distribuito con 10-15 ettolitri d'acqua.

Trattare all'inizio della fioritura e ripetere ogni 8-10 giorni, secondo l'andamento stagionale.

— ORTICOLTURA:

a) Lattuga: contro la Botrite e la Sclerotinia kg. 1,5/ha con trattamenti fogliari ripetuti.

b) Indivia: per combattere le Sclerotinie che possono attaccare le indivie nel terreno, usare gr. 6-8/mq.

c) Pomodoro - Peperone - Melanzana: contro Botrite ed Alternaria gr. 100-150/hl. con trattamenti fogliari ripetuti.

Dato il gran numero di varietà e le differenti condizioni ambientali, è consigliabile effettuare saggi preliminari.

— FRUTTICOLTURA:

— Pomacee (pero): contro Alternaria a gr. 150/hl. Iniziare i trattamenti alla caduta dei petali e proseguirli alla cadenza di 15 giorni fino al termine della carenza.

— Drupacee: contro la Monilia del pesco, albicocco, ciliegio, mandorlo, susino a gr. 150/hl. Trattare prima, durante e dopo la fioritura.

— FLOREALI ED ORNAMENTALI (in pieno campo o in serra): contro Botrite a gr. 150/hl.; contro Alternaria del Garofano a gr. 200/hl.; contro Rizoctonia del Garofano a gr. 4-8/mq.

Dato il gran numero di specie e varietà e le differenti condizioni ambientali, è consigliabile effettuare saggi preliminari d'impiego.

— AGLIO: contro il mal dello sclerozio mediante impolverazione dei bulbilli, a gr. 300 per quintale di bulbilli.

— PATATA: contro Rizoctonia; immergere i tuberi per 5 minuti in una soluzione di gr. 800/hl., prima della semina.

— BARBABIETOLA: contro Phoma, mediante impolverazione a gr. 300 per quintale di seme.

— CONCIA DELLE SEMENTI: contro la Carie del frumento e l'Elmintosporiosi dell'orzo: gr. 150-200 per q.le di seme.

Per la preparazione della miscela, mettere la dose in poca acqua, indi mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea.

Versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il ROVRAL è compatibile con: Azifene; Benlate; Dithane M 45; Folgreen LB; Karathane LC; Lannate 25; Lannate L; Lorzene Flow; Metilon 20; Naftil micronizzato; R6 Erresel M 50; R6 Erresel SB M 10; Sofril 80; Soluble Plant Food; Spintox; Zirasan 90; Zolone Liquido 25; Zolone P B 25.

Per quanto riguarda la miscibilità del prodotto con Dafene; Karathane PB; Parafene Rosso; Sumifene; Zitiol, si consiglia di procedere nel modo seguente:

1) stemperare in acqua il ROVRAL e versare nell'irroratrice già riempita di acqua per metà;

2) aggiungere il bagnante adesivo Etaldyn a gr. 50 per ettolitro;

3) stemperare in acqua il prodotto da aggiungere e versarlo quindi nell'irroratrice che, agitando, va portata a volume.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare il prodotto sulla pera Decana del Comizio.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI:

21 giorni prima della raccolta, su lattuga, indivia, pomodoro, peperone, melanzana, pero, fragola
28 giorni prima della raccolta su vite
40 giorni prima della raccolta sulle altre colture

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

RAVIT S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
V.le degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.78.041 (5 linee)
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68

STAB.: Paganica (L'Aquila)

Reg. n. 3771 Ministero Sanità del 16-6-1980
12/84

3779

VAPAM®

® Marchio registrato della STAUFFER CHEMICAL CO. - U.S.A.

SOLUZIONE FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE DEL TERRENO

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:

— **Principio attivo**

METAMSODIUM (anidro) puro . . . gr. 32,7

— **Sostanze inerti e coadiuvanti q.b. a gr. 100**

Classe III'

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbo nervoso, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:

Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è instato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: *consultare un Centro Antiveleni.*

Generalità: Il VAPAM è un prodotto fumigante che deve le sue proprietà fungicide e collaterali al gas (Metil-iso-tiocianato di sodio) che si produce nel terreno a seguito della sua decomposizione. Esso viene impiegato nel trattamento preventivo del terreno per combattere i parassiti fungini agenti dei marciumi radicali. marciumi del colletto, avvizzimenti delle piantine; Fusarium - Verticillium - Phialophora - Pythium. Il VAPAM svolge nel contempo altre interessanti azioni collaterali e cioè: azione nematocida sulle forme libere, azione erbicida, azione insetticida.

MODALITA' DI IMPIEGO

Preparazione del terreno - Per ottenere i migliori risultati e cioè una penetrazione e diffusione perfetta, il terreno deve essere ben sminuzzato e piuttosto umido.

Sostanza organica - Il letame e la torba devono essere interrati un mese prima dei trattamenti.

Temperatura - Al momento dell'applicazione la temperatura del terreno non deve essere inferiore a 14 °C e non superare i 32 °C.

Applicazione - Il VAPAM deve essere distribuito in modo uniforme diluito nell'acqua (10-20 hl/Ha) mediante un irroratore a spruzzo oppure mediante l'impianto di irrigazione a pioggia. Per piccole superfici può essere impiegato l'annaffiatoio. Immediatamente dopo, l'appezzamento trattato, deve essere sottoposto ad una lenta irrigazione, fino a quando il terreno risulterà bagnato ad una profondità di cm. 25-30. E' possibile distribuire il VAPAM anche con palo iniettore praticando i fori a distanza di cm. 15-18 come massimo, ed effettuando subito dopo una irrigazione superficiale che raggiunga qualche centimetro di profondità. Dieci-dodici giorni dopo il trattamento lavorare molto superficialmente il terreno per favorire la dispersione dei gas originatisi dal VAPAM. Indi attendere ancora 8-10 gironi prima di procedere alla semina od al trapianto.

Dosi: La dose normale di VAPAM è di 1000 Kg/Ha. Tale dose dovrà essere portata a Kg. 1500-2000 quando si operi su terreni pesanti o interessati prevalentemente da verticilli o fialofora. Le dosi più elevate sono particolarmente consigliabili quando il trattamento avviene con temperatura del terreno sul minimo sopra indicato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' - Il VAPAM non è compatibile con altri fumiganti del suolo. Evitare pertanto la mescolanza e dovendo applicare anche dei nematocidi fare due applicazioni separate a distanza di 2-5 giorni.

RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è nocivo per gli animali domestici ed il bestiame e tossico per i pesci.

INTERVALLO - Far trascorrere 20-30 giorni dal trattamento alla semina.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
Registraz. Min. Sanità N. 3779 del 19-6-1980
DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO KG. :

3785

FOLTAMIN®

CLASSE IV

Polvere bagnabile — Fungicida organico per combattere alcune malattie crittogamiche delle piante coltivate.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Folpet puro g 50
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 g.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua e digitale).

Caratteristiche
Il FOLTAMIN® è un fungicida organico, valido contro malattie crittogamiche in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e floricoltura.

Modalità di impiego
Dosi per 100 litri di acqua:
Frutticoltura: g 200 contro ticchiolatura del melo e del pero e per prevenire parzialmente la lenticellosi sulla Golden Delicious.
Dopo la fioritura può provocare fitotossicità al meli; è fitotossico per la cultivar Butirra d'Anyou.
Sugli agrumi, contro l'Elsinoe fawcetl aumentare la dose a g 250 ed eseguire il primo trattamento quando i due terzi dei petali sono caduti.
Contro la melanosi (Diaporthe citri) la dose va portata a g 300-500, cominciando i trattamenti 1 settimana prima dell'inizio della fioritura.

Viticoltura: g 200-250 contro peronospora, con qualche successo contro il marciume grigio dell'uva, antracnosi.
Durante il periodo di crescita della vite o di maggior sviluppo delle foglie è necessario abbreviare la cadenza dei trattamenti per prevenire le infezioni.
Per le uve da vinificare, sospendere il suo impiego 40 giorni prima della vendemmia ed eseguire gli ultimi trattamenti con fungicidi rameici.
Orticoltura: g 200-250 contro la peronospora ed alternaria (della patata, del pomodoro, della cipolla, della lattuga); alternaria ed antracnosi (della patata, del pomodoro, del fagiolo); septoria e cercospora (del sedano); antracnosi delle cucurbitacee (cocomeri, meloni, cetrioli, zucche). Eseguire trattamenti preventivi a distanza di 7-10 giorni, usando 8-10 hl/ha di poltiglia secondo lo sviluppo e la densità delle colture.
Il FOLTAMIN® è efficace contro il marciume grigio della fragola e del lampone (Botrytis cinerea).

Colture ornamentali: (rose, crisantemi, tulipani): g 200-250 contro la septoriosi del crisantemi, macchie nere e peronospora delle rose. E' necessario bagnare bene tutte le giovani cacciate dalle piante.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
Il FOLTAMIN® è miscibile con la maggior parte dei fitofarmaci in forma di polvere bagnabile. Non va miscelato con i prodotti alcalini (calce, polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) né con olii o prodotti oleosi.
AVVERTENZA: Inoltre il FOLTAMIN® non deve essere usato 20 giorni prima o dopo l'applicazione di olii minerali e prodotti a base di zolfo.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il FOLTAMIN® è fitotossico per la cultivar del pero Butirra d'Anyou. Per i meli da non usarsi dopo la fioritura, perché può manifestare fitotossicità.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
Sulle uve da vino, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 3785 del 15.9.80 del Ministero della Sanità
DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 1-10

DU PONT — DU PONT CONID SPA AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3786

DIMETHOAT AMONN

CLASSE III ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Concentrato emulsionabile — Estere fosforico ad azione citotropica, specifico per la lotta contro gli insetti ed acari.

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Dimethoate p.a. puro g 38
Emulsionanti, tensioattivi, coloranti e solventi quanto basta a 100 gr.
Contiene «XILOLO».

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici:

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia;
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni 10 minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con acqua e sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, cotamina, latte, olio e grassi.
La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

Caratteristiche

Il DIMETHOAT AMONN è un insetticida con efficacia iniziale e residua, anche perchè dotato di azione citotropica che consente di raggiungere gli insetti che non sono direttamente investiti dal trattamento.

Modalità di impiego

Dosi per 100 litri di acqua:
Frutticoltura contro afidi, tripidi, psille, acari, maggiolini, cocciniglie, cc 75-100. Trattare all'inizio delle infestazioni.
Mosca delle ciliege: cc 50. Trattare all'invaiatura (cambiamento di colore dei frutti). Mosca della frutta cc 75 per le albicocche e cc 125 per le pesche. Cemiostoma del melo: cc 75-100. Trattare ai primi sintomi di infestazione. Mosca delle olive cc 150 in trattamenti preventivi o curativi da giugno ad ottobre. Tignole dell'olivo cc 100-150 da marzo a giugno contro le 3 generazioni dell'insetto.
Depressaria e nottua del carciofo cc 75-100 in 3 trattamenti da fine ottobre a fine novembre.
Colture ortensi ed ornamentali contro afidi, tripidi, acari, ditteri, collemboli cc 75-100. Trattare alla prima comparsa dei parassiti.

Preparazione della poltiglia

Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità di acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il DIMETHOAT AMONN è miscibile in via di massima con i più comuni litofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Non impiegare il prodotto su crisantemi, gigli orientali, agrifoglio ed altre piante ornamentali, nonchè sulle drupacee in fiore (ciliegio, susino, albicocco, pesco, mandorlo).

Rischi di nocività

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 3786 del 15.9.80 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Lt. 1

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3788

AFIDAMON®

CLASSE I^a

VELENO

Insetticida liquido — Insetticida sistemico per la lotta contro i principali parassiti in frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, ciliegio, agrumi olivo), orticoltura (patate, cavoli, cetrioli, meloni, lattughe, fagioli, piselli, carciofi, asparagi, bietola, pomodoro) e colture ornamentali in pieno campo.

Composizione
100 g. di prodotto contengono:
18 g. di Fosfamidone puro
Emulsionanti, tensioattivi e solventi quanto basta a 100 g.
Contiene «2-ETOSSIETANOLO (ETILGLICOLE)».
ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

CONSIGLI TEREPEUTICI
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia;
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.
CONTROINDICAZIONI: morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.
La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

Caratteristiche
L'AFIDAMON è un insetticida sistemico per la lotta contro Afidi, Tingidi, Tripidi, Tentredini e Ditteri.

Modalità di impiego
Dosi per 100 litri d'acqua:
Contro Afidi: cc 100, con questa dose si ha pure un'azione collaterale contro Tingidi, Tripidi, Tentredini, larve ed adulti di Ditteri.
Contro Afidi resistenti: cc 150.

Preparazione della poltiglia
Versare l'AFIDAMON lentamente e sotto agitazione nella quantità di acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
L'AFIDAMON è miscile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese). La miscela con certi prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Qualche dubbio si ha solo per qualche varietà di ciliegio. In tal caso effettuare dei saggi su qualche pianta prima di usarlo su vasta scala.

Rischi per la fauna utile
L'AFIDAMON è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, i pesci e per il bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti — ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N.3788 del 19.6.80 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto 1 lt.

DUPONT DU PONT CONID SPA AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3789

TEDION V - 18 •

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Acaricida emulsionabile — Specifico per la lotta contro gli acari (Ragno rosso) nocivi alle piante coltivate

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
8 g Tetradifon puro
Emulsionanti, tensioattivi, cosolventi e solventi quanto basta a 100 g.
Contiene «XILOLO e CICLOESANONE»

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in un luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.
CONSIGLI TERAPEUTICI:
Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g 25 di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questo acaricida hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.
Barbiturici (luminal 0,1 - 0,2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari, fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.
CONTROINDICAZIONI:
La morfina e per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

Caratteristiche
Il TEDION V-18® è particolarmente indicato per la lotta contro gli acari fitofagi in quanto:
— distrugge sicuramente sia le uova estive che gli stadi larvali;
— ha forte potere penetrante e distrugge anche le uova estive e le larve che si trovano sulle lamine opposte a quelle trattate;
— è efficace contro le uova invernali, quando il trattamento viene effettuato alla schiusura delle stesse.
Il TEDION V-18® si può usare su tutte le piante coltivate: in frutticoltura su melo, pero, pesco, ciliegio, fragola, agrumi; in viticoltura; in orticoltura su pomodoro, melanzana, peperone, melone, cocomero, cetriolo, zucchini, zucca, fagiolo, fagiolino; su piante da fiore ed ornamentali in pieno campo.

Modalità di impiego
Si consiglia di impiegare il TEDION V-18®, quando una parte delle uova invernali sono già schiuse. Il trattamento si deve effettuare con la massima accuratezza, bagnando bene tutti gli organi ed i rami ove le uova invernali sono in schiusura.
Dose per 100 litri di acqua cc. 200.
Per il lungo effetto residuo, il TEDION V-18® dà in frutticoltura brillanti risultati, anche dopo la fioritura, alla dose di 200 cc. per 100 litri di acqua. Il TEDION V-18® può essere usato da solo anche sulle altre colture indicate.

Preparazione della poltiglia
Versare il TEDION V-18® lentamente e sotto agitazione nella quantità di acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
Il TEDION V-18® è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese). La miscela con certi prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 3789 del 13.10.80 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Lt. 1-5-10-20-25

• = TEDION V-18. Marchio registrato della N.V. Philips-Duphar - Amsterdam

3791

TERSANIL polvere

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere solubile — Fungicida a base di chinosolo per la disinfezione solo di piantonai e semenzai di colture floricole ed ornamentali

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
69,5 g di Chinosolo puro
Inerti quanto basta a 100 grammi

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in un luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Il TERSANIL POLVERE è un fungicida ad azione curativa e preventiva per la lotta contro i marciumi radicali, mal dello sclerozio, mal del colletto, fusariosi ed altre malattie fungine dei semenzai e dei piantonai di piante floricole ed ornamentali.

Modalità di impiego
Dosi per 10 litri di acqua:
Mal dello sclerozio, mal della tela nei semenzai e nei piantonai di colture floricole ed ornamentali:
Lotta preventiva: g 0,5 nebulizzando più volte la vegetazione
Lotta curativa: g 1 nebulizzando in ragione di 2-3 litri di soluzione per m².
Su terreno umido usare TERSANIL POLVERE in ragione di g 10 per m².

Mal del colletto, marciume delle piantine nei semenzai e nei piantonai di colture floricole ed ornamentali:
Lotta preventiva: 0,5 g ripetendo le irrorazioni ogni 15 giorni
Lotta curativa: g 1 - 3, disinfettando il terreno poco prima della messa a dimora delle colture.
Su terreno umido usare il TERSANIL POLVERE in ragione di 10 g per m².

Preparazione della poltiglia
Sciogliere il TERSANIL POLVERE in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Il TERSANIL POLVERE è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 3791 del 19.6.80 Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg 1

DU PONT
DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3794

Utarame S Caffaro

Polvere secca a base di rame e zolfo

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Rame metallo . . . . (sottoforma di ossicloruro tetraramico)	g 25
Zolfo puro (esente da selenio) .	g 8
Coformulanti .	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

caffaro S.p.A. - Milano

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 3794 del Ministero della Sanità del 15-9-1980

CARATTERISTICHE

L'**UTARAME S CAFFARO** è un anticrittogamico studiato per trattamenti polverulenti. Questo formulato permette una riduzione del tempo e delle spese di somministrazione.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

- Peronospora della vite;
- Ticchiolatura delle pomacee (melo, pero);
- Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cercospora delle colture orticole (aglio, barbabietola, carota, cavolo, cipolla, fagiolo, fagiolino, melanzana, patata, pisello, pomodoro, spinacio).

La dose di impiego va da 15 a 25 kg per ettaro e per trattamento.
Distribuire il prodotto uniformemente con polverizzatori alle epoche indicate dagli schemi di difesa normalmente in uso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

L'**UTARAME S CAFFARO** non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.) con oli minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, con Diclofluanide.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Avvertenza: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

(*) Meli cupro-sensibili: Abbondanza «Belfort» - Commercio - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman -Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - King David - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana.

(**) Peri cupro-sensibili: Abate Fetel - Buona Luigia D'Avranche - Butirra Clairgeau -Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard.

NOCIVITÀ: l'**UTARAME S CAFFARO** è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg --

3797

QUINTAMON S

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

POLVERE BAGNABILE

Fungicida organico per la disinfezione dei semenzai e dei piantonai delle colture floricole ed ornamentali per la lotta contro i marciumi radicali, il mal del piede ed altre malattie crittogamiche.

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:
30 g Dicloran puro
0,9 g Chinosolo puro
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 g.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazione mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

Nel QUINTAMON® S sono abbinate le attività anticrittogamiche di due sostanze attive, il dicloran ed il chinosolo, indicate per la lotta contro i marciumi pedali e radicali provocati da funghi del terreno quali Sclerotinia, Botrytis, Rhizoctonia, Fusarium.

Modalità d'impiego

Disinfezione dei semenzai e dei piantonai delle colture floricole ed ornamentali (semenzai, piantonai): impiegare 4-5 g di prodotto per m², interrandolo a 2-3 cm di profondità, oppure 250-300 g di formulato in acqua e distribuiti su 100 m² di superficie.
Marciume dei bulbi e dei tuberi in piantonai e semenzai (dalie, gladioli, narcisi, tulipani, gigli, fresie): impolverare i bulbi ed i tuberi con 500-600 g di prodotto ogni 100 Kg, oppure immergerli per 20-30 minuti in una sospensione allo 0,5%.

Preparazione della poltiglia e tecnica di impiego

Il QUINTAMON® S si può usare per nebulizzazioni con acqua e per trattamenti polverulenti a secco.
Polverizzazioni: Effettuare delle polverizzazioni leggere con l'aiuto di un polverizzatore ben regolato.
Nebulizzazione: Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Per la nebulizzazione il QUINTAMON® S è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i periodi più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

Registrazione N. 3797 del 29.11.82 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg 5 - 1 - 10

3827

I CLASSE

VELENO

Parafos' 20

Insetticida liquido

Il PARAFOS 20 agisce per contatto, per ingestione e per asfissia contro i più dannosi insetti in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, colture in pieno campo di ornamentali.

Composizione

100 g. di prodotto contengono:
19,7 g di Parathion puro
Coformulanti specifici ed inerti quanto basta a 100 grammi.
Contiene «XILOLO».
ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
— Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
SINTOMI DI INTOSSICAZIONE
Lacrimazione - miosi - scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - bradicardia - ipotensione - fibrillazioni muscolari - convulsioni - edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia;
iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.
CONTROINDICAZIONI: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

Caratteristiche

Il PARAFOS 20 agisce per ingestione, per contatto e per asfissia contro gli insetti più dannosi in frutticoltura (melo, pesco, albicocco, ciliegio, pruno, castagno, noce, olivo, agrumi), viticoltura, orticoltura (cavoli, insalate, carote, pomodori, patate, peperoni, melanzane, meloni, cocomeri, cetrioli, zucche, zucchini, cipolle, aglio, porri, carciofi, asparagi, fagioli, fagiolini, piselli, bietole), e colture in pieno campo di ornamentali.

Modalità di impiego

Dosi per 100 litri d'acqua:
Contro Afidi, Tentredini, Tignole dell'uva: 50-80 cc; Psillidi, Larve di Coccinlglie, Coleotteri, Cocciniglie cotonose, Bruchi, Afide lanigero: 80-100 cc.

Preparazione della poltiglia

Versare il PARAFOS 20 lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il PARAFOS 20 è miscibile con i più comuni antiparassitari. In combinazione con poltiglie contenenti calce (poltiglia bordolese, polisolfuro di calcio) va irrorato entro poche ore.
La miscela con prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi per la fauna utile

Il PARAFOS 20 è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
In caso di miscela con olii minerali tale periodo deve essere elevato a 30 giorni.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti — ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 3827 del 15.9.80 del Ministero della Sanità.

Contenuto 10

DA NON VENDERSI SFUSO.

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3845

Insetticida in polvere bagnabile per la difesa di fruttiferi, vite, agrumi, olivo, bietola da zucchero, ortaggi, fiori e colture ornamentali in pieno campo, colture forestali e vivai di colture arboree.
Si impiega in trattamenti liquidi contro insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore.

COMPOSIZIONE	
— Endosulfan puro .	g. 32,9
— Coadiuvanti ed inerti: quanto basta a	g. 100

® Marchio registrato SIPCAM - Milano

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato, munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di Produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

Registrazione n. 3845 del 12/9/1980 Ministero della Sanità

Natura del rischio: rischio di intossicazione per inalazione per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto sotto chiave. in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; evitare di respirare i vapori. non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle e gli occhi; durante la preparazione e l'impiego usare tute. guanti. maschere ed occhiali protettivi; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva). in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:
Vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.

Consigli terapeutici:
Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante, somministrazione di purganti salini (g. 25 di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.
Barbiturici (Luminal 0,1-0,2 g.) contro i tremori e le contrazioni muscolari; fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni:
la morfina e l'alcool e, per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina e l'efedrina.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla dose di g. 100-150 diluiti in 100 litri di acqua, aumentandola fino a g. 200 in 100 litri di acqua in caso di forti infestazioni.
Le dosi indicate sono relative ad irrorazioni effettuate con pompe a volume normale.
Il prodotto si impiega sulle colture e contro gli insetti di seguito specificati:

Fruttiferi: psilla del pero, tignola del melo e del pesco, afidi, minatrici fogliari, antonomo, tripidi, tentredini, cicaline, eriofide delle fragole e del nocciolo.

Vite: tignola dell'uva, sigaraio, oziorrinco, cassida.

Agrumi (arancio, limone, mandarino, mandarancio): afidi e tripidi.

Olivo: oziorrinco, margaronia, tignola (di prima e seconda generazione).

Bietola da zucchero: altica, cleono, lixo, afidi, mamestre, cassida, (dose per ettaro di superficie 1,5-2 kg.).

Fiori e colture ornamentali (solo in pieno campo): afidi, tripidi, tentredini, eriofide del ciclamino, cimici, cicadelle.

Colture forestali, vivai di colture arboree (melo, pero, pesco, susino, albicocco, mandorlo, ciliegio, vite, agrumi, olivo): insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore in genere.

Preparazione della poltiglia: stemperare la quantità di prodotto necessario in poca acqua e portare poi al volume desiderato agitando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo. Non è compatibile con i prodotti alcalini tipo poltiglia bordolese, polisolfuri e calce.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima della raccolta.

Attenzione. da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 1

3847

CUPRAVIT MICRO

OSSICLORURO DI RAME MICRONIZZATO

**per irrorazioni
in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, floricoltura, bieticoltura, olivicoltura e agrumicoltura**

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Cupravit Micro contengono:
g 30 di rame puro (sotto forma di ossicloruro);
sospensivanti, bagnanti ed inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: *in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

ISTRUZIONI PER L'USO

Frutticoltura: 1) Melo e Pero - Contro la ticchiolatura: 0,25-0,3% prima della fioritura; 0,2-0,25% dopo la fioritura; 0,15-0,2% per i trattamenti al verde. 2) Drupacee - Contro la bolla del pesco, la perforazione delle foglie: 1% solo per i trattamenti invernali.
Viticoltura: contro la peronospora della vite: 0,4-0,5%.
Orticoltura: contro la septoriosi del sedano e del pomodoro, l'antracnosi del pisello, la peronospora della patata, del pomodoro e della cipolla, l'alternariosi della patata e del pomodoro: 0,5%.
Floricoltura in pieno campo o in serra: contro la peronospora e la ticchiolatura della rosa, la ruggine del garofano, la septoriosi del garofano e del crisantemo: 0,3-0,5%.
Bieticoltura: contro la cercospora o vaiolatura delle foglie e la peronospora: 0,5%.
Olivicoltura: contro il vaiolo o occhio di pavone: 0,3-0,5%.
Agrumicoltura (Limoni, Aranci, Mandaranci, Mandarini): contro l'antracnosi, il marciume dei frutti e il mal secco: 0,3-0,5%.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Il Cupravit Micro è miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra, ad eccezione di quelli che contengono TMTD (Pomarsol 50). **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana), e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la plena ripresa vegetativa.
Nocività: Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: STI - Solfotecnica Italiana
Cotignola (RA) - Via S. Francesco

Registrazione Ministero Sanità n. 3847 del 3-10-1980

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg

BAYER

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

BAYER

3879

CEPOS

Diserbante selettivo per colture orto-floricole e per la fragola

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Clorthal-metile puro	g 73,5
Coformulanti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CAFFARO S.P.A. - MILANO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 3879 del Ministero della Sanità del 16-10-1980

CARATTERISTICHE
Il CEPOS è un diserbante selettivo, formulato come polvere bagnabile, da impiegare in pre-emergenza delle infestanti sulle seguenti colture: **cipolla, porro, sedano, finocchio, carota, peperone, fragola, aglio, asparago, bulboso da fiore.**
Il CEPOS agisce come "antigerminello" sui semi di Digitaria, Amarantus, Chenopodium, Setaria, Portulaca, Stellaria, Papaver, Poa annua, ecc. Poco sensibili sono le poligonacee; non esplica nessuna azione sulle infestanti già nate e sulle perennanti (gramigna, cipero, stoppione, e vilucchio); resistenti sono anche Alopecurus e Capsella.
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Kg 15-18/ha in circa 600 litri di acqua in post-semina o post-trapianto della coltura.
Il CEPOS può essere impiegato anche su **cetriolo, anguria e melone** (dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto) e su **pomodoro** (trattando 4-6 settimane dopo il trapianto).
Su fragola e su asparago il trattamento va effettuato dopo la messa a dimora per i nuovi impianti e prima della ripresa vegetativa primaverile per i vecchi impianti.
Su campi da golf e prati all'inglese (turf) impiegare kg 13/ha in 600 litri di acqua all'inizio della primavera, prima della germinazione delle infestanti dopo aver eseguito il taglio quanto più raso possibile del tappeto erboso. Dopo il trattamento, effettuare un'abbondante irrigazione a pioggia.
Per preparare la miscela diserbante stemperare prima la dose necessaria in poca acqua e portarla al volume desiderato; distribuirla infine mantenendola in costante agitazione, su terreno ben lavorato, ripulito da erbacce e con sufficiente grado di umidità.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ:
Il prodotto deve essere applicato da solo.
FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Durante l'irrorazione evitare che lo spruzzo giunga su colture diverse da quelle da trattare.
Avvertenze: se le colture trattate dovessero fallire per cause avverse si possono subito ripiantare le colture verso le quali il prodotto è selettivo e raccomandato.
Non effettuare il trattamento in terreni torbosi dove il prodotto viene disattivato dalla sostanza organica.
Prima di seminare cereali sullo stesso terreno trattato con CEPOS nel periodo estivo, è prudente effettuare una buona aratura e lasciare per 15-20 giorni il terreno a riposo.
Nocività: durante il trattamento ed il relativo periodo di carenza, tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO Kg 10

3908

TIOSOL(r) B

Zolfo bagnabile micronizzato per la lotta contro l'Oidio o mal bianco della vite, del melo, del pesco, delle colture orticole (pisello, carciofo, bietola, carota, insalate, melone, zucca, zucchino, cocomero, cetriolo), colture floreali ed ornamentali.

COMPOSIZIONE	
– Zolfo puro (esente da Selenio)	g 60
– Coadiuvanti ed Inerti: quanto basta a	g 100

(R) Marchio registrato SIPCAM–MILANO

SIPCAM–Soc.It.Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano

CLASSE IV

Officina di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A - Via De Gasperi - Cotignola (RA)

Registrazione n. 3908 del 16.10.1980 - Ministero della Sanità

Norme precauzionali: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico dei prodotti usati per la miscela mostrandogli le etichette

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega contro tutte le specie di Oidio o mal bianco che colpiscono le colture di vite, melo, pesco, colture orticole (pisello, carciofo, bietola, carota, insalate, melone, zucca, zucchino, cocomero, cetriolo), colture floreali ed ornamentali.
Il prodotto si impiega alla dose di g 200–400 per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale, usando la dose più bassa durante i periodi con più alte temperature.
Poiché in viticoltura le epoche di intervento coincidono praticamente con quelle contro la Peronospora, è sempre necessario associare il prodotto alle poltiglie acupriche o rameiche usate contro la Peronospora.
Effettuare sempre i trattamenti in ore fresche della giornata evitando di trattare subito dopo una pioggia.

Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto in poca acqua a parte, versandolo poi nel totale quantitativo di acqua o nella poltiglia a cui si vuole associare, agitandolo con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese, ecc.) con Olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, con Diclorofluanide ed inoltre deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli Olii minerali e del Captano.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico sulle varietà seguenti di mele : Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap; può inoltre arrecare danno alla varietà di vite Sangiovese e può essere fitotossico, con temperature elevate, su cucurbitacee.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

3923

Thiamon® colloidale

CLASSE IV

Polvere bagnabile — Zolfo bagnabile per la lotta contro gli Oidi in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e colture ornamentali.

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:
80 gr. di Zolfo puro (esente da selenio)

Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

Il THIAMON ® COLLOIDALE si distingue per la sua alta sospensività ed adesività. Possiede un'azione pronta, anche a basse temperature.

Modalità di impiego

Dose per 100 litri di acqua:

Frutticoltura: (melo, pero, pesco) trattamenti pre-florali g 200-400, trattamenti post-florali g 150-200;

Viticoltura: trattamenti preventivi g 100-200; in presenza di attacchi g 200-300;

Orticoltura: (cetrioli, meloni, pomodori, piselli) g 100-200;

Tabacco: intervenendo al manifestarsi della malattia con 2-3 trattamenti distanziati di circa 10 giorni l'uno dall'altro: g 150-250;

Colture ornamentali: (crisantemi, cinerarie, begonie, ortensie, rose) g 100-200.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

Il THIAMON ® COLLOIDALE non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, Diclofluanide.

Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il THIAMON ® COLLOIDALE può arrecare danno alle seguenti cultivars di Mele: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla Bianca - Commercio - Golden Delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Romo Beauty - Stayman Red - Winesap.

Pere: Buona Luisa D'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - Williams - Decana del Comizio.

Vite: Sangiovese.

Cucurbitacee - può essere fitotossico.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N 3923 del 16.10.80 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 1 - 2 - 2,5

DU PONT — DU PONT CONID SPA AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3924

THIAMON® 80

CLASSE IV

Polvere bagnabile — **Zolfo bagnabile micronizzato per la lotta contro gli Oidi in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e colture ornamentali**

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:
80 g di zolfo puro (esente da selenio)

Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

Il THIAMON ® 80 possiede un'elevata sospensività ed adesività, resistenza al dilavamento ed un'azione pronta anche a basso temperature.
E' impiegato per la lotta contro il mal bianco dello piante da frutto, della vite, delle colture orticole ed ornamentali.

Modalità di impiego

Dose per 100 litri di acqua:
Frutticoltura: (melo, pero, pesco) trattamenti pre-florali g 700, trattamenti post-florali 300-400;
Trattare ogni 8-10 giorni a cominciare dalla liberazione delle gemme. In miscela con fungicidi (A 150, DITHANE M-45) potenzia l'effetto della poltiglia contro la Ticchiolatura.
Viticoltura: g 200-400;
Orticoltura: (cetrioli, meloni, pomodori, piselli) g 100-300;
Tabacco: intervenendo al manifestarsi della malattia con 2-3 trattamenti distanziati di circa 10 giorni l'uno dall'altro: g 300-350.
Colture ornamentali: (crisantemi, cinerarie, begonie, ortensie, rose) g 100-300.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto in poca acqua e aggiungerlo alla quantità di acqua o di poltiglia necessaria, mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

Il THIAMON ® 80 non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, Diclofluanide.

Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali o del Captano.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il THIAMON ® 80 può arrecare danno alle seguenti cultivars di
Mele: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla Bianca - Commercio - Golden Delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.
Pere: Buona Luisa D'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - Williams - Decana del Comizio.
Vite: Sangioveso.
Cucurbitacee: può essere fitotossico.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 39[illegible] del 16.10.80 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 1-5-10-20-25

DU PONT — DU PONT CONID SPA AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3926

TRINET COMBI

CLASSE IV

Polvere bagnabile **Diserbante selettivo di pre-emergenza per il frumento**

Composizione 100 grammi di prodotto contengono:

Trifluralin puro	g. 14,3
Neburon puro	g. 40,5
Bagnanti, disperdenti ed inerti q. b. a	g. 100

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche Il TRINET COMBI è un erbicida specifico per il diserbo del frumento in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.

Il TRINET COMBI combatte efficacemente le infestanti graminacee e dicotiledoni quali Alopecurus, Apera spica venti, Bromus, Lolium, Setaria, Digitaria, Poa, Echinochloa, Amaranthus, Atriplex, Ambrosia, Capsella, Chenopodium, Oxalis, Papaver, Polygonum, Portulaca, Raphanus, Sinapis, Sonchus, Spergula, Stellaria, Veronica, Galium, Lamium, mantenendo una perfetta selettività.

Istruzioni speciali Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del TRINET COMBI e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio.

Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orzo, ecc.) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto.

La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

Modalità di impiego Frumento autunnale — dose media Kg. 4-5 per ettaro distribuiti con almeno 500 litri di acqua per ettaro. Il trattamento con TRINET COMBI va effettuato dopo la semina del frumento, prima della emergenza della coltura e delle infestanti.

L'efficacia erbicida è migliore su terreno ben lavorato, privo di zolle, con elevato grado di umidità del suolo al momento del trattamento e dopo la sua esecuzione.

Preparazione della poltiglia Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità Il TRINET COMBI è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Non ripetere il trattamento sulle colture prima di sei mesi.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 3926 del 16.10.80 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 0,5 - 1 - 5

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

3932

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ICI Solplant SpA — Del gruppo Imperial Chemical Industries PLC — ICI

'SPERSUL' 2

Zolfo colloidale bagnabile finemente disperso contro le infezioni oidiche delle colture arboree ed erbacee

COMPOSIZIONE

Zolfo puro colloidale (esente da selenio)	g 80
Disperdenti, bagnanti ed additivi	q.b. a g 100

CLASSE IV

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione: ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Confezionato presso: SICOPA S.n.c. - Pianello Val Tidone (PC)
Registrazione Ministero della Sanità n. 3932 del 13-10-1980
'SPERSUL' - Trade Mark - **Imperial Chemical Industries PLC**

'SPERSUL' 2 consente trattamenti più efficaci, rispetta la vegetazione, agisce anche a basse temperature che ostacolano l'azione degli zolfi in formulazione normale.

DOSI DI IMPIEGO (riferite a 100 litri d'acqua)

Viticoltura:
g 100-150: oidio (trattamenti post-fioritura)
g 200-250: oidio (trattamenti pre-fioritura)
g 300 : erinosi

Frutticoltura:
g 200-300: oidio del melo e del pero, mal bianco del pesco, del susino e del ciliegio, corineo del pesco delle nettarine e dell'albicocco.
g 400 : due trattamenti pre-fiorali sulle pomacee con 'SPERSUL' 2 da solo o in associazione con i più comuni fungicidi ne attiva l'efficacia contro la ticchiolatura.

Floricoltura (in pieno campo):
g 150-300: oidio delle rose e del crisantemo, mal bianco del garofano.

Orticoltura:
g 150-300: oidio della lattuga, radicchio, cicorino, zucchino, melone, cetriolo, cocomero, cardo, carciolo, spinacio, pisello, pomodoro, barbabietola, melanzana.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

Non è miscibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali, captan, DDVP, binapacryl, diclofluanide.
Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli olii minerali e del captan.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Evitare di applicare 'SPERSUL' 2 nelle ore calde e soleggiate.
Può essere fitotossico per cucurbitacee e vite Sangiovese
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di **mele:** Blak Ben Davis, Blak Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap, e di **pero:** Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
Sospendere il trattamento 5 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

g

3949

Solvitene® P.

Fungicida acuprico in polvere secca a base di Ditiocarbammati di zinco e di zolfo: per la difesa della Vite, Pomodoro e Garofano.
Si impiega in trattamenti polverulenti contro: Peronospora ed Oidio della vite, crittogame del pomodoro e Ruggine del garofano.

COMPOSIZIONE

— Zineb puro	g	3,3
— Ziram puro	g	2,7
— Zolfo (selenio assente) puro	g	40,0
— Coadiuvanti, coloranti, inerti: quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM—Milano

SIPCAM- Soc. It. Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA
Montalcino frazione Torrenieri (SI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 3949 del 20/12/1980 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusione di sangue.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si distribuisce in ragione di 25-40 Kg/ha a seconda dello sviluppo delle colture, con i comuni solforatori a mano o meccanici, effettuando i trattamenti di buon mattino possibilmente quando la vegetazione è bagnata dalla rugiada. Se a breve distanza dal trattamento cade una pioggia intensa è opportuno ripetere l'applicazione.

- **Vite contro la Peronospora e l'Oidio:** i trattamenti si eseguono in fioritura, alla formazione degli acini, all'invaiatura e successivamente secondo l'andamento stagionale e l'intensità delle malattie.
- **Pomodoro** : solo fino alla prima fioritura, contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi. I trattamenti vanno iniziati prima della comparsa delle malattie e ripetuti a distanza di 7-10 giorni o ad intervalli più ravvicinati a seconda dell'andamento stagionale e dell'intensità delle malattie.
- **Garofano:** contro la Ruggine.

Da non applicare con mezzi aerei.

Da non impiegare in serra.

Da non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità: non è compatibile con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, Diclofluanide, ed inoltre deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può arrecare danno alla varietà di vite Sangiovese.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 1

3952

Solvitene® S

Fungicida acuprico in polvere bagnabile micronizzata a base di Ditiocarbammati di Zinco e Zolfo.
Si impiega per la lotta contemporanea contro la Peronospora e lo Oidio della vite, Peronospora, Alternariosi, Septoriosi e Cladosporiosi del pomodoro (solo fino alla prima fioritura), Ticchiolatura ed Oidio del melo, Ruggine del garofano.

COMPOSIZIONE		
— Zineb puro	g	19,5
— Ziram puro	g	23,75
— Zolfo puro (Selenio assente)	g	25
— Coadiuvanti, coloranti ed inerti, quanto basta a	g	100

(r) Marchio registrato SIPCAM - Milano.

SIPCAM—Soc.It.Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA
Montalcino frazione Torrenieri (SI)

CLASSE III

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Registrazione n. 3952 del 9/12/1980 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento é avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente é cosciente; se é in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusione di sangue.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto è un anticrittogamico acuprico costituito da una associazione di ditiocarbammati di zinco dei tipi Ziram e Zineb e di Zolfo che gli conferisce caratteristiche qualitative derivanti dalla consociazione dei requisiti positivi dei suddetti principi attivi.

Pomodoro: solo fino alla prima fioritura, **contro la Peronospora, l'Alternaria, la Septoria,** si impiega alla dose normale di g 400-500 in 100 litri di acqua irrorati con pompe a volume normale, ripetendo i trattamenti ad opportuni intervalli secondo lo sviluppo delle malattie.

Vite: contro la Peronospora e l'Oidio, si impiega alla dose normale di g 400-500 per 100 litri di acqua irrorati con pompe a volume normale. I trattamenti si eseguono secondo i consueti calendari adottati per la comune poltiglia bordolese e per le altre poltiglie rameiche.

Melo: contro la **Ticchiolatura e l'Oidio,** si impiega alla dose normale di g 400-500 per 100 litri di acqua irrorati con pompe a volume normale, in trattamenti primaverili-estivi ripetuti ad opportuni intervalli.

Garofano: contro la Ruggine, il prodotto si impiega alla dose normale di g 400-500 per 100 litri di acqua irrorati con pompe a volume normale.
I trattamenti si effettuano a partire dalle prime fasi vegetative delle colture e si ripetono durante il ciclo di sviluppo delle stesse ad intervalli di 10-15 giorni.

Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto in poca acqua a parte, aggiungere poi gradatamente il totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei.

Da non impiegare in serra.

Da non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità: alla poltiglia di prodotto possono essere associati tutti i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo ad eccezione delle sostanze alcaline quali polisolfuro e poltiglia bordolese; non è compatibile inoltre con Olii minerali, Captano, DDVP, Binapacril, Diclofluanide e deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego di Olii minerali e del Captano.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può arrecare danno alla seguenti varietà di melo: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap e di vite Sangiovese

Rischi di nocività: per 8-10 giorni dopo il trattamento, impedire alle galline di entrare nel frutteto.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

3973

SOLBAR "S"

POLISOLFURO DI BARIO

CLASSE II

NOCIVO

a.. elevata solubilità per trattamenti antiparassitari in frutticoltura, viticoltura e floricoltura
45% di zolfo attivo

COMPOSIZIONE

g 100 di Solbar "S" contengono:
g 99 di polisolfuro di bario tecnico (corrispondente a g 45 minimo di zolfo attivo);
solubilizzanti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: intossicazione grave per inalazione, per ingestione, o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto, schiacciandole e poi interrando in fosse profonde circa un metro cospargendo con calce viva. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto orale

Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, coliche addominali, diarrea profusa, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea (la morte avviene in piena coscienza per paralisi respiratoria).

Consigli terapeutici di massima e condizioni al caso: lavanda gastrica con solfato di sodio o magnesio - Analettici cardiorespiratori - Spasmolitici - Fleboclisi con aspartato di potassio (1-3 mEq: K flebo).

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Frutticoltura: Drupacee (pesco, susino, ciliegio): 4-6% contro cocciniglie e mal bianco. - Pomacee (melo e pero): 5-7% contro cocciniglie, ticchiolatura e mal bianco.

Viticoltura: 2-3% contro oidio ed erinosi.

Floricoltura: 2-3% contro mal bianco od oidio della rosa.

N.B. - Il trattamento con Solbar "S" si esegue all'ingrossamento delle gemme.

N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

AVVERTENZE

Per l'esecuzione dei trattamenti con Solbar "S" è consigliabile non fare uso di pompe irroratrici di rame, ma soltanto di pompe irroratrici di ottone, di bronzo o di rame rivestite di piombo. Qualora non si abbiano disponibili che pompe di rame, queste devono essere lavate più volte al termine dei trattamenti. Le macchie di Solbar "S" sui vestiti si possono togliere facilmente lavandole con aceto diluito.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Solbar "S" è miscibile con prodotti a base di esteri fosforici; in tal caso è necessario aumentare di 1/3 la dose di questi prodotti.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: STI - Solfotecnica Italiana
Cotignola (RA) - Via S. Francesco

Registrazione Ministero Sanità n. 3973 del 20-12-80

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Kg [illegible]

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

3991

3991

DA NON VENDERSI SFUSO

CARATTERISTICHE

Il GRANOX S 48 è un diserbante ormonico-selettivo efficace contro le erbe infestanti non graminacee.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

Sintomi di intossicazione: Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni, coma.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Conservare questo prodotto chiuso a chiavo in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi con acqua e sapone. - Evitare di respirare i vapori.

NORME PRECAUZIONALI

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NATURA DEL RISCHIO

ERBICIDA SELETTIVO NON VOLATILE

Per la lotta contro le erbe infestanti non graminacee del grano e altri cereali (orzo, segale, avena).

GRANOX S 48

Composizione (Rif. a gr. 100):
2,4 D puro (da sale amminico) .... gr. 32,5
Diluenti e bagnanti .... q.b. a 100

Classe III

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Contenuto Kg. 1

Registrazione n. 3991 del 11.9.81 del Min. Sanità

DOTT. Formenti S.p.A.
20149 MILANO - VIA CORREGGIO, 45

Off. di prod. DIACHEM S.p.A. - Albano S.A. (BG)

MODALITÀ D'IMPIEGO

Dosi: da kg. 1,2 a kg. 2,4 per ettaro diluiti in 300-600 litri di acqua, secondo il tipo di irroratrice usata, agitando con cura.

Epoca del trattamento: su colture di grano, orzo o segale di semina autunnale, il trattamento deve essere effettuato nel periodo che va dalla fine dell'«accestimento» all'inizio della fase di «botticella» (rigonfiamento della spiga nella guaina fogliare).
Non trattare durante la fase di «botticella» nè durante la fioritura.
Il trattamento può essere eseguito con qualsiasi tipo di pompa irroratrice (a spalla o a traino) purchè la distribuzione del liquido avvenga in modo uniforme e la dose per ettaro rimanga costante qualunque sia il quantitativo di acqua impiegato.
È consigliabile usare dosi alte nel caso di erbe infestanti resistenti e adulte, vegetazione fitta; usare dosi basse per infestazioni normali, infestanti poco resistenti e giovani, temperature superiori a 15°C.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il GRANOX S 48 può essere miscelato con CORNOX M 30 e altri erbicidi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può danneggiare colture sensibili, quali la vite, piante da frutta, ortaggi, piante ornamentali, pioppi, ecc.; evitare quindi che venga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Non fare il trattamento con GRANOX S 48 su cereali traseminati con leguminose (trifoglio su grano) o su mais.
Non trattare in giornate di pioggia e di vento o con temperature inferiori al 12°C.
Non usare per altri trattamenti antiparassitari la pompa impiegata per il diserbo.

Nocività: è nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

3992

ZIRAMON®

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

POLVERE BAGNABILE - Fungicida organico a base di Ziram micronizzato

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Ziram puro gr. 80
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a grammi 100.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscenza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.

Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE

Lo ZIRAMON® lascia sulle piante trattate un deposito uniforme e resistente al dilavamento. Non imbratta la frutta, nè le piante ornamentali e non richiede l'aggiunta di sostanze bagnanti o adesivanti nemmeno per il trattamento alle piante difficilmente bagnabili.

MODALITA' D'IMPIEGO

Lo ZIRAMON® è d'impiego generale contro le malattie crittogamiche delle piante, ma è particolarmente indicato nelle seguenti colture:

Frutticoltura: Melo e Pero: contro la Ticchiolatura: Trattamenti pre-fiorali g 150-200, trattamenti post-fiorali g150. Pesco: contro la Bolla ed il Corineo: trattamenti al bruno (autunno - invernali) g 400-500; trattamenti al verde (primaverili-estivi) g 150
Floricoltura: Garofano: contro la Ruggine; Rose contro la Ticchiolatura g 150-200
Orticoltura: Asparago: contro la Ruggine g 200; Cocomero e Fagiolo: contro l'Antracnosi g 200; Pomodoro: contro la Peronospora, l'Alternaria e la Septoria g 300
Fragola: contro il Marciume g 200

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Lo ZIRAMON® è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese). La miscela con certi prodotti emulsionabili (METIAMON) non è consigliabile.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per le varietà di pero: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione n. 3992 del 12.11.1980 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto Kg. 1-5-10-20-25

3996

Fungicida acuprico per la difesa della vite, pomacee, tabacco, pomodoro, garofano.
Si impiega per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco, Ticchiolatura delle pomacee, Alternariosi e Septoriosi del pomodoro, Ruggine del garofano.

COMPOSIZIONE	
— Zineb puro .	gr. 80
— Coadiuvanti ed inerti, quanto basta a .	. gr. 100

(R) Marchio registrato SIPCAM - Milano

SIPCAM–Soc.It.Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA
Montalcino Frazione Torrenieri (SI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 3996 del 12/11/1980 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento é avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente é cosciente; se é in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusione di sangue.

MODALITA' DI IMPIEGO

Le dosi di impiego sono riferite a 100 litri di acqua irrorati con pompe a volume normale.

Vite: contro la Peronospora il prodotto si impiega alla dose di **gr. 150-250**; i trattamenti si effettuano seguendo i normali calendari adottati per la poltiglia bordolese e le altre poltiglie rameiche.
Per la lotta contemporanea contro l'Oidio o Mal bianco della vite è necessario associare ad ogni ettolitro di poltiglia di prodotto **gr. 200-400** di TIOSOL B (zolfo bagnabile) o **gr. 80-100** di TIOKOLL 80 (zolfo colloidale) oppure **gr. 200-300** di TIOSOL 80 (zolfo micronizzato).

Pomacee: contro la Ticchiolatura del melo e del pero usare una dose di **gr. 150-250**, in trattamenti primaverili-estivi ripetuti ad opportuni intervalli.

Tabacco: contro la Peronospora tabacina il prodotto si impiega alla dose di **gr. 250**. I trattamenti si iniziano alla nascita delle piantine, ripetendo gli interventi ogni 2-3 giorni per tutto il periodo di permanenza delle piantine in semenzaio; dopo il trapianto i trattamenti vanno proseguiti ed effettuati 1-2 volte alla settimana a seconda della stagione e della virulenza della malattia.

Pomodoro: solo fino alla prima fioritura contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi: **gr. 250.**

Garofano: contro la Ruggine: **gr. 150-250.**

Preparazione della poltiglia: stemperare accuratamente in poca acqua a parte la prestabilita quantità di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua agitando energicamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Da non impiegare in serra.

Da non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità: il prodotto non è compatibile in miscela con sostanze alcaline, come polisolfuro, poltiglia bordolese, calce. E' miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: su alcune cultivar di pero (Butirra Precoce Morettini, Conference, Curato, Principessa di Gonzaga, Zucchermanna, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate, Spadoncina, Scipiona, Coscia, Mora, Giardina, Spinacarpi, Armella, S. Maria, Decana del Comizio, Abate Fètel), il prodotto può dare luogo a manifestazioni fitotossiche e pertanto se ne sconsiglia l'uso.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 1

SIPCAM

4005

ETAZIN C 80

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI ZINEB

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono
ZINEB puro gr 65
Disperdenti, bagnanti, coloranti, inerti q.b. a gr 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.)
Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni.
In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

L'ETAZIN C 80 è una polvere blu da impiegarsi per trattamenti liquidi alla vite, alle piante di melo e pero e alle colture, pomodoro solo fino alla prima fioritura — e garofani in pieno campo
Si usa a dosi varianti da gr 200 a gr 300 per ettolitro di acqua contro: Ticchiolatura del melo e del pero; Peronospora della vite; Alternariosi e Septoriosi del pomodoro, ruggine del garofano.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA - NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità: l'ETAZIN C 80 è miscibile con tutti i prodotti di comune impiego.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Varietà di pere sensibili allo Zineb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Intervallo che deve essere rispettato fra l'ultimo trattamento e la raccolta: 28 giorni.

« Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. »
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. »
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. »

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a — CENTO (Ferrara) — Tel. 906207

Stabilimento di produzione:
AGRINDUSTRIA - S. CIPRIANO PO (PV)
Reg. n. 4005 del 11/11/80 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO PESO NETTO KG

DIMILIN® 12

CLASSE IV

Polvere bagnabile — **Insetticida per ingestione ed a largo spettro d'azione, per la difesa delle piante di melo e pero, forestali, ornamentali e floreali in pieno campo.**

Composizione

100 g di prodotto contengono:
12 g di Diflubenzuron puro
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 g

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

Il DIMILIN® 12 appartiene ad un gruppo di insetticidi di sintesi, che agiscono esclusivamente contro le forme larvali degli insetti, con un processo che ne blocca lo sviluppo nelle fasi di muta.

Il diflubenzuron, principio attivo del DIMILIN® 12, ha infatti la proprietà di inibire la formazione della chitina, procedimento fondamentale di quel complesso di trasformazioni che va sotto il nome di metamorfosi degli insetti.

L'azione del DIMILIN® 12 si esplica soltanto nella fase di muta degli insetti. Le larve, dopo l'ingestione dell'insetticida, continuano normalmente il proprio sviluppo. Soltanto nelle fasi di muta successive, conseguentemente alla alterazione del processo di formazione della chitina da parte del diflubenzuron, le larve non riescono a formare un nuovo epitelio ed a liberarsi dalla esuvia. Il DIMILIN® 12 non ha pertanto alcuna attività insetticida nei confronti degli insetti adulti, i quali hanno già completato il loro processo metamorfico.

L'azione insetticida del DIMILIN® 12 è particolarmente significativa contro molti parassiti dannosi alle colture agrarie, quali: minatrici delle piante da frutto, ricamatrici, tortricidi in genere, nottue, tignole, bega verde e bega africana del garofano, psilla del pero, processionaria del pino, Lymantria dispar.

Modalità d'impiego

Dosi per 100 litri d'acqua:

Frutticoltura (melo, pero): contro le minatrici (litocollete, cemiostoma) g 80-160. Effettuare il trattamento durante la fase di volo degli adulti, in corrispondenza della ovideposizione.

Il prodotto non è attivo contro le larve già racchiuse nelle mine.

Contro le ricamatrici del melo e del pero (Capua, Pandemis, Adoxophies) g 150-250. Trattare durante la deposizione delle uova. **Contro la psilla del pero:** g 200-300. Effettuare il trattamento alla schiusura delle uova.

Piante forestali: contro Lymantria dispar, processionaria del pino, tignole, nottue, agrotidi e tortricidi in genere: g 150-250.

Piante ornamentali: (solo in pieno campo) **contro tignole e nottue** g 150-250. Su tutte le colture effettuare il trattamento in linea di massima durante la deposizione delle uova o al più tardi quando le uova stanno per schiudere.

Colture floricole: (solo in pieno campo) **contro bega verde e la bega africana del garofano, nottue, aleurodidi, tignole e agrotidi: g 150-300.**

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

Il DIMILIN® 12 è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

REGISTRAZIONE N. 4019 16.10.80

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 0,1 - 0,5 - 1 - 5

® Marchio e prodotto della Philips-Duphar B.V. - Amsterdam (Olanda)

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

4043

Diserbante selettivo in pasta liquida di impiego in pre-semina, pre-emergenza e post-emergenza su bietola da zucchero, da foraggio e da orto.

COMPOSIZIONE

— Cloridazon puro	g	35
— Coadiuvanti, Inerti: quanto basta a	g	100

® Marchio registrato SIPCAM - Milano

SIPCAM—Soc. It. Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
CHEMIA - SpA
S. Agostino (FE)

CLASSE IV

Registrazione n. 4043 del 11/11/1980 Ministero della Sanità

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali e viene assorbito sia per via radicale che per via fogliare dai semi in germinazione o dalle plantule appena spuntate dal terreno purché al momento del trattamento presentino le foglie cotiledonari e non più di 1-3 foglie vere; il prodotto è selettivo per la bietola in quanto viene da questa rapidamente trasformato in metaboliti non dannosi.

Infestanti molto sensibili sono: Matricaria chamomilla, Veronica sp., Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Lamium sp., Stellaria media, Thlaspi arvense, Chenopodium album, Atriplex sp., Galinsoga parviflora, Solanum nigrum, Urtica urens, Capsella bursa pastoris, Linaria sp., Polygonum convolvulus, Polygonum lapathifolium; **sono mediamente sensibili**: Euphorbia sp., Fumaria officinalis, Galium Aparine, Papaver rhoeas, Poa sp., Senecio vulgaris, Mercurialis annua, Polygonum aviculare; **sono mediamente resistenti**: Alopecurus sp., Anagallis arvensis, Avena fatua, Lolium sp., Rumex sp., Aiuga sp., : **sono resistenti**: invece tutte le malerbe perenni quali Cirsium arvense, Agropyrum repens, Cynodon Dactylon, Convolvulus sp., Equisetum sp., Sorghum halepense, Cyperus sp.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega in pre-semina e pre-emergenza a dosi variabili di **4,5-9 lt/ha** in funzione della natura del terreno.

- **in terreni leggeri ; 4,5 lt/ha**
- **in terreni di medio impasto : 6 lt/ha**
- **in terreni pesanti : 7,5-9 lt/ha**

Il prodotto si impiega anche in post-emergenza con infestanti nella fase di plantula alla dose di **4,5-5 lt/ha.**

Nei terreni torbosi il diserbante viene bloccato dalla sostanza organica e difficilmente si riesce ad ottenere un'azione erbicida soddisfacente; si può tuttavia intervenire in post-emergenza dopo la nascita delle infestanti.

Diluire la prestabilita quantità di prodotto in 4-6 o più ettolitri di acqua per ettaro, irrorando con pompa a volume normale.
Il prodotto si può impiegare anche localizzato, riducendo la dose di impiego alla effettiva superficie di terreno trattato.
Il prodotto si impiega dal momento della semina fino a quando le infestanti si trovino alla fase di plantula: su infestanti più sviluppate (4 o più foglie) si ha un'azione soltanto parziale.
Il trattamento in post-emergenza si può anche effettuare dopo una zappatura o dopo il diradamento purché le infestanti non siano presenti, oppure si trovino al massimo alla fase di 1-3 foglie.
Preparare il terreno perfettamente affinato effettuando il diserbo su terreno fresco e umido ovvero assicurandosi che a breve distanza cada una pioggia per permettere al prodotto di distribuirsi uniformemente sullo strato superficiale del terreno e di venire così assorbito dalle radici delle infestanti.
Qualora si debba operare su terreno asciutto e non si abbiano successive piogge, è necessaria procedere ad un'irrigazione entro 8-10 giorni dal diserbo.

Preparazione della poltiglia : agitare la confezione prima dell'uso. Diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità : il prodotto è miscibile con erbicidi ed insetticidi previsti per allargare l'azione contro le malerbe e per la lotta contro gli insetti. Non sono miscibili in genere gli insetticidi in formulazione liquida emulsionabile.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: sisconsiglia il trattamento nel periodo che va dall'emergenza della bietola fino all'emissione della seconda foglia vera. La selettività del prodotto può essere compromessa da attacchi di insetti o di malattie fungine che determinano lesioni sulle radici o sulle foglie aprendo vie alla penetrazione del prodotto. Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture sensibili vicine.
Se è necessaria una ricoltivazione è sconsigliabile la semina o il trapianto di pomodoro, colza, ravizzone, cavoli e cavolfiori.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto Lt.**

SIPCAM

4056

TUMAR®

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Liquido emulsionabile — Insetticida per la difesa dei fruttiferi e colture orticole.

Composizione
100 g. di prodotto contengono:
22,1 g. di Chlorpirifos-metile puro
Solventi ed emulsionanti quanto basta a 100 grammi
Contiene «XILOLO»

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore:
Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

CONTROINDICAZIONI: morfina, teofillina, aminfillina, coramina, latte, olio e grassi.
La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

Caratteristiche
Il TUMAR® è un insetticida fosforganico, formulato come «liquido emulsionabile». Esso agisce per contatto, per ingestione ed in parte per azione di vapore.
Il TUMAR® è particolarmente indicato per combattere le larve di Lepidotteri, neanidi di Cocciniglie. Inoltre il TUMAR® esplica un'azione frenante sullo sviluppo delle popolazioni di Acari, Tetranichidi, tali come Panonychus, Tetranychus, Eotetranychus.

Modalità d'impiego
Dosi d'impiego per 100 litri d'acqua:

Frutticoltura (melo e pesco): cc. 200 contro Lepidotteri, Tortricidi (Capua, Cacoecia, Pandemis, Eulia), Tignola orientale (Laspeyresia), Anarsia. cc. 200-250 contro neanidi di Cocciniglie (Aspidiotus ed altre).
Orticoltura (pomodoro, piselli, lattuga, carciofi, cavoli, melanzane, ravanelli): lt. 1,5-2 per ha. contro le Nottue (Agrotis, Mamestra), Cavolaia (Pieris), Macaone (Papilio).

Preparazione della poltiglia
Versare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
Il TUMAR® è miscibile con i vari formulati fungicidi, acaricidi ed insetticidi, esclusi quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti . ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 4056 del 12.11.80 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto lt. 1-5-10

4062

®KAURITIL

Preparazione di ossicloruro di rame con adesività.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Rame metallo (sotto forma di ossicloruro tetraramico)	g 47
Bagnanti ed inerti q.b. a	g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DISTRIBUZIONE E VENDITA:

BASF-Agritalia S.p.A. - Milano

Officina di produzione:

CAFFARO S.P.A. - ADRIA-CAVANELLA PO (RO)

Confezionato presso: SICOPA - VALTIDONE (PC)

Reg. Min. San. N.° 4062 **del** 12.11.1980

® = Marchio registrato BASF.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il ®KAURITIL riunisce in sé le seguenti proprietà: adesività, resistenza al dilavamento delle piogge, sospensività.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Agrumi

Contro antracnosi, scabbia e marciume: 0,25-0,3%.

Bietola

Contro cercospora e peronospora: 4 kg/ha. Un trattamento verso il 15-20 giugno ed un secondo 20 giorni dopo sono generalmente sufficienti; in caso di raccolta tardiva è consigliabile un terzo trattamento da effettuarsi sempre con l'intervallo di 20 giorni.

Tabacco

Contro thielavia, batteriosi, peronospora: 0,35%.

Fruttiferi

Melo e Pero

Contro la ticchiolatura: 0,25-0,3%. Trattando quando le gemme sono appena schiuse e quando inizia la caduta dei fiori. In seguito ci si regoli a seconda della stagione e delle varietà (vedi fitotossicità).

Pesco, Ciliego, Albicocco, Susino, Mandorlo

Contro bolla, lebbra, scopazzi, ruggini, corineo, gommosi, sclerotinia: alla caduta delle foglie: 1%; a fine inverno: 0,7%; a gemme rigonfie: 0,5%.

Vite

Contro peronospora e antracnosi: 0,3-0,4%.

Olivo

Contro occhio di pavone e antracnosi: 0,4%. Due trattamenti, il primo in febbraio ed il secondo in settembre, sono generalmente sufficienti.

Colture ortive

Cavolo: Contro alternaria e peronospora	0,35%
Cipolla: Contro peronospora	0,4%
Fagiolo: Contro antracnosi e vaiolatura	0,4-0,5%
Patata: Contro peronospora	0,4-0,5%
Pomodoro: Contro peronospora, alternaria e septoria	0,4-0,5%
Sedano: Contro septoria	0,35%

Colture floreali

Crisantemo, garofano: septoriosi e alternariosi	0,2%
Rosa: Contro la ticchiolatura e maculatura delle foglie	0,2%

Si ottiene una poltiglia mettendo il ®KAURITIL in un recipiente a parte aggiungendo poca acqua e mescolando sino ad ottenere una pasta senza grumi ed omogenea. Si aggiunge poi altra acqua mescolando continuamente e con energia sino ad ottenere una poltiglia a concentrazione di ca. 1 parte di ®KAURITIL e 10 parti di acqua. Il tutto sarà versato nel serbatoio della pompa, aggiungendo con i soliti sistemi acqua sino a giungere al livello desiderato. Non devono essere aggiunti altri bagnanti o adesivanti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il ®KAURITIL è miscibile con altri preparati quali acaricidi, esteri fosforici, zolfi, fungicidi organici. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura. Sul pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgentufd, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne consiglia l'impiego dopo la ripresa vegetativa.

Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

100 g

4064

VITENE® S.BLU

Fungicida acuprico per la difesa della vite, pomacee, tabacco, pomodoro, garofano.

Si impiega per la lotta contro Peronospora della vite, Peronospora del pomodoro (solo sino alla prima fioritura) e del tabacco, Ticchiolatura delle pomacee, Alternaria o Septoriosi del pomodoro, Ruggine del garofano.

COMPOSIZIONE		
Zineb puro	g	39
Ziram puro	g	28,5
Coadiuvanti, coloranti ed inerti q.b. a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM - Milano

SIPCAM–Soc.It.Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA
Montalcino frazione Torrenieri (SI)

CLASSE III

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Registrazione n. 4064 del 10/12/1980 Ministero Sanitá

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umiditá e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento é avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente é cosciente; se é in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb puó provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusione di sangue.

MODALITA' DI IMPIEGO

Le dosi di impiego sono riferite a 100 lt. di acqua irrorati con pompe a volume normale.

Vite: contro la Peronospora il prodotto si impiega alla dose di g 200-300; i trattamenti si effettuano seguendo i normali calendari adottati per la poltiglia bordolese e le altre poltiglie rameiche. Per la lotta contemporanea contro l'Oidio o Mal bianco della vite é necessario associare ad ogni ettolitro di poltiglia di prodotto g 200-400 di TIOSOL, zolfo bagnabile, oppure g 80-100 di TIOKOLL 80, zolfo colloidale.

Pomacee: (melo e pero) contro la Ticchiolatura usare una dose di g 200-300, in trattamenti primaverili-estivi ripetuti ad opportuni intervalli.

Tabacco : contro la Peronospora tabacina il prodotto si impiega alla dose di g 300. I trattamenti si iniziano alla nascita delle piantine, ripetendo gli interventi ogni 2-3 giorni per tutto il periodo di permanenza delle piantine in semenzaio; dopo il trapianto i trattamenti vanno proseguiti ed effettuati 1-2 volte alla settimana a seconda della stagione e della virulenza della malattia.

Pomodoro: solo fino alla prima fioritura contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi: g 200-300.

Garofano: contro Ruggine, il prodotto si impiega alla dose di g 200-300.

Preparazione della poltiglia: stemperare accuratamente in poca acqua a parte la prestabilita quantitá di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua agitando energicamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Da non impiegare in serra.

Da non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilitá: alla poltiglia di prodotto possono essere associati i piú comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo, escluse le miscele alcaline. Non miscelare con poltiglie contenenti prodotti a base rameica.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piú lungo.
Devono inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piú tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicitá: su alcune cultivar di pero (Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna) il prodotto puó dare luogo a manifestazioni fitotossiche e pertanto se ne sconsiglia l'uso.

Rischi di nocivitá: per 8-10 giorni dopo il trattamento, impedire alle galline di entrare nei frutteti.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

CLASSE III

4071

FITOZIR 90

Anticrittogamico ecuprico a base di ziram

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 86 di ZIRAM puro
q. b. a gr. 100 di supporti, disperdenti e coadiuvanti.

ATTENZIONE:
manipolare con prudenza

Natura dei rischi di intossicazione:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

blu

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il Medico
Sintomi di intossicazione: *l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).*
Terapia: *In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.*
Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

Il FITOZIR 90 è un fungicida indicato in frutticoltura per la lotta contro la Bolla e la Gommosi del pesco e la Ticchiolatura delle pomacee.
Il FITOZIR 90 è anche vantaggiosamente impiegato per il controllo di malattie fungine in orticoltura e floricoltura.

Dosi e modalità d'impiego per 100 litri d'acqua:
Ticchiolatura del pero e del melo: trattamenti prefiorali gr. 150-200; trattamenti dopo la fioritura gr. 100-200.
Bolla e Gommosi del pesco: trattamenti autunnali gr. 400-500; trattamenti di fine inverno gr. 350-400; trattamenti primaverili gr. 150-200.
Ticchiolatura del pomodoro e della rosa: gr. 150-200.
Ticchiolatura del nespolo: gr. 200-300.
Si stempera il quantitativo necessario in poca acqua fino ad ottenere una soluzione omogenea, indi si versa nell'acqua restante da irrorare, rimescolando con cura per alcuni minuti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità:
Il FITOZIR 90 è miscibile con i più comuni insetticidi agricoli ad eccezione di quelli aventi reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
Può arrecare qualche danno ai giovani rametti di pesco Red Haven, Cardinal e Dixired e può causare fitotossicità alle seguenti varietà di pero sensibili allo ZIRAM: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

S.p.A.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1
Officina di produzione:
S.I.L.I.A. S.p.A. - APRILIA (LT) - Via Nettunense Km. 23,4

Registrazione N. 4071 del 29/11/1980 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO Kg.

4074

CUPROSAN®

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA.

Polvere bagnabile **Fungicida cupro-organico per la lotta contro la Peronospora della vite.**

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo gr. 15
(sotto forma di ossicloruro tecnico al 58,7%)
Folpet p. a. puro gr. 30
(da p. a. tecnico all'80%)
Coformulanti specifici, coloranti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua:
Fino al primo trattamento post-fiorale compreso g 250.
Trattamenti post-florali e trattamenti aggiuntivi fino a 40 giorni prima del raccolto g. 300.
Per controllare il Mal bianco (oidio) aggiungere g 80-100 di THIAMON coll.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Preparazione della poltiglia
Impastare con poca acqua il CUPROSAN e unirlo, mescolandolo fortemente, alla quantità di acqua necessaria per ottenere la concentrazione voluta.

Compatibilità
Il CUPROSAN è normalmente miscibile con i fitofarmaci in forma di polvere bagnabile (come THIAMON, ARVIN, ecc.).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 4074 del 1.12.80 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 25 - 10 - 5 - 1

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

4087

FUNGIMAN 88

ANTICRITTOGAMICO ORGANICO AD AZIONE PREVENTIVA

COMPOSIZIONE: MANEB PURO g 80 - BAGNANTI, DISPERDENTI, INERTI, QUANTO BASTA A g 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;
— conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;
— in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;
— durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione - Purganti salini - Cure sintomatiche. Per la irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: *alcool, olii e grassi.*

Avvertenza: *consultare un centro antiveleni.*

MODALITA' DI IMPIEGO

Il FUNGIMAN 88 più comunemente viene usato sulle seguenti colture, alla dose di 300-350 g per 100 litri di acqua, dose valida con pompe irroratrici a volume normale:
— pomodoro solo fino alla prima fioritura: contro peronospora, alternariosi, septoriosi;
— tabacco: contro peronospora tabacina (la dose di impiego deve essere ridotta: in pieno campo 150 g/hl acqua; in semenzaio 50 g/hl acqua);
— pioppo: contro marssonina, ticchiolatura;
— cereali in campo: contro ruggine, septoriosi;
— melo e pero: contro ticchiolatura;
— garofano: contro ruggine.

Stemperare il prodotto in poca acqua a parte e poi versarlo nel recipiente dell'irroratore, aggiungendo acqua ed agitando.
Ove le condizioni del trattamento lo consigliano, è utile l'aggiunta del BAGNANTE ADESIVO S.
Il FUNGIMAN 88 può essere usato in miscela con i concimi fogliari CF-1 o FITO FEED, o con gli integratori fogliari specifici.

DIVIETO D'IMPIEGO

- **divieto d'impiego in serra;**
- **divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.**

Da non applicare con mezzi aerei.

Miscibile con i più noti antiparassitari in commercio e con tutti quelli di nostra produzione. AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può produrre fenomeni di fitotossicità su germinelli di tabacco. Varietà di pere sensibili al Maneb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Blanca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zechermanna.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIVAM SOCIETA' ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO S.p.A.
VIA SCARLATTI, 30 - 20124 MILANO - TELEFONO 270 451

Officina di produzione: Diachem S.p.A. - 24061 Albano S. Alessandro (Bg)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 4087 del 9-12-1980

Peso Kg. 1

4093

A - 150®

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile Fungicida organico per combattere le principali malattie crittogamiche in frutticoltura, viticoltura, delle colture ornamentali e del pomodoro (solo fino alla prima fioritura).

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Zineb puro - gr. 65
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- Conservare la confezione ben chiusa;
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- Non operare contro vento;
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
- *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
- *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
- *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA:
- In caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
- Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
  Controindicati: alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.
- In caso di ingestione di Zineb può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

Modalità e campi d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua g. 150-200.
In caso di elevato pericolo d'infezione aumentare la dose sino a g. 300.

Pomacee: contro la ticchiolatura del melo e del pero, macchie bianche delle foglie del pero (Mycosphaerella sentina), ruggini ed altre malattie crittogamiche.
Vite: contro la peronospora.
Pomodoro: solo fino alla prima fioritura: contro la peronospora.
Garofano: contro la ruggine.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
NON IMPIEGARE IN SERRA.
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Compatibilità
L'A-150® è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Si sconsiglia l'impiego del prodotto su alcune varietà di pere sensibili allo Zineb: Abate Fetel, Armella, Butirra d'estate, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S. Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi e Zecchermanna.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12
Registrazione N. 4093 del 12/9/81 del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO.
Contenuto Kg. 1

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

4114

CARBAMON 65

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile — **Fungicida organico per combattere le malattie da funghi in frutti-viti-floricoltura e pomodoro solo fino alla prima fioritura.**

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Zineb puro - gr. 65
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA:
— **In caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.**
— **Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.**
Controindicati: alcool, olii, grassi. Nel casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.
— **In caso di ingestione di Zineb può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.**

Modalità e campi d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua g. 150-200.
In caso di elevato pericolo d'infezione aumentare la dose sino a g. 300.

Pomacee: contro la ticchiolatura del melo e del pero, macchie bianche delle foglie del pero (mycosphaerella sentina) ruggini, perforazione delle foglie ed altre malattie da funghi.
Vite: contro la peronospora.
Pomodoro: solo fino alla prima fioritura: contro la peronospora.
Garofano: contro la ruggine.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
NON IMPIEGARE IN SERRA.
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Compatibilità
Il CARBAMON 65 è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Su alcune cultivar di pero (Abate Fetel - Armella - Butirra Morettini - Conference - Coscia - Curato - Decana del Comizio - Gentil Bianca - Gentilona - Giardina - Mora - Principessa di Gonzaga - S. Maria - Scipiona - Spadona d'estate - Spadoncina - Spinacarpi - Zecchermanne) il prodotto può dar luogo ad alcune manifestazioni fitotossiche e pertanto se ne sconsiglia l'uso.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12
Registrazione N. 4114 del 11.12.80 del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO.
Contenuto Kg. 25-1-10

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

4121

CLORTOSIP(R) R

Fungicida organico in polvere bagnabile ad ampio spettro di efficacia e con persistenza di azione per la difesa di Melo, Pero, Vite, Ortaggi, Patata, Fiori e Colture ornamentali.

COMPOSIZIONE

— Clorotalonil puro	g	15
— Rame puro (sotto forma di Ossicloruro tetraramico)	g	30
— Coadiuvanti,Coloranti,Inerti: quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM - Milano

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura - Milano SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 4121 del 9/12/1980 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate per 100 litri di acqua distribuiti con pompe a volume normale (pari a 500—1000 l/ha di colture erbacee, secondo il loro sviluppo vegetativo).

MELO, PERO : contro la Ticchiolatura : **g 300-400**

VITE : contro la Peronospora: **g 300-500** (aggiungere Zolfo bagnabile od altro fungicida antioidio per combattere tale malattia).

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA : contro Peronospora, Septoria, Ticchiolatura, Alternaria, Antracnosi : **g 400-600.**

PATATA : contro Peronospora e Alternaria : **g 400-500** (= 3-4 Kg/ha).

SEDANO, CAROTA : contro Alternaria e Septoria : **g 400-500.**

COLTURE FLORICOLE (Rosa, Garofano, Gladiolo e Crisantemo) e ORNAMENTALI : contro Peronospora, Ticchiolatura, Alternaria, Septoria : **g 400-600.**

Per tutti gli impieghi sopra indicati, intervenire principalmente con trattamenti preventivi secondo i normali calendari dei trattamenti..

Preparazione della poltiglia : impastare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità : il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari in polvere bagnabile di impiego primaverile-estivo ad eccezione delle miscele alcaline come poltiglia bordolese e polisolfuri. Qualora si desiderasse effettuare miscele con liquidi emulsionabili, normalmente sconsigliate, controllare la compatibilità degli stessi con prove preliminari.

Avvertenze : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : stante l'elevato numero di varietà delle specie orticole e floreali, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici, prima di passare al trattamento di superfici più ampie.
Su vite, accertare preventivamente eventuali sensibilità delle uve bianche, specie da tavola.
Non trattare durante la fioritura; su alcune varietà di **Melo** (Abbondanza "Belford", Black Steyman, Commercio, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di **Pero** (Abate fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia, pertanto l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Rischi di nocività : il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO PESO 1 Kg.

ACUPRICO T 75

4133

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI ZIRAM

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:
— ZIRAM puro gr. 71,25
— Coadiuvanti e inerti q.b. a gr. 100

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - conservare la confezione ben chiusa - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua - non operare contro vento - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

L'ACUPRICO T 75 si impiega a dosi variabili da 150 a 300 grammi per ettolitro di acqua nei trattamenti al verde contro la ticchiolatura del melo e del pero, cancro dei rametti, septoria alternaria delle colture orticole (fagioli, sedani, patate, pomodori) e floreali.
Alla dose di gr. 600 - 800 per ettolitro di acqua si usa nei trattamenti autunno invernali - alle dupracee, contro la gommosi parassitaria e la bolla.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina e con olii minerali.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo - Devono anche essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della mescolazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Varietà di peri sensibile allo Ziram: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate.

Sospendere il trattamento 10 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da usare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizzetti, 2/a - CENTO (Ferrara) - Tel. 90.62.07

Stabilimento di produzione:
SCAM S.r.l. - Via Bellaria n. 164 - MODENA
Registrazione N. 4133 del 20-12-1980 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

4148

Utaziramit S Caffaro

Polvere secca a base di Ziram e Zolfo

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Ziram puro	g 16
Zolfo puro (esente da selenio) .	g 12,5
Coformulanti .	. q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi d'intossicazione: *l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.*
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: *nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza, la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.*
Controindicazioni: *alcool, olii, grassi.*

AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni.

caffaro S.p.A. - Milano

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 4148 del Ministero della Sanità del 28-1-1981

MODALITÀ E CAMPI DI IMPIEGO
L'UTAZIRAMIT S CAFFARO è un anticrittogamico per trattamenti polverulenti contro la Ticchiolatura ed il Mal bianco del **Melo** e del **Pero**; la Bolla, il Corineo, e l'Oidio del **Pesco, Ciliegio, Albicocco** e **Susino**.
L'UTAZIRAMIT S CAFFARO è un prodotto per trattamenti polverulenti a secco che assicura protezione.
La dose di impiego è di kg 20-25/ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari in polvere secca.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto è fitotossico per le seguenti varietà di pero: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 25

4151

TERSANIL compresse

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Compresse — **Fungicida a base di chinosolo per la disinfezione solo di piantonai e semenzai di colture floricole ed ornamentali.**

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
69,5 g di Chinosolo puro
Inerti quanto basta a 100 grammi

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Il TERSANIL COMPRESSE è un fungicida ad azione curativa e preventiva per la lotta contro i marciumi radicali, mal dello sclerozio, mal del colletto, fusariosi ed altre malattie fungine dei semenzai e dei piantonai di piante floricole ed ornamentali.

Modalità di impiego
Dosi per 10 litri di acqua:
Mal dello sclerozio, mal della tela nei semenzai e nei piantonai di colture floricole ed ornamentali:
Lotta preventiva: 1 compressa nebulizzando più volte la vegetazione
Lotta curativa: 2 compresse, nebulizzando in ragione di 2-3 litri di soluzione per m².

Mal del colletto, marciume delle piantine nei semenzai e nei piantonai di colture floricole ed ornamentali:
Lotta preventiva: 1 compressa ripetendo le irrorazioni ogni 15 giorni
Lotta curativa: 2-6 compresse disinfettando il terreno poco prima della messa a dimora delle colture.

Preparazione della poltiglia
Sciogliere il TERSANIL COMPRESSE in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
Le compresse di TERSANIL sono solubili in acqua e la soluzione è compatibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione per quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
LA QUINOLEINE - F-76350 OISSEL (Francia) - 3, Rue Octave-Fauquet

Registrazione N 4151 del 20.12.80 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 0,5 - 1

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

4161

AZURAM®

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile — Anticrittogamico a base di rame (ossicloruro)

Composizione
100 gr. di prodotto contengono:
40 gr. di rame metallo (sotto forma di ossicloruro)
Bagnanti, disperdenti, coloranti ed inerti quanto basta a 100 grammi

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
L'AZURAM è un anticrittogamico in polvere bagnabile che combatte tutte le malattie delle colture arboree ed erbacee sensibili al rame.
L'AZURAM si conserva per un periodo di tempo indefinito in ambiente asciutto.

Modalità d'impiego
Dosi per 100 litri di acqua
Frutticoltura: Pomacee (melo e pero: contro la ticchiolatura nei trattamenti preflorali) gr 300;
Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio): contro il corineo, la bolla e la sclerotinia impiegare l'AZURAM agli stadi ed alle dosi seguenti:

1) Caduta delle foglie	g	1000 1500
2) Riposo vegetativo (gennaio)	g	1000
3) Ingrossamento delle gemme	g	800 1000

Viticoltura: contro la peronospora g 500

In condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo e diffusione della malattia e sulle varietà più suscettibili alle infezioni peronosporiche aumentare la dose e soprattutto abbreviare l'intervallo fra un trattamento e l'altro.

Orticoltura: contro le principali malattie crittogamiche del pomodoro (Peronospora, Alternaria, Macchie delle foglie) del fagiolo (Antracnosi), del pisello (Antracnosi, Peronospora), del sedano (Alternaria, Septoria), del carciofo (Peronospora), del cardo (Peronospora), del cavolo (Peronospora), della cipolla (Peronospora), dei cetrioli (Peronospora), dello spinacio (Peronospora). gr. 400 - 500.
Barbabietole: contro la Cercospora g 600 (500-700 litri di poltiglia per ettaro).
Patata: contro la Peronospora, l'Anternariosi g. 750
Colture ornamentali: A seconda della sensibilità delle piante al rame si impiegano da 150 a 400 g di AZURAM per 100 litri di acqua.

Preparazione della poltiglia
Stemperare l'AZURAM in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
L'AZURAM è normalmente miscibile con i fitofarmaci in forma di polvere bagnabile (come THIAMON - ARVIN)

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, e le varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Staymann, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Aranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12
Registrazione N 4161 del 20.12.80 del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto Kg 1 - 10 - 25

4167

SCLEROSAN 10

POLVERE A BASE DI THIRAM PER TRATTAMENTI A SECCO

COMPOSIZIONE	
gr. 100 di prodotto contengono:	
THIRAM puro	gr. 10
Coformulanti	q. b. a gr. 100

CLASSE III•
ATTENZIONE!
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite ecc).
Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione provoca il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente, se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
AVVERTENZA: consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

VITICOLTURA:
Contro Botritis Cinerea, Peronospora larvata del Grappolo.
ORTICOLTURA:
Contro Sclerotinia della Lattuga e del Radicchio, Marssonina Panattoniana (Vaiolatura della lattuga e scarola) Marciume del piede (Fusariosi) e Verticillosi della piantina di pomodoro. Fusariosi e Marciume delle melanzane, cocomero, peperoni.
FLORICOLTURA:
Contro Fusariosi del garofano, Morbo Bianco e Cancrena dei Bulbi dei gigli, la Gleosporiosi del ciclamino.

Lo SCLEROSAN 10 può essere distribuito a mezzo polverizzatori meccanici o manuali. Contro la Sclerotinia (Marciume del colletto) della lattuga e del radicchio è bene eseguire il primo trattamento non oltre i 15 giorni dopo il trapianto, ripetendolo ad intervalli di 15 giorni per almeno due o tre volte a seconda dell'andamento stagionale. Per tale lotta è importante che il prodotto sia cosparso su tutta la superficie del terreno oltre che sulle foglie. Contro la Marssonina Panattoniana (Vaiolatura della lattuga e scarola) cospargere il prodotto sulle foglie e nel terreno attorno al colletto della pianta. E' consigliabile eseguire almeno un primo trattamento preventivo prima che la pianta accestendo copra con le foglie il terreno circostante il colletto. Gli altri trattamenti si inizieranno alla prima comparsa delle caratteristiche macchie sulle foglie ed andranno ripetuti a distanza di 10-15 giorni a seconda dell'andamento stagionale.

DOSI D'IMPIEGO

Nella lotta contro la Sclerotinia cospargere uniformemente la superficie del terreno impiegando non meno di 40 Kg. per ettaro. Nella lotta contro la Marssonina Panattoniana cospargere i cespi usando non meno di 20 Kg. di prodotto per ettaro.

COMPATIBILITA': IL PRODOTTO SI IMPIEGA DA SOLO.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

FITOTOSSICITA'

Il prodotto non deve essere applicato su colture precedentemente trattate con sali di rame.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

SICIL IMPORT EXPORT s.r.l.

PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA

Sede: 97019 VITTORIA (RG) - Via Gen. Cascino, 33/a - Telef. 0932/986699 - 992567 - 993510

Stabilimento: SIPCAM - SALERANO SUL LAMBRO - MILANO

Reg. N. 4167 del 13 1-1981 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

4181

FRUTTENE®

90

TIPO EXPORT

Fungicida acuprico in polvere bagnabile a base di Ziram micronizzato per la difesa del melo, pero, pesco ed altre drupacee, ortaggi, fiori, colture ornamentali, vivai.

Si impiega in trattamenti liquidi contro la Ticchiolatura delle pomacee, la Bolla del pesco, il Corineo delle drupacee.

COMPOSIZIONE	
- Ziram puro	g 85,6
- Coadiuvanti ed inerti, quanto basta a	g 100

(r) Marchio registrato SIPCAM - Milano

SIPCAM-Soc.It.Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano SpA
Viale Gian Galeazzo 3 - Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 4181 del 17/2/1981 Ministero Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento é avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente é cosciente; se é in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini.
Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Meli e Peri: contro la Ticchiolatura si impiega alla dose normale di g 180-270 in 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale nei trattamenti pre-fiorali, fiorali ed immediatamente post-fiorali ed alla dose di g 180 nei successivi interventi. In caso di forti infezioni la dose di impiego va opportunamente aumentata.

Peschi ed altre drupacee (ciliegio, susino, albicocco): contro il Mal della Bolla, il Corineo, il Cancro dei rametti, la Ticchiolatura e la Ruggine, si impiega alle seguenti dosi riferite a 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale: g 450-550 nei trattamenti autunnali; g 360-450 nei trattamenti di fine inverno; g 180-270 nei trattamenti primaverili-estivi.

Altre colture: contro Septoria, Alternaria, Cladosporium, Ruggine di ortaggi (cavoli, spinacio, insalate, bietole, fagiolo, fagiolino, pisello, carota, finocchio, sedano, prezzemolo, ravanello, cipolla, aglio, porro, asparago, carciofo, patata, pomodoro, peperone, melanzana, melone, zucca, zucchino, cetriolo) e di fiori impiegare una dose di g 150-200 per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale.

Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto in pochissima acqua in modo da ottenere una pastetta densa ed omogenea e versare poi nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità; il prodotto può essere associato alle più comuni poltiglie antiparassitarie di impiego primaverile-estivo, nonché nei trattamenti di fine inverno alle poltiglie a base di Polisolfuro di bario e di Olii bianchi al Parathion. Non miscelare con poltiglie rameiche Dovendo associare prodotti emulsionabili é necessario aggiungere prima ed ogni ettolitro di poltiglia, g 50 di Bagnante Emulsol.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo; devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non trattare le varietà di pero: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate, sensibili al prodotto.

Rischi di nocività: per 10 giorni dopo il trattamento, impedire alle galline di entrare nei frutteti.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso é pericoloso.

Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

SIPCAM

4203

CUPRENE® 50
micronizzato

Anticrittogamico micronizzato al 50 % di rame metallo per la lotta contro la Bolla e il Corineo del pesco e delle drupacee nei trattamenti autunnali e di fine inverno e contro la Peronospora della vite, la Ticchiolatura del melo e del pero, la Cercospora della bietola nei trattamenti primaverili-estivi.

COMPOSIZIONE	
Rame metallo .... (sotto forma di Ossicloruro tetraramico)	g 50
Coadiuvanti ed inerti, quanto basta a	g 100

(r) Marchio registrato SIPCAM - Milano.

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano — SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana - SpA
Via S.Francesco - Cotignola (RA)

CLASSE III

**ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

Registrazione n. 4203 del 17/2/1981 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle seguenti dosi riferite a 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale:

- **kg 1-1,2** nei trattamenti autunnali sui peschi e sulle drupacee
- **kg 0,8-1** nei trattamenti di fine inverno sul pesco e sulle drupacee
- **g 300-400** nei trattamenti pre-fiorali e post-fiorali su meli e peri
- **g 350-400** nei trattamenti contro il Mal secco dei limoni, l'Occhio di pavone e la Lebbra dell'olivo
- **g 400-600** contro la Peronospora della vite, la Peronospora della patata
- **kg 0,8-1** per gli interventi contro la Cercospora della bietola
- **g 80-100** per integrare le poltiglie di zolfi bagnabili nella lotta contro la Ticchiolatura delle pomacee

Preparazione della poltiglia : stemperare il prodotto in poca acqua a parte e versare poi nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: alla poltiglia di prodotto possono essere associati tutti i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo purché non alcalini, quali poltiglia bordolese, polisolfuri, calce.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza "Belford", Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgendùft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadá, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dottor Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Rischi di nocività: il prodotto é tossico per i pesci.

Sospendere il trattamento 20 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

4205

ZETARAM® L

Ossicloruro di rame micronizzato in formulazione liquida per la difesa della vite, dei fruttiferi, dell'olivo, degli agrumi, delle colture orticole e floreali.
Si impiega in trattamenti liquidi contro Peronospora della vite, Ticchiolatura del melo e del pero, Bolla del pesco e Corineo delle drupacee, Peronospora e altre crittogame del pomodoro e della patata; Cercospora della bietola, Occhio di pavone e Lebbra dell'olivo, Mal secco ed Antracnosi degli agrumi, Peronospora, Alternaria, Ruggine, Cercospora, Septoria, Ticchiolatura, Antracnosi e Cladosporiosi di colture orticole e floreali.

COMPOSIZIONE

— Rame metallo (sotto forma di Ossicloruro tetrarameico)	g 26
— Coadiuvanti, Inerti, Coloranti: quanto basta e - contiene Glicol etilenico	g 100

® Marchio registrato SIPCAM - Milano

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano
Officina di produzione:
CAFFARO SpA - Adria-Cavanella Po (RO)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 4205 del 17/2/1981 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.conservare la confezione ben chiusa. non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA'DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale.

VITE
Peronospora della vite: g 500 :effettuare i normali trattamenti sulla base dei calendari di lotta comunemente usati in zona. Impiegare il prodotto preferibilmente dopo la fioritura della vite, usando prima della fioritura ed in fioritura, fungicidi acuprici.
In zone ed in annate con forti infezioni di Peronospora, si può opportunamente aumentare la dose di impiego a g 600–700.
Contro l'Oidio o Mal bianco, aggiungere uno Zolfo bagnabile.

FRUTTIFERI (Melo, Pero, Pesco, Drupacee)
Ticchiolatura e Cancri rameali del melo e del pero
Trattamenti autunnali o di fine inverno : g 800–1000
Trattamenti pre-fiorali : g 300–400
Da non usare durante il periodo vegetativo sulle varietà di melo e di pero sensibili ai prodotti rameici.
Bolla del pesco e Corineo delle drupacee (trattamenti invernali) : g 800–1000

OLIVO ED AGRUMI
Occhio di Pavone e Lebbra dell'olivo : g 500
Mal secco, Antracnosi e Fumaggine degli agrumi: g 500
Iniziare i trattamenti prima della comparsa della malattia e ripeterli secondo necessità.

POMODORO E PATATA
Peronospora ed altre crittogame parassite (Alternaria, Septoria, Cladosporiosi): g 500–600, effettuare trattamenti preventivi ripetendoli secondo necessità

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Cercospora della barbabietola: 4 Kg/ha in 500-600 lt di acqua;trattamenti ripetuti 2-3 volte secondo l'andamento della malattia.

ORTAGGI (Sedano, Carota, Melone, Anguria, Zucchino, Cetriolo, Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Cavolo ed altre Crucifere).
Cercospora e Septoria del sedano e della carota : g 500
Peronospora ed Antracnosi del melone,anguria,zucchino,cetriolo:g 500
Antracnosi e Ruggine del pisello, fagiolo, fagiolino : g 500
Peronospora del cavolo e di altre crucifere : g 500

FIORI
Ruggine, Peronospora, Ticchiolatura, Septoria di colture floreali (garofano, rosa, crisantemo); g 500

Per tutti gli impieghi sopra indicati iniziare i trattamenti prima della comparsa delle malattie e ripetere i trattamenti secondo lo sviluppo delle stesse.

Avvertenza: le dosi indicate corrispondono a quelle normalmente indicate per i prodotti a base di rame. In condizioni agronomiche e nei periodi stagionali diversamente favorevoli allo sviluppo della malattia si può aumentare o diminuire opportunamente le dosi sopra riportate.

Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto in poca acqua a parte, quindi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente.
Il prodotto é già neutro e quindi non richiede l'aggiunta di Calce.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto é compatibile con i più comuni antiparassitari di uso primaverile-estivo ad eccezione delle miscele alcaline come Polisolfuri e Calce.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre. osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e alcune varietà di melo (Abbondanza "Belford", Black Stayman, Commercio, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott.Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Rischi di nocività; il prodotto é tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti;ogni altro uso é pericoloso.

Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali .

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso g**

SIPCAM

4221

CLASSE III

BRANDOL® 25 L

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

Composizione
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 25 di BRANDOL® puro
q.b. a gr. 100 di solventi ed emulsionanti

Contiene Xilolo

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico:
Sintomi di intossicazione: sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, ipertermia, colorazione gialla delle sclere.
Terapia: In caso di intossicazione acuta, ricorrere alla lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5% (non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni all'esofago, molto frequenti in caso di ingestione). Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda. Analettici (tipo simpatolo, veritolo e coramina) somministrati per via parenterale, se esiste una lieve sindrome ipotensiva; qualora questa fosse di grado elevato il paziente va ricoverato in reparto di rianimazione per trattamento più idoneo. Trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche in caso di collasso ed ipotensione grave. Metil e propiltiouracile fa ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale.
E' controindicata l'atropina.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

Il BRANDOL 25 L combatte efficacemente le varie forme di oidio che colpiscono sia le piante da frutto che quelle ornamentali di seguito indicate. L'azione antioidica del BRANDOL 25 L oltrechè preventiva è anche curativa.

Dosi e modalità d'impiego:

MELO - Intervento preventivo: I trattamenti vanno iniziati con cadenza settimanale, quando la pianta è nella fase vegetativa detta delle «orecchiette di topo» o in quella dei «bottoni rosa» e proseguiti fino a quella definitiva della «noce». In annate normali dette fasi vegetative corrispondono circa al periodo compreso fra i primi di aprile ed i primi di giugno. Successivamente, gli intervalli fra un trattamento e l'altro vanno ampliati a 10-12 giorni, fin verso la prima decade di luglio, periodo nel quale vengono poi sospesi avendo l'apparato fogliare praticamente raggiunto la completa maturazione ed anche perchè le condizioni ambientali rendono trascurabile la possibilità di nuove infezioni oidiche. Va tenuto presente che non solo è possibile, ma è consigliabile l'impiego del BRANDOL 25 L in miscela con olii bianchi. Detta miscela va utilizzata nel periodo primaverile in cui normalmente si impiega l'olio bianco.
Intervento curativo: Dovendo intervenire in un frutteto in cui l'infezione oidica abbia già avuto la possibilità di diffondersi, si debbono eseguire tre trattamenti a distanza di 6-7 giorni, poi fare seguire i successivi alla distanza di 10-15 giorni, per la protezione della nuova vegetazione estiva.
Tanto nel trattamento preventivo, quanto in quello curativo, le dosi di impiego normali sono di 120-130 gr. per ettolitro. In caso di necessità esse possono essere aumentate anche a 150 gr. per ettolitro.
PESCO - Iniziare i trattamenti alla scamiciatura dei frutticini, con una frequenza di 8-10 giorni, fino all'accrescimento del frutto, alla dose di 120-130 gr. per ettolitro.
VITE - Il calendario dei trattamenti più opportuno può essere considerato il seguente:
I trattamento, alle foglie libere con germogli di 3-4 cm.
II trattamento, alla formazione dei grappolini.
III trattamento, ai bottoni florali - inizio fioritura.
IV trattamento, inizio allegagione.
V trattamento, alla mignolatura - acini di 3-4 mm.
VI trattamento, sviluppo del grappolo - invaiatura.
La dose d'impiego è di 120-130 gr. per ettolitro.
Si consiglia di evitare i trattamenti alla comparsa dei primi segni della maturazione del grappolo.
Nelle zone meridionali, soprattutto a clima caldo asciutto, si consiglia di ridurre le dosi a 60-80 gr. per ettolitro e di rispettare un intervallo di 7-8 giorni fra un trattamento e l'altro.
CUCURBITACEE (zucchino, zucca, cetriolo, cocomero, melone) - Intervenire alla dose di 100-130 gr. per ettolitro, fin dalle prime comparse della malattia, con trattamenti settimanali nel periodo di massimo accrescimento della pianta. Successivamente, quando essa ha raggiunto lo sviluppo completo, gli interventi possono essere distanziati fino a 10-12 giorni.
ROSE - Per il controllo dell'Oidio delle rose, si deve intervenire sin dalle primissime comparse della malattia con trattamenti settimanali, alla dose di 100-130 gr. per ettolitro, quando la pianta si trova nella fase del massimo sviluppo vegetativo. Successivamente, a sviluppo completato, i trattamenti possono essere diradati fino a 12-15 giorni.

Per ottenere una buona emulsione in acqua del BRANDOL 25 L, è necessario aggiungere, lentamente e sotto buona agitazione, una quantità di acqua uguale al quantitativo di BRANDOL 25 L prescelto. Alla emulsione così ottenuta si aggiunge, sempre agitando, ancora una quantità di acqua 2-3 volte superiore a quella precedentemente impiegata. Infine, si diluisce la pre-emulsione così ottenuta, fino al volume definitivo.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità - Questo prodotto si distingue per la possibilità di essere miscelato anche con gli olii bianchi. Il BRANDOL 25 L può essere miscelato con AGRUMOL, ACAROL, FACAROL, FITOZIR PASTA 45, POLYSAR MT, SARIAFOS 20 E, TETRASAR 50, VITAM, VITAM AZZURRO, VITAM SARIAF.
Dovendo abbinare il BRANDOL 25 L con uno dei prodotti di cui sopra, è opportuno aggiungere la sua pre-emulsione, preparata come sopra, all'altra emulsione o sospensione già pronta per l'impiego.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
VITE: evitare i trattamenti alla comparsa dei primi segni della maturazione del grappolo.
Attenersi alle dosi minime d'impiego su Prosecco, Malvasia bianca e nera, Garganega, Schiava grossa, Freisa, Regina, Italia, Cardinal e Perla di Czaba, varietà sulle quali si possono occasionalmente verificare fenomeni di sensibilità.
Evitare i trattamenti al Moscato.
DRUPACEE: sulle nettarine, i trattamenti eseguiti nelle fasi di formazione e accrescimento dei frutti possono causare defogliazioni e cascola; pertanto su tali cv. il BRANDOL 25 L può all'occorrenza essere distribuito dopo la raccolta dei frutti. Si sconsiglia il trattamento sulle nettarine precoci - tipo Harmking ed analoghe.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione:
da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

S.p.A.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Officina di produzione e sede amministrativa:
FAENZA (RA) - Via S. Silvestro, 1

Registrazione Ministero della Sanità n. 4221 del 17-2-1981

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO**

® Marchio e brevetto SARIAF

SARIAF S.p.A.

4222

CLASSE III

BRANDOL® 20 PB

Composizione
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 20 di BRANDOL® puro
q.b. a gr. 100 di supporti, disperdenti e coadiuvanti

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni per il medico:

Sintomi di intossicazione: sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, ipertermia, colorazione gialla delle sclere.
Terapia: In caso di intossicazione acuta, ricorrere alla lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5% (non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni all'esofago, molto frequenti in caso di ingestione). Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda. Analettici (tipo simpatolo, veritolo e coramina) somministrati per via parenterale, se esiste una lieve sindrome ipotensiva; qualora questa fosse di grado elevato il paziente va ricoverato in reparto di rianimazione per trattamento più idoneo. Trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche in caso di collasso ed ipotensione grave. Metil e propiltiouracile fa ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale.
E' controindicata l'atropina.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

Dosi e modalità d'impiego: il BRANDOL 20 PB combatte efficacemente le varie forme di oidio che colpiscono le piante, sia da frutto sia ornamentali di seguito indicate. L'azione antioidica del BRANDOL 20 PB oltrechè preventiva è anche curativa.
MELO - Intervento preventivo: I trattamenti vanno iniziati con cadenza settimanale, quando la pianta è nella fase vegetativa detta delle «orecchiette di topo» o in quella dei «bottoni rosa» e proseguiti fino a quella definitiva della «noce». In annate normali dette fasi vegetative corrispondono circa al periodo compreso fra i primi di aprile ed i primi di giugno. Successivamente, gli intervalli fra un trattamento e l'altro vanno ampliati a 10-12 giorni, fin verso la prima decade di luglio, periodo nel quale vengono poi sospesi avendo l'apparato fogliare praticamente raggiunto la completa maturazione ed anche perchè le condizioni ambientali rendono trascurabile la possibilità di nuove infezioni oidiche. Va tenuto presente che non solo è possibile, ma è consigliabile l'impiego del BRANDOL 20 PB in miscela con olii bianchi. Detta miscela va utilizzata nel periodo primaverile in cui normalmente si impiega l'olio bianco.
Intervento curativo: Dovendo intervenire in un frutteto in cui l'infezione oidica abbia già avuto la possibilità di diffondersi, si debbono eseguire tre trattamenti a distanza di 6-7 giorni, poi fare seguire i successivi alla distanza di 10-15 giorni, per la protezione della nuova vegetazione estiva.
Tanto nel trattamento preventivo, quanto in quello curativo, le dosi di impiego normali sono di 150-160 gr. per ettolitro. In caso di necessità esse possono essere aumentate anche a 190 gr. per ettolitro.
PESCO - Iniziare i trattamenti alla scamiciatura dei frutticini, con una frequenza di 8-10 giorni, fino all'accrescimento del frutto, alla dose di 150-160 gr. per ettolitro.
VITE - Il calendario dei trattamenti più opportuno può essere considerato il seguente:
I trattamento, alle foglie libere con germogli di 3-4 cm.
II trattamento, alla formazione dei grappolini.
III trattamento, ai bottoni florali - inizio fioritura.
IV trattamento, inizio allegagione.
V trattamento, alla mignolatura - acini di 3-4 mm.
VI trattamento, sviluppo del grappolo - invaiatura.
La dose d'impiego è di 150-160 gr. per ettolitro.
Nelle zone meridionali, soprattutto a clima caldo asciutto, si consiglia di ridurre le dosi a 80-100 gr. per ettolitro e di rispettare un intervallo di 7-8 giorni fra un trattamento e l'altro.
CUCURBITACEE (zucchino, zucca, cetriolo, cocomero, melone) - Intervenire alla dose di 125-160 gr. per ettolitro, fin dalle prime comparse della malattia, con trattamenti settimanali nel periodo di massimo accrescimento della pianta. Successivamente, quando essa ha raggiunto lo sviluppo completo, gli interventi possono essere distanziati fino a 10-12 giorni.
ROSE - Per il controllo dell'Oidio delle rose, si deve intervenire sin dalle primissime comparse della malattia con trattamenti settimanali, alla dose di 125-160 gr. per ettolitro, quando la pianta si trova nella fase del massimo sviluppo vegetativo. Successivamente, a sviluppo completato, i trattamenti possono essere diradati fino a 12-15 giorni.
Per ottenere una buona sospensione in acqua del BRANDOL 20 PB, è necessario aggiungere, lentamente e sotto buona agitazione, una quantità di acqua uguale al quantitativo di BRANDOL 20 PB prescelto. Alla sospensione così ottenuta si aggiunge, sempre agitando, ancora una quantità di acqua 2-3 volte superiore a quella precedentemente impiegata. Infine, si diluisce la pre-sospensione così ottenuta, fino al volume definitivo.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità - Questo prodotto si distingue per la possibilità di essere miscelato anche con gli olii bianchi. Il BRANDOL 20 PB può essere miscelato con AGRUMOL, ACAROL, FACAROL, FITOZIR PASTA 45, POLYSAR MT, SARIAFOS 20 E, TETRASAR 50, VITAM, VITAM AZZURRO, VITAM SARIAF. - Dovendo abbinare il BRANDOL 20 PB con uno dei prodotti di cui sopra, è opportuno aggiungere la sua pre-sospensione preparata come sopra, all'altra emulsione o sospensione già pronta per l'impiego.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
VITE: evitare i trattamenti alla comparsa dei primi segni della maturazione del grappolo.
Attenersi alle dosi minime d'impiego su Prosecco, Malvasia bianca e nera, Garganega, Schiava grossa, Freisa, Regina, Italia, Cardinal e Perla di Czaba, varietà sulle quali si possono occasionalmente verificare fenomeni di sensibilità.
Evitare i trattamenti al Moscato.
DRUPACEE: sulle nettarine, i trattamenti eseguiti nelle fasi di formazione e accrescimento dei frutti possono causare defogliazioni e cascola: pertanto su tali cv. il BRANDOL 20 PB può all'occorrenza essere distribuito dopo la raccolta dei frutti. Si sconsiglia il trattamento sulle nettarine precoci - tipo Harmking ed analoghe.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione:
da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

S.p.A.
Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1
Officina di produzione:
ANIC AGRICOLTURA S.p.A. - CARRARA AVENZA (MS)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4222 del 17-2-1981

DA NON VENDERSI SFUSO Peso

® Marchio e brevetto SARIAF

4248

CUPRAMON

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile — **Ossicloruro tetraramico per la lotta contro le più comuni malattie crittogamiche**

Composizione
100 g di prodotto contengono:
50 g di rame metallo (sotto forma di ossicloruro)
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua:

Viticoltura. Contro la Peronospora: prima della fioritura g 300-400; dopo la fioritura g 500.

Drupacee (Pesco). Contro la Bolla e il Corineo: alla caduta delle foglie g 1000-1500; durante il riposo vegetativo (gennaio) g 1000; all'ingrossamento delle gemme g 800.
Il trattamento all'ingrossamento delle gemme vale pure per il ciliegio, l'albicocco.

Pomacee (Melo, Pero). Il CUPRAMON è indicato specialmente per prevenire e combattere le malattie che non sono sufficientemente controllate dagli acuprici. Ticchiolatura rameale del Pero g 1000. Cancro del Melo e del Pero (Nestria galligena e Physalospora malorum) g 500-700; trattare all'inizio della caduta delle foglie, al termine della caduta delle foglie stesse e poco prima dell'inizio della vegetazione.

Orticoltura: g 200-600 contro le principali malattie crittogamiche del pomodoro (Peronospora, Alternariosi, Macchie delle foglie), del pisello (Antracnosi, Peronospora), del carciofo (Peronospora), del cardo (Peronospora), del cavolo (Peronospora), della cipolla (Peronospora) dei cetrioli (Peronospora) dello spinacio (Peronospora). In particolare contro: Septoriosi e Alternariosi del Sedano, della Carota, Antracnosi del fagiolo, g 500-600; Peronospora della patata g 700.

Colture industriali. Contro Cercospora della Bietola, Peronospora ed altre malattie crittogamiche del Pomodoro g 500 (600-800 litri di poltiglia per ettaro di coltura).

Colture ornamentali. Secondo la sensibilità delle piante e la suscettibilità dei parassiti g 300-400.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il CUPRAMON in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità
Il CUPRAMON è normalmente miscibile con i fitofarmaci in forma di polvere bagnabile (come THIAMON - ARVIN).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve esere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco e le varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N 4248 del 27.3.81 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 1 - 5 - 10

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

4312

CARATTERISTICHE
Il **MITRAN** è un acaricida preparato in polvere bagnabile specifico per la lotta contro tutte le forme di acari, anche resistenti, delle colture di melo e pero.
La sua attività si esplica per contatto nei confronti delle forme mobili (neanidi ed adulti) con caratteristica di lunga persistenza.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Contro le specie di acari fitofagi infestanti le colture di melo e di pero quali: tetranici, eriofidi, tarsonemidi nella dose di 80-120 g per ettolitro d'acqua, usando dosi inferiori nei casi di lievi infestazioni.
Intervenire non appena si notano sulle foglie i primi acari.
È buona norma l'aggiunta alla preparazione acquosa di Bagnante Caffaro nella dose di g 50 per ettolitro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il **MITRAN** è compatibile in miscela con gli insetticidi, fungicidi, fertilizzanti fogliari esclusi quelli aventi reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO Kg 10

MITRAN

Acaricida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
CIEXATIN puro . . . . g 24
Coformulanti . . . . q.b. a g 100

CLASSE II

NOCIVO

NATURA DEL RISCHIO
Intossicazione grave per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sostanza nociva per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
***Sintomi d'intossicazione**: cefalea occipitale continua o parossistica, ronzii auricolari, iperacusia, vertigini, rachialgia, dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra, ritenzione urinaria, insufficienza respiratoria e di circolo, interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie e paralisi), dermatosi.*
***Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso**:*
Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando in relazione alla via di contaminazione abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgente salino non violento e carbone medicinale in abbondanza.
Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale. Terapia sintomatica.

CAFFARO S.P.A. - MILANO

Prodotto su formula originale e sotto il controllo della
CAFFARO S.p.A. nello stabilimento VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
Ozzano Emilia (BO)
Registrazione n. 4312 del Ministero della Sanità del 16-4-1981

4332

Karathane® FN

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile fungicida organico specifico contro Oidii in frutticoltura, orticoltura ed ornamentali.

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Dinocap p.a. puro gr. 25
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 gr.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.
Sintomi di intossicazione.
Sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertermia. Colorazione gialla delle sclere. La morte consegue ad edema celebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.
Consigli terapeutici.
Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5% - Emetici e catartici se il paziente è cosciente - Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione.
Combattere la ipertemia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri di acqua fredda.
Trasfusione o flebo - clisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isoteniche nel caso di collasso od ipotensione - Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale - Ossigeno, respirazione artificiale.
Controindicazione: atropina.

Caratteristiche
Il KARATHANE FN è un fitofarmaco specifico per la lotta contro le varie specie di Mal bianco dei frutteti, piante ornamentali e colture ortensi.
Ha azione preventiva, curativa, eradicante. Agisce anche a basse temperature e non ustiona a temperature relativamente alta.
Il KARATHANE FN se usato in continuità, svolge una qualche azione acaricida.

Modalità d'impiego
Dosi per 100 litri di acqua.
Frutticoltura: g. 70-100 contro l'Oidio.
Trattando settimanalmente la dose si può ridurre a g. 60-70.
Cucurbitacee (cetrioli): g. 30-60, ogni 5-7 giorni, secondo la necessità.
Rose in serra: g. 40-60, ogni 5-7- giorni.
Rosai in piena aria: g. 60-100 ogni 7-10 giorni.
Piante ornamentali: g. 30-60 a seconda della sensibilità delle colture.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Miscibilità
Il prodotto è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione con quelli a reazione basica o alcalina (Poltiglia bordolese, Polisolfuri, ecc.), con Endosulfan, Isolano, Minacide, Carbofenthion, Ethion, Binapacryl, Dimeton-Metile, Triclorfon, Olii minerali, T.M.T.D., Urea.
Per l'applicazione a piante di melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e prima della fioritura non deve essere miscelato con Parathion.
Deve essere impiegato a distanza di tre settimane dalla distribuzione di olii minerali e di qualunque formulato emulsionabile.
Non usare il prodotto quando la temperatura è superiore ai 32° C.
Il KARATHANE FN si può irrorare in miscela con A 150, DITHANE M-45, A-SPECIAN e ZIRAMON.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il KARATHANE FN non deve essere distribuito durante la fioritura.

Rischi di nocività
E' tossico per alcuni artropodi utili (Fitoseidi, Anthocoris sp.).
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto (per le cucurbitacee 7 giorni prima del raccolto).
Attenzione: ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 4332 del 18.5.81 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 1-10

®Marchio registrato dalla ROHM & HAAS Co. - Filadelfia

DU PONT
DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

4340

LEVEN®

Anticrittogamico acuprico
a base di etilenbisditiocarbammato
di zinco (Zineb)

Composizione:
Zineb puro . . . . g. 65
Inerti, Adensivanti, Bagnanti . q.b. a g. 100

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

III CLASSE
ATTENZIONE: manipolare con prudenza

BASLINI

Baslini - Industrie Chimiche S.p.A.

Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782
20122 Milano

Stabilimento produttore:
Baslini Ind. Chim. S.p.A. - Treviglio (BG)

Registrazione N. 4340 del 25-5-81 del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua o sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini.

Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomato oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA
Consultare un Centro antiveleni.

In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

Il LEVEN è un fungicida organico dotato di sospensività e di potere coprente.
Il LEVEN combatte le seguenti malattie:
Vite: Peronospora ed Antracnosi - alla dose di g. 250-300 per 100 lt. di acqua.
Pero e Melo: Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alterna' alla dose di g. 250-300 per 100 lt. di acqua.
Pomodoro: solo fino alla prima fioritura: Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Antracnosi - g. 300-400 per 100 lt. di acqua.
Garofano: Ruggine - alla dose di g. 200-300 per 100 lt. di acqua.
Pioppo: Ticchiolatura - alla dose di gr. 250-300 per 100 lt. di acqua.
Tabacco: Peronospora tabacina - alla dose di g. 250-300 per 100 lt. di acqua, in semenzaio - alla dose di g. 250 per 100 lt. di acqua, in pieno campo.
Divieto di impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il LEVEN si versa nel totale quantitativo di liquido rimescolando energicamente per alcuni minuti fino a formazione di una poltiglia omogenea. Bagnare bene le piante affinchè il prodotto possa distribuirsi uniformemente su tutte le superfici da proteggere.
Si consiglia di aggiungere g. 100 di PRUNIG ogni 100 lt. di miscela.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ
Il LEVEN è compatibile con i prodotti con cui normalmente viene consigliata l'unione (bagnante - Parathion - Ossicloruro) e con i più noti prodotti similari della concorrenza. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina.

AVVERENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Varietà di pere sensibili allo ZINEB: Abate Fetel, Armella Butirra precore Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

4349

ENKIL 80®

Anticrittogamico acuprico

Composizione:

Maneb puro	g. 80
Eccipienti bagnanti e sospensivanti .	q.b. a g. 100

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

BASLINI

Baslini - Industrie Chimiche S.p.A.

Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782
20122 Milano

Stabilimento produttore:
Baslini Ind. Chim. S.p.A. - Treviglio (BG)

Registrazione N. 4349 del 25-5-81 del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi di acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini.

Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA

Consultare un centro antiveleni.

L'ENKIL 80 è un anticrittogamico ad azione preventiva

APPLICAZIONI DELL'ENKIL 80 polvere bagnabile

Vite: Peronospora, Escoriosi, Antracnosi alla dose di g. 200-400 p- 100 lt. di acqua.

Pomacee: Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria alla do- g. 200-400 per 100 lt di acqua.

Pomodoro solo fino alla prima fioritura: Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Antracnosi alla dose di g. 200-400 per 100 lt. di acqua.

Concia delle sementi: Fusarium nivale (Grano), Fusarium moniliforme e Gibberella zeae (Mais), Pericularia oryzae e Fusarium sp. (Riso), Phoma betae, Fusarium sp., Rhizoctonia solani, Cercospora beticola (Barbabietola), Fusarium sp., Rhizoctonia solani, Phytium sp. (Sementi orticole) alal dose di g. 200-400, q.le di seme.

Pioppo: Marsonnina, Ticchiolatura g. 200-400 per 100 lt. di acqua

Cereali in campo: Elminthosporium sp. Rhynchosporium secalis, Alternaria sp., Dilosphospora alopecuri, Fusarum sp., Cladasporium sp., Ustillago sp., Tilletia sp., Ophiobolus sp., Cercosporella sp., Rhizoctonia sp. alla dose di Kg. 2,5-3/ha

Garofano: Ruggine - alla dose di g. 200-400 per 100 lt. di acqua.

Tabacco: Peronospora tabacina - alal dose di g. 200-400 per 100 lt. di acqua.

Divieto di impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate.

Il prodotto è tossico per i pesci.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

EPOCHE D'IMPIEGO

A scopo preventivo a seconda del calendario d'incubazione delle malattie.

MODALITA D'IMPIEGO

Si versa l'ENKIL 80 in poca acqua e dopo avere agitato per discioglierlo perfettamente si versa la poltiglia ottenuta nella rimanente quantità di acqua tale da raggiungere la concentrazione voluta. Bagnare uniformemente le superfici vegetali da proteggere.

COMPATIBILITA

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione che con quelli alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), minacide, binapacryl e rame.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA

Varietà di pere sensibili al MANEB, Abate Fetel, Armella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

4397

ALBISAL®

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Liquido miscibile — **Fungicida a base di ossichinolina, specifico per la disinfezione solo di piantonai e semenzai di colture floricole ed ornamentali.**

Composizione — 100 grammi di prodotto contengono:
16,5 g. di ossichinolina pura
Solventi quanto basta a 100 grammi.

Natura del rischio — Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico — **Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.**
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro d'acqua) e digitale.

Caratteristiche — L'ALBISAL è un fungicida ad azione curativa e preventiva, specifico per la lotta contro marciumi radicali, mal dello sclerozio, mal del colletto, fusariosi ed altre malattie fungine tipiche dei semenzai e dei piantonai di floreali ed ornamentali.

Modalità d'impiego — Dosi d'impiego per 100 litri d'acqua:

Mal dello sclerozio e mal della tela nei semenzai e nei piantonai di colture floricole ed ornamentali.
Lotta preventiva: g. 2 nebulizzando più volte la vegetazione;
lotta curativa: g. 4 nebulizzando in ragione di 2-3 litri di soluzione per mq. Su terreno umido usare l'ALBISAL in ragione di g. 40 per mq.
Mal del colletto, marciume delle piantine nei semenzai e nei piantonai di colture floricole ed ornamentali.
Lotta preventiva: g. 2 ripetendo le irrorazioni ogni 15 giorni; **lotta curativa**: g. 4-12, disinfettando il terreno poco prima della messa a dimora delle colture. Su terreno umido usare l'ALBISAL in ragione di 40 g. per mq.

Fusariosi del garofano e del geranio: g. 2 immergendo le talee per 6-8 ore nella soluzione.
Marciumi radicali nei semenzai e piantonai di colture floricole ed ornamentali.
Lotta preventiva: g. 4 disinfettando il terreno prima della semina o del trapianto, con 2-3 litri di soluzione per mq. Durante la vegetazione irrorare ripetutamente a metà dose.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità — L'ALBISAL è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione — DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione N. 4397 del 25.5.81 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO lt. 1-10

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

4419

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

CRITTOMET®

FUMIGANTE GRANULARE PER LA DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI TERRENI E TERRICCIATI CONTRO INSETTI TERRICOLI, FUNGHI, NEMATODI ED ERBE INFESTANTI, IN PRE-SEMINA ED IN PRE-TRAPIANTO

Registrazione Ministero Sanità n. 4419 del 29.7.81
® Marchio depositato

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Dazomet puro	g 98

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il CRITTOMET, fumigante in formulazione granulare, una volta incorporato nel terreno, si trasforma in composti gassosi attivi contro i parassiti animali e vegetali presenti, come insetti terricoli, nematodi, semi o plantule di erbe infestanti, funghi, (Fusarium sp., Verticillium sp., Phoma sp., agenti dei marciumi radicali del colletto, degli steli e dell'apparato radicale, insetti vari, larve di maggiolino, elateridi; nematodi liberi, galligeni ed incistati).

Dosi, Modalità e settori di impiego
Il CRITTOMET si impiega alle seguenti dosi:
— terreni di pieno campo e serre 50-70 g/mq
— terricciati e composte varie 200-250 g/mc
Il prodotto, una volta distribuito uniformemente, deve essere subito dopo incorporato nello strato attivo del terreno alla profondità di 20 cm. circa, facendo seguire una rullatura qualora il terreno stesso si presentasse troppo soffice.

Se fosse necesario effettuare la disinfezione di strati di terreno che superino i 20 cm. si deve aumentare la dose di 15-20 g/mq ogni 10 cm. di profondità.

Il CRITTOMET può essere impiegato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare una uniforme distribuzione.

Al momento del trattamento, il terreno deve essere perfettamente livellato e sminuzzato, nonché avere un giusto grado di umidità (cioè terreno in condizioni di tempera adatto alle lavorazioni meccaniche).
Inoltre, il terreno deve avere una temperatura non inferiore ai 10°C, alla profondità di 20-25 cm. e deve essere privo di residui di precedenti colture.

L'impiego di letame ben maturo dovrà precedere di 40-45 giorni il trattamento con CRITTOMET, avendo cura di non distribuire nel corso del trattamento stesso concimi organici o torba, né concimi minerali azotati a base di ammoniaca.

Quando si effettua il trattamento su terricciati, è opportuno stenderli su un foglio impermeabile (possibilmente di plastica) in strati di 20-25 cm. di altezza, incorporando con motocoltivatore la dose prestabilita di CRITTOMET. Sovrapporre successivamente un nuovo strato di 20 cm. ed operare come in precedenza, fino ad avere al massimo l'altezza di un metro. Coprire il cumulo con polietilene od altro materiale per trattenere i vapori.

Dopo 10-15 giorni togliere la copertura e rimuovere completamente il terriccio che sarà pronto per l'uso dopo 3 settimane dalla distribuzione se la temperatura supera i 15°C. Con temperature più basse, intorno ai 10°C, prolungare l'attesa di altre 2 settimane.

Nel caso di disinfestazione da nematodi, è necessario attendere qualche giorno fra la preparazione del terreno ed il trattamento allo scopo di consentire la decomposizione dei residui vegetali, la fuoriuscita dei nematodi dalle galle e, quindi, il miglior contatto di questi ultimi con i principi attivi gassosi del CRITTOMET.

Per ottenere una buona azione diserbante, sono sufficienti 20 g/mq di prodotto incorporati ad una profondità di 5-10 cm. Qualora si rendessero necessarie successive lavorazioni al terreno, è opportuno non superare la profondità indicata per non portare in superficie strati di terreno non trattati contenenti semi di infestanti.

L'azione diserbante si esplica su semi, rizomi e bulbi in attività vegetativa, mentre sfuggono i semi completamente quiescenti. Allo scopo di ottenere i migliori risultati, sarà necessario eseguire una irrigazione circa una settimana prima del trattamento, per ridurre al minimo la quantità di semi ancora dormienti.

Consigli pratici
Dopo la distribuzione del prodotto è utile effettuare una buona irrigazione superficiale (10-15 cm.) da ripetersi eventualmente dopo 2-3 giorni, per favorirne la funzionalità ed evitarne l'evaporazione dei metaboliti gassosi.

Dopo la prima irrigazione, si raccomanda di coprire il terreno con un telo di polietilene. Qualora, dopo qualche giorno fossero ancora presenti granuli indecomposti, a causa di basse temperature o scarsa umidità, è necessario eseguire una nuova irrigazione. Dopo 21 giorni dal trattamento (25-30 giorni qualora le condizioni siano state sfavorevoli) è necessario arieggiare il terreno con una fresatura per favorire la fuoriuscita dei vapori residui del CRITTOMET. Trascorse 1-2 settimane da questa operazione è, comunque, opportuno eseguire il test del crescione.

Test del crescione
E' necessario eseguire questo test prima di procedere alla semina ed al trapianto nei terreni trattati con CRITTOMET, allo scopo di assicurarsi della completa scomparsa dei vapori del prodotto; riempire a metà un vaso di vetro, munito di tappo a perfetta tenuta, con terreno non pressato prelevato da vari punti del campo ed a varie profondità.

Come elemento di confronto si utilizza un vaso con terreno non trattato. Introdurre in entrambi i contenitori un batuffolo di cotone inumidito al quale siano stati fatti aderire semi di crescione (Lepidium sativum) od in mancanza di questi, semi di insalata. Fare in modo che il batuffolo rimanga sollevato dal terreno. Chiudere ermeticamente i vasi e tenerli in ambiente luminoso alla temperatura di 20-22°C. Eseguire queste operazioni molto rapidamente evitando di arieggiare il terreno trattato introducendolo nel vaso. A queste temperature i semi dovrebbero germinare in 1-2 giorni. Assenza e ritardo nella germinazione e sviluppo stentato sono indice di presenza dei vapori di CRITTOMET. Sarà quindi opportuno ripetere il test dopo una settimana. Il terreno potrà essere messo in coltura soltanto quando sarà accertata l'assenza di vapori.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con altri formulati.

FITOTOSSICITA'
Poiché i vapori di CRITTOMET sono altamente fitotossici, si raccomanda di costituire una fascia di rispetto di almeno 50 cm. per non danneggiare colture in atto, alberi, cespugli e arbusti eventualmente presenti. Inoltre, nei trattamenti in serra si dovrà usare la massima cautela per evitare il contatto dei vapori con colture eventualmente vicine: molto sensibili sono per esempio Ficus sp. e Asparagus plumosus.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SOCIETÀ ITALO AMERICANA SIAPA PRODOTTI ANTIPARASSITARI

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

San Vincenzo di Galliera (Bologna)

Contenuto Kg.

4434

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi d'intossicazione: vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.
Consigli terapeutici:
Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante, somministrazione di purganti salini (g 25 di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1-0,2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari, fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.
Controindicazioni: la morfina, l'alcool e per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITA'
È tossico per gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

'ACARKIL'

Acaricida specifico contro uova, neanidi, adulti

COMPOSIZIONE

Tetradifon puro	g 5,9
Dicofol puro	g 13,6
Solventi, adesivanti, emulsionanti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

p. p. ICI SOLPLANT s.p.a.

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione:
S.C.A.M. S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 4434 del 26-9-1981
'ACARKIL' - Marchio registrato ICI Solplant S.p.A.

'ACARKIL' è un acaricida a base di Tetradifon e di Dicofol, per trattamenti primaverili-estivi.

CAMPI DI IMPIEGO
Frutticoltura: pero, melo, pesco, ciliegio, agrumi.
Orticoltura: fagiolo, fava, fragola, pomodoro.
Floricoltura in pieno campo: ciclamino, garofano, rosa.
Dose: ml 200 per 100 litri di acqua.

Avvertenze:
In caso di infestazione in atto si consiglia di ricorrere a due trattamenti ravvicinati a 4-5 giorni l'uno dall'altro.
La dose può essere aumentata senza pregiudizio sino a 250 ml per 100 litri di acqua.
Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'
'ACARKIL' è compatibile con la massima parte degli insetticidi e degli anticrittogamici di uso comune. Non è compatibile con la poltiglia bordolese, con i polisolfuri di calcio e di bario e in genere con prodotti a reazione alcalina.
La miscela con ossicloruri di rame e con Colloidox va fatta con precauzione. La miscela con Captan 50 Solplant va fatta aggiungendo anche Agral.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

DA NON VENDERSI SFUSO

ml 10

4467

BAZIN 65®

Fungicida agricolo per viticoltura, frutticoltura, orticoltura, floricoltura in pieno campo

Composizione:
Zineb puro . . . . g. 65
Sostanze inerti o coadiuvanti . q.b. a g. 100

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

BASLINI

Baslini - Industrie Chimiche S.p.A.

Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782
20122 Milano

Stabilimento produttore:
Baslini Ind. Chim. S.p.A. - Treviglio (BG)

Registrazione N. 4467 del 12-9-81 del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare le confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevante o corsi d'acqua.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini.

Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA
Consultare un Centro antiveleni.

In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il BAZIN 65 è un fungicida organico dotato di sospensività e di potere coprente.
Il BAZIN 65 combatte le seguenti malattie:
Vite: Peronospora ed Antracnosi - alla dose di g. 250-300 per 100 lt. di acqua.
Pero e Melo: Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria - alla dose di g. 250-300 per 100 lt. di acqua.
Pomodoro solo fino alla prima fioritura: Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Antracnosi - g. 300-400 per 100 di acqua.
Garofano: Ruggine - alla dose di g. 200-300 per 100 lt. di acqua in pieno campo.
Pioppo: Ticchiolatura - alla dose di g. 250-300 per 100 lt. di acqua.
Tabacco: Peronospora tabacina - alla dose di g. 250-300 per 100 lt. di acqua, in semenzaio - alla dose di gr. 250 per 100 lt. di acqua, in pieno campo.
Il BAZIN 65 si versa nel totale quantitativo di liquido rimescolando energicamente per alcuni minuti fino a formazione di una poltiglia omogenea.
Bagnare bene le piante affinchè il prodotto possa distribirsi uniformemente su tutte le superfici da proteggere.
Si consiglia di aggiungere g. 100 di PRUNIG ogni 100 lt. di miscela.

Da non applicare con mezzi aerei.

Divieto di impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITÀ
Il BAZIN 65 è compatibile con i prodotti con cui normalmente viene consigliata l'unione (Bagnante - Parathion - Ossicloruro) e con i più noti prodotti similari della concorrenza.
Non miscelare con prodotti a reazione alcalina.

AVVERENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Si sconsiglia l'impiego di prodotto sulle varietà di Pero sensibili al BAZIN 65 quali ad esempio: Abate Fètel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

4485

VOTROMITE F

ACARICIDA EMULSIONABILE

CLASSE III

ATTENZIONE! Manipolare con prudenza

Composizione: gr 100 di prodotto contengono:

— Propargil puro	gr 30
— Fenson puro	gr 25
— Coformulanti	q.b. a 100
— Contiene Xilolo	

Caratteristiche:
Il VOTROMITE F è costituito dall'unione di due sostanze attive, il propargil ed il fenson, ad azione completamente sinergica.
L'azione di contatto di queste due sostanze assicura un controllo su tutti gli stadi di sviluppo (uova, larve e adulti) degli acari, permettendo la completa protezione delle piante per un lungo periodo di tempo.
Il VOTROMITE F è consigliato per la lotta contro le più comuni specie di acari (tetranichidi, eriofidi, tarsonemidi) ed in particolare contro i ceppi resistenti ai più comuni acaricidi che infestano *le piante da frutto*: melo, vite; *le colture industriali*: barbabietola da zucchero, mais; *le orticole*: pomodoro, pisello, patata, melanzana, peperone, fagiolo, fava, carota, sedano; *le floreali*: garofano in pieno campo.

Natura del rischio:
Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- Conservare la confezione ben chiusa;
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua;
- Non operare contro vento;
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
- Evitare di respirare i vapori.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Intossicazione acuta: Lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (gr 25 di solfato di sodio).
Per la liposolubilità di questo acaricida hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.
Barbiturici (Luminal gr 0,1-0,2) contro i tremori e le contrazioni muscolari; fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia.
Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicati la morfina e l'alcool e, per evitare la fibrillazione ventricolare, la adrenalina o l'efedrina.

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

REGISTRAZIONE N. 4485 DEL 1° OTTOBRE 1981 DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

® Marchio Registrato Soc. UNIROYAL INC. - New York (USA)

Dosi e modalità d'impiego: dosi per 100 litri di acqua:
- gr 150 nella generalità dei casi e nelle fasi iniziali dell'infestazione;
- gr 200 in caso di attacchi massicci e con infestazioni in fase avanzata.

Per l'applicazione del prodotto si consiglia di impiegare un forte quantitativo di acqua fino allo sgocciolamento quando si opera a volume normale e di usare un comune adesivo-bagnante alla dose consigliata dalla ditta produttrice.
Nei trattamenti a basso volume e quando si utilizza la metà di acqua rispetto al volume normale, è necessario raddoppiare la dose del prodotto e quella dell'adesivo-bagnante. I migliori risultati con il VOTROMITE F si ottengono quando le irrorazioni sono effettuate a temperatura superiore a 18°C.
Il prodotto si versa direttamente e lentamente sotto agitazione nel quantitativo di acqua richiesto o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

Compatibilità: Il VOTROMITE F è compatibile con la generalità dei fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione fortemente alcalina, come la poltiglia bordolese, i polisolfuri e gli zolfi, e gli olii minerali. La miscela con i prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile.

Avvertenze:
In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
Il prodotto è fitotossico sulle seguenti colture: pero, rosa, fragola. Sulla vite il VOTROMITE F è fitotossico solo se usato in pre-fioritura.
Dopo un trattamento con olii minerali lasciar trascorrere un mese prima di effettuare l'applicazione con il VOTROMITE F.

Rischio di nocività: Il VOTROMITE F è tossico per i pesci e gli insetti utili.

« SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA »

« **Attenzione:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

UNIROYAL

UNIROYAL CHIMICA S.p.A.
Via delle Industrie, 40
04013 LATINA SCALO

Officina di produzione: UNIROYAL CHIMICA S.p.A. - Via delle Industrie, 40 - 04013 LATINA SCALO

DA NON VENDERSI SFUSO — PESO NETTO DELLA CONFEZIONE: KG

4498

AFORT®

Composizione per 100 grammi:
gr. 24,25 Butocarboxim puro
Coformulanti q.b. a gr. 100

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Evitare di respirare i vapori
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrare in fosse profonde più di un metro cospa gendo con calce viva)
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico:
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione:
Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripe tersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente nei bambini.

Controindicazioni:
Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

Modalità d'impiego:
Sciogliere la dose prescritta del prodotto direttamente in acqua.

Campi d'impiego:
L'AFORT® è un insetticida ad azione aficida in formulazione liquida, emulsionabile in acqua, con azione pronta contro gli afidi. L'azione di questo prodotto è immediata e si manifesta per contatto ed ingestione. La sua efficacia dura da 2 a 3 settimane. L'AFORT® combatte efficacemente tutte le specie di afidi su colture arboree, arbustive ed erbacee.

Piante arboree:

Melo:
(Aphis pomi) afide verde del melo
(Dysaphis plantaginea) afide rosa del melo
(Eriosoma lanigerum) afide lanigero del melo

Pesco:
(Myzus persicae) afide verde del pesco
(Hyalopterus pruni) afide farinoso del pesco

Susino:
Myzus persicae) afide verde del pesco
Hyalopterus pruni) afide farinoso del pesco

Piante erbacee:
Bietola da zucchero e da coste:
(Aphis fabae) afide nero della bietola
Pomodoro: Afide verde del pesco (Myzus persicae)
Insalate: Afide verde del pesco (Myzus persicae)
Cavoli: Afide ceroso del cavolo (Brevicoryne brassicae)
Fagioli: Afide nero della fava (Aphis fabae)
Piante ornamentali in pieno campo.

Dosi d'impiego per 100 litri d'acqua: 250–300 cc

J. & A. MARGESIN S.p.A.
Fitofarmaci
LANA (Bolzano)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
L'AFORT® è compatibile con i più comuni prodotti antiparassitari, ad eccezione delle sostanze alcaline.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischio di nocività:
Il prodotto è nocivo agli insetti utili, agli animali domestici, ai pesci ed al bestiame. Per non causare danni agli insetti pronubi, si consiglia di non trattare durante il periodo della fioritura.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione: "Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali".

4505

RANDOL CAFFARO

Fungicida emulsionabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Brandol* puro .	g 25
Solventi ed emulsionanti. (contiene xilolo)	q.b.a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: *sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, ipertermia, colorazione gialla delle sclere.*

Terapia: *in caso di intossicazione acuta, ricorrere alla lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5% (non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni all'esofago, molto frequenti in caso di ingestione). Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda. Analettici (tipo simpatolo, veritolo e coramina) somministrati per via parenterale, se esiste una lieve sindrome ipotensiva; qualora questa fosse di grado elevato il paziente va ricoverato in reparto di rianimazione per trattamento più idoneo. Trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche in caso di collasso ed ipotensione grave. Metil e propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale.*
E controindicata l'atropina.

* marchio e brevetto SARIAF

CAFFARO S.P.A. - MILANO

0405

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 4505 del Ministero della Sanità del 8-10-1981

CARATTERISTICHE

Il **RANDOL CAFFARO** è un anticrittogamico emulsionabile in grado di combattere tutte le forme di Oidio, in particolare quelle che colpiscono le piante da frutto e le colture ornamentali di seguito indicate.
L'efficacia antioidica del Randol Caffaro si esplica sia in fase preventiva, sia attraverso una intensa azione curativa.

DOSI E MODO DI IMPIEGO

- **Viticoltura**
  la dose di impiego è di 120-130 g per ogni 100 litri di acqua e la frequenza degli interventi può in linea di massima ricalcare quella dei normali trattamenti antiperonosporici.
  Si consiglia di sospendere i trattamenti alla comparsa dei primi segni della maturazione del grappolo.
- **Pomacee (Melo) e Drupacee (Pesco)**
  i trattamenti vanno eseguiti con cadenza settimanale a partire dalla fase vegetativa detta delle "orecchiette di topo" o analoga, sino alla fine di Maggio; successivamente e fino alla fine di Luglio gli interventi tra un trattamento e l'altro vanno ampliati a 10-12 giorni. La dose di impiego in questo caso è di 120-130 g per 100 litri d'acqua.
- **Cucurbitacee (Cetriolo, Cocomero, Melone, Zucca, Zucchino) e Piante Ornamentali in campo**
  intervenire alla prima comparsa della malattia con trattamenti settimanali utilizzando una dose di 100-130 g per 100 litri d'acqua.

Per ottenere una buona emulsione con il **RANDOL CAFFARO** è necessario aggiungerlo lentamente e sotto una buona agitazione, ad un quantitativo di acqua pari alla dose prescelta. All'emulsione così ottenuta si aggiunge, sempre agitando, un quantitativo di acqua di due-tre volte superiore a quello precedentemente impiegato; infine si diluisce questa pre-emulsione fino a volume definitivo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **RANDOL CAFFARO** può essere miscelato con gli olii bianchi. Detta miscela è particolarmente consigliabile nei trattamenti iniziali ai fruttiferi e ciò anche per favorire la distruzione delle uova svernanti degli acari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg

4512

ENDOSELE 3 GR

INSETTICIDA GRANULARE A BASE DI ENDOSULFAN PER LA DISINFESTAZIONE DEL TERRENO DESTINATO A COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO O IN SERRA

Composizione per g. 100.
ENDOSULFAN puro .... g. 2,8
Coformulanti q.b. a .... g. 100

CLASSE III - ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio. Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico. Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.
Consigli terapeutici: intossicazione acuta, lavanda gastrica abbondante, somministrazione di purganti salini (25 g. di Solfato di Sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (Luminal 0,1-0,2 g.) contro i tremori muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.
Controindicazioni: morfina, alcool e per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina e l'efedrina. AVVERTENZA: consultare un Centro antiveleni.

Dosi e modalità di impiego. L'Endosele 3 GR è un insetticida che agisce per contatto e per ingestione nei confronti degli insetti dotati di apparato boccale masticatore e succhiatore. Viene impiegato per la disinfastazione del terreno contro elateridi, maggiolini, grillotalpe, miriapodi, agrotidi, cavallette e tentredini.
L'Endosele 3 GR, viene impiegato alle seguenti dosi: 25-30 g. ogni 10 m² (Kg. 25-30 per ettaro) in terreni sciolti o di medio impasto. 40-50 g. ogni 10 m² (Kg. 40-50 per ettaro) in terreni pesanti o torbosi.
Dopo la distribuzione del prodotto è necessario incorporarlo nel suolo mediante una opportuna lavorazione (fusatura, erpicatura e zappatura.)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità. Il prodotto va impiegato da solo.

Rischio di nocività.
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e per il bestiame.

ATTENZIONE. Da impiegare esclusivamente in agricoltura con esclusione di colture destinate ad alimentazione; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO Peso Kg. 0,500
REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ N. 4512 del 21-10-1981

Officina di produzione: BIMEX S.p.A. - ISOLA (VC)

**ITALVERDE S.R.L. - Via S. Bernardino, 120
24100 BERGAMO - Tel. 035/212234**

4518

CUPRAZIN 20-30

Fungicida cupro-organico in polvere bagnabile colorata, per irrorazioni

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:
Rame metallico (sotto forma di ossicloruro) 20 gr.
Zineb puro 30 gr.
Supporti inerti, bagnanti, coloranti e disperdenti q.b. a 100 gr.

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- **una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto**
- **conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore**
- **in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta**
- **durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.
In caso di ingestione lo Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il **CUPRAZIN 20-30** va impiegato alle seguenti dosi per ettolitro d'acqua in trattamenti a volume normale, sulle seguenti colture:
VITE: 250-400 gr. contro la Peronospora. Il prodotto è particolarmente adatto per trattamenti proventivi, ogni qualvolta si manifesti il pericolo di infezioni crittogamiche (aumento di temperatura e umidità), durante la fase più delicata della vegetazione della vite, quella che va dall'allegagione all'invaiatura, volendo impiegare il prodotto anche in trattamenti di chiusura dovrà usarsi la dose più alta.
POMACEE: 200-300 gr. contro la Ticchiolatura.
POMODORO: 300-400 gr., intervenendo solo fino alla prima fioritura, contro Peronospora, Alternariosi e Septoriosi.
GAROFANO (in pieno campo): 300-400 gr. contro la Ruggine.
Preparazione della sospensione: Stemperare il prodotto con poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea; diluire quindi alla concentrazione voluta con la rimanente quantità d'acqua, agitando.

DIVIETI D'IMPIEGO
- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **DA NON IMPIEGARE IN SERRA**
- **DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE**

COMPATIBILITA'
Il **CUPRAZIN 20-30** è compatibile con la generalità degli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Non trattare durante la fioritura. Nel trattamenti post-florali ai fruttiferi escludere: **le varietà di melo sensibili al rame:** Abbondanza « Bedford », Black Stayman, Golden Delicious, Jonathan, Gravelnstein, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Wineshap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Mantovana e Commercio. **Le varietà di pero sensibili al rame:** Buona Luigia, Butirra Clairgeau, Butirra Giffar, Passacrassana, William, Favorita di Clap, Kaiser. **Le varietà di pero sensibili allo zineb:** Abate Fêtel, Armella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi e Zecchermanna.
RISCHI DI NOCIVITA': E' tossico per i pesci.

SOSPENDERE IN TRATTAMENTO
28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A.
Sede legale: Via Matteotti, 16 - 48100 RAVENNA
Stabilimento di produzione: Cotignola (RA) - Via X Aprile, 3

Registrazione Ministero della Sanità n. 4518 del 21-10-1981

Peso netto: gr.

4590

BRUTION WP 20

CLASSE I

VELENO

POLVERE BAGNABILE - Insetticida citotropico per frutticoltura, agrumi, viticoltura, orticoltura, floricoltura e colture ornamentali in pieno campo.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
19 g Methidathion puro
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3.8.1968 n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO
rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
– Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. – Conservare la confezione ben chiusa. – Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. – Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. – Evitare di respirare i vapori. – Non operare contro vento. – Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. – Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. – Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva). – In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarree, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso.
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

CARATTERISTICHE
Il BRUTION WP 20 è un insetticida a largo spettro d'azione che agisce per contatto ed ingestione. È caratterizzato da un'elevata azione citotropica ed una buona persistenza d'azione per cui risulta efficace contro cocciniglie, lepidotteri, tortricidi e minatrici, tignole, carpocapsa ditteri fitofagi, afidi e coleotteri.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dosi per 100 litri di acqua : 200-300 grammi

Frutticoltura (melo, pero, pesco, susino) : contro la psilla del pero, afidi, cocciniglie, capua, cacoecia, carpocaspa, minatrici, antonomo;

Agrumi : contro cocciniglie, tignole, ditteri fitofagi;

Viticoltura : contro tignole, tortricidi, Sparganothis, cocciniglie;

Barbabietola da zucchero : contro Cleono, Lixus, altiche, afidi;

Orticoltura (patata e pomodoro) : contro dorifora, cavolaia, nottue, afidi, ditteri;

Floricoltura e colture ornamentali in pieno campo : contro afidi, tortricidi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il BRUTION WP 20 è miscibile in via di massima con i più comuni prodotti antiparassitari ad eccezione di quelli a spiccata reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri).

Avvertenze : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Si sconsigliano i trattamenti al pesco dopo la ripresa vegetativa per la sensibilità riscontrata in alcune varietà.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il BRUTION WP 20 è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N. 4590 del 28.12.81 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto kg 1-5-10

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

4607

CLASSE II

NOCIVO

ORTHO® DIBROM

Concentrato emulsionabile	**Insetticida-acaricida a base di Naled**
Composizione	100 grammi di prodotto contengono: 64,5 gr. di Naled puro Emulsionanti, tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi Contiene «XILOLO»
Natura del rischio	Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Norme precauzionali	- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Evitare di respirarne i vapori. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva). - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Informazioni per il medico	**Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.** **SINTOMI DI INTOSSICAZIONE** **Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.** **CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO** **In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita ed ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.** **Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.** **Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.** **Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.** **Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.** **CONTROINDICAZIONI** **Morfina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.**
Caratteristiche	L'Ortho Dibrom è particolarmente indicato per la lotta contro Afidi, Acari, Tripidi. Ha un'ottima efficacia iniziale di contatto ed una persistenza relativamente breve.
Modalità di impiego	Dosi per 100 litri di acqua: **Frutticoltura** (pesco, nettarina) e **viticoltura**: contro Afidi e Tripidi cc 100-120; contro Acari cc 150-300. **Orticoltura** (spinaci, insalata, sedano, cardo) contro Nottue ed Afidi cc 100-150; (cipolla) contro Tripidi e Mosca della cipolle cc 200· (cavoli, cavolfiori) contro Cavolaia e Tignola dei cavoli ed Afidi cc 100-150; (fagioli, piselli) contro Nottue ed Afidi cc 100-200; (patate) contro Altica e Dorifora della patata cc 100-150; (pomodori) contro Nottue, Sfinge e Mosche cc 125; (cocomeri e meloni) contro Tripidi ed Afidi cc 100-150, contro Acari cc 150-300; (bietola da zucchero) contro Nottue cc 100-120 ed Acari cc 150-300. **Colture foraggere** (erba medica, trifoglio, prato) contro Afidi, Cicaline, Nottue e Cimici cc 100-200. **Colture ornamentali** (solo in campo): contro Afidi, Cicaline, Minatori, Acari cc 200.
Preparazione della poltiglia	Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità di acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata. DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità	L'ORTHO DIBROM è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese). La miscela con certi prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività	Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.
Fitotossicità	Il prodotto può essere fitotossico a temperature superiori a 32°C. Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta. Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Titolare della registrazione	DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2
Officina di produzione	DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12 Registrazione N. 4607 del 30.12.81 del Ministero della Sanità. DA NON VENDERSI SFUSO. Contenuto lt. 1

4625

ROOTING POLVERE

RADICANTE ORMONICO PER TALEE DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Composizione (Rif. a g 100)

N.A.A. puro g 0,04

polveri inerti q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione, o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi con acqua e sapone.
Evitare di respirare i vapori.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Prep. n. del

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

g 1000

DOTT. Formenti S. p. A.
Industria Chimica Farmaceutica
Via Correggio, 45 - 20149 MILANO

Off. di prod. DIACHEM S.p.A. - Albano S.A. (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 4625 del 23-1 1982

MODALITÀ DI IMPIEGO: 4625

Preparare le talee di fiori e di piante ornamentali nel modo usuale ed immergere circa 2 cm. della parte terminale nella polvere radicante prima di metterle a dimora.
Quando si devono trattare talee legnose, immergere prima la base in acqua, scuotere per allontanare l'eccesso di acqua e quindi immergerle nella polvere radicante.
Piantare subito come di consueto nel terreno.

COMPATIBILITÀ:

Il prodotto va usato da solo.
"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".
"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

DA NON VENDERSI SFUSO

4628

I CLASSE

VELENO

CARBOFURAN FARMOPLANT LIDAL®

INSETTICIDA GRANULARE PER LA GEODISINFESTAZIONE DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Composizione

Carbofuran puro	g 4,5
Adesivanti ed inerti	q.b. a g 100

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 4628 **del** 13.1.1982
® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

Insetticida sistemico attivo nei confronti degli insetti terricoli, di alcuni fitofagi che colpiscono la parte aerea e dei nematodi;

la distribuzione va effettuata alla semina, sia su tutta la superficie a mezzo di spandiconcimi, sia in forma localizzata lungo le file di semina mediante gli idonei microgranulatori opportunamente tarati, in modo da assicurare una somministrazione uniforme ed il necessario interramento:

impiegare per la disinfestazione di tutta la superficie 40-60 kg/ha previo interramento e per quella localizzata 10-12 kg/ha.

Il prodotto non trasmette alcun odore o sapore alle piante coltivate su suolo trattato.

Il formulato può essere usato solo in pre-emergenza.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il prodotto può essere miscelato solo con concimi granulari.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, il bestiame, i pesci e gli insetti utili.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Evitare di respirarne i vapori.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).

In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione

Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto.

Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.

Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente nei bambini. Nei casi gravi o sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione.

Ossigeno - terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni

Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

24

4674

CLASSE IV

DISERBO - STI

Diserbante formulato in Polvere Solubile

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:
DALAPON (2,2-dicloropropionato di sodio)
puro 85 gr.
(pari a gr. 73,6 di acido equivalente)
Coadiuvanti e disperdenti q.b. a 100 gr.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

IN CASO DI INTOSSICAZIONE CHIAMARE IL MEDICO PER I CONSUETI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO.

CARATTERISTICHE

IL DISERBO-STI è un'erbicida sistemico, specifico per la distruzione delle infestanti graminacee annuali e perenni (gramigna, avena selvatica, sorghetto, erba codina) e altre monocotiledoni (tifacee, alismatacee, ciperacee e giuncacee).
Il DISERBO-STI non esplica un'azione caustica, ma viene assorbito dalle infestanti per via fogliare e radicale, bloccandone lo sviluppo vegetativo e causando così il loro totale disseccamento.
Data la grandissima diffusione delle specie infestanti combattute dal DISERBO-STI, il prodotto è impiegato:

— **Nel settore agricolo** per il diserbo di terreni destinati alla semina od all'impianto di colture, di frutteti, di vigneti, del colza, di medicai e di trifogliai.
— **Nel settore civile-industriale** per il diserbo di canali di irrigazione e di scolo, di fossi e laghi, di aree non coltivate, di bordi delle strade, di piazzali, di aie, di campi sportivi, di binari ferroviari, di piste di aereoporti e di velodromi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

— **Diserbo di terreni destinati alla semina o all'impianto di frutteti o vigneti:** 10-15 Kg./Ha. in 6-8 hl. d'acqua. Effettuare il trattamento con le infestanti in pieno sviluppo ed eseguire una lavorazione del terreno dopo circa un mese. La semina o l'impianto della coltura deve avvenire dopo tre mesi dall'intervento diserbante.
— **Diserbo di piante da frutto:** 5-8 Kg./Ha. in 7-8 Hl. d'acqua. I frutteti non devono avere meno di 5 anni. Effettuare i trattamenti tra i filari avendo cura di non investire la coltura utile con la nube irrorante.
— **Diserbo di vigneti:** 9-10 Kg./Ha. in 7-8 Hl. d'acqua. Usare solo in vigneti di età superiore ai 5 anni. Sui vigneti collinari o con radici superficiali è preferibile dimezzare le dosi effettuando due trattamenti distanziati di 15-20 giorni l'uno dall'altro.
Il prodotto deve essere usato solo su chiazze isolate di gramigna.
— **Diserbo di medicai e trifogliai:** 4-5 Kg./ha. in 7-8 Hl. d'acqua. Effettuare il trattamento a partire dal 2° anno, prima della ripresa vegetativa, o subito dopo gli sfalci estivi.
— **Diserbo di aree non coltivate:** 20-30 Kg./Ha. in 8-10 Hl. d'acqua. Usando la dose più elevata in presenza di specie particolarmente robuste e resistenti ed intervenendo nel periodo di maggior attività vegetativa.
— **Diserbo di canali, fossi o laghi** 20-30 Kg./Ha. in 20-30 Hl. d'acqua. Intervenire preferibilmente quando le infestanti sono in pieno rigoglio vegetativo. Le dosi più elevate vanno impiegate contro infestanti superiori a due metri di altezza e contro Phragmites e Typha.
— **Diserbo del colza:** 2-2,5 Kg./Hl., in 3 Hl. d'acqua, da quando il colza ha un minimo di tre foglie fino al momento della levata.
— **Diserbo di fabbricati urbano-industriali:** 15-20 Kg., in 20-30 Hl. d'acqua. Intervenire, preferibilmente, quando le infestanti sono in pieno rigoglio, vegetativo.

Le dosi minime e massime sono in relazione al grado di infestazione presente all'atto del trattamento.
La quantità d'acqua deve essere sufficiente ad irrorare uniformemente tutta la vegetazione infestante, evitando però lo sgocciolamento ed il contatto con le piante utili.
Avere cura che, a causa del vento, non si verifichi trasporto dell'erbicida nelle zone adiacenti coltivate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con la generalità dei diserbanti escluso gli oli minerali, ma non deve essere miscelato con insetticidi, anticrittogamici e concimi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto è fitotossico per cereali, mais, bietole per cui occorre evitare il contatto con tali colture. Evitare inoltre il contatto con le radici dei fruttiferi, quindi non usare mai il prodotto in terreni sabbiosi. Infine evitare che la nube irrorante investa la vegetazione delle piante trattate.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO
20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A.

Sede legale: Via Matteotti, 16 - 48100 RAVENNA
Stabilimento di produzione: Via S. Francesco - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4674 **del** 25/02/1982

PESO NETTO

4678

RUBIN

CLASSE IV

POLVERE BAGNABILE - Erbicida in polvere bagnabile specifico per il diserbo selettivo delle bietole.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
64,5 g Cloridazon (Ex Pirazon) puro
Disperdenti, bagnanti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

NORME PRECAUZIONALI

– Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici – Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il RUBIN® è un erbicida specifico che agisce principalmente per assorbimento radicale e parzialmente per via fogliare.
Condizione essenziale per ottenere un buon risultato erbicida è una sufficiente umidità nel terreno e lo stadio vegetativo delle infestanti che vengono controllate dalla germinazione fino alla fase di 2 foglie vere.
Il RUBIN® è molto attivo contro : Amaranthus retroflexus, Atriplex patula, Caspella bursa pastoris, Chenopodium album, Galeopsis tètrahit, Galinsoga parviflora, Lamium amplexicaule, Matricaria chamomilla, Poa annua, Papaver rhoeas, Polygonum persicaria, Polygonum convolvulus, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Spergula arvensis, Stellaria media, Thlaspi arvense, Urtica urens, Veronica sp. Il RUBIN® è mediamente attivo contro: Ajuga sp., Anagallis arvensis, Centaurea cyanus, Euphorbia sp., Fumaria officinalis, Galium aparine, Mercurialis annua, Polygonum aviculare, Senecio vulgaris, Vicia sp., Viola tricolor Il RUBIN® non è attivo contro le malerbe perenni o germinanti in profondità come Agropyron repens, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon, Cyperus sp., Equisetum sp., Pancium crus-galli, Sorghum halepense ed in genere contro tutte le malerbe quando hanno superato lo stadio di sensibilità.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il RUBIN® può essere applicato con qualsiasi tipo di pompa irroratrice regolata a dovere, in modo da poter distribuire il prodotto uniformemente su tutta la superficie da diserbare. Normalmente si impiegano da 300 a 600 lt. d'acqua per ettaro per trattamenti a pieno campo, che si possono eseguire nelle seguenti epoche:

Pre-semina: questo trattamento, eseguito su terreno già preparato, permette l'incorporamento del prodotto con erpici ad una profondità di 3-4 cm., rendendo la sua efficacia indipendente dall'andamento stagionale.

Pre-emergenza: con questo intervento, che può essere eseguito dalla semina fino a poco prima dell'emergenza delle bietole, si ottengono buoni risultati solo se entro 2-3 settimane dal trattamento cade un'abbondante pioggia, altrimenti bisogna ricorrere all'irrigazione.

Post-emergenza: questo trattamento viene consigliato solo se era impossibile eseguire l'intervento in pre-semina o pre-emergenza. Si effettua solo su bietole che hanno già sviluppato le prime foglie vere fino al momento della chiusura della fila. L'efficacia migliore si ottiene su infestanti in germinazione, per cui spesso è necessario eseguire una lavorazione preventiva. Spesso in quest'epoca il RUBIN® viene applicato come secondo trattamento in miscela con un altro erbicida selettivo scelto in base alle infestanti presenti.

Dosi d'impiego
Terreno sabbioso: 3 kg/ha.
Terreno di medio impasto: 4 kg/ha.
Terreno argilloso: 5 kg/ha.
Terreno torboso: 6 kg/ha. con trattamento in post-emergenza contro infestanti in fase dicotiledonare.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua ed aggiungerlo successivamente alla quantità d'acqua richiesta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il RUBIN® è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Azione residua
Il terreno trattato con questo prodotto dopo una normale lavorazione, può essere riseminato con bietole, mais e patate; ma è sconsigliabile la semina od il trapianto di pomodoro, colza, ravizzone, cavoli o cavolfiori.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli ani-
TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N. 4678 del 25.2.82 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto kg 1-5-10

4681

VELENO

BRUTION

SOLUZIONE EMULSIONABILE - Insetticida citotropico per frutticoltura, agrumi, viticoltura, orticoltura, floricoltura e colture ornamentali in pieno campo.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
19 g Methidathion puro
Tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi
Contiene «XILOLO»

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3.8.1968 n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
– Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. – Conservare la confezione ben chiusa. – Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. – Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. – Evitare di respirare i vapori. – Non operare contro vento. – Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. – Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. – Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva). – In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia , ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita o ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2 - 1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il BRUTION è un insetticida a largo spettro d'azione che agisce per contatto ed ingestione. È caratterizzato da un'elevata azione citotropica ed una buona persistenza d'azione per cui risulta particolarmente efficace contro cocciniglie, lepidotteri, tortricidi e minatrici, tignole, carpocapsa, ditteri fitofagi, afidi e coleotteri.

MODALITA' DI IMPIEGO
Dosi per 100 litri di acqua: 200-300 cc

Frutticoltura (melo, pero, pesco, susino): contro la psilla del pero, afidi, cocciniglie, capua, cacoecia, carpocapsa, minatrici, antonomo;

Agrumi: contro cocciniglie, tignole, ditteri fitofagi;

Viticoltura: contro tignole, tortricidi, Sparganothis, cocciniglie;

Barbabietola da zucchero: contro Cleono, Lixus, altiche, afidi;

Patata e pomodoro: contro dorifora, cavolaia, nottue, afidi, ditteri;

Floricoltura e colture ornamentali in pieno campo: contro afidi, tortricidi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il BRUTION è miscibile in via di massima con i più comuni prodotti antiparassitari ad eccezione di quelli a spiccata reazione alcalina. (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Si sconsigliano i trattamenti al pesco dopo la ripresa vegetativa per la sensibilità riscontrata in alcune varietà.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il BRUTION è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
AMONN FITOCHIMICA SPA - Bolzano, via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
AMONN FITOCHIMICA SPA - Stabilimento di Bolzano, via Siemens 12

Registrazione N 4681 del 25.2.1982 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto kg. 0,5

AMONN FITOCHIMICA SPA
BOLZANO, VIA PIAVE 2

4700

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Se si opera con atomizzatori indossare una maschera protettiva.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi d'intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici: lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

'PIRIMOR'

Aficida a rapida azione attivo anche contro gli afidi resistenti.

COMPOSIZIONE

Pirimicarb puro	g 23,7
Disperdenti, bagnanti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione: CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 4700 del 17-3-1982
'PIRIMOR' - Trade Mark Imperial Chemical Industries PLC

CARATTERISTICHE: 'Pirimor' è efficace contro tutte le specie di afidi comprese quelle resistenti agli esteri fosforici. Esplica rapidamente il suo effetto con azione fumigante e translaminare riuscendo a colpire gli afidi annidati nelle foglie accartocciate. Alle dosi consigliate non è pericoloso per i predatori degli afidi. Non lascia odori sgradevoli.

MODALITA' DI IMPIEGO

Campi di impiego

Frutticoltura: (melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio).
Orticoltura: (carota, cavoli, broccoli, cetrioli, cipolla, fagioli, fragola, peperoni, patata, pomodori, rapa, lattuga, indivia).
Floricoltura di pieno campo e in serra.
Colture industriali: (barbabietola, lino, canapa, tabacco).
Colture erbacee: (frumento, orzo, avena, fava).
Essenze forestali.

Dosi g 150 per 100 litri di acqua.

Avvertenze

Nei trattamenti su brassicacee o contro afide lanigero, aggiungere alla miscela g 100 di bagnante AGRAL.
Irrorare bagnando bene tutta la vegetazione da proteggere, anche la più nascosta.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

'Pirimor' è compatibile con la maggior parte dei prodotti normalmente utilizzati nei trattamenti antiparassitari salvo con quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli animali donestici, per i pesci e per il bestiame. È tossico per gli insetti utili.

Sui cereali sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta; sulle altre colture 14 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

9

4765

KLAIN NECAXIN

INSETTICIDA GRANULARE PER GLI INSETTI DEL TERRENO GRILLOTALPE, LARVE DI AGROTIDI, FORMICHE, DORIFORE

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:
— CARBARYL (esente da ß-naftolo) puro . . . . gr. 5
— Eccipienti e adescanti q.b. a . . . . gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero ai centro di rianimazione. Ossigeno-terapia se vi è cianosi.

CONTROINDICAZIONE: Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

ISTRUZIONI PER L'USO: L'esca insetticida granulare **KLAIN-NECAXIN** trova pratico impiego nella distruzione degli insetti del terreno destinato a colture floricole ed ornamentali in pieno campo o in serra contro: grillotalpe, larve di agrotidi, dorifore, formiche.
Distribuire l'esca **KLAIN-NECAXIN** in ragione di 200 gr. per ogni 10 metri quadrati e interrare leggermente con seminatrice o rastrello (Kg. 20 per ettaro).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto va impiegato da solo.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili, i pesci ed il bestiame ed animali domestici.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Registrazione Nr. 4765 del 10-5-82 delMinistero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO kg. 10**

AGRIFARMAX - via Goresina inf. n. 6 - Bellombra di Adria (ROVIGO)

Officina di produzione: IRCA S.p.A. - via del Tonale, 87 - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

4768

DIMILIN® 25 AMONN

CLASSE IV

Polvere bagnabile — **Insetticida per ingestione per la difesa di piante di melo e pero, forestali, ornamentali e floricole solo in campo.**

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:
Diflubenzuron puro g 25
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

IL DIMILIN® 25 AMONN appartiene ad un gruppo di insetticidi di sintesi che inibiscono la deposizione della chitina negli insetti, con conseguente morte in fase di muta.

DIMILIN® 25 AMONN è efficace contro i microlepidotteri minatori e i lepidotteri ricamatori del melo, la Carpocaspa, l'Orgyia e la Psilla del pero.

In foresta combatte **Thaumetopoea pityocampa** (Processionaria del pino), **Lymantria dispar, Rhyacionia buoliana e Pristiphora abietina.**

Modalità d'impiego

Dosi per 100 litri d'acqua:

Frutticoltura (meli e peri): contro **i microlepidotteri** minatori (**Lithocolletis, Cemiostoma**) g 50-60. Effettuare il trattamento durante la fase di volo degli adulti, in corrispondenza della ovideposizione.

Contro i lepidotteri ricamatori (Capua, Archips), Carpocapsa, Orgyia: 80 g
Trattare durante la deposizione delle uova o in prossimità della loro schiusura.

Contro la Psilla del pero: g 80.
Effettuare il trattamento alla schiusura delle uova.

Piante forestali: contro Thaumetopoea pityocampa, Lymantria dispar, Rhyacionia buoliana, Pristiphora abietina: g 50-70.
Su tutte le colture effettuare il trattamento, in linea di massima, durante la ovideposizione o quando le uova stanno per schiudere.

Colture ornamentali e floricole in pieno campo: contro Operophtera brumata, Euproctis chrysorrhoea g 50-60. Trattare le colture durante la ovideposizione o quando le uova stanno per schiudere.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

IL DIMILIN® 25 AMONN è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 45 prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Titolare della registrazione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

Officina di produzione

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 4768 del 10.5.82 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto g 500 - Kg 1 - 5

® Marchio e prodotto della Philips-Duphar B.V. Amsterdam (Olanda).

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

4770

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ERBICIDA LIQUIDO - specifico per il diserbo selettivo delle barbabietole da zucchero, da orto e da foraggio.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
15,36 g di Phenmedipham puro
Solventi, emulsionati e coadiuvanti quanto basta a 100 grammi.
Contiene «XILOLO e CICLOESANONE»

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
— SINTOMI D'INTOSSICAZIONE
Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
— CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi.
— CONTROINDICAZIONI
Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

CARATTERISTICHE
Il BEDIFAM® è un'erbicida specifico che agisce principalmente per assorbimento fogliare per cui viene applicato in post-emergenza di bietole ed infestanti. L'efficacia del trattamento dipende in modo particolare dallo stadio delle infestanti ed è massima nei primi stadi di sviluppo. È importante che per 7 - 8 ore dopo il trattamento non piova in modo che il prodotto venga assorbito completamente dalle infestanti.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Dose per ettaro: 6 - 8 lt. di BEDIFAM® diluito in 400 - 500 lt. di acqua bagnando bene le infestanti: impiegare il BEDIFAM® quando le infestanti sono nelle prime fasi dello sviluppo (2 foglie) indipendente dallo stadio della bietola.
Non eseguire il trattamento su bietole bagnate o con temperature superiori a 25° C.
Trattare solo bietole in buon stato vegetativo.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITÀ
Il BEDIFAM® è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Sospendere il trattamento 30 giorni prima del raccolto.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possano derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N. 4 770 del 10.5.1982 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto lt. 1 - 5

4807

SUKAMON

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

POLVERE BAGNABILE: aficida specifico a rapida azione anche contro Afidi resistenti.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Pirimicarb puro gr. 23,75.
Disperdenti, bagnanti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
— SINTOMI DI INTOSSICAZIONE
Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
— CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno-terapia se vi è cianosi.
— CONTROINDICAZIONI
Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

CARATTERISTICHE
Il SUKAMON® è un aficida a base di Pirimicarb attivo contro tutte le specie di afidi, anche quelle resistenti ai prodotti tradizionali. Il SUKAMON® è ad effetto rapido e per la sua proprietà fumigante e citotropica colpisce anche gli afidi protetti nelle foglie accartocciate.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Dosi per 100 litri d'acqua:
Contro gli afidi in frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, susino, agrumi, fragola), orticoltura (patata, peperone, melanzana, pisello, fagiolo, fava, carciofo, insalata, carota, cocomero, cetrioli, zucchini), delle colture industriali (pomodoro, barbabietola), e colture floricole ed ornamentali in pieno campo: impiegare il SUKAMON® alla dose di 100-150 gr/hl.
In caso di forte infestazione e particolarmente contro l'Afide verde e farinoso del pesco e contro l'Afide nero della fava si consiglia di applicare la dose di 150 gr/hl aggiungendo 100 cc/hl di Bagnante Amonn.
Per ottenere i migliori risultati si raccomanda di trattare le piante fino alla soglia dello sgocciolamento, avendo cura di trattare bene tutte le parti della pianta.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITÀ
Il SUKAMON® è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione per i polisolfuri, poltiglia bordolese.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto può essere nocivo per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame; è tossico per gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N. 4807 del 21.05.82 del Ministero della Sanità
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto Kg. 0,5-1-5

4819

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

GLIFOBEN

Fungicida organico ad azione di contatto e sistemica
Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 25 di Iprodione puro
gr. 25 di Benomyl puro
Coformulanti q.b. a 100

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida organico ad azione di contatto e sistemico, indicato per la lotta contro le malattie crittogamiche delle colture di seguito indicate.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 4819 Ministero Sanità del 7-6-1982

2/85

APPLICAZIONI E DOSI

- VITICOLTURA: contro la Botrite a kg. 1,5-2 per ettaro, distribuiti con 10-15 ettolitri d'acqua. Trattare alla sfioritura, prima della chiusura del grappoli, all'inizio dell'invaiatura, e 2-3 settimane dopo l'invaiatura.

Per le varietà sensibili alla Botrite del peduncolo, effettuare un trattamento anche in pre-fioritura.

Il prodotto non ostacola la fermentazione dei mosti; esplica inoltre azione frenante sullo sviluppo del mal bianco.

- FRUMENTO, ORZO

Concia delle sementi: contro Carie, Septoriosi, Elmintosporiosi, Carbone nudo (Ustilago nuda) e Fusarium nivale, gr. 300 per quintale di seme.

L'applicazione può essere effettuata a secco, mescolando la dose di prodotto al frumento, oppure mediante appositi apparecchi che distribuiscano omogeneamente una poltiglia costituita dalla dose di prodotto aggiunta a litri 0,5 di acqua per quintale di seme.

- FRUTTICOLTURA (Drupacee): contro Monilia a gr. 150/hl. Trattare prima, durante e dopo la fioritura.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi della nostra gamma.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta dell'uva
Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta delle drupacee

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

4820

INEX®

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE
CON PRUDENZA

DISERBANTE LIQUIDO: per il diserbo selettivo in pre-emergenza del grano.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Pendimethalin (penoxalin) puro gr. 16.
Linuron puro gr. 9.
Coformulanti (emulsionanti e solventi) quanto basta a 100 grammi.
Contiene « XILOLO e CICLOESANONE ».

NATURA DEL RISCHIO
Prodotto pericoloso per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Non operare contro vento. — Evitare di respirarne i vapori, il nebulizzato e le polveri. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Irritante per la cute. L'ingestione può provocare bruciori gastroesofagei, vomito, diarrea, subittero, albuminuria, ematuria. TERAPIA: Per la dermatosi pomate cortisoniche od antistaminiche. Non è consigliabile la lavanda gastrica. Si consiglia fleboclisi glucosate, potassio, epatoprotettori.

CARATTERISTICHE E GAMMA D'AZIONE
L'INEX®, basato su un'appropriata miscela di pendimethalin (penoxalin) e linuron, è un diserbante da distribuire sul terreno, ove svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle più importanti infestanti annuali sia graminacee che dicotiledoni (delle quali ultime controlla anche le plantine, purché non abbiano superato lo stadio di 2-3 foglie vere):
Graminacee: Alopecurus, Apera, Bromus, Poa;
Dicotiledoni: Anagallis, Anthemis, Capsella, Cerastium, Fumaria, Lamium, Matricaria, Myosotis, Papaver, Polygonum, Ranunculus, Raphanus, Sinapis, Stellaria, Thlaspi, Veronica, Viola.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Per il diserbo selettivo del grano l'INEX® deve essere distribuito sul terreno nel periodo compreso fra la semina e l'emergenza alla dose di 5 Kg/ha (da aumentare a 6 Kg/ha in presenza di terreni argillosi o compatti, oppure notoriamente soggetti a forti infestazioni di graminacee). Su terreni torbosi e ricchi di sostanza organica è consigliabile aumentare di circa 1/3 la dose suggerita.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA ED ISTRUZIONI PER L'USO
Al fine di permettere all'INEX® di esplicare al meglio la sua attività diserbante e la sua selettività verso le colture suggerite, attenersi alle seguenti modalità operative:
— effettuare una buona preparazione del letto di semina in modo da operare su terreno perfettamente livellato e privo di zolle, tale da formare una massa uniforme e compatta;
— effettuare le semine in maniera uniforme e regolare ad una profondità di almeno 4 cm., avendo altresì cura di evitare che alcuni semi rimangano scoperti o a pelo di terra.
— stemperare la calcolata dose di INEX® in poca acqua agitando la miscela e poi, sempre continuando ad agitare, aggiungere il quantitativo d'acqua necessario a raggiungere la consigliata concentrazione. Effettuare il trattamento non appena sia stata preparata la miscela. Se questa viene lasciata a riposo per parecchie ore, è consigliabile rimescolarla bene, poco prima dell'impiego.
— distribuire la miscela, senza incorporarla, con un quantitativo di acqua oscillante tra i 300 e gli 800 lt/ha a seconda del tipo di pompa usata, in modo da assicurare una completa ed uniforme bagnatura del terreno e cioè senza lacune e senza sovrapposizioni.
— dopo la distribuzione lavare accuratamente con acqua e sapone attrezzature, utensili e recipienti adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITÀ
Non si consigliano miscele di INEX® con altri prodotti.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto svolge la sua azione a carico di semi e germinelli localizzati nello strato superficiale del terreno. Pertanto, al fini della selettività verso le colture suggerite è indispensabile attenersi alle consigliate modalità e profondità di semina. In caso di semine superficiali ed irregolari la selettività può essere ridotta specialmente se forti piogge sopravvengono dopo il trattamento. Il prodotto può essere fitotossico verso le colture non indicate in etichetta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
CYANAMID ITALIA S.p.A. - Catania - Zona Industriale

Registrazione N. 4820 del 3.6.82 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 20-5-1

4831

KLAIN LIMAXIN

ESCA LUMACHICIDA GRANULARE PER LA DISTRUZIONE DI LIMACEE LUMACHE, CHIOCCIOLE E GASTEROPODI IN GENERE

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono: Metaldeide acetica pura gr. 5 Supporto proteico q.b. a 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici, conservare la confezione ben chiusa, non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto: non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione: violenti dolori addominali, diarrea, vomito biancastro (aspetto di latte cagliato), schock, midriasi, ipotermia, obnubilazione del sensorio.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con carbonato di sodio (gr. 5 per litro di acqua), riscaldare il paziente, cardiotonici, fleboclisi clorurate e glucosate con noradrenalina, diuretici, barbiturici, neuroplegici, anfetamina e derivati in caso di torpore.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI E MODALITA' D'IMPIEGO: l'esca granulare KLAIN LIMAXIN va sparsa a spaglio, a file o a mucchietti, preferibilmente di sera dopo eventuale pioggia o innaffiatura o con terreno comunque umido.
Gr. 100-300 per ogni 100 metri quadrati di superficie a secondo del grado di infestazione. (Kg. 10-30 per Ha).
Gr. 2-3 (pochi granuli) attorno alle piante per trattamenti singoli. Per evitare infestazioni dall'esterno distribuire il prodotto lungo i margini delle aree da proteggere.
KLAIN LIMAXIN distrugge limacee, lumache, chiocciole e gasteropodi in genere infestanti le colture floreali in pieno campo e serra.
KLAIN LIMAXIN attira con le proteine contenute nell'esca i molluschi: non fermenta, non ammuffisce, non viene dilavato dalle piogge, non viene asportato dal vento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

ATTENZIONE: da impiegare nelle colture floricole in pieno campo o in serra. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Registrazione nr. 4831 del 3-6-82 - Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO: kg. 1**

AGRIFARMAX - via Goresina inf. n. 6 - Bellombra di Adria (ROVIGO)

officina di produzione bimex s.p.a. — isola vicentina (vi)

4838

ZANTIR® AZZURRO

Anticrittogamico micronizzato per trattamenti in polvere sulla vite

COMPOSIZIONE

— Rame puro (sotto forma di ossicloruro)	g 4,58
— Zineb puro	g 2,4
— Zolfo puro (esente da selenio)	g 49,75
— Disperdenti, inerti, adesivanti e coloranti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.**
- **Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
- *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
- *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

CONTROINDICAZIONI: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

CARATTERISTICHE

Lo **ZANTIR AZZURRO** è un fungicida formulato in polvere secca da distribuire tal quale. E' particolarmente indicato contro l'Oidio e per la lotta complementare contro la Peronospora.

Lo **ZANTIR AZZURRO** è prodotto specifico per la vite indicato per zone a clima asciutto ed a scarsa disponibilità d'acqua, ove rende possibile l'attuazione di una valida difesa contro Oidio e Peronospora. In queste condizioni trova impiego particolarmente nel periodo estivo quando si formano sulla vegetazione rugiade che creano le condizioni ideali per attacchi di Peronospora sui grappoli.

Lo **ZANTIR AZZURRO** consente una uniforme copertura della superficie fogliare e può penetrare anche nelle parti interne dei grappoli. La sua colorazione permette un'evidente « marcatura » della vegetazione.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Lo **ZANTIR AZZURRO** va distribuito con polverizzatrici che consentano una regolare fuoriuscita della polvere in modo da formare una nube e da coprire uniformemente la vegetazione anche nelle parti più interne.

La dose media è di **20 kg/ha.** Tale quantitativo è da aumentare a **40-50 kg/ha** in relazione al tipo di allevamento, allo sviluppo vegetativo della coltura, alla gravità delle infezioni. Intervallare ai trattamenti polverulenti con **ZANTIR AZZURRO** trattamenti liquidi con ANTIR e Microzolfi, specie in periodi con andamento stagionale particolarmente favorevole alla Peronospora.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA': Lo **ZANTIR AZZURRO** è compatibile con tutti gli antiparassitari preparati in polvere secca.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA
EniChemAgricoltura S.p.A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO
Officina di Produzione:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di TREVIGLIO (Bergamo)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 4838 del 21 Giugno 1982

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg. 25**

4839

ZANTIR®

Anticrittogamico micronizzato per trattamenti in polvere sulla vite

COMPOSIZIONE

— Rame puro (sotto forma di ossicloruro)	g 4,58
— Zineb puro	g 2,4
— Zolfo puro (esente da selenio)	g 49,75
— Disperdenti, inerti, adesivanti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.**
- **Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
- *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
- *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI D'INTOSSICAZIONE: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscenza la lavanda gastrica va pratica previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Lo **ZANTIR** è un fungicida formulato in polvere secca, da distribuire tal quale. E' particolarmente indicato contro l'Oidio e per la lotta complementare contro la Peronospora.

Lo **ZANTIR** è prodotto specifico per la vite, indicato per zone a clima asciutto ed a scarsa disponibilità d'acqua, ove rende possibile l'attuazione di una valida difesa contro Oidio e Peronospora. In queste condizioni trova impiego particolarmente nel periodo estivo quando si formano sulla vegetazione rugiade che creano le condizioni ideali per attacchi di Peronospora sui grappoli.

Lo **ZANTIR** consente una uniforme copertura della superficie fogliare e può penetrare anche nelle parti più interne dei grappoli.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Lo **ZANTIR** va distribuito con polverizzatrici che consentano una regolare fuoriuscita della polvere in modo da formare una nube e da coprire uniformemente la vegetazione anche nelle parti più interne.

La dose media è di **20 kg/ha.** Tale quantitativo è da aumentare a 40-50 kg/ha in relazione al tipo di allevamento, allo sviluppo vegetativo della coltura, alla gravità delle infezioni. Intervallare ai trattamenti polverulenti con **ZANTIR** trattamenti liquidi con ANTIR e Microzolfi, specie in periodi con andamento stagionale particolarmente favorevole alla Peronospora.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA': Lo **ZANTIR** è compatibile con tutti gli antiparassitari preparati in polvere secca.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per évitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA
EniChemAgricoltura S.p.A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione:
BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Stabilimento di TREVIGLIO (Bergamo)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 4839 de 21 Giugno 1982

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg. 10**

4850

CARATTERISTICHE

Il **TERFIT PASTA** può essere usato sulle seguenti colture: **Pomacee, Drupacee, Vite, Agrumi, Olivo, Mais, Medica, Pomodoro, Pisello, Patata, Peperone, Bietola, Fagiolo, Insalata, Cavoli, Colture Ornamentali** ed è specifico nella lotta contro i seguenti parassiti: **Carpocapsa** (verme delle mele e delle pere): eseguire i trattamenti al primo sfarfallamento degli adulti (circa alla metà di maggio) e continuare fino ad agosto ad intervalli di 10-15 giorni. **Tignola orientale del pesco (Cidia)**: iniziare i trattamenti per la protezione dei germogli, verso la fine di maggio; per proteggere i frutti fare 4-5 trattamenti nel mese di luglio e agosto distanziandoli di 10-15 giorni l'uno dall'altro. **Tignole dell'uva, dell'olivo, degli agrumi, Cocciniglia mezzo grano di pepe dell'olivo, degli agrumi e dell'oleandro, Ricamatrice, Cacoecia ed Eulia del melo e del pero, Fitonomo, Apion e Misurino dei medicai, Cavolaia, Lepidotteri di: pomodoro, pisello, patata, peperone, bietola, fagiolo, insalata, cavoli**: eseguire i trattamenti fin dall'apparizione dei parassiti, ripetendoli a distanza di 10-15 giorni. Contro la **Dorifora della patata** si può intervenire ai primi di maggio, verso giugno contro le larve, un eventuale terzo trattamento in luglio quando compaiono i nuovi adulti.

Impiego del TERFIT PASTA contro la Piralide del Mais nella lotta alla prima generazione

I trattamenti devono essere eseguiti al fine di proteggere il culmo, specialmente nella zona sottostante la spiga per evitare che le gallerie scavate dalle larve a varie altezze lungo lo stocco, ostacolino la circolazione della linfa impedendo la formazione di infiorescenze femminili (spighe) di dimensioni normali e nei casi più gravi, la rottura dello stocco. L'epoca per i trattamenti inizia allorchè lo stocco ha raggiunto un'altezza di circa metri 1,20 -1,50 (fine giugno - primi di luglio) eventualmente ripetendoli a seconda delle necessità. Poichè le farfalle tendono a depositare la uova nelle zone più alte della pianta, effettuando i trattamenti, occorre investire la pianta dall'alto.

Impiego del TERFIT PASTA contro la Piralide del Mais nella lotta alla seconda generazione.

Con macchine idonee si può intervenire anche contro la seconda generazione. Gli adulti sfarfallano alla fine di luglio e continuano per tutto agosto e nei primi giorni di settembre con il massimo d'intensità nei primi 15-20 giorni d'agosto. In questo periodo deve essere intensificata la lotta contro gli adulti per evitare il più possibile le ovodeposizioni o contro le larve che penetrino nelle spighe.

DOSI D'IMPIEGO

La dose normale d'impiego è di g 200-250 ogni 100 litri d'acqua. Contro la Piralide impiegare kg 2.5-3 di prodotto per ha.
Operando con pompe a volume ridotto, elevare proporzionalmente le dosi.

Preparazione della poltiglia

Stemperare in poca acqua la dose di prodotto, mescolare e versare agitando nel quantitativo totale di acqua richiesto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il **TERFIT PASTA** è miscibile con i più comuni antiparassitari in commercio e miscele degli stessi, purchè non a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il **TERFIT PASTA** è tossico per le api: è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO Kg 5

TERFIT PASTA

Insetticida in pasta

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
Carbaryl puro . . . . g 34,6
(beta-naftolo assente)
Coformulanti . . . . q.b. a g 100
contiene glicole etilenico

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi di intossicazione: *nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.*
Consigli terapeutici: *lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio: lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.*
Attenzione a non somministrare atropina in dosi eccessive, specialmente ai bambini. Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

CAFFARO S.P.A. - MILANO

0305

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 4850 del Ministero della Sanità del 19-6-1982

4852

METAL®

Insetticida fosforganico

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

Composizione:

Malathion puro . . . . g. 50

Solventi, emulsionanti, diluenti q.b. a g. 100

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

BASLINI

Baslini - Industrie Chimiche S.p.A.

Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782
20122 Milano

Stabilimento produttore: Baslini Ind. Chim. S.p.A. - Treviglio (BG)

Registrazione N. 4852 del 25-10-82 del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea., bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionali al caso. In caso di evidento ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al Centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Insetticida ad azione per contatto ed ingestione.
Parassiti combattuti: afidi, tangidi, tripidi, cidia, perrisia, tignole, tetredini, antonomi, fitonomi, misurino, monosteira, mosche della frutta, bega verde, cavolaia, larve minatrici e ricamatrici, apion, carpocapsa.

COLTURE PROTETTE:
- **floricoltura** in pieno campo.
- **agrumi:** arancio, limone, cedro, mandarino, clementino, pompelmo, bergamotto.
- **orticolture:** carciofo, cipolla aglio, porro, cavolo, cavolfiore, cocomero, melone, cetriolo, zucchino, lattuga, indivia, radicchio, patata, pisello, fagiolo, fagiolino, pomodoro, peperone, melanzana, carota, sedano, finocchio, spinacio.
- **piante da frutto:** pero, melo.
- **grano.**

DOSI D'IMPIEGO
g. 200-300 per 100 litri d'acqua.

EPOCHE D'IMPIEGO
Alla prima comparsa dei parassiti e ad ogni eventuale reinfestazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Bagnare abbondantemente ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere, in particolare le pagine inferiori delle foglie.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione che con quelli alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.).

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Può essere fitotossico nelle serre su fagioli e cucurbitacee.

NOCIVITÀ a seguito del trattamento: il prodotto è nocivo per gli altri insetti utili; animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

4893

CLASSE III

ATTENZIONE manipolare con prudenza

FUNGICIDA ORGANICO DI SINTESI IN POLVERE, PER LA CONCIA A SECCO E UMIDA DELLE SEMENTI

COMPOSIZIONE

Mancozeb puro g 60

Sostanze inerti, coloranti e coadiuvanti q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento di Massa (MS)

Registrazione Ministero della Sanità N. 4893 del 4.9.1982

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

Il NEMISPOR 60 non influisce sul potere germinativo delle sementi trattate, anche se microlesionate.
Viene impiegato nella concia secca e umida delle sementi mescolando il prodotto uniformemente con tutta la massa di semi da trattare. L'operazione viene solitamente effettuata impiegando un apposito recipiente cilindrico rotante.

FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE
Contro la Carie (Tilletia tritici), la Fusariosi (Fusarium nivale), lo Septoriosi del frumento; l'Elmintosporiosi dell'orzo e della segale; il Carbone fisso dell'orzo ed il Carbone volante dell'avena: g 200 per quintale di seme.

RISO
Contro il Brusone (Pyricularia oryzae), la Fusariosi (Fusarium spp.) e l'Elmintosporiosi (Helminthosporium oryzae): g 250-350 per quintale di seme.

MAIS
Contro il Carbone (Ustilago maydis), le contaminazioni esterne da Fusarium moniliforme e Gibberella zeae e l'Elmintosporiosi (Helminthosporium maydis): g 300-400 per quintale di seme.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Contro il Mal del piede (Phoma betae), la Fusariosi (Fusarium spp) il Mal vinato (Rhizoctonia violacea, la Cercosporiosi (Cercospora beticola) ed il Pythium ultimum): g 600 per quintale di seme.

COLTURE ORTICOLE
Contro Pythium spp, Botrytis spp, Fusarium spp e Rhizoctonia solani: g 300-800 per quintale di seme a seconda del tipo di seme.

Avvertenza
I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati alla alimentazione dell'uomo o del bestiame.

DIVIETI D'IMPIEGO

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **DA NON IMPIEGARE IN SERRA**
- **DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE**

Compatibilità
Il NEMISPOR 60 è miscibile con gli insetticidi comunemente impiegati nella concia del seme.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto: Kg 0,100

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

4906

TRINET® L

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

LIQUIDO EMULSIONABILE - Diserbante selettivo di pre-emergenza per colture di cereali a semina invernale.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
19 g Trifluralin puro
9 g Linuron puro
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi - Contiene «XILOLO»

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Irritante per la cute. L'ingestione può provocare bruciori gastro-esofagei, vomito, diarrea, subittero, albuminuria, ematuria. Terapia: per le dermatosi pomate cortisoniche od antistaminiche. Non è consigliabile la lavanda gastrica. Si consiglia: fleboclisi, glucosate, potassio, epatoprotettori.

CARATTERISTICHE
Il TRINET® L è un erbicida specifico per il diserbo del frumento in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.
Il TRINET® L garantisce una rapida distruzione delle infestanti graminacee e dicotiledoni quali Alopecurus, Apera spica venti, Bromus, Lolium, Poa, Echinocloa, Amaranthus, Atriplex, Anagallis, Matricaria chamomilla, Cerastium, Capsella, Chenopodium, Fumaria, Papaver, Polygonum, Portulaca, Raphanus, Sinapis, Sonchus, Spergula, Stellaria, Veronica, Galium, Lamium, mantenendo una perfetta selettività.
Il TRINET® L non controlla Avena spp., Agropyron repens, Cirsium spp.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Frumento autunnale duro e tenero, orzo e segale a semina invernale: dose media Kg. 3-4 per ettaro distribuiti con almeno 500 litri di acqua per ettaro. Il trattamento con il TRINET® L va effettuato dopo la semina del frumento, prima dell'emergenza della coltura e delle infestanti. L'efficacia erbicida è migliore su terreno ben lavorato, privo di zolle, con elevato grado di umidità del suolo al momento del trattamento e dopo la sua esecuzione.

ISTRUZIONI SPECIALI
Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Trifluralin in miscela con Linuron e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalate, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio.
Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio o da orto) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto.
La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITÀ
Il TRINET® L non deve essere miscelato con altri prodotti.

[illegible]

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

AVVERTENZE
— Conservare il prodotto in locali a temperatura superiore ai 5° C.
— Non conservare presso sorgenti di calore o fuoco.
— Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per l'impiego del prodotto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Pieve 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

Registrazione N 4906 del 07.09.82 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 1-0,5-5.

4948

TOTERBA

DISERBANTE TOTALE

COMPOSIZIONE

Clorato di sodio puro	gr. 84
Coformulanti q.b. a	gr. 100

CLASSE IV

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Tenere in luogo sicuro, lontano dal calore e dalle fiamme libere.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PROPRIETA' E IMPIEGO
E' un diserbante per la distruzione di ogni erba in fase attiva di crescita. Per il diserbo totale di bordi stradali, viali, cortili, aree non coltivate, aree industriali, sedi ferroviarie, mura, ovunque si voglia eliminare malerbe non desiderate.

USO E DOSI
Kg. 1 per 40 lt. d'acqua.
Distribuire circa 1 lt. di soluzione per ogni mq. di superficie da trattare. Per erbacce tenaci (tipo gramigna) o molto sviluppate radoppiare la dose oppure ripetere il trattamento dopo 15 giorni. E' opportuno, prima di effettuare il diserbo, inaffiare il terreno con semplice acqua. Meglio se il trattamento è fatto dopo una abbondante pioggia.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

MISCIBILITA'
Il prodotto si usa da solo.

AVVERTENZE
Evitare che il TOTERBA venga a contatto con piante ornamentali, arbusti, alberi ed altre colture Tenere il prodotto lontano dall'acqua destinata ad usi domestici o irrigazioni.
Evitare il contatto con i semi, fungicidi e fertilizzanti.
Usare sempre la stessa pompa per l'uso di TOTERBA e non usarla per fertilizzanti, insetticidi e disinfettanti, ricordandosi di lavarla accuratamente dopo l'uso.

ATTENZIONE: Impiegare il prodotto in assenza di colture agricole, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGROZOOFARMA s. r. l. - MORTEGLIANO (UD)

OFFICINA DI PRODUZIONE: AGROZOOFARMA - MORTEGLIANO (UD)

Reg. Min. San. n. 4948 del 15 - 10 - 1982

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg 25

4988

BAMIST®

Fungicida cuprorganico

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

Composizione:
Zineb puro . . . . g. 16
Rame metallo puro . . . . g. 21
(sotto forma di Ossicloruro tetramico)
Colormulanti . . . . q.b. a g 100

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

BASLINI
Baslini - Industrie Chimiche S.p.A.
Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782
20122 Milano

Stabilimento produttore:
Baslini Ind. Chim. S.p.A. - Treviglio (BG)

Registrazione N. 4988 del 25.10.1982 del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Non operare controvento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini.

Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA

Consultare un centro antiveleni.

In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfo-deidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il BAMIST è un anticrittogamico misto.

Il BAMIST è indicato su:

Vite: peronospera, antracnoci - alla dose di g. 250-300 per 100 lt. di acqua

Pomacee: ticchiolatura, septoria, ruggine, alternaria alla dose di g. 250-300 per 100 lt. di acqua.

Pomodoro: solo fino alla prima fioritura: peronospora, alternariosi, septoriosi, cladosporiosi, antracnosi - alla dose di g. 250-300 per 100 lt. di acqua.

Garofano in pieno campo: ruggine - alla dose di g. 250 per 100 lt. di acqua.
Si versa il BAMIST in poca acqua e dopo avere agitato per scioglierlo perfettamente si versa la poltiglia ottenuta nella rimanente quantità di acqua, tale da raggiungere la concentrazione voluta. Si consiglia sempre di aggiungere PRUNIG alla dose di g. 30-40 per 100 lt. di poltiglia ottenuta, allo scopo di aumentare l'attività bagnante ed adesiva della miscela da irrorare.

EPOCHE DI IMPIEGO

Usare il prodotto a scopo preventivo a seconda del calendario di incubazione delle malattie.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina o con Dicloran.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura. Su alcune varietà di melo e pero cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia pertanto l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Cultivars di melo sensibili al rame: Abbondanza Belfort, Black Ben Davis, Black Stayman, Calcilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Gravestein, Jonathan, Renetta del Canada, Rome Beaty (Morgenduft), Stayman Red, Stayman Winesap. Cultivars di pero sensibili al rame ed allo Zineb: Abate Fêtel, Buona Luigia d'Aveanches, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Passacrassana, Trionfo di Vienna, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Giardina, Kaiser, Mora, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, William, William precoce, Butirra estiva. Sulle nuove varietà e sulle varietà locali di melo e di pero, prima dell'applicazione a pieno campo, saggiare la selettività del formulato su alcune piante.

Nocività a seguito di trattamento: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

5043

CLASSE I

DISTOR E.C.

VELENO

INSETTICIDA LIQUIDO a base di Memotil per combattere Lepidotteri, Coleotteri ed Afidi nei frutteti, vigneti, colture orticole, colture industriali ed ornamentali in pieno campo.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metomil puro gr. 18,4.
Solventi quanto basta a 100 grammi.
Contiene «ETILGLICOLE e CICLOESANONE».

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del 3 agosto 1968, n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Evitare di respirarne i vapori. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva). — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: Miosi, sudorazione profusa, debolezza, polso lento, nausea e vomito, tremori muscolari, visione confusa, crampi addominali, diarrea.
Consigli terapeutici - Trattamento: nel caso di inalazione, trasportare il paziente in ambiente non contaminato; nel caso di contatto togliere gli abiti contaminati e lavare prontamente la pelle e gli occhi contaminati con acqua abbondante; in caso di ingestione, lavanda gastrica. All'apparizione di segni locali o sistemici o di sintomi di avvelenamento colinesterasico somministrare atropina: **intossicazione leggera** 1,2 - 2 mg per via intramuscolare o intravenosa, ripetendo il trattamento ad intervalli di 10 - 30 minuti, fino a comparsa di fenomeni di atropinizzazione; **intossicazione severa** 2-4 mg. per via intravenosa, ripetendo la somministrazione di 2 mg. ogni 3 - 10 minuti, fino a scomparsa dei segni e dei sintomi.
Non somministrare 2-PAM: controindicati anche la morfina e gli altri depressori della respirazione.
Se necessario rimuovere le eccessive secrezioni e mantenere aperte le vie respiratorie. In caso di severa intossicazione praticare la respirazione artificiale o ossigenoterapia. Per alleviare le convulsioni, nel caso che interferiscano con la respirazione e non siano alleviate dall'atropina, somministrare Trimethadion (Tridion), 1 gr. intravena ogni 15 minuti fino ad un massimo di 5 gr., o sodio Thiopental (soluzione 2,5%) intravena.
Pronto soccorso: Se ingerito provocare il vomito con acqua salata calda (un cucchiaio da tavola di sale in un bicchiere d'acqua), ripetendo fino a che il vomito non sia chiaro; se inalato allontanare dall'ambiente contaminato, far coricare e riposare calmo; in caso di contatto togliere gli abiti contaminati e lavare la pelle e gli occhi contaminati con abbondante quantità d'acqua; se il paziente mostra difficoltà respiratoria praticare immediatamente la respirazione artificiale; somministrare due tavolette di Atropina da 0,6 mg per via orale o facendole sciogliere sotto la lingua, se sono disponibili. In seguito, ogni 10 - 15 minuti, somministrare una tavoletta di Atropina fino a che la gola e la pelle siano asciutte. Se necessario somministrare altre tavolette per mantenere asciutta la gola e la pelle.

CARATTERISTICHE
Il DISTOR E.C. è un insetticida liquido che agisce per contatto e grazie alla sua azione translaminare è in grado di combattere anche quei parassiti di difficile controllo come gli afidi resistenti. L'efficacia migliore si ottiene comunque intervenendo con tempestività e colpendo gli insetti nei loro primi stadi di sviluppo. Fra i parassiti sensibili al prodotto ricordiamo: Minatori, Afidi, Verme e Ricamatrici della frutta, Tignola, Anarsia, Cocciniglie, Cavolaia, Nottue, Aleurodidi, Tripodi, Cleono, Altica.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Dosi per 100 lt. d'acqua:
Melo e pero: 200-250 cc. contro Ricamatrici (Capua, Cacoecia), Verme delle mele e delle pere (Carpocapsa) e Afidi intervenendo alla prima comparsa dei parassiti. Contro Litocollete intervenire contro le larve di primo stadio: contro Cemiostoma intervenire sulle mine con diametro inferiore a 4 - 5 mm. **Vite:** 200-250 cc. contro Tignole (Clysia ambiguella e Lobesia botrana). Intervenendo alla schiusura delle uova e bagnando bene tutta la vegetazione basta in genere un trattamento per controllare efficacemente l'insetto. **Pesco:** 200-250 cc. contro Afidi, Anarsia lineatella, Cydia molesta. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione curando particolarmente di bagnare tutta la vegetazione ed in caso di reinfestazione ripetere l'intervento. **Agrumi ed olivo:** 200-250 cc. contro Cocciniglie (Pseudococcus citri e Saissetia oleae) effettuare il trattamento in presenza del massimo numero delle neanidi; contro Tignola (Prays oleaellus) basta un trattamento in tempo debito per eliminare il parassita. **Barbabietola da zucchero:** 200-250 cc. contro Afidi, Altica, Cleono eseguire il trattamento alla prima comparsa degli insetti e ripeterlo eventualmente a distanza di 10 - 15 giorni. **Ortaggi:** (Pomodori, peperoni, melanzane, cucurbitacee, cavolo, lattuga, fagiolo e pisello) 200-250 cc. contro Afidi, Nottue, Cavolaie eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo in caso di reinfestazione. È consigliabile l'aggiunta di Bagnante Amonn. **Garofano** (solo in pieno campo): 200-250 cc. contro Afidi e Bega (Tortrix pronubana) iniziare i trattamenti all'inizio dell'infestazione e ripeterli in caso di reinfestazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITÀ
Il DISTOR E.C. è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il DISTOR E.C. è tossico per i pesci, le api, gli animali domestici ed il bestiame. Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2
OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N. 5043 del 27.11.82 del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto lt. 0,5-1-5

5048

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei (per es. interrando in fosse profonde un metro e cospargendo con calce) le confezioni che contenevano il prodotto
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bracardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti e 0,2 - 1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24 - 48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Insetticida Polivalente

Composizione: g. 100 di prodotto contengono:

— clorfenvinphos puro	g. 9
— Coadiuvanti ed inerti	q.b. a g. 100

ATTENZIONE!

Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I

VELENO

FITOCHIMICA GIULIANA

di DARIO MULITSCH
Corso Verdi, 69
34170 GORIZIA

Prodotto nello stabilimento CHEMIA spa di S. Agostino (Fe) - S. S. 255 - Km. 46

Registrazione Ministero Sanità n. 5048 del 27-11-82

Peso Kg. 25

MODALITA' D'IMPIEGO

Il BIP P è indicato contro gli insetti del terreno. Il prodotto va impiegato prima della semina e del trapianto distribuendolo con gli opportuni mezzi meccanici ed interrandolo mediante lavorazioni di erpicatura fresatura, zappatura. Si impiega sulle seguenti colture:

— **patata:** contro le larve di nottuidi e contro la dorifora in presemina o prima della rincalzatura;

— **mais:** contro la piralide e le larve di nottuidi in genere;

— **sedano, carota, cavolo:** contro la mosca, i coleotteri e i lepidotteri nottuidi.

Dose d'impiego: Colture traplantate: Kg. 20-25 per Ha. Immediatamente prima o subito dopo il trapianto trattando sulle file della coltura per una larghezza di circa 15 cm. Sulle colture seminate: Kg. 20-25 per Ha. distribuito su tutta la superficie prima della semina ed interrato con una leggera lavorazione.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con la maggior aprte dei fitofarmaci eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: è tossico per i pesci, gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 30 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

5053

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

In locali chiusi data la sua volatilità, è consigliabile indossare una maschera antipolvere.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

ICI Solplant SpA

Insetticida-acaricida liquido specifico per il trattamento dei cereali immagazzinati

COMPOSIZIONE

Pirimifos-metil puro		g 5
Coadiuvanti, solventi	q.b. a	g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

'ACTELLIC' 5 agisce per contatto e asfissia in mo do rapido e duraturo contro gli insetti adulti e allc stadio di larva e gli acari nocivi ai cereali immagazzinati.
Combatte: **calandre** o punteruoli, **tribolio, silvano, trogoderma,** ed altri coleotteri, **vera tignola** de grano, **tignola grigia** delle provviste alimentari, ec in genere gli **insetti** che frequentano i magazzini e i depositi, e l'acaro della farina.
La sua efficacia non è modificata dal calore c dall'umidità dei cereali.
'ACTELLIC' 5 non altera il potere germinativo de semi di cereali e non modifica le caratteristiche panificatorie delle farine ricavate da cariossid trattate.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose: 8-16 ml/q.le di cereali

- Il prodotto va applicato tale e quale, con ido neo apparecchio distributore, all'atto dell'im magazzinamento, su cereali già sottoposti alla consueta pulitura.
- Prima di introdurre i cereali è sempre consi gliabile procedere ad una pulizia a fondo degl ambienti, bruciando le immondizie ed effet tuando un trattamento preventivo alle paret ed ai soffitti con 'ACTELLIC' in formulazione emulsionabile.
- I cereali destinati all'alimentazione umana e del bestiame devono essere sottoposti ad adeguato processo di pulitura prima della molitura

COMPATIBILITÀ

Dato il particolare metodo di applicazione, il prodotto si usa tale e quale.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci. È nocivo per il bestiame.

- Attenzione ad impiegare esclusivamente per gli usi indicati in etichetta; ogni altro uso è pericoloso.
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione
SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 5053 del 27-11-1982
ACTELLIC - Marchio registrato Imperial Chemical Industries PLC

DA NON VENDERSI SFUSO

lt 5

5055

DISTOR W.P.

CLASSE I^a

VELENO

POLVERE BAGNABILE: Insetticida a base di Metomil per combattere Lepidotteri, Coleotteri ed Afidi nei frutteti, vigneti, colture ornamentali ed industriali, colture orticole.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metomil puro gr. 23.
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

ATTENZIONE! **Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del 3 agosto 1968, n. 1255.**

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Evitare di respirarne i vapori. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva). — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: Miosi, sudorazione profusa, debolezza, polso lento, nausea e vomito, tremori muscolari, visione confusa, crampi addominali, diarrea.
Consigli terapeutici - Trattamento: nel caso di inalazione, trasportare il paziente in ambiente non contaminato; nel caso di contatto togliere gli abiti contaminati e lavare prontamente la pelle e gli occhi contaminati con acqua abbondante; in caso di ingestione, lavanda gastrica. All'apparizione di segni locali o sistemici o di sintomi di avvelenamento colinesterasico somministrare atropina: **Intossicazione leggera** 1,2 - 2 mg. per via intramuscolare o intravenosa, ripetendo il trattamento ad intervalli di 10 - 30 minuti, fino a comparsa di fenomeni di atropinizzazione; **Intossicazione severa** 2-4 mg. per via intravenosa, ripetendo la somministrazione di 2 mg. ogni 3 - 10 minuti, fino a scomparsa dei segni e dei sintomi.
Non somministrare 2-PAM: controindicati anche la morfina e gli altri depressori della respirazione.
Se necessario rimuovere le eccessive secrezioni e mantenere aperte le vie respiratorie. In caso di severa intossicazione praticare la respirazione artificiale o ossigenoterapia. Per alleviare le convulsioni, nel caso che interferiscano con la respirazione e non siano alleviate dall'atropina, somministrare Trimethadion (Tridion), 1 gr. intravena ogni 15 minuti fino ad un massimo di 5 gr., o sodio Thiopental (soluzione 2,5%) intravena.
Pronto soccorso: Se ingerito provocare il vomito con acqua salata calda (un cucchiaio da tavola di sale in un bicchiere d'acqua), ripetendo fino a che il vomito non sia chiaro; se inalato allontanare dall'ambiente contaminato, far coricare e riposare calmo; in caso di contatto togliere gli abiti contaminati e lavare la pelle e gli occhi contaminati con abbondante quantità d'acqua; se il paziente mostra difficoltà respiratoria praticare immediatamente la respirazione artificiale; somministrare due tavolette di Atropina da 0,6 mg. per via orale o facendole scivolare sotto la lingua, se sono disponibili. In seguito, ogni 10 - 15 minuti, somministrare una tavoletta di Atropina fino a che la gola e la pelle siano asciutte. Se necessario somministrare altre tavolette per mantenere asciutta la gola e la pelle.

CARATTERISTICHE
Il DISTOR W.P. è un insetticida che agisce per contatto e grazie alla sua azione translaminare è in grado di combattere anche quei parassiti di difficile controllo come gli afidi resistenti. L'efficacia migliore si ottiene comunque intervenendo con tempestività e colpendo gli insetti nei loro primi stadi di sviluppo. Fra i parassiti sensibili al prodotto ricordiamo: Minatori, Afidi, Verme e Ricamatrici della frutta, Tignola, Anarsia, Cocciniglie, Cavolaia, Nottue, Aleurodidi, Tripidi, Cleono, Altica.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Dosi per 100 lt. d'acqua:
Melo e pero: 200 gr. contro Ricamatrici (Capua, Cacoecia), Verme delle mele e delle pere (Carpocapsa) e Afidi intervenendo alla prima comparsa dei parassiti. Contro Litocollete intervenire contro le larve di primo stadio; contro Cemiostoma intervenire sulle mine con diametro inferiore a 4 - 5 mm. **Vite:** 200 gr. contro Tignole (Clysia ambiguella e Lobesia botrana). Intervenendo alla schiusura delle uova e bagnando bene tutta la vegetazione, basta in genere un trattamento per controllare efficacemente l'insetto. **Pesco:** 200 gr. contro Afidi, Anarsia lineatella, Cydia molesta. Eseguire un trattamento all'inizio dell'infestazione curando particolarmente di bagnare tutta la vegetazione ed in caso di reinfestazione ripetere l'intervento. **Agrumi ed olivo:** 200 gr. contro Cocciniglie (Pseudococcus citri e Saissetia oleae) effettuare il trattamento in presenza del massimo numero delle neanidi; contro Tignola (Prays oleaellus) basta un trattamento in tempo debito per eliminare il parassita. **Barbabietola da zucchero:** 200 gr. contro Afidi, Altica, Cleono eseguire il trattamento alla prima comparsa degli insetti e ripeterlo eventualmente a distanza di 10 - 15 giorni. **Ortaggi:** (Pomodori, melanzane, cucurbitacee, cavolo, lattuga, peperoni, fagiolo, pisello) 200 gr. contro Afidi, Nottue, Cavolaie, eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo in caso di reinfestazione. È consigliabile l'aggiunta di Bagnante Amonn. Garofano (solo in pieno campo): 200 - 250 gr. contro Afidi e Bega (Tortrix pronubana) iniziare i trattamenti all'inizio dell'infestazione e ripeterli in caso di reinfestazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITÀ
Il DISTOR W.P. è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il DISTOR W.P. è tossico per i pesci, le api, gli animali domestici ed il bestiame. Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2
OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N. 5055 del 27.11.82 del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto Kg. 5 - 1

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

5067

CALIBOR

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

ERBICIDA FLOWABLE specifico per il diserbo dei cereali invernali ed in particolare del frumento.

COMPOSIZIONE

100 gr. di prodotto contengono:
43,65 gr. di clortoluron p.a. puro.
Solventi, disperdenti, bagnanti e coadiuvanti quanto basta a 100 gr.
Contiene: GLICOL ETILENICO

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. – Conservare la confezione ben chiusa. – Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. – Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il CALIBOR agisce sia come erbicida ad azione residua nel terreno, sia come erbicida fogliare di contatto; controlla le infestanti graminacee da seme quali Alopecurus, Apera, Avena, Lolium, Poa, e le malerbe annuali a foglia larga quali Capsella, Centaurea, Cerastium Geranium, Chenopodium, Galeopsis, Lamium, Matricaria, Mercurialis, Poligonum, Raphanus, Sinapis, Stellaria.
Il CALIBOR agisce contro le graminacee infestanti se applicato, sia in pre-emergenza che fino allo stadio della quinta foglia. Il migliore controllo delle infestanti a foglia larga si ottiene se il prodotto viene applicato prima della loro emergenza o al più tardi nello stadio compreso tra la seconda e la quarta foglia.
Il CALIBOR è altresì indicato nelle applicazioni di pre-emergenza per il diserbo chimico selettivo del frumento primaverile.
Usare con precauzione su grano duro. Varietà sensibili Demar 4 e Kid.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Frumento ed altri cereali invernali

pre-emergenza: 4,3 - 5,4 Kg/ha, secondo la natura del terreno, in 600-1000 litri di acqua.
Il trattamento si effettua subito dopo la semina o nei primi giorni successivi e comunque ancora prima che inizi l'emergenza della coltura.
Il terreno deve essere ben lavorato, sminuzzato e soprattutto accuratamente livellato per evitare ristagni di acqua.
post-emergenza: Kg 3,5 - 4,5 per ettaro in 600 - 1000 litri di acqua.
Il trattamento si effettua alla fine dell'inverno, normalmente nei mesi di febbraio-marzo, quando sia la coltura che le infestanti riprendono lo sviluppo vegetativo.
Frumento primaverile:
pre-emergenza: 3,5 - 4,5 kg/ha, secondo la natura del terreno in 600 - 1000 litri di acqua.
Il trattamento si effettua solo subito dopo la semina.

Avvertenze
Evitare superdosaggi ed accumuli della miscela erbicida.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

FITOTOSSICITÀ

Il trattamento non è consigliabile nei terreni molto sabbiosi, ghiaiosi ed in quelli facilmente soggetti a ristagni di acqua nel periodo invernale. Dopo l'applicazione del prodotto possono manifestarsi fenomeni di sofferenza della coltura, si tratta però di fenomeni transitori che in condizioni normali scompaiono in breve tempo e non hanno alcuna conseguenza sulla produzione.
Evitare l'uso di questo prodotto sulle varietà di grano Demar 4 e Kid.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE

CHEMIA S.p.A. - Stabilimento di S. Agostino (FE)
Strada Statale 255 - km 46

Registrazione N. 5067 del 27.11.82 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto kg 1-5-10

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

5072

GRILLOSTOP

ESCA INSETTICIDA PRONTA ALL'USO

Composizione per g. 100.
FENITROTHION puro .... g. 5
Coformulanti q.b. a .... g. 100

CLASSE III - ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio. Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare di respirare i vapori.

Informazioni per il medico. Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezione endovenosa di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2 - 1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche. È un'esca insetticida granulare che agisce per contatto e per ingestione contro una vasta gamma di insetti terricoli quali: larve di lepidotteri, larve di ditteri, elateridi, grillo nero, maggiolino, bibione, tipule, agrotidi, grillotalpa, nottue che danneggiano le colture floricole intensive a pieno campo o in serra.

Dosi e modalità di impiego. Si impiega alla dose di 40-60 g ogni 10m² (40-60 kg/ha) spargendo i granuli uniformemente sul terreno.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità. Il prodotto va usato da solo.

Rischio di nocività. Il prodotto è tossico per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci e gli insetti utili. È necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattmento prima di far pascolare bestiame sulle zone trattate ed alimentarlo con vegetali che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.

ATTENZIONE. Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Non impiegare su colture destinate ad alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO Peso g. 1000
REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ N. 5072 del 29-11-1982

Officina di produzione: IRCA S.p.A. - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

5073

GRILLKILLER

ESCA INSETTICIDA PRONTA ALL'USO

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
— FENITROTHION puro . . . . g 5
— Coformulanti q.b. a . . . . g 100

Classe III ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone. Evitare di respirare i vapori.
Informazioni per il medico: Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.
Caratteristiche: È un'esca insetticida granulare che agisce per contatto e per ingestione contro una vasta gamma di insetti terricoli quali: larve di lepidotteri, larve di ditteri, elateridi, grillo nero, maggiolino, bibione, tipule, agrotidi, grillotalpa, nottue che danneggiano le colture floricole intensive in pieno campo o in serra.
Dosi e modalità di impiego: Si impiega alla dose di 40-60 g ogni 10 m² (40-60 kg/ha) spargendo i granuli uniformemente sul terreno.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

Compatibilità: il prodotto va usato da solo.
Rischio di nocività: Il prodotto è tossico per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci e gli insetti utili. È necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate ed alimentarlo con vegetali che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Non impiegare su colture destinate ad alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione Ministero della Sanità N. 5073 del 29-11-1982

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO G ?**

B I M E X S. p. A.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) - Via Cogolla, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.81.69 - 55.81.99

Prodotto da « DIACHEM S.p.A. » - Bergamo
Stabilimento di Albano S. A.

5102

POLVERE BAGNABILE

CLASSE IV

COMPOSIZIONE

Zolfo bagnabile puro (esente da Selenio)	gr. 90
Coformulanti q. b. a . . .	gr. 100

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

INDICAZIONI: contro il mal bianco della rosa, dell'ortensia, del crisantemo e delle colture floreali in genere: 120-180 gr. per 100 lt. d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Lo ZOLFO AZF è miscelabile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra, ad eccezione dei prodotti a base di oli minerali. Nel caso si dovesse effettuare un trattamento con questi prodotti, bisogna impiegare lo ZOLFO AZF con un intervallo di almeno 3 settimane.

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
Da usarsi esclusivamente in colture floreali intensive su pieno campo o serra.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

AGROZOOFARMA s.r.l. - MORTEGLIANO (UD)

Officina di produzione: AGROZOOFARMA - Mortegliano

Reg. Min. San. n. 5102 del 29 - 11 - 1982

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg 5

5130

NICHESAN

II CLASSE

INSETTICIDA LIQUIDO per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore o masticatore.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
50 gr. Fenthion puro.
Tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi.
•CONTIENE XILOLO•

NATURA DEL RISCHIO
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Evitare di respirarne i vapori. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — Rendere innocue e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva). — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

— SINTOMI DI INTOSSICAZIONE
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

— CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita o ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

— CONTROINDICAZIONI
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

MODALITÀ D'IMPIEGO E COLTURE
Dosi per 100 litri d'acqua:

Frutticoltura: pesco: contro la mosca della frutta, afidi, tripidi e tentredini cc. 100, contro la cydia del pesco cc. 150-200; ciliegio: contro la mosca delle ciliege cc. 50, contro la mosca della frutta cc. 100; **agrumi:** contro la mosca della frutta, tignola ed afidi cc. 100;

Olivo: contro tignola cc. 50; contro mosca dell'olivo e della frutta cc. 100;

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITÀ
Il NICHESAN® è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2
OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N.5130 del 22.12.82 del Ministero della Sanità
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto cc. 500 et 1

5135

CALIBOR WP

CLASSE IV

ERBICIDA SPECIFICO - per il diserbo dei cereali invernali ed in particolare del frumento.

COMPOSIZIONE

100 gr. di prodotto contengono:
77,6 gr. di clortoluron puro
Bagnanti, disperdenti ed inerti q.b. a 100 gr.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il CALIBOR WP agisce sia come erbicida ad azione residua nel terreno, sia come erbicida fogliare di contatto; controlla le infestanti graminacee da seme quali Alopecurus, Avena, Lolium, Poa e le malerbe annuali a foglia larga quali Capsella, Centaurea, Cerastium, Geranium, Chenopodium, Galeopsis, Lamium, Matricaria, Mercurialis, Poligonum, Raphanus, Sinapis, Stellaria.
Il CALIBOR WP agisce contro le graminacee infestanti se applicato, sia in pre-emergenza che fino allo stadio della quinta foglia. Il migliore controllo delle infestanti a foglia larga si ottiene se il prodotto viene applicato prima della loro emergenza o al più tardi nello stadio compreso tra la seconda e la quarta foglia. Il CALIBOR WP è altresì indicato nelle applicazioni di pre-emergenza per il diserbo chimico selettivo del frumento primaverile.

MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento ed altri cereali invernali:
Pre-emergenza: 2,5-3 kg./ha, secondo la natura del terreno, in 600-1.000 litri d'acqua. Il trattamento si effettua subito dopo la semina o nei primi giorni successivi e comunque ancor prima che inizi l'emergenza della coltura. Il terreno deve essere ben lavorato, sminuzzato e soprattutto accuratamente livellato per evitare ristagni d'acqua.
Post-emergenza: kg. 2-2,5/ha in 600-1.000 litri d'acqua. Il trattamento si effettua alla fine dell'inverno, normalmente nei mesi di febbraio-marzo, quando sia la coltura che le infestanti riprendono lo sviluppo vegetativo.
Frumento primaverile:
Pre-emergenza: 2-2,5 kg/ha, secondo la natura del terreno in 600-1.000 litri d'acqua. Il trattamento si effettua subito dopo la semina.
Avvertenza: evitare superdosaggi ed accumuli della miscela.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il trattamento non è consigliabile nei terreni sabbiosi, ghiaiosi ed in quelli facilmente soggetti a ristagni d'acqua nel periodo invernale. Dopo l'applicazione del prodotto possono manifestarsi fenomeni di sofferenza della coltura, si tratta però di fenomeni transitori, che in condizioni normali scompaiono in breve tempo e non hanno alcuna conseguenza sulla produzione. Comunque non usare questo prodotto sulle varietà di grano Demar 4 e Kid.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione n. 5135 del 22.12.82 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto kg. 1-5-10

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

5136

. CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE
CON PRUDENZA

POLVERE SOLUBILE - Insetticida - aficida per la lotta contro alcuni insetti.

COMPOSIZIONE

100 gr. di prodotto contengono:
Acefate puro gr. 42,5
Coadiuvanti ed inerti q.b. a 100 gr.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua — Non operare contro vento — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo. Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio. Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

CARATTERISTICHE

Il POMONET è un insetticida-aficida fosforganico. Agisce per contatto ed ha azione sistemica locale. L'effetto è molto rapido verso gli afidi, mentre verso alcuni insetti (larve di ricamatrici protette dalle foglie) mostra la sua efficacia appena dopo qualche giorno.

MODALITA' DI IMPIEGO

Dosi per 100 litri di acqua:
Pomacee: contro Afidi e Orgya antiqua gr.80-120; contro Carpocapsa e Ricamatrici (Cacoecia, Capua, Eulia, Pandemis) gr.120-150. Drupacee: contro Afidi e Orgya antiqua gr.80-120; contro Anarsia e Ricamatrici gr.120-150. Vite: contro Tignole e Cicaline gr.80-120; contro Nottue gr.120-150. Agrumi: contro Afidi gr.80-120; contro Cocciniglie gr.100-150. Olivo: contro Cocciniglie gr.100-150. Fragola: contro Afidi gr.80-120; contro Tortricidi gr.120-150. Patate: contro Afidi gr.80-120 (oppure kg.0,8-1,2/ha). Garofano: in pieno campo contro la Bega verde gr.120-150.
Dosi per ettaro:
Tabacco: contro l'Afide verde kg.0,8-1,2/ha. Barbabietola da zucchero: contro la Mosca kg.0,8-1,2/ha; contro la Mamestra kg.1,2-1,5/ha. Mais: contro la Piralide kg.1,5-2/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume, mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il POMONET è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo; devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora di verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Su colture fruttifere evitare di eseguire trattamenti ravvicinati a più di 15 giorni.

RISCHI DI NOCIVITA'

Non impiegare in fioritura, perchè è tossico per gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto, per le pomacee ed olivo sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

AMONN FITOCHIMICA SPA - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE

AMONN FITOCHIMICA SPA - Bolzano, Via Siemens 12

Registrazione N.5136 del 22.12.82 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto kg.10 - 1 - 5

5176

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SPASOR*

(LIQUIDO)

DISERBANTE PER VIGNETI, AGRUMETI, STOPPIE DI CEREALI ED INCOLTI (RIPE, SCOLINE, STRADE, SEDI FERROVIARIE, DEPOSITI ED IMPIANTI INDUSTRIALI) EFFICACE SU MALERBE ANNUALI E PERENNANTI

Registrazione Ministero Sanità n° 5176 del 1-2-83

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Glyphosate puro	gr. 41
— Coformulanti	q.b. a gr. 100

* Marchio MONSANTO.

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un diserbante di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni o dicotiledoni, annuali e perenni (Gramigna, Sorghetto, Cipero, Vilucchio). Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono pure devitalizzati.
Lo SPASOR è rapidamente disattivato a contatto con il terreno: quindi, la presenza del prodotto nel terreno non causa alcun danno alle colture perenni come viti e agrumi.
Non possedendo il prodotto efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo, è necessario prima o dopo il trattamento con lo SPASOR, intervenire con un erbicida ad azione persistente sul terreno (es. Simazina, Diuron) per evitare la nascita delle infestanti provenienti da semi che possono germinare dopo l'applicazione dello SPASOR.
L'effetto visivo dell'azione dello SPASOR consiste in un ingiallimento ed in un appassimento graduali che si risolvono nella morte dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale. La durata di questo processo è correlata alle condizioni ambientali e logicamente è caratterizzata da una certa lentezza dovuta all'azione svolta in profondità dall'erbicida.
Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, distribuendo circa 300-500 litri di poltiglia per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare inutili perdite per gocciolamento.
Diserbo selettivo della vite e degli agrumi: i trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su fasce lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma.
Le dosi di impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione delle specie delle infestanti presenti:
- **3-5 l/ha**: contro la maggior parte delle erbe annuali.
- **4-5,5 l/ha**: contro Sorghum halepense, Agropyrum repens, Ranunculus spp.
- **5,5-7 l/ha**: contro Cyperus rotundus, Cirsium arvense (in fioritura), Artemisia vulgaris, Potentilla spp., Plantago spp., Taraxacum officinale, Rumex spp. e Felci.

Contro il Cyperus rotundus per ottenere un risultato più duraturo si può effettuare un primo trattamento alla dose di 5,5 l/ha ripetendo l'intervento sui ricacci alla dose di 4 l/ha.
- **8-10 l/ha**: contro Convolvulus arvensis ben sviluppato (inizio fioritura), Cynodon dactylon, Urtica spp., Daucus carota, Sonchus arvensis, Tussilago farfara, Cannucce (alte 50-80 cm).
- **10-12 l/ha**: contro Convolvolus arvensis all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm).

NOTE IMPORTANTI
Impiegare pompe a bassa pressione (massimo 3 atmosfere) e barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di dimensioni grosse. Evitare durante i trattamenti formazione di deriva e di goccioline polverizzate, che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco, specialmente se non bene lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni o schermi, che evitino alla poltiglia erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante, specialmente se si irrorano viti o fruttiferi con forme di allevamento basse. Il trattamento con erbicida residuale integrativo contro erbe provenienti da seme va eseguito:
- **nei vigneti**: in autunno o in primavera;
- **negli agrumeti**: in inverno o prima dell'irrigazione estiva, su terreno privo di infestanti o lavorato.

Si possono impiegare Simazina, Diuron alle dosi prescritte.
Non impiegare il prodotto in miscela con l'erbicida residuale.
Diserbo delle stoppie di cereali.
Impiegare il prodotto su infestanti in vegetazione, sia dopo una coltura (in estate o in autunno), sia prima della coltura (in primavera): in questo secondo caso la lavorazione del terreno e la semina può essere effettuata 2-3 settimane dopo il trattamento. Su Sorghetta alta 30-40 cm. usare una dose di 5,5 l/ha mentre se l'infestante è all'inizio della fioritura usare 4 l/ha di SPASOR.
Diserbo totale degli incolti (ripe, scoline, strade, sedi ferroviarie, depositi ed impianti industriali): le dosi e le modalità di impiego sono quelle precedentemente indicate per ogni specie di erba infestante. Per ottenere anche un duraturo controllo delle infestanti provenienti da seme è necessario far seguire in autunno-inverno o su terreno privo di infestanti, l'uso di un diserbante residuale (es. Simazina, Diuron). Nel caso la vegetazione da distruggere fosse molto alta e densa, usare sino a 1000 l/ha di acqua, evitando sempre la deriva e che l'irrorato giunga su colture vicine.
Avvertenze: le piogge, che cadono entro 6 ore dall'applicazione, ne riducono l'efficacia. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria, facilitando la crescita delle infestanti, favoriscono l'esito del diserbo; le temperature basse o il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto, purché le infestanti siano verdi, vitali e non essiccate. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento: alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura od in uno stadio più avanzato. Arature, fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento riducono l'efficacia del diserbo.
Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2-3 settimane, prima di procedere a lavorazione del terreno.
Fra trattamenti con erbicidi residuali ed applicazioni del prodotto lasciar intercorrere almeno 1-2 settimane.
Preparazione della miscela: agitare la confezione prima dell'uso. Diluire in poca acqua a parte la dose prestabilita di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente.
Da non applicare con mezzi aerei.
Compatibilità: il prodotto si usa da solo.
Fitotossicità: evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare, rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto di tutte le colture agricole. Irrorare il prodotto con pompe a bassa pressione (massimo 3 atmosfere), evitare formazione di deriva e, se si irrorano vigneti allevati bassi, usare ugelli schermati da coni od apparati protettivi. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe ed i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.
Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acqua destinata all'irrigazione.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.

Contenuto Lt. 0,200

prodotto nello stabilimento di

SILIA S.p.A. - Via di Tor Sapienza 172 - ROMA

5184

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

POLVERE BAGNABILE diserbante selettivo per frumento, mais, erba medica, pisello, girasole e aglio.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
70 gr. di Methabenzthiazuron puro
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Frumento: 2-3 Kg/ha di prodotto sciolti in 500-800 litri d'acqua a seconda del tipo di pompa, eseguendo il trattamento subito dopo la semina; tale trattamento è particolarmente efficace contro le infestanti graminacee quali: Alopecurus, Apera spica-venti, Poa; contro Camomilla, Stellaria, Veronica, Sinapis, Raphanus, Canapa selvatica ed altre infestanti a foglia larga.
1,5-2 Kg/ha sciolti in 600-800 litri d'acqua a seconda del tipo di pompa, eseguendo il trattamento a fine inverno, tale trattamento consente di ottenere solo risultati parziali contro le infestanti graminacee.

Mais: 3-4 Kg/ha sciolti in 500 litri d'acqua, trattando in pre-emergenza della coltura; si ottiene un buon controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni da seme.
Seminare alla profondità di 5 cm e ricoprire bene il seme.

Erba medica: 2-3 Kg/ha in autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando la coltura è in riposo vegetativo a seguito dei primi freddi.

Pisello e girasole: applicare 2-3 Kg/ha di prodotto in 500-600 litri d'acqua in pre-emergenza della coltura.
Seminare alla profondità di 5 cm e limitare i dosaggi nei terreni sciolti.

Aglio: 2-3 Kg/ha sciolti in 500-600 litri d'acqua, intervenendo in autunno in pre-emergenza della coltura o a fine inverno.

Avvertenza: il diserbo con ERBIL® non deve essere effettuato in terreni torbosi; impiegare la dose minima in terreni leggeri. Se in estate dopo la coltura diserbata viene effettuata una seconda coltura (fagioli, zucchini, ecc.) è necessario eseguire un'aratura prima della semina o del trapianto.
Si sono dimostrate resistenti all'ERBIL® le seguenti infestanti: Veccia, Avena selvatica, Polygonum conv., Galium a., Cirsio, Artemisia, Romice, Convolvolo, Tarassaco.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto può essere impiegato nel trattamento di fine inverno in miscela con alcuni diserbanti ormonici (Agherud dicamba, Combamon) per allargare lo spettro d'azione.
Per il diserbo del mais è possibile la miscela con Turcan.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.
Attenzione - da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

Registrazione n. 5184 del 1.2.83 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto Kg. 1-5-10

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

5198

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

AVVERTENZA

FOLTAPET L 27-7 può essere irritante per la pelle, per le mucose e per gli occhi. In soggetti particolarmente sensibili, si possono verificare manifestazioni anche vistose, ma transitorie e non preoccupanti dato che presenta un rischio trascurabile per l'uomo.
Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione. Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastroesofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili e per i pesci.
Su uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti. Su uve da tavola e sulle altre colture sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

'FOLTAPET' L 27-7

Fungicida liquido a base di Folpet e Captafol per trattamenti in: VITICOLTURA - FRUTTICOLTURA ORTICOLTURA - FLORICOLTURA

COMPOSIZIONE

Folpet puro		g 26,7
Captafol puro		g 6,7
Coadiuvanti, inerti	q.b. a	g 100

CLASSE IV

p. p. ICI SOLPLANT s.p.a.

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione:
CHEVRON CHEMICAL COMPANY - Port. de Bouc (Francia)
Registrazione Ministero della Sanità n. 5198 del 1-2-1983
'FOLTAPET' - Marchio registrato Chevron Chemical Company

'FOLTAPET' L 27-7 è un'associazione di due fungicidi organici, il Folpet ed il Captafol. Ciò lo rende indicato per una lotta efficace contro le più comuni malattie fungine delle colture erbacee ed arboree.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite a 100 l di acqua)

Orticoltura: ml 300 contro Peronospora e Alternariosi del pomodoro, Peronospora e Antracnosi della lattuga, cetriolo e melone; ml 400 contro Peronospora e Alternariosi della patata, Botrytis della melanzana, Peronospora della cipolla.

Viticoltura: ml 300-400 contro Peronospora e Botrytis (muffa grigia). Per i trattamenti antiperonosporici si raccomanda di seguire il "calendario d'incubazione" proprio della zona.
Per i trattamenti anti-botritici si raccomandano interventi continui, in condizioni favorevoli di sviluppo della malattia.

Piante ornamentali in pieno campo: ml 500 contro Antracnosi, Alternariosi, Botrytis; ml 300 contro Fusariosi del garofano.

Frutticoltura:

Pomacee: ml 200-300 contro ticchiolatura (solo trattamenti prefiorali). È fitotossico per le seguenti cultivar: Pere (Butirra d'Anjou) - Mele (Red delicious, Winesap) - ml 300 contro marciumi di magazzino (Gleosporium)

Albicocco: ml 300 contro sclerotinia.

Nespolo: ml 300 contro ticchiolatura.

Pesco: ml 600 contro bolla, corineo, cancro dei rametti e monilia (trattamenti al bruno).

Olivicoltura: ml 400 contro occhio di pavone e antracnosi.

COMPATIBILITÀ

È miscibile con la maggior parte degli antiparassitari di uso comune. Non è miscibile con Poltiglia bordolese. Può essere applicato solo 20 giorni dopo un trattamento a base di olii minerali o polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Alcune cultivar di vite, tipo Schiava, risultano particolarmente sensibili. Per ridurre eventuali fenomeni fitotossici si suggerisce:
— non superare lt 4 di Foltapet L 27-7 per ettaro
— trattare nelle ore meno calde della giornata
— usare pompe che distribuiscano uniformemente il prodotto, senza sgocciolamento.

DA NON VENDERSI SFUSO

lt 20

5213

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE
CON PRUDENZA

POLVERE BAGNABILE per il diserbo selettivo in pre-emergenza del frumento

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
20 g di pendimetalin puro
33 g di neburon puro
coformulanti (bagnanti, disperdenti ed inerti) quanto basta a 100 grammi.

NATURA DEL RISCHIO
Prodotto pericoloso per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
– Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. – Conservare la confezione ben chiusa. – Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. – Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. – Non operare contro vento. – Evitare di respirare i vapori. – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E GAMMA D'AZIONE
Il VALEX è un diserbante specifico per il diserbo selettivo pre-emergenza del frumento mediante distribuzione sul terreno ove svolge la sua azione tossica verso i germinelli e le plantule delle più importanti infestanti annuali e cioè:

– graminacee:
Alopecurus, Apera, Bromus, Lolium, Phalaris, Poa.

– dicotiledoni:
Anagallis, Anthemis, Capsella, Cerastium, Fumaria, Galium, Lamium, Matricaria, Myosotis, Papaver, Polygonum, Ranunculus, Raphanus, Sinapis, Stellaria, Thlaspi, Veronica, Vicia, Viola.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Dopo la semina del frumento e prima dell'emergenza sia della coltura che delle infestanti distribuire il VALEX sul terreno alla dose di 5 Kg/ha diluiti in 4-6 hl di acqua, avendo cura di operare su terreno umido, ben lavorato e privo di zollosità. Su terreni pesanti ed argillosi ed in presenza di forti infestazioni di Galium e di graminacee è consigliabile aumentare la dose a 6 Kg/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare la calcolata dose di prodotto in poca acqua agitando bene e poi, sempre continuando ad agitare, aggiungere lentamente il restante quantitativo di acqua necessaria per raggiungere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Non si consigliano miscele con altri formulati

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N. 5213 del 10.2.83 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto

Kg. 1-5-20

5218

RIGRON

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ERBICIDA LIQUIDO - specifico per il diserbo selettivo del riso e del grano.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
39,2 g di Bentazon sale sodico puro.
Solventi e bagnanti: quanto basta a 100 grammi.

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare colture, bevande e alimenti o corsi d'acqua — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il RIGRON è un erbicida di contatto, per cui si impiega esclusivamente in post-emergenza delle colture e delle infestanti. Per svolgere in pieno la sua efficacia non deve essere dilavato entro le 12 ore consecutive al trattamento.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Riso: 4-5 lt/ha distribuiti uniformemente in 400-500 lt/ha. Il periodo ottimale di impiego si verifica normalmente 30-60 giorni dopo la semina, quando la maggior parte delle infestanti sono emerse ed in fase di crescita. Il trattamento deve essere eseguito su risaia asciutta (togliere l'acqua 1-2 giorni prima dell'applicazione), per cui si consiglia di trattare durante le ore più calde della giornata. Dopo 2-3 giorni dal trattamento la risaia può essere nuovamente sommersa.Infestanti controllate: Butomus umbellatus, Alisma plantago, Scirpus mucronastus e maritimus, Sparganium erectum, Thypha spp., Sagitaria sagittifolia. Cyperus disformis e Heleocharis sono invece scarsamente sensibili al RIGRON.

Grano: 3-4 lt/ha.

Il RIGRON controlla principalmente le infestanti a foglia larga e particolarmente la Matricaria chamomilla. Se correttamente impiegato, in modo da evitare i fenomeni di deriva, non esistono problemi per le colture vicine (vigneti, frutteti, colture ortive, cucurbitacee).

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il RIGRON è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 120 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N. 5218 del 10.2.83 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Lt. 1 - 5

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

5243

MARLON® PB

Composizione per 100 grammi:
gr. 19 METHIDATHION puro
Coformulanti q. b. a gr. 100

Attenzione: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato, munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R 3 agosto 1968, N. 1255.

CLASSE I VELENO

Insetticida fosforganico per la frutticoltura, l'agrumicoltura, l'orticoltura, la floricoltura e le colture industriali.

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Evitare di respirare i vapori
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrare in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva)
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico:
Esteri fosforici: Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo. Sintomi d'intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare. Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita ed ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2 - 1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc., somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio. Controindicazioni: Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi. AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche e campi d'impiego:
MARLON®-PB agisce per contatto, ingestione, penetrando nei tessuti vegetali, uccidendo gli insetti annidiati nei frutti:
Melo: contro Carpocapsa, Cecidomia, Cacoecia, Afidi, Capua, Cemiostoma
Pero: contro Cocciniglie, Psille
Pesco: contro Cocciniglie, Afidi, Tripidi
Susino: contro Afidi, Cocciniglie
Olivo: contro Cocciniglie
Vite: contro Tignole e Cicaline
Gelso: contro Cocciniglie
Asparago: contro Ipopta (Hypopta caestrum) e Mosca degli asparagi, Nottue, Calocampa
Carciofo: contro afidi (Brachycardus cardui) e Altiche
Patata: contro Dorifora, Afidi, Nottue, Tignola
Pomodoro: contro Afidi, Tripide, Dorifora (Leptinotarsa decemlineata)
Barbabietola da zucchero: contro Cleono, Lixus e Altica.

Modalità d'impiego:
Diluire il MARLON®-PB in poca acqua e versare la sospensione ottenuta nella restante quantità d'acqua mescolando accuratamente.

Dosi d'impiego per 100 litri d'acqua: 200–250 gr. a seconda dei parassiti da combattere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:
Il MARLON®-PB è miscibile con la maggior parte dei soliti insetticidi e fungicidi in uso, esclusi i prodotti alcalini.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
Il prodotto è fitotossico per il pesco dopo la ripresa vegetativa.

Rischio di nocività:
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
NON FARE PASCOLARE E NON ALIMENTARE IL BESTIAME CON PRODOTTI TRATTATI DIRETTAMENTE O ACCIDENTALMENTE, PER NON MENO DI 20 GIORNI DAL TRATTAMENTO

"Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso".
"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato".
"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali".

Officina di produzione: Visplant - Chimiren - Renazzo di cento (FE)

J. & A. MARGESIN - Fitofarmaci - Lana d'Adige (BZ)

Registrazione Ministero della Sanità N. 5243 del 16-2-1983

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO: KG

5245

ESCA GRANULARE A BASE DI METALDEIDE PRONTA ALL'USO

COMPOSIZIONE

Metaldeide pura	gr. 4,9
Disperdenti, supporti e coadiuvanti q. b. a	gr. 100

CLASSE III — ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con pelle.

SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
Violenti dolori addominali, diarrea, vomito biancastro (aspetto di latte cagliato) shock, midriasi, ipotermia, convulsioni, obnubilazione del sensorio.

CONSIGLI TERAPEUTICI:
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (grammi 5 per litro di acqua), riscaldare il paziente, cardiotonici, fleboclisi clorurate o glucosate con noradrenalina, diuretici, barbiturici, neuroplegici, anfetamina e derivati in caso di torpore.

CARATTERISTICHE:
L'esca è pronta all'uso per la lotta contro tutte le specie di lumache. Il prodotto si presenta in forma granulare. I granuli sono prodotti in maniera tale da garantire la loro azione nel tempo: la loro efficacia rimane invariata anche in presenza di vento e pioggia.

DOSI E TECNICA D'IMPIEGO:
Colture floreali in pieno campo o serra: spargere verso sera gr. 250-400 per 100 mq.. Ripetere la distribuzione quando i granuli sono scomparsi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Non è prevista la miscela con altri prodotti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITA':
Il prodotto, è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

DA USARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA SU COLTURE FLOREALI INTENSIVE, SU PIENO CAMPO O SERRA, nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGROZOOFARMA s.r.l. - MORTEGLIANO (Ud)

Officina di produzione: AGROZOOFARMA - Mortegliano

Reg. Min. San. N. 5245 del 16-2-1983

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg. 10

5263

LISAMON

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE
CON PRUDENZA

LIQUIDO EMULSIONABILE - Diserbante selettivo per il mais.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Alaclor p.a. puro gr. 43,2
Tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi.

CONTIENE XILOLO.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

– Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. – Conservare la confezione ben chiusa. – Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. – Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. – Non operare contro vento. – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il LISAMON è un diserbante specifico per il mais, che agisce per assorbimento radicale sui semi delle infestanti in fase di germinazione. Il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali da seme, specialmente le graminacee (Poa, Giavone), come pure la Digitaria, Setaria, Panicum dichotomiflorum; controlla anche le infestanti dicotiledoni quali: Amarantus, Capsella b.p., Matricaria, Sinapis, Veronica. Il prodotto è poco attivo contro la Stellaria e le Poligonacee, nonchè contro le infestanti perenni da rizoma o stolone, quali Gramigna, Convolvulus, Sorghetta, Artemisia.

MODALITA' D'IMPIEGO

Preparare accuratamente il terreno, affinchè non rimangano zolle; il diserbo va effettuato su tutta la superficie del campo, oppure localizzato su strisce larghe 20-25 cm. Impiegare il LISAMON subito dopo la semina del mais e prima della nascita delle infestanti, alle dosi seguenti: Lt. 3 in miscela con Kg.4 di TURCAN (Atrazina) per ettaro.
Lt. 6/ha in terreni dove predominano le graminacee resistenti all'Atrazina e nei mais di secondo raccolto.
Lt. 5/ha in terreni sciolti; Lt. 7-8/ha in terreni organici.
Si consiglia di distribuire il LISAMON in 4-5 ettolitri d'acqua, e se non piove durante le due settimane successive al trattamento, è necessario effettuare una irrigazione a pioggia superficiale. Eventuali sarchiature dovranno essere solo superficiali, onde permettere al LISAMON di espletare la sua azione sui semi delle infestanti.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Versare il prodotto nella quantità d'acqua necessaria e rimescolare bene.

Avvertenza: dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti usati per la distribuzione della poltiglia diserbante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il LISAMON è miscibile con TURCAN e Simazina. Nelle miscele con Atrazina e Simazina è importante mantenere sempre in movimento la poltiglia nella pompa irroratrice.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non consociare altre colture alle coltivazioni di mais trattate ed evitare che il prodotto venga a contatto con colture sensibili. Nel caso di semina di altre colture, è importante che siano trascorsi almeno 3-4 mesi dal trattamento ed è necessario effettuare una buona aratura prima della semina.

Attezione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitore danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

Registrazione N. 5263 del 3.3.83 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Lt. 1-5-10

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

5281

CRONETON 40 P. B.

AFICIDA SISTEMICO

per piante da frutta (pomacee, drupacee, agrumi), ortaggi (cavolo, insalata, fava, fagiolo, pisello, fagiolino), carciofo, patata, barbabietola da zucchero, tabacco, piante da fiore e ornamentali in pieno campo e in serra

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Croneton 40 PB contengono:
g 40 di etiofencarb puro
sospensivanti ed inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi di intossicazione: neusea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero in centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: 0,1-0,2% (100-200 g in 100 lt d'acqua) a seconda delle specie di afidi e dell'intensità dell'infestazione.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non impiegare nel periodo fiorale e, limitatamente ai meli, fino a 30 giorni dopo.
Nocività: il prodotto è nocivo a insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per ortaggi, 14 giorni prima del raccolto per frutta, 30 giorni prima del raccolto per bietole.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Filago (BG)

Registrazione Ministero Sanità n. 5281 del 16-3-1983

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

g 500

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

5285

KILPER BLAU®

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

POLVERE BAGNABILE - Fungicida cupro-organico per la lotta contro le principali malattie crittogamiche della vite, delle pomacee, del pomodoro e garofano.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb p.a. puro gr. 14,4
Rame metallo (sottoforma di ossicloruro) gr. 25
Coformulanti, bagnanti, disperdenti, coloranti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

-- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti bevande o corsi di acqua. — Non operare contro vento. -- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. - Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: L'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.

Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomato oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

MODALITA' DI IMPIEGO

Dosi per 100 litri di acqua:
Pomacee: contro la ticchiolatura del melo e del pero nei trattamenti pre-fiorali g. 300.
Vite: contro la peronospora, prima della fioritura g. 300; dopo la fioritura g.300-400. In caso di forti infezioni impiegare la dose massima consigliata ed abbreviare l'intervallo dei trattamenti.
Pomodoro: solo fino alla prima fioritura: contro peronospora, septoriosi ed alternariosi g. 300-400.
Garofano: in pieno campo contro la ruggine g. 300-400

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il KILPER BLAU® è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione per quelli a reazione alcalina (polisolfuri e Poltiglia Bordolese).
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura;
sulle varietà di melo (Abbondanza «Belford» - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canadà Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Clairgeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE

DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano Via Siemens 12

Registrazione n. 5285 del 30.3.83 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto kg 1 - 5 - 10 - 25

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

5296

QUINTAMON 4 P.S.

CLASSE IV

POLVERE SECCA - Fungicida organico contro le muffe, i marciumi del colletto e delle radici delle piante orticole e floreali in pieno campo

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
4 g di dicloran p.a. puro
Coformulanti q.b. a 100g

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il QUINTAMON 4 P.S. è un fungicida efficace nella lotta contro i funghi dei generi Sclerotinia, Rhizoctonia e Botrytis. Può essere impiegato su molte piante coltivate ed in particolare per la lotta contro la Botrytis della fragola, i marciumi da Sclerotinia, Botrytis e Rhizoctonia dell'insalata, dei gladioli e di altre bulbose, e quelli del colletto e delle radici degli ortaggi coltivati in pieno campo che in ambiente coperto (semenzai, piantonai e serre).
La formulazione in polvere secca caratterizzata da un potere penetrante maggiore dalle miscele liquide, permette di ricoprire uniformemente la vegetazione, anche se questa è molto fitta, combattendo le infezioni fungine di grave intensità.

MODALITA' DI IMPIEGO

Contro la Rhizoctonia e Botrytis dell'aspargo, contro la Botrytis, Rhizoctonia e Sclerotinia dell'Insalata, delle cucurbitacee e solanacee, contro la Botrytis e Sclerotinia della carota e della cipolla, contro la Botrytis del tabacco, contro la Botrytis, Rhizoctonia e Sclerotinia delle colture floreali ed ornamentali: in semenzaio, in serra o in pieno campo: a terreno nudo: si applica il prodotto alla dose di 30 g/mq, interrandolo di 1 - 2 cm con rastrello; sulla coltura in atto: si effettuano a seconda dell'andamento stagionale 2-3 trattamenti alla distanza di 3-4 settimane impolverando il colletto delle piantine alla dose di 8 g/mq di QUINTAMON 4 P.S..
Il prodotto non deve essere impiegato su piantine troppo giovani quando la temperatura è elevata: le piantine devono avere almeno 4 foglie complessive e devono avere superato la crisi di trapianto (10 - 15 giorni dopo il trapianto).
Fragola: contro la Botrytis e Rhizoctonia a seconda dell'andamento stagionale e dell'intensità dell'attacco, distribuire 40-60 Kg/ha (4-6 g/mq) di Quintamon 4 P.S. dall'inizio della fioritura con intervalli di 10-15 giorni.
Concia dei bulbi di cipolle o di fiori: contro la Botrytis e Sclerotinia: QUINTAMON 4 P.S. si impiega impolverando i bulbi alla dose di 1 Kg di prodotto per 100 Kg di bulbi.
Disinfezione dei terriciati: mescolare 1 Kg di QUINTAMON 4 P.S. per ogni metro cubo di terriciato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Pur essendo il QUINTAMON 4 P.S compatibile con molti antiparassitari di uso comune, la miscela è tuttavia da sconsigliare, in quanto, per le dimensioni delle particelle, queste in fase di distribuzione delle miscele, si possono separare.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

In caso di dubbio o di varietà poco diffuse o di recente acclimatizzazione, è consigliabile eseguire preventive prove parcellari.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

Registrazione Nr. 5296 del 30.3.83 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg 25-10-5-1

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

5302

SEFTAL 50 PB

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

5302

Composizione: g 100 di prodotto contengono:

— CAPTANO puro . . . . g 50
— Coformulanti q. b. a . . . . g 100

CLASSE IV

Norme precauzionali: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi d'intossicazione: azione irritante sul tratto gastro intestinale con dolori addominali bruciori gastroesofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.

Caratteristiche: il SEFTAL 50 PB è un fungicida organico di sintesi ad ampio spettro di azione, con caratteristiche antiparassitarie. Il prodotto viene impiegato su: **pomacee** contro la ticchiolatura; **vite** contro peronospora e botritis; **drupacee** contro bolla e carineo; **patata** e **pomodoro** contro peronospera e alternaria della patata; **carota** contro septoria e cercospora; **fragola** contro antracnosi e botritis; **rosa** in pieno campo contro perospora, ticchiolatura e marciume; **garofano** in pieno campo contro alternaria, septoria, carbone e fusarium.
Il SEPTAL 50 PB può, inoltre, essere impiegato per il controllo del marciume dei bulbi e per la disinfezione del terreno contro il marciume e l'avvizzimento delle piantine in semenzaio o vivaio dovuti a Phithium, fusarium, fitoftora, rizoctonia.
Dosi e modalità d'impiego: il SEFTAL 50 PB si impiega alla dose di 200-250 g/hl d'acqua elevabile a 300 g/hl in presenza di forti attacchi di crittogame. Le applicazioni sulle pomacee vanno effettuate prima e dopo la fioritura ad intervalli di 10-15 giorni, mentre sulle drupacee si effettuano dopo la fioritura. Contro il marciume dei bulbi, questi vengono immersi per 1-1,5 ore in una soluzione al-l'1 % di SEFTAL 50 PB, per poi piantarli dopo completa asciugatura. Nella disinfezione del terreno il prodotto viene raccomandato alla dose di 2-4 g/m² di superficie, irrorando od inaffiando il terreno, iniziando i trattamenti quando i semi sono germinati e ripetendoli settimanalmente. Nelle irrorazioni alle piante i trattamenti si ntendono a volume normale. Quando questi si effettuano con pompe a volume ridotto, le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela un adesivo bagnante. Il prodotto va diluito in acqua fino ad ottenere una densa crema, il resto dell'acqua si aggiunge successivamente.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

Compatibilità: il SEFTAL 50 PB non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisulfuri, ecc.) con oli e con zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di oli e zolfi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (stark delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra clairgeau - Contessa di Parigi - trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.
Rischio di nocività: il prodotto è tossico per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci e gli insetti utili.
Il suo impiego deve essere sospeso 15 giorni prima della raccolta ma per le uve destinate alla vinificazione tale arco di tempo dovrà rispettare i 40 giorni.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso: chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Reg. Ministero Sanità n. 5302 del 30-03-83

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO g 100**

S E P R A N s . r . l .
36033 ISOLA V.CENTINA (VI) Via Cogolla, 5/B
TELEFONO N.: (0444) 55.82.28

off. di prod. Visplant-Chimiren - Renazzo di Cento (Fe)

5312

TERBULIN

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

POLVERE BAGNABILE - Diserbante selettivo di pre-emergenza per il frumento.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Terbutrin p.a. puro gr. 20
Linuron p.a. puro gr. 10
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

– Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. – Conservare la confezione ben chiusa. – Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. – Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. – Non operare contro vento. – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Irritante per la cute. L'ingestione può provocare bruciori gastroesofagei, vomito, diarrea, subbitero, albuminuria ed ematuria.
Terapia: per la dermatosi pomate cortisoniche od antistaminiche. Non è consigliabile la lavanda gastrica. Si consiglia fleboclisi glucosate, potassio, epatoprotettori.

CARATTERISTICHE

Il TERBULIN è un erbicida specifico per il diserbo del frumento, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.
Il TERBULIN garantisce una rapida distruzione delle infestanti graminacee e dicotiledoni quali Alopecurus, Apera spica venti, Lolium, Poa, Echinochloa, Atriplex, Ambrosia, Capsella, Oxalis, Papaver, Polygonum, Portulaca, Raphanus, Sinapis, Sonchus, Chamomilla, Stellaria, Veronica, Galium, Lamium, mantenedo una perfetta selettività.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Frumento autunnale - dose media kg. 4-5 per ettaro distribuiti con almeno 500 lt. d'acqua per ettaro. Il trattamento con TERBULIN va effettuato dopo la semina del frumento prima della emergenza della coltura e delle infestanti.
L'efficacia erbicida è migliore su terreno ben lavorato, privo di zolle, con elevato grado di umidità del suolo al momento del trattamento o dopo la sua esecuzione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume miscelando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il TERBULIN è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci.

Avvertenza:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

Registrazione Nr. 5312 del 15.4.83 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERE SFUSO

Contenuto Kg. 1 - 5 - 10

5321

Caratteristiche del prodotto e modalità d'impiego

Il prodotto è efficace contro i nematodi (liberi, cisticoli e galligeni) viventi nel terreno.

Dose generale d'impiego, per ettaro di superficie:
150-200 litri (15-20 cc/m²), operando su terreni sciolti o sabbiosi e 200-250 litri (20-25 cc/m²) su terreni di medio impasto e pesanti.

Si consigliano in ogni caso le dosi più alte per il controllo dei nematomi cisticoli e degli insetti parassiti.

L'applicazione va fatta su terreno privo della coltura programmata, ben soffice e fresco (umidità come per la semina), con temperature di 10°-25°C (ottimali 15°). Localizzare il prodotto a 10-15 cm di profondità nei terreni argillosi o ricchi di sostanza organica e a 15-25 cm nei terreni sabbiosi.

Usare per la distribuzione:

- Pali iniettori, per piccole superfici.
- Fumigatori a traino, per grandi superfici, con iniezioni distanti al massimo 30 cm.

Dopo il trattamento il terreno deve essere irrigato o rullato per evitare l'evaporazione del prodotto.

AVVERTENZA: chi utilizza il prodotto deve provvedere in modo idoneo a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità (48 ore).

Da non applicare con mezzi aerei.

E' vietato impiegare il prodotto in serra e in ambienti chiusi.

Fitotossicità

Poiché il gas prodotto dal DD 92 Schering è fitotossico per le piante coltivate, il trattamento deve essere effettuato sul terreno privo di vegetazione, evitando che nelle vicinanze ci siano piante sensibili come pesco, vite, pioppo in vegetazione.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

Attendere almeno 28 giorni prima di mettere a coltura il terreno stesso (attendere di più con terreni pesanti o d'inverno con piogge prolungate o con le dosi più alte).

Una settimana prima di effettuare la semina o il trapianto è consigliabile arieggiare il terreno trattato operando una leggera lavorazione.

«Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso».

«Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato».

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO l. 100

DD 92 SCHERING

Nematocida del terreno e per reimpianti di vite, pesco e agrumi

Composizione su g 100:

1,3 Dicloropropeno puro	g 92,3
Prodotti correlati	g 6,7
Coformulanti	q.b. a 100

CLASSE II

NOCIVO

LIQUIDO INFIAMMABILE

SCHERING S.p.A.
Divisione Agricoltura
20131 MILANO - VIA MANCINELLI, 11

Officina di Nova Milanese

Registrazione del Ministero della Sanità
N° 5321 del 26/04/1983

Natura del rischio:

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- *Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini od agli animali domestici;*
- *Conservare la confezione ben chiusa.*
- *Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.*
- *Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi di acqua.*
- *Evitare di respirarne i vapori;*
- *Non operare contro vento.*
- *Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;*
- *Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;*
- *Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es. riducendole a piccolo volume o interrandole in fosse profonde);*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle. Veleno neurotropo: provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico — tempo di latenza: anche parecchie ore.

Sintomi neurologici: cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave.

Sintomi a carico dell'apparato digerente e del fegato: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero da epatite tossica.

Sintomi a carico dell'apparato respiratorio: dispnea, tosse, congestione e edema polmonare.

Sintomi a carico degli occhi e della pelle: congiuntivite irritativa, irritazione cutanea.

Sono possibili lesioni renali tossiche e conseguente coma uremico.

Consigli terapeutici di massima e condizionali al caso:

Rimuovere immediatamente i vestiti contaminati e lavare pelle e capelli con acqua e sapone.

Può essere utile l'applicazione cutanea di creme a base di cortisonici. Lavare gli occhi con molta acqua corrente per almeno 15 minuti.

In caso di ingestione, e se non è presente vomito, praticare lavanda gastrica (dopo intubazione se il paziente è in stato di incoscienza) seguita da instillazione di 3-4 cucchiai di carbone medicinale attivato e 30 g di solfato di sodio o di magnesio. Terapia sintomatica.

In caso di inalazione: terapia sintomatica: aminofillina (250 mg) contro spasmi bronchiali, somministrata per via rettale o endovena, cortisonici, ossigeno se necessario; se è presente edema polmonare, somministrare anche diuretici (tiazide). Nei casi gravi è indispensabile il ricovero in Centro di rianimazione.

Controindicazioni: non somministrare sedativi a base di bromo, oppiacei, adrenalina per via parenterale, alcool, sostanze lipidiche come latte e olio.

AVVERTENZA

Consultare un centro antiveleni.

5329

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

INFIAMMABILE

Nematocida del terreno e per reimpianti di vite, pesco e agrumi

COMPOSIZIONE
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 92,3 di 1,3 Dicloropropene puro
gr. 6,7 Prodotti correlati
Coformulanti quanto basta a 100

® Marchio registrato dalla The Dow Chemical Company Midland Michigan - USA

Natura del rischio:
Intossicazione grave per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
— Dopo l'uso distruggere le confezioni, oppure decontaminarle lavandole accuratamente con acqua calda e soda caustica al 3-4% risciacquandole ripetutamente con cura.
— Non utilizzare assolutamente le confezioni per la conservazione di bevande o di prodotti alimentari.
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.
Tenere lontano dal fuoco e dalle fonti di calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle. Veleno neurotropo: provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico — tempo di latenza: anche parecchie ore. Sintomi neurologici: cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave.
Sintomi a carico dell'apparato digerente e del fegato: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero da epatite tossica.
Sintomi a carico dell'apparato respiratorio: dispnea, tosse, congestione e edema polmonare.
Sintomi a carico degli occhi e della pelle: congiuntivite irritativa, irritazione cutanea.
Sono possibili lesioni renali tossiche e conseguente coma uremico.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Rimuovere immediatamente i vestiti contaminati e lavare pelle e capelli con acqua e sapone.
Può essere utile l'applicazione cutanea di creme a base di cortisonici. Lavare gli occhi con molta acqua corrente per almeno 15 minuti.
In caso di ingestione, e se non è presente vomito, praticare lavanda gastrica (dopo intubazione se il paziente è in stato di incoscienza) seguita da instillazione di 3-4 cucchiai di carbone medicinale attivato e 30 gr. di solfato di sodio o di magnesio. Terapia sintomatica.
In caso di inalazione: terapia sintomatica: aminofillina (250 mg.) contro spasmi bronchiali, somministrata per via rettale o endovena: cortisonici; ossigeno se necessario: se è presente edema polmonare somministrare anche diuretici (tiazide).
Nei casi gravi è indispensabile il ricovero in centro di rianimazione.

Controindicazioni:
Non somministrare sedativi a base di bromo, oppiacei, adrenalina per via parenterale, alcool, sostanze lipidiche come latte e olio.

Avvertenza
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il TELONE II libera il terreno da tutte le specie di nematodi tra cui quelli che formano galle (Meloydogyne spp), cisti (Heterodera spp), lesioni (Pratylenchus spp) ed in generale tutte le anguillule che infestano terreni destinati a tutte le colture ed inoltre al reimpianto di vite, pesco e agrumi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Coltivazioni erbacee:
— terreni leggeri: litri 120-160/ha.
— Terreni di medio impasto o leggermente forti: litri 160-200/ha.

Frutteti
Per il reimpianto dopo breve periodo (1-2 anni) di vite, pesco, agrumi litri 350-500/ha.
Le dosi più alte, in ogni caso, sono consigliate nelle colture con radici profonde, terreni pesanti con alto contenuto di sostanze organiche nel terreno, e presenza di nematodi e cisti.

TEMPO E MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato sempre su terreno nudo.
Il TELONE II può essere applicato durante l'anno quando la temperatura del terreno è fra i 5°C. ed i 27°C.
Al tempo del trattamento il terreno deve essere ben lavorato e privo delle zolle e delle sostanze organiche indecomposte; inoltre, deve possedere il giusto grado di umidità come per la semina.
Il TELONE II si inietta sul terreno, mediante pali iniettatori e macchine fumigatrici. Le iniezioni vanno fatte alla distanza di 30-40 cm. fra loro ed alla profondità di:
a) cm. 15-25 (in funzione della profondità delle radici della coltura da impiantare, per l'impianto delle colture erbacee;
b) cm. 25-35 per impianto di colture arboree.

Trattamento di pieno campo
Per il trattamento di grandi superfici impiegare apparecchi fumigatori a traino a distribuzione continua e regolabile del liquido fumigante il quale scendendo lungo coltelli assolcatori viene immesso nel terreno.
Dopo il trattamento il terreno deve essere rullato o irrigato, onde evitare l'evaporazione del TELONE II.

Aereazione del Terreno e Semina - Trapianto
Ad una distanza di 7 o 14 giorni dopo il trattamento praticare una zappatura od una erpicatura profonda allo scopo di liberare il terreno dai vapori residui.
La semina o il trapianto della coltura dovrà essere fatta da 7 a 10 giorni dopo l'aereazione del terreno e almeno 28 giorni dopo il trattamento con il TELONE II.
Nel caso in cui, nel periodo successivo al trattamento, si verificassero basse temperature o eccessive precipitazioni sarà bene attendere 21 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura.
Nel caso di applicazioni con dosi elevate (330 litri/ha.) attendere almeno 60 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura.
In ogni caso prima della semina o impianto della coltura è necessario che il terreno non abbia nessun odore di TELONE II.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Essendo i vapori del TELONE II fitotossici, i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Far trascorrere almeno 28 giorni tra il trattamento e semine e reimpianti

AVVERTENZE

E' vietato l'impiego del prodotto in serra ed in ambienti chiusi.
Chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità: 48 ore.
Il TELONE II può danneggiare i contenitori e le attrezzature fabbricati con alluminio, magnesio e loro leghe.
Il TELONE II non è indicato nei terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica.
I fertilizzanti a base di azoto ammoniacale possono impiegarsi soltanto quando la coltura si è ben consolidata e la temperatura del terreno è superiore a 18°C.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. n. 5329 Ministero Sanità del 9-5-1983
8/84

5343

LIMASANEX

ESCA GRANULARE A BASE DI METALDEIDE PRONTA ALL'USO
PER COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO O SERRA

COMPOSIZIONE
Metaldeide pura . . . . gr. 4,9
Disperdenti, supporti e coadiuvanti q. b. a . . . . . gr. 100

CLASSE III — ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua, non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con pelle

SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
Violenti dolori addominali, diarrea, vomito biancastro (aspetto di latte cagliato) shock, midriasi, ipotermia, convulsioni, obnubilazione del sensorio

CONSIGLI TERAPEUTICI:
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (grammi 5 per litro di acqua), riscaldare il paziente, cardiotonici, fleboclisi clorurate o glucosate con noradrenalina, diuretici, barbiturici, neuroplegici, anfetamina e derivati in caso di torpore.

CARATTERISTICHE:
L'esca è pronta all'uso per la lotta contro tutte le specie di lumache. Il prodotto si presenta in forma granulare. I granuli sono prodotti in maniera tale da garantire la loro azione nel tempo: la loro efficacia rimane invariata anche in presenza di vento e pioggia.

DOSI E TECNICA D'IMPIEGO:
Colture floreali in pieno campo o serra: spargere verso sera gr. 250-400 per 100 mq.. Ripetere la distribuzione quando i granuli sono scomparsi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Non è prevista la miscela con altri prodotti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITA':
Il prodotto, è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

DA USARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA SU COLTURE FLOREALI INTENSIVE, SU PIENO CAMPO O SERRA, nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGROZOOFARMA s.r.l. - MORTEGLIANO (Ud)

Officina di produzione: AGROZOOFARMA - Mortegliano

Reg. Min. San. N. 5343 del 26.4.1983

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg. 25

5352

NELK BLAU

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

POLVERE BAGNABILE - Fungicida cupro-organico per la difesa della vite, del pomodoro e del garofano.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb p.a. puro g. 8,5
Rame metallo (sotto forma di ossicloruro) g. 30
Bagnanti, disperdenti, coloranti ed inerti q.b. a 100 grammi.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti bevande o corsi di acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicazioni alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

MODALITA' DI IMPIEGO

Dosi per 100 litri di acqua:
Vite: contro la Peronospora 300-400 g
Pomodoro: solo fino alla prima fioritura: contro Peronospora e Alternariosi 300-400g
Garofano: in pieno campo contro la Ruggine 400 g

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA':

Il NELK BLAU è miscibile con Thiamon colloidale per la lotta contemporanea contro l'Oidio e la Peronospora e può essere miscelato con Kelthane, Parafos, Metiamon, Dryfos per la lotta contemporanea contro Acari, Tignole, Sigaraio, Zigene.
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

Registrazione N. 5352 del 11.5.83 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto kg. 1-5-10-25

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

5359

ARGINET

Diserbante totale ad azione pronta e residuale per canali, argini di risaie ed aree non coltivate

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Dalapon puro	g 35
Simazina pura	g 20
Atrazina pura	g 9
Coformulanti	q.b.a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CAFFARO S.P.A. - MILANO

CAFFARO

Prodotto su formula originale e sotto il controllo della CAFFARO S.p.A. nello stabilimento di:
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE) S.S. 255 Km 46
Registrazione Ministero della Sanità n. 5359 del 19-5-1983

CARATTERISTICHE

L'ARGINET agisce per assorbimento fogliare sulle infestanti presenti al momento del trattamento e, per assorbimento radicale, impedisce inoltre la nascita di nuove malerbe per un periodo di circa 6-8 mesi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

— Per il diserbo di argini, sponde, canali, l'ARGINET si impiega alle dosi di g 150-250 (in relazione allo sviluppo delle infestanti) in 10 litri d'acqua per 100 metri quadrati (pari ad es. a 100 metri lineari di un argine della larghezza di 1 metro).

— Per il diserbo di aree non coltivate, la dose può essere elevata a g 300-400 in 10 litri d'acqua per 100 metri quadrati (pari a kg 30-40/ha).

Il prodotto va distribuito con le comuni pompe a spalla, su infestanti in vegetazione, evitando di investire con il prodotto il riso o altre colture utili.
Per preparare la poltiglia stemperare la dose stabilita di prodotto in poca acqua in modo da ottenere una pasta omogenea, e versare poi questa nella quantità d'acqua occorrente per il trattamento, mescolando con cura.

AVVERTENZA

Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili (es. frumento, bietola, tabacco, ecc.) occorre un intervallo di 12 mesi. Tale intervallo va osservato anche per le ripetizioni del trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

L'ARGINET va usato da solo.

FITOTOSSICITÀ

L'ARGINET va distribuito solo sulle erbe da distruggere. Evitare il contatto con colture sensibili vicine.
Dopo il trattamento lavare con cura i recipienti e la pompa impiegati prima di destinarli ad altri trattamenti.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura alle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto o fresco.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 10

5436

SIMAZINA CAFFARO

Diserbante in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Simazina puro	g 50
Coformulanti	q.b. a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CAFFARO S.P.A. - MILANO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5436 del 14-7-1983

CARATTERISTICHE
La SIMAZINA CAFFARO è un diserbante che agisce per assorbimento radicale contro molte infestanti annuali quali Coda di Volpe, Giavoni, Digitaria, Camomilla, Ortica, Veronica, Papavero, Rafano, Geranium, Stellaria, Porcellana, Erigeron, Persicaria, Borsa del Pastore.
Il prodotto possiede una selettività prevalentemente di tipo stratigrafico, in quanto si fissa nei primi strati di terreno normalmente non interessati dalle radici delle piante coltivate e la sua azione è persistente.
Perchè tale azione si esplichi al meglio è consigliabile evitare le lavorazioni profonde mentre sono utili quelle superficiali specialmente se al trattamento segue un periodo di siccità. Poichè il prodotto agisce per assorbimento radicale, l'azione è più rapida se al trattamento segue una pioggia o una irrigazione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
La SIMAZINA CAFFARO si impiega in sospensioni acquose stemperando la dose stabilita in poca acqua e portando a volume desiderato.
La SIMAZINA CAFFARO va distribuita con pompe irroratrici curando l'uniforme spargimento con 600-1000 litri di acqua per ettaro.

— Melo, pero, pesco, vigneti, agrumeti, oliveti	kg 5-7 /ha
— Asparago e carciofo	kg 4-5 /ha
— Rose, vivai di piante legnose e di vite americana	kg 2-4 /ha
— Diserbo totale di aree non coltivate	kg 10-20/ha
— Diserbo di fossi e canali	kg 10 /ha
— Disebo degli argini di risale	kg 2-3 /ha

N.B. Nei terreni ricchi di sostanza organica impiegare le dosi più alte.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
La SIMAZINA CAFFARO è miscibile con la maggior parte degli erbicidi.
Si consiglia la miscela con Dissecante Caffaro nei trattamenti su infestanti già sviluppate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, occorre un intevallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Da impiegare solo su colture specializzate.
Sospendere il trattamento 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 1

5461

VITAVAX® 38/38

FUNGICIDA PER LA CONCIA DELLE SEMENTI

CLASSE III

ATTENZIONE! Manipolare con prudenza

Composizione: gr 100 di prodotto contengono:
— Carbossina . . . . . . gr 37,5 di p.a. puro
— Captano . . . . gr 37,5 di p.a. puro
— Bagnanti, disperdenti . . . q.b. a 100

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone;
— Evitare di respirare i vapori.

AVVERTENZA: durante la manipolazione del prodotto si dovranno usare guanti ed occhiali protettivi date le proprietà irritanti del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
Azione irritante sul tratto gastrointestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia:
Lavanda gastrica con magnesia usta (gr 30 per litro di acqua) e digitale.

Caratteristiche: Il Vitavax 38/38 è un fungicida sistemico in polvere bagnabile impiegato nella concia delle sementi e dei bulbi per le seguenti colture: Frumento, Orzo, Segale, Avena, Sorgo, Riso, Mais, Cotone, Barbabietola da zucchero, Erba Medica, Trifoglio ed altre foraggere, Pomodoro, Piante da fiore ed ornamentali.
Il prodotto unisce all'azione sistemica dovuta alla carbossina, che penetra all'interno di essi, quella per contatto dovuta al captano.
Il prodotto è efficace contro: *Rhyzoctonia solani, Cercosporella herpotricoides, Tilletia spp., Ustilago spp., Phoma betae, Fusarium gramineum, Fusarium spp., Helminthosporium spp., Pythium spp., Alternaria spp., Septoria spp.*

REGISTRAZIONE N. 5461 DEL 9.11.1983 DEL MINISTERO DELLA SANITA'

® Marchio Registrato Soc. UNIROYAL INC. - New York (USA)

Dosi e modalità d'impiego:
Per 100 Kg di seme si impiegano le seguenti dosi:
— Frumento, Orzo, Segale, Avena . . 200 gr
— Sorgo . . . . 200-250 gr
— Riso 200-250
— Mais 200-250 gr
— Cotone . . . . . . 300-350 gr
— Barbabietola da zucchero . . . . 500-700 gr
— Erba Medica, Trifoglio ed altre foraggere . . 200-300 gr
— Pomodoro . . . . 200-300 gr
— Semi di Piante da fiore ed ornamentali . . . . 250-350 gr

Per 100 Kg di bulbi si impiegano da 500 a 750 gr di Vitavax 38/38.
Il trattamento può essere effettuato a secco mescolando direttamente la polvere con il seme da conciare nel modo più uniforme, oppure con il sistema «slurry». In questo secondo caso al prodotto si aggiunge la quantità di acqua richiesta per ottenere una pasta che verrà meccanicamente spruzzata sul seme. Per i bulbi il trattamento viene fatto a secco oppure per immersione, per 1 ora, degli stessi in una soluzione allo 0,5% del prodotto.

Compatibilità: Il Vitavax 38/38 è compatibile con la generalità degli insetticidi e fungicidi impiegati nella concia delle sementi.

Avvertenza: In casi di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: E' tossico per i pesci.

« **Attenzione:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».
Il seme trattato deve essere impiegato esclusivamente per la semina; non deve essere perciò riutilizzato per l'alimentazione dell'uomo, degli animali domestici, del bestiame e della selvaggina.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

UNIROYAL

UNIROYAL CHIMICA S.p.A.
Via delle Industrie, 40
04013 LATINA SCALO

Officina di produzione: RAVIT S.p.A. - QUASSOLO (TO)

DA NON VENDERSI SFUSO PESO NETTO KG 0,1

5472

STICEREAL 2,4 D - Pso

Disorbante selettivo per i cereali

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:

2,4 D puro (da sale sodico)	47 gr.
Coformulanti	q.b. a 100 gr.

CARATTERISTICHE

Lo STICEREAL 2,4 D-Pso è un diserbante ormonico, in polvere solubile, indicato per il diserbo selettivo dei cereali (grano, orzo, avena, segale, riso) e per il trattamento localizzato contro il romice dei prati. Agisce per assorbimento fogliare, non essendo volatile conferisce al trattamenti sicurezza anche quando il diserbo viene eseguito vicino alle colture sensibili, è perciò consigliato per il diserbo vicino ad alberi da frutto, vite, ortaggi e colture floreali in genere.

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Astenie di grado notevole, aritmie, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO: Abbondante lavaggio gastrico, ossigeno terapie, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.

CONTROINDICAZIONI: è sconsigliata la digitale.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Lo STICEREAL 2,4 D-Pso distrugge le seguenti malerbe che infestano il grano ed i cereali minori: Artemisia, Ranuncolo, Veccia, Capsella, Cardo, Borsa del pastore, Papavero, Camomilla, Soffione, Equiseto, Senape, Convolvolo, Fiordaliso, Romice, Celidonia, Stellaria, Veronica, Ederella, Rapanello edd Erba morella.

E' impiegato alle seguenti dosi per ettaro:

- Per grano, orzo, avena e segale: 1-2,2 Kg.; intervenendo quando il cereale ha completato l'accestimento (comparsa della sesta foglia sul cumulo principale) sino all'inizio della fase di botticella.
- Per il riso: 1,5-2,5 Kg.; intervenendo ad accestimento completato e fino a qualche giorno prima della levata degli steli.

Adottare le dosi inferiori per le infestanti più sensibili (Veccia, Papavero, Convolvulo) ed in risaia con acqua a basso livello; le dosi superiori contro le infestanti più resistenti (Ranuncolo, Romice, Cardo) e in risaia con acqua a pieno livello (sui 10 cm.).

L'opportuna dose di prodotto va sciolta in un quantitativo d'acqua sufficiente per irrorare uniformemente la superficie da diserbare. Operare con tempo buono ed a temperature non inferiori a 15-18 °C.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con la generalità dei diserbanti esclusi gli oli minerali.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto non essendo volatile può essere impiegato anche in vicinanza di colture sensibili. Evitare comunque di colpire direttamente tali colture col diserbante, non operare in presenza di vento ed evitare fenomeni di deriva.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO
20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A.

Sede legale: Via Matteotti, 16 - 48100 RAVENNA
Stabilimento di produzione: Via S. Francesco - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5472 **del** 14.09.1983

5475

BAYCOR BIETOLA

FUNGICIDA SPECIFICO

per la lotta contro la cercospora e l'oidio della barbabietola da zucchero

CLASSE I

VELENO

COMPOSIZIONE

g 100 di Baycor Bietola contengono:
g 12,5 di bitertanolo puro;
g 10 di fentin acetato puro;
coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto, schiacciandole e poi interrando in fosse profonde circa 1 metro. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Nocivo per ingestione, inalazione o contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione: cefalea occipitale continua o parossistica - ronzii auricolari - iperacusia - vertigini - rachialgia - dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra - ritenzione urinaria - insufficienza respiratoria e di circolo - interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie e paralisi) - dermatosi.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando — in relazione alla via di contaminazione — abluzioni cutanee, lavanda gastrica somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale - terapia sintomatica.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Barbabietola da zucchero: contro la cercospora e l'oidio: 2-2,5 kg/ha in 600-800 lt d'acqua, eseguendo 2-4 trattamenti iniziando alla comparsa dei primi sintomi e distanziandoli a intervalli non superiori a 3 settimane a seconda delle condizioni climatiche più o meno favorevoli allo sviluppo della malattia.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Baycor Bietola può essere miscelato con insetticidi formulati come polveri bagnabili. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: STI - Solfotecnica Italiana
Cotignola (RA) - Via S. Francesco

Registrazione Ministero Sanità n. 5475 del 10-10-1983

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg 5

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

5481

BAZIN 80

Fungicida polvere bagnabile

Composizione:

Zineb puro	g. 80
Sostanze inerti e coadiuvanti .	q.b. a g. 100

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

BASLINI

Baslini - Industrie Chimiche S.p.A.

Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782
20122 Milano

Stabilimento produttore:
Baslini Ind. Chim. S.p.A. Treviglio (BG)

Registrazione N. 5481 del 3-10-83 del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

DIVIETO D'IMPIEGO

Divieto d'impiego in serra.
Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA

Consultare un Centro antiveleni.
In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

BAZIN 80 combatte le seguenti malattie:

Vite: Peronospora ed Antracnosi - alla dose di gr. 250-300 per 100 lt. di acqua.

Pero e Melo: Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria - alla dose di gr. 250-300 per 100 lt. di acqua.

Pomodoro (solo fino alla prima fioritura): Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Antracnosi - gr. 300-400 per 100 lt. di acqua.

Garofano in pelno campo: Ruggine - alla dose di gr. 200-300 per 100 lt. di acqua.

Pioppo: Ticchiolatura - alla dose i gr. 250-300 per 100 lt. di acqua.

Tabacco: Peronospora tabacina - alla dose di gr. 250-300 per 100 lt. di acqua, in semenzaio - alla dose di gr. 250 per 100 lt. di acqua, in pieno campo.

Il BAZIN 80 si versa nel totale quantitativo di liquido rimescolando energicamente per alcuni minuti fino a formazione di una poltiglia omogenea. Irrorare bene le piante affinchè il prodotto possa distribuirsi uniformemente su tutte le superfici da proteggere.
Si consiglia di aggiungere gr. 100 di PRUNIG ogni 100 lt. di miscela.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI:

Divieto di impiego in serra e su colture diverse a quelle indicate.

COMPATIBILITA

Lo BAZIN 80 è compatibile con i prodotti con cui normalmente viene consigliata l'unione (bagnante - Parathion - Ossicloruro) e con i più noti similari della concorrenza.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA

Si sconsiglia l'impiego di prodotto sulle varietà di Pero sensibili allo BAZIN 80 quali ad esempio: Abate Fètel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana Del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle pi alle persone e agli animali.

Kg.

5486

ATRAFLO

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

FORMULAZIONE FLOWABLE: Erbicida specifico per il diserbo del mais e del sorgo.

COMPOSIZIONE
100 Grammi di prodotto contengono:
Atrazina pura gr. 42,75
Bagnanti, disperdenti, coadiuvanti e solventi quanto basta a 100 grammi.
Contiene «Glicole etilenico»

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
L'ATRAFLO è un erbicida specifico per il diserbo del mais e del sorgo.
Agisce per contatto e per assorbimento radicale contro le più dannose malerbe annuali monocotiledoni e dicotiledoni, quali: giavone, borsa pastore, erba morella, amaranto, farinello, poa, persicaria, mercorella, stellaria.
Le malerbe ed apparato radicale rizomatoso ed in genere quelle perenni (Vilucchio, Gramigne, Sorgo selvatico) nonché le Setarie, la Digitaria ed il Giavone americano sono resistenti all'ATRAFLO.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Kg. 4 - 6/Ha in 600-1000 litri di acqua. Effettuare il trattamento preferibilmente in pre-emergenza, subito dopo la semina. Qualora cause impreviste (stagione avversa, altri impegni di lavoro) fanno ritardare l'intervento in pre-emergenza, il diserbo si può fare anche alla nascita del mais e del sorgo oppure in post-emergenza.
Una buona sistemazione del terreno ed un suo buon tenore in acqua facilitano l'azione diserbante del prodotto ed assicurano un ottimo risultato.
Nei terreni torbosi o comunque ricchi di humus, si esclude l'impiego dell'ATRAFLO in pre-emergenza e si consiglia il trattamento in post-emergenza alla dose consigliata, con l'aggiunta di Lt. 5 di Paramon 80 in 600-1000 litri di acqua.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare la dose di prodotto stabilito nel quantitativo d'acqua necessaria al trattamento, mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
L'ATRAFLO è fitotossico per tutte le colture non indicate in etichetta e soprattutto per il mais tardivo di secondo raccolto. Sono raccomandati in tal caso trattamenti al mais localizzati sulle file e non in pieno campo.

Avvertenze: Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es.: bietola, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
AMONN FITOCHIMICA SPA - Bolzano - via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
CHEMIA SPA - Stabilimento di S. Agostino (FE) - Strada Statale 255 - km. 46

Registrazione N. 5486 del 3.10.1983 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 20

AMONN FITOCHIMICA SPA
BOLZANO, VIA PIAVE 2

5504

BAYCOR Z. f.

FUNGICIDA ORGANICO

per trattamenti liquidi su pomacee, drupacee ed ortaggi

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Baycor Z.f. contengono:
g 8 di bitertanolo puro
g 67,5 di ziram puro
coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Si raccomanda l'uso di maschere durante l'impiego del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose bronchite.

Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pomacee (melo e pero): contro ticchiolatura con azione collaterale contro mal bianco del melo: 0,25% (250 g in 100 lt d'acqua) eseguendo gli interventi ad intervalli di 7-8 giorni a partire dalla fase di apertura delle gemme fino alla fase di frutto-noce e successivamente ad intervalli di 8-12 giorni in dipendenza dell'andamento climatico. Il prodotto è particolarmente indicato per frutteti misti.

Drupacee (pesco, susino, ciliegio, albicocco e mandorlo): contro monilia: 0,2-0,25% (200-250 g in 100 lt d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti, prima, durante e dopo la fioritura, ripetendoli alla comparsa dei primi sintomi della malattia ad intervalli di 6-8 giorni impiegando la dose più elevata e gli intervalli più brevi nei periodi climatici più favorevoli allo sviluppo della malattia.

Contro oidio con buona azione collaterale contro bolla, corineo, fusicoccum e cytospora: 0,15-0,2% (150-200 g in 100 lt d'acqua) effettuando trattamenti preventivi con inizio alla fase della scamiciatura dei frutti alla cadenza di 7-10 giorni circa; in caso sia necessario intervenire con infezione in atto, elevare la dose allo 0,22% (220 g in 100 lt d'acqua).

Ortaggi (fagiolo, zucchino, cetriolo): contro antracnosi, mal bianco, ruggine e peronospora: 0,2% (200 g in 100 lt d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti ad intervalli di 7-8 giorni, effettuando il primo all'inizio dell'attacco.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il Baycor Z.f. può essere miscelato con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: solo le varietà di pero Spadona, Gentilbianca, Gentilona, Cannellina, si sono dimostrate sensibili allo ziram e non devono essere trattate con Baycor Z.f.

Nocività: evitare che gallinacei ed equini pascolino nei campi trattati per una settimana dopo il trattamento.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto della frutta e 14 giorni per gli ortaggi.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: I.R.C.A. - Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5504 del 3.10.1983

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

g

5550

ARLYFAR

AFICIDA SELETTIVO A RAPIDA AZIONE

attivo anche contro gli afidi resistenti

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono:
— Pirimicarb puro . . . . . . gr. 23
— Disperdenti bagnanti . . . . q. b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
Conservare la confezione ben chiusa;
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
Non contaminare alimenti, bevande e corsi d'acqua;
Non operare contro vento;
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterosi).

Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto.
Atropina solfato (mg2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

AVVERTENZA: Sentire un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: L'ARLYFAR è un aficida a base di Pirimicarb, principio attivo appartenente al gruppo delle Pirimidine carbammate. E' adatto alla lotta contro tutte le specie di afidi, anche quelli resistenti agli esteri fosforici. E' di rapido effetto, ha una buona azione translaminare (si trasferisce da una pagina all'altra della foglia) e fumigante, ma senza odori sgradevoli, e colpisce anche gli afidi nascosti e protetti nelle foglie accartocciate.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: dosi per 100 litri di acqua:
Frutticoltura: su pesco e susino contro l'afide verde del pesco gr. 100-150.
Orticoltura: su patata, fava, pomodoro, contro gli afidi gr. 200.
Floricoltura: in pieno campo e in serra contro tutte le specie di afidi gr. 200.
Per ottenere i migliori risultati si raccomanda di curare molto bene l'irrorazione, cercando di bagnare anche la vegetazione nascosta. Si può impiegare qualsiasi irroratrice ma, in caso di atomizzazione, si consiglia di impiegare la dose di 150 gr/hl di soluzione. Con macchine a spalla o a moto munite di lancia a mano si potranno impiegare 100 gr/hl nelle infestazioni normali e agli inizi della vegetazione, 150 gr/hl per forti infestazioni o con colture molto fitte.
Quando si ricorre agli automezzi è consigliabile proteggersi il volto con una comune maschera.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': L'ARLYFAR è compatibile con tutti gli anticrittogamici; si consiglia però di eseguire una prova preventiva di miscelazione per accertare l'effettiva compatibilità dei coformulanti. Non è miscelabile con polisolfuri e poltiglia bordolese.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. E' tossico per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

field farm s.r.l.
Via S. Pietro, 2 66010 TOLLO (Chieti)
Officina di produzione: SARIAF S.P.A. - Via S.Silvestro, 1 48018 FAENZA (RA)

Registrazione Nr. 5550 del 21 - 01 - 84 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO KG.1**

5555

FENTAMON® P.B.

I CLASSE

VELENO

POLVERE BAGNABILE - Fungicida per la lotta contro la Cercospora della barbabietola.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Fentin idrossido puro g 18.
Coformulanti, bagnanti, disperdenti ed inerti: quanto basta a 100 grammi.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Evitare di respirarne i vapori. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole di calce viva). — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: Cefalea occipitale continua o parossistica - ronzii auricolari - iperacusia - vertigini - rachialgia - dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra - ritenzione urinaria - insufficienza respiratoria e di circolo - interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie o paralisi) - dermatosi.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO
Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando - in relazione alla via di contaminazione - abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale - terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE
Il FENTAMON® P.B. è un fungicida studiato per la lotta contro la cercospora della barbabietola (cercospora bieticola).

MODALITA' D'IMPIEGO
Contro la Cercospora della barbabietola impiegare Kg 1,2-1,8 di FENTAMON® P.B. per ettaro: la dose massima si utilizza solamente per attacchi gravi. Il FENTAMON® P.B. nella lotta contro la Cercospora della barbabietola si usa generalmente per 2-3 trattamenti alla distanza di non più di 3 settimane a seconda dell'andamento stagionale. Le dosi unitarie, le concentrazioni ed il numero dei trattamenti vanno pertanto adeguati alla precocità della coltura, alla suscettibilità della varietà, alla virulenza degli attacchi. I trattamenti devono avere carattere relativamente preventivo e vanno iniziati a cominciare da metà giugno, comunque non prima della comparsa dei sintomi dell'infezione della malattia (macchie sulle foglie). Il FENTAMON® P.B. si può distribuire con i normali mezzi meccanici, quali pompa a pressione (a mano, a spalla, a motore), idropneumatiche ed atomizzatori.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'
Il FENTAMON® P.B. non è miscibile con prodotti emulsionabili o emulsionanti, ne' con concimi fogliari (eccetto AXAN). Il FENTAMON® P.B. è miscibile con Afidamon.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI PER LA FAUNA UTILE
Il FENTAMON® P.B. è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Pieve 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N. 5555 del 12.1.84 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg 1-10

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

5566

DISERBANTE SELETTIVO PER CEREALI

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare
con prudenza

COMPOSIZIONE

- Ioxynil estere ottanoico puro g 14.5
- Mecoprop estere butossietanolico puro g 48
- Emulsionanti e solventi q.b.a g 100

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

UNION CARBIDE ITALIA S.p.A.
Via Durini 28
20122 Milano
Tel.: 77 571
Telex: 311 068 ucimi

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.
SINTOMI D'INTOSSICAZIONE
Casi lievi sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, faccia rossa.
Casi gravi sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea
Casi molto gravi sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.
CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO
Primo soccorso mettere subito il paziente in stato di assoluto riposo in luogo fresco. Togliere ed isolare gli indumenti contaminati Lavare pelle e capelli con acqua e sapone nel caso in cui siano stati a contatto con l'erbicida Se il paziente riesce a bere, somministrargli generosamente acqua o the, ma non latte Per i pazienti in coma aggiungere glucosio al 5%
L'iperpiressia va combattuta raffreddando il corpo del paziente (togliere gli indumenti, portare l'infortunato in luogo fresco, applicare compresse bagnate di alcool). Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato Come sedativi si possono adoperare, a piccole dosi, la cloropromazina (25 mg) e la promazina (50 mg), ma tali farmaci possono provocare un aumento dell'ipertermia.
In caso di ingestione lavanda gastrica con carbone attivo adsorbente oppure con soluzione al 5% di bicarbonato di sodio Purgare con solfato di sodio Durante il trasporto in ospedale il paziente deve rimanere immobile e tranquillo (eventualmente con l'impiego dei sedativi già ricordati)
Si somministreranno liquidi per via parenterale e si praticherà respirazione artificiale Ossigenoterapia.
In ospedale, in base alla determinazione degli elettroliti o ad altri controlli ematici, si potrà regolare esattamente il bilancio elettrolitico
ALCUNE CONTROINDICAZIONI morfina, atropina, barbiturici, purganti oleosi.

CARATTERISTICHE

Il **CERTROL H** può essere impiegato su ogni varietà di cereali: grano, orzo, segale, alle dosi e nelle condizioni raccomandate. Non trattare in nessun caso cereali già traseminati con leguminose.

Il **CERTROL H** possiede un ampio periodo di intervento ed è efficace contro le seguenti malerbe, di difficile controllo: Bifora, Gallio, Matricaria, Stellaria, Polygonum, Veronica.
Il **CERTROL H** controlla altresì infestanti comuni quali: Fiordalisi, Capsella, Chenopodio, Papavero, Fumaria, Veccia, Ranuncoli.
Il **CERTROL** distrugge allo stadio di plantula il Crisantemo segetum e la Galeopsis tetrahit.

EPOCA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento può essere eseguito durante la fase di accestimento sino a fine levata. Come caso limite si può già intervenire allo stadio di 4 foglie del cereale.
Trattare di preferenza quando le malerbe sono giovani in fase di attiva crescita, non aspettare che si formino i bottoni fiorali perchè sarebbe troppo tardi.
I trattamenti più vantaggiosi sono su infestanti giovani: esse non hanno ancora avuto modo di nuocere al cereale e sono più facili da distruggere.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Con temperatura tra 15-20°C .... impiegare 2,5 litri/ha
Con temperatura tra 8-14°C e per trattamenti tardivi dalla fine dell'accestimento sino a fine levata .... impiegare 2,5-3 litri/ha
Quantitativo di acqua: Se il trattamento è effettuato in uno stadio precoce e le malerbe non sono ancora riparate dal cereale, distribuire la dose di **CERTROL H** con 250-400 litri/ha. Se il trattamento è tardivo e le malerbe sono sviluppate e riparate dal cereale, impiegare 400-600 litri/ha.
Non trattare se la temperatura all'ombra è superiore ai 25°C. Effettuato il trattamento lavare abbondantemente l'apparecchiatura. Le parti in legno o in gomma che fossero venute a contatto con la soluzione erbicida non potranno venire in alcun modo bonificate e perciò andranno adibite al solo diserbo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il **CERTROL H** è compatibile con la generalità dei diserbanti.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Officina di produzione:

DIACHEM S.p.A. – Albano S. Alessandro (Bergamo)

Registrazione Ministero Sanità N. 5566 del 23-11-1983

DA NON VENDERSI SFUSO

Volume litri 1

CERTROL ® è un marchio registrato della Union Carbide Agricultural Products Company Inc., USA.
85820

5607

CLASSE Iª

VELENO

CARBOFURAN AMONN TALINEX

INSETTICIDA MICRO GRANULARE - **Da usarsi per la lotta contro i parassiti animali del terreno nella coltura della bietola da zucchero.**

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Carbofuran p.a. puro g 4,5;
Coadiuvanti ed interti quanto basta a g 100

ATTENZIONE! **Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3.8.1968 n.1255.**

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare il prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici — Conservare la confezione ben chiusa — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua — Evitare di respirarne i vapori — Non operare contro vento — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto, (per es. interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva) — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterosi).

Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispena, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi o sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

CARATTERISTICHE
Il CARBOFURAN AMONN TALINEX è un insetticida ad azione sistemica. Protegge le barbabietola dai principali insetti che danneggiano le foglie come l'altica, l'atomaria, gli afidi, la pegomia ed ha anche proprietà nematocida. Esso non trasmette alcun odore e sapore alle piante che crescono sul terreno trattato.

MODALITA' D'IMPIEGO
Trattamento parziale del terreno: distribuire 10-13 kg/ha di prodotto alla semina lungo le file a mezzo di microgranulatori.
Trattamento generale del terreno: distribuire 45-65 kg/ha di prodotto uniformemente a mezzo di spandiconcime ed interrandolo successivamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con altri antiparassitari, ma può essere distribuito in miscela con concimi granulari.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per il bestiame e per i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

Registrazione N. 5607 del 6.12.83 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto kg 1-5-10-20-25

5630

ANTICASCOLA L

Fitormone liquido per mele e pere

COMPOSIZIONE:

NAA puro	gr. 2,45
Diluenti e disperdenti q.b. a .	gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE:

L'ANTICASCOLA L è un fitoregolatore in formulazione liquida appositamente studiato per prevenire la cascola prematura delle mele e pere. In condizioni ottimali di temperatura od umidità manifesta la sua azione entro poche ore dal suo impiego.

MODALITÀ D'IMPIEGO:

Pero - Varietà precoci: 70 cc. per 100 litri di acqua, 7 giorni prima della raccolta.
Varietà estive 80 cc. per 100 litri d'acqua, 7-10 giorni prima della raccolta.
Varietà autunnali 100 cc. per 100 litri d'acqua, 10 giorni prima della raccolta.
Varietà invernali 100-130 cc. per 100 litri d'acqua, 1° trattamento fine agosto, 2° trattamento dopo 15 giorni circa.

Melo - Varietà precocissime: 40-60 cc. per 100 litri di acqua, 8-15 giorni prima della raccolta.
Varietà precoci 60-70 cc. per 100 litri d'acqua, 10-18 giorni prima della raccolta.
Varietà normali 70-85 cc. per 100 litri d'acqua, 10-20 giorni prima della raccolta.
Varietà tardive 85-100 cc. per 100 litri d'acqua, 10-20 giorni prima della raccolta.
Irrorare la vegetazione preferibilmente verso sera bagnando uniformemente l'intera chioma delle piante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ:

Da non miscelare con altri antiparassitari.
Sospendere i trattamenti almeno 5 giorni prima della raccolta.
« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DEMETRA ITALIA s.r.l.
Via S. Vitale, 5 - SESTO IMOLESE di Imola (Bo)

Officina di produzione: CIFO - S. Giorgio di Piano (Bo)

Reg. Ministero Sanità n. 563 del 6-12-1983

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso netto Kg.**

5659

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

LIQUIDO EMULSIONABILE - diserbante selettivo per la barbabietola da zucchero e lo spinacio.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cycloate p.a. puro 72,7 g
Tensioattivi e solventi q.b. a 100 g
Contiene «XILOLO»

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione e per contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi di intossicazione
Nausea - vomito - diarrea - sciallorrea - dispnea - lacrimazione - tremori - convulsioni - miosi - bradicardia - edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima condizionati al caso
Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio - lavaggio cutaneo se vi fu contatto - atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini. - Ossigenoterapia se vi è cianosi. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al Centro di rianimazione.
Controindicazioni
Ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

CARATTERISTICHE
L'EXILIN controlla una vasta gamma di infestanti graminacee ed a foglia larga quali: Lolium sp., Echinochloa spp (Giavone), Digitaria spp. Avena selvatica, Solanum spp., Chenopodium album, Portulaca oleracea, Amaranthus retroflexus, Capsella bursa pastoris, Setaria spp., Lamium spp., Cyperus spp., Dactylis glomerata, Sorghum halepense (da seme).
Il prodotto una volta incorporato nel suolo agisce contro le malerbe principalmente nella fase di germinazione, rispettando la coltura.

MODALITA' DI IMPIEGO
L'EXILIN va impiegato in pre-semina della coltura con incorporamento nel terreno ben livellato e sminuzzato alle seguenti dosi:
— su terreni leggeri e sabbiosi : 5 lt/ha
— su terreni argillosi e ricchi di humus: 7 lt/ha.
Il prodotto va distribuito con una quantità di acqua che varia da 350 a 900 lt per ettaro a pressioni non oltre lo 5 atmosfere. L'incorporamento alla profondità di ca. 5-8 cm deve essere eseguito entro la prima mezz'ora dalla distribuzione, con erpici a dischi o a denti o zappe rotanti. Usando erpici è bene eseguire due passaggi incrociati, dopo di che può essere effettuata la semina. Per lo spinacio è necessario eseguire, dopo la semina, una rullatura del terreno per favorire l'emergenza.
In presenza delle colture è possibile una leggera lavorazione del terreno senza superare mai la profondità di incorporamento.
Lavare accuratamente gli utensili agricoli impiegati per il diserbo, se possibile usare una pompa esclusivamente per diserbare.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Diluire il prodotto nella quantità di acqua necessaria al trattamento mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
L'EXILIN non può essere miscelato con fertilizzanti, insetticidi ed anticrittogamici.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Far trascorrere 110 giorni dal trattamento prima di seminare la carota.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N. 5659 del 28.12.83 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto lt. 1-5-10

5660

CLASSE IV

LENAMON 80 P.B.

POLVERE BAGNABILE

Diserbante per la barbabietola da zucchero e da foraggio e per lo spinacio

CONSOZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Lenacil p.a. puro g 80

Bagnanti, disperdenti ed inerti q.b. a g 100

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il LENAMON 80 P.B. combatte le comuni infestanti da seme in fase di pre- e post-emergenza. Sfuggono al controllo: Amaranthus, Galium, Veronica e Euphorbia e tutte le infestanti perenni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Pre-semina con interramento ad erpice leggero alla profondità di 2-3 cm: terreni di medio impasto Kg 0,75/ha, terreni pesanti Kg 1/ha.
Pre-semina: Kg 1/ha
Post-emergenza: Kg 0,8 - 1/ha in miscela con il BEDIFAM che completandolo ne aumenta la persistenza. In questo caso la bietola deve avere emesso, al momento del trattamento, le prime due foglie vere. Per lo spinacio non superare mai le dose di Kg 1/ha.
E' sconsigliabile l'impiego del LENAMON 80 P.B. nei terreni sciolti o sabbiosi e torbosi.

Avvertenze per l'impiego: E' essenziale il buon funzionamento degli apparecchi usati per il diserbo e l'uniformità della distribuzione. Evitare di ripassare sul terreno già trattato.
Data la scarsa solubilità in acqua è necessario provvedere, se entro due settimane non sono caduti 10-15 mm di pioggia, ad una irrigazione a pioggia.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta. A causa della notevole persistenza nel terreno del LENAMON 80 P.B., il terreno trattato può essere destinato solo alla coltura della barbabietola e dello spinacio.

COMPATIBILITA'

Il LENAMON 80 P.B. non è miscibile con sostanze e/o prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 30 gg. prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

AMONN FITOCHIMICA S.p.A. - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N. 5660 del 28.12.83 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg 1-5

5664

CLASSE I

VELENO

RODAMON® ES

ESCA RODENTICIDA PRONTA PER L'USO E PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE IN APERTA CAMPAGNA

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Chlorophacinone p.a. puro gr. 0,006
Supporti vegetali, conservanti, coloranti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Evitare di respirarne i vapori. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva). — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per ingestione.

Sintomi di intossicazione: emorragie cutanee e delle mucose - ematuria. Neutralizza la vitamina K, per cui a livello epatico si blocca la formazione di protombina. La sintomatologia è pertanto prevalentemente emorragica.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
vitamina K, vitamine C e P, consigliabili emotrasfusioni in casi gravi.

CARATTERISTICHE:

Il RODAMON® ES è un'esca rodenticida a base di cereali, molto adatta per l'impiego in campo aperto, efficace contro le più comuni specie di ratti e topi.

Questi rodono graminacee e leguminose da foraggio, così nei campi di cereali si formano chiazze nude. Attaccano tuberi di patate, radici di bietole, di rape e non risparmiano nemmeno la corteccia delle radici e del colletto delle piante da frutto. Causano danni tracciando gallerie sottorraneee in ogni direzione. Anche sotto la neve continuano la loro azione scavatrice e roditrice. I roditori, una volta ingerita una sufficiente quantità di esca, muoiono per emorragia interna senza dolorosa agonia.

Il RODAMON® ES non provoca nei ratti alcuna repulsione né per l'esca né per il veleno. Essi continueranno a cibarsene finché lentamente ma sicuramente giungeranno a morte.

MODALITA' DI IMPIEGO

Distribuire il RODAMON® ES nei luoghi più battuti dai roditori in quantità abbondante - gr. 200-500 per luogo; in modo che tutti i roditori possano cibarsene.

L'esca viene posta in luoghi un po' protetti dalle intemperie, consigliamo di coprirla con una scatola rovesciata ed alzata da un lato, oppure di disporla nel box appositamente studiati a tale scopo. Controllare di tanto in tanto se l'esca è stata completamente mangiata ed in tal caso rinnovarla.

Non toccare mai l'esca con le mani perché i ratti ed i topi fiutano e diffidano di ogni odore estraneo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

RISCHI DI NOCIVITA'

Il RODAMON® ES è tossico per gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

Registrazione N.5664 del 28.12.83 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 1-5-10

5665

CLASSE III

NEBUTRIN® N

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

POLVERE BAGNABILE. Diserbante selettivo di pre-emergenza per i cereali.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
20 gr. di Terbutrin puro
30 gr. di Neburon puro
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il NEBUTRIN® N è un erbicida specifico per il diserbo dei cereali in pre-emergenza della coltura e delle infestanti. Il NEBUTRIN® N combatte efficacemente infestanti graminacee e dicotiledoni quali Alopecurus, Apera spica-venti, Poa, Echinocloa, Atriplex, Ambrosia, Capsella, Oxalis, Papaver, Polygonum, Portulaca, Sonchus, Chamomilla, Stellaria, Veronica, Lamium, mantenendo una perfetta selettività.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Frumento tenero, segale, orzo, avena - dose media Kg 4-6 per ettaro, distribuiti con almeno 500 lt d'acqua per ettaro. Usare la percentuale più bassa nei terreni sciolti e quella più alta nei terreni più pesanti.
Il trattamento con NEBUTRIN® N va effettuato dopo la semina dei cereali prima dell'emergenza dei cereali e delle infestanti. Non ripetere il trattamento prima di 6 mesi.
L'efficacia erbicida è migliore su terreno ben lavorato, privo di zolle, con elevato grado di umidità del suolo al momento del trattamento o dopo la sua esecuzione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il NEBUTRIN® N è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano 12
Via Siemens 12
Registrazione N.5665 del 28.12.83 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg 1 - 5

5675

CLASSE III

LINURON 50 AMONN

ATTENZIONE: DA MANIPOLARE CON PRUDENZA

POLVERE BAGNABILE

Diserbante selettivo per le colture di cereali, mais, patata, carota, sedano, finocchio, prezzemolo, rapa, fagiolo, fagiolino e fragola.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
50 gr. di Linuron puro
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Irritante per la cute. L'ingestione può provocare bruciori gastroesofagei, vomito, diarrea, subittero, albuminuria ed ematuria.

Terapia

Per le dermatosi pomate cortisoniche od antistaminiche. Non è consigliabile la lavanda gastrica. Si consigliano fleboclisi glucosate, potassio, epato-protettori.

CARATTERISTICHE

Il LINURON 50 AMONN è un diserbante selettivo per la distruzione delle specie erbacee annuali infestanti le colture di cereali, mais, patate, carote, sedano, finocchio, prezzemolo, rapa, fagiolo, fagiolino e fragola ed esplica la sua azione sia per via fogliare sia per via radicale.

Le infestanti controllate sono: l'Amarantus retroflexus, Anagallis, Capsella bursa pastoris, Chenopodium spp., Galinsoga parviflora, Digitaria sanguinalis, Echinocloa crus-galli, Euphorbia spp, Matricaria chamomilla, Mercurialis annua, Papaver, Plantago maior, Polygonum convolvulus e persicaria, Portulaca oleracea, Ranunculus, Senecio, Setaria spp, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Stellaria media, Veronica spp.

Il LINURON 50 AMONN non controlla le erbe perennanti con apparato radicale bulboso, profondo e rizomatoso come Cynodon dactylon, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Equisetum arvense, Scirpus maritimus, Sorghum halepense, Taraxacum officinalis.

La persistenza del LINURON 50 AMONN è relativamente breve (2-3 mesi) alle normali dosi di impiego e non vi sono pertanto pericoli di effeti residui per le colture che seguono la rotazione.

MODALITA' DI IMPIEGO:

Dosi per ettaro da distribuire in 400-600 litri di acqua.

Frumento, orzo, segale, avena, mais: applicare solo in pre-emergenza, durante o subito dopo la semina (2-3 giorni) alla dose di 2 Kg/ha. La dose può essere ridotta a Kg 1-1,5/ha in terreni leggeri, mentre dovrà essere aumentata fino a Kg 2,5 per ettaro, per terreni pesanti. Seminare il mais a profondità non inferiore a 5 cm e provvedere che sia ben ricoperto.

Patata: intervenire in pre-emergenza fra la semina e l'emergenza impiegando, secondo il tipo di terreno, la dose di Kg 1,5-3/ha.

Carota: in pre-emergenza della coltura e prima della germinazione dei relativi semi che devono essere ben coperti dal terreno, applicare, secondo il tipo di terreno, la dose di Kg 1-2,5/ha. In post-emergenza, quando le carote hanno differenziato il secondo palco fogliare (4 foglie vere) Kg 1,5-2/ha.

Sedano, finocchio, prezzemolo: in pre-emergenza per terreni di medio impasto, subito dopo la semina alla dose di Kg 1,5-2,5/ha, oppure in post-emergenza (escluso prezzemolo) dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto alla dose di Kg 1-2/ha.

Rapa: a partire da 8-10 giorni dal trapianto in pieno campo impiegare la dose di Kg 1,5-2/ha.

Fagiolo, fagiolino: in pre-emergenza o subito dopo la semina della coltura impiegare secondo il tipo di terreno la dose di Kg 0,8-1,5/ha.

Fragola: si impiega su tutta la superficie a partire dal secondo anno d'impianto, poco prima del risveglio vegetativo primaverile alla dose di Kg 1,5-2,5/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua aggiungendo poi la quantità di acqua necessaria agitando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il LINURON 50 AMONN non deve essere miscelato con insetticidi fungicidi e concimi.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri erbicidi deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2
OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano, Via Siemens 12

Registrazione N.5675 del 28.12.83 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg 1-5

5713

BASEV

Polvere bagnabile
Insetticida polivalente

Composizione:

100 gr. di prodotto contengono:
Carbaryl puro (esente da β-naftolo) . g. 47,5

Disperdenti, supporti
e coadiuvanti . . . . q.b. a g. 100

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

BASLINI

Baslini - Industrie Chimiche S.p.A.

Telefono (02) 7782
Via G. Serbelloni, 12
20122 Milano

Stabilimento produttore:
Baslini Ind. Chim. S.p.A. Treviglio (BG)

Registrazione N. 5713 del 2-2-84 del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere, ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima o condizionati al caso.

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

AVVERTENZA

Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE E INDICAZIONI

BASEV è indicato su pomacee, pesco, garofani in pieno campo, vite, cavoli (cavolaia), patata, agrumi, olivo.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

POMACEE: g. 125-150/hl contro, carpocapsa, capua, ca-coecia, eulia.
PESCO: g. 200-250/hl contro tignola orientale.
CAVOLI: g. 150-200/hl contro cavolaia.
PATATE: g. 150-200/hl contro dorifora.
GAROFANI: g. 200-250/hl contro tortrice (in pieno campo).
VITE: g. 150-200/hl contro tignola.
OLIVO: g. 150-200/hl contro tignola.
AGRUMI: g. 150-200/hl contro tignola.

EPOCA DI APPLICAZIONE

Intervento alla prima comparsa dei parassiti ripetendo i trattamenti in corrispondenza di nuovi attacchi.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

BASEV è miscibile con gli insetticidi e funghicidi usuali, esclusi i prodotti alcalini in genere (poltiglia bordolese, polisolfuri ecc.).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici: qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 7 giorni.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

5715

/

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento per ingestione e per contatto.
Sintomi di intossicazione: (desunti da animali da laboratorio a rapido recupero). Sedazione, atassia, andatura irregolare, deambulazione irrequieta con tremori occasionali e convulsioni.
Consigli terapeutici:
In caso di contaminazione cutanea: togliere immediatamente gli abiti contaminati e lavare abbondantemente la pelle contaminata con acqua e sapone. Trattamento sintomatico.
In caso di contaminazione oculare: subito lavare abbondantemente con acqua gli occhi per almeno 15 minuti.
In caso di ingestione: provocare il vomito e procedere, con debita cautela, a lavanda gastrica. Se il paziente è incosciente, dopo averlo intubato. Somministrare per via iniettiva, sedativi del sistema nervoso centrale, preferibilmente Diazepam, se si manifestano convulsioni. Sostenere opportunamente la respirazione, controllando ed aiutando le funzioni cardiovascolari e renali. Nei casi gravi o sospetti gravi, ricovero a un Centro di Rianimazione, e consultare comunque un Centro Antiveleni.

COMPATIBILITÀ
'CYMBUSH' 5L è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi di uso comune.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
È tossico per gli insetti utili e per i pesci.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
pisello: 3 giorni
fragola, fagiolino, broccolo, cavolfiore: 7 giorni
arance, pesche, ciliegie, pere, cavolo, cipolla, patata: 14 giorni
pomodoro, barbabietola da zucchero: 21 giorni
uva, mais, frumento: 28 giorni
tabacco: 60 giorni
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

DA NON VENDERSI SFUSO **ml 10**

ICI Solplant SpA

'CYMBUSH' 5 L

Insetticida liquido emulsionabile ad ampio spettro di efficacia.

COMPOSIZIONE
Cipermetrina pura . . . . g 5
Bagnanti, emulsionanti, solventi. . . . q.b. a g 100
(contiene metilglicole)

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione:
CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 5715 del 12-1-1984
'CYMBUSH' Marchio registrato Imperial Chemical Industries PLC

Le caratteristiche principali di 'CYMBUSH' 5L sono:
- azione per contatto e ingestione su una vasta gamma di insetti parassiti
- potere abbattente e residuo
- effetto repellente
- non imbratta la vegetazione
- sicurezza d'impiego

MODALITÀ DI IMPIEGO
Epoca: infestazione in atto.
Metodo: irrorazione accurata ed uniforme di tutta la pianta da difendere.
Mezzi: qualsiasi mezzo irrorante, compresi gli atomizzatori.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

COLTURA	PARASSITI	DOSE (ml/hl)
DRUPACEE (Pesco, ciliegio)	**Afidi:** su foglie non accartocciate	75-100
	Anarsia: Cidia, lepidotteri in genere	100-150
	Cocciniglie: contro le neanidi in trattamenti estivi	100-150
	Tripidi, mosca	100-150

Nota: per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari **si consiglia** un trattamento con **'CYMBUSH' 5L a 100-150 ml/ettolitro** in miscela con **Olio bianco** (Albolineum) **a 1,5 lt/ettolitro, allo stadio vegetativo di bottoni rosa**

COLTURA	PARASSITI	DOSE (ml/hl)
POMACEE (Pero)	Psilla	
	1° trattamento di fine inverno contro adulti svernanti	100-150
	2° trattamento sulle uova mature prodotte dalla 1ª generazione	150 all'apparire delle prime neanidi 200 con inizio melata
	3° trattamento (facoltativo) contro la 3ª generazione	200-300
	Afidi: su foglie non accartocciate	75-100
	Fillominatori (Cemiostoma, Litocolletis): contro la 1ª generazione allo stadio di uova mature, prima della comparsa delle mine	100-150
	Ricamatrici estive e lepidotteri in genere	100-150
	Carpocapsa	100-150
	Cocciniglie: contro le neanidi in trattamenti estivi	100-150

Nota: per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari **si consiglia** un trattamento con **'CYMBUSH' 5L a 100-150 ml/ettolitro** in miscela con **Olio bianco** (Albolineum) **a 2-3 lt/ettolitro allo stadio compreso tra le orecchiette di topo e la differenziazione dei mazzetti.**

COLTURA	PARASSITI	DOSE (ml/hl)
ORTAGGI IN CAMPO E SERRA (Cavolo, broccolo, cavolfiore, fagiolino, pisello, pomodoro, cipolla, patata)	**Dorifora**	100-125
	Nottue (allo scoperto)	100-150
	Mosca bianca	75-100
	Afidi	100-150
	Cavolaia, tripidi, piralidi	100-150
VITE	**Tignola e tignoletta**	
	contro la 1ª generazione, se necessario	100-150
	contro la 2ª generazione	100-150
	Cocciniglie e Sigaraio	100-125
FRAGOLA	**Nottue** (allo scoperto)	100-150
	Afidi	75-100
AGRUMI (Arancio)	**Afidi**	75-100
	Cocciniglie contro le neanidi in trattamenti estivi	100-150
	Mosca degli agrumi	100-150
	Mosca bianca	75-100
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	**Altica**	1000-1200 cc/ha
	Afidi	500-600 cc/ha
	Nottue (allo scoperto)	600-1000 cc/ha
	Cleono, Lisso, Cassida	800-1000 cc/ha
TABACCO	**Afidi**	75-100
	Mosca bianca	75-100
	Nottue (allo scoperto), **Tripidi**	100-150
MAIS	**Afidi**	75-100
	Piralide	100-150
FRUMENTO	**Afidi, Lema**	75-100

Tutte le dosi si riferiscono a trattamenti a volume normale.
Per trattamenti a volume ridotto mantenere invariata la dose per ettaro calcolata per trattamenti a volume normale.

Avvertenze
Impiegare le dosi più alte in caso di forti infestazioni
Bagnare accuratamente tutte le parti della pianta
Contro la Psilla e sulle colture orticole si consiglia di aggiungere il bagnante 'Agral' in ragione di ml 50 ogni ettolitro di emulsione
NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA
Conservare a temperatura superiore a 5°C

Da non applicare con mezzi aerei

5727

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

POLVERE BAGNABILE - Insetticida per la lotta contro i parassiti in frutticoltura, viticoltura, fragolicoltura, agrumicoltura, olivicoltura, bieticoltura, maiscoltura ed orticoltura.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triclorfon p.a. puro g 49
Bagnanti, disperdenti ed inerti q.b. a 100 grammi.

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
– Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. – Conservare la confezione ben chiusa. – Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. – Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. – Non operare contro vento. – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

MODALITA' D'IMPIEGO E CAMPI D'IMPIEGO
Dosi per 100 litri d'acqua:
Frutticoltura: ciliegio: contro la mosca 150 g, pesco: contro la cidia e l'anarsia 300-400 g. Viticoltura: contro tignola e tortricidi 150 g, contro Eulia pulchellana 250-400 g. Fragolicoltura: contro i tortricidi (Pandemis dumetana, Argyroploce lacunana, Choristoneura lafauryana) 300 g. Agrumicoltura: contro la tignola, la cimice verde e gli adulti della mosca della frutta 300-500 g. Olivicoltura: contro la tignola e la mosca 300-500 g. Bieticoltura: contro le nottue (Mamestra spp., Agrostis spp., ecc.) 200-250 g, contro la mosca 150-200 g. Maiscoltura: contro la seconda generazione della piralide 200-250 g. Orticoltura: sedano, cipolla aglio: contro la mosca 300-500 g.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'
Il FONEX® è miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra. Non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, calce, ecc.).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico se irrorato su fiori aperti.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

Registrazione N.5727 del 2.2.84 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Contenuto kg 1-5-10

5735

CLASSE IV

POLVERE BAGNABILE - Fungicida a largo spettro d'azione contro le malattie fungine in frutticoltura (melo, pero, pesco) viticoltura, orticoltura (sedano, patata, pomodoro, barbabietola da zucchero, fagioli, cavoli, melanzane, lattuga, cipolla, peperone, fragola), piante ornamentali e floricole (rosa, garofano, crisantemo, geranio, iris, zinia) in pieno campo.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Clorotalonil p.a. puro g 75
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a g 100.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.

CARATTERISTICHE
Il DOROSAN è un fungicida a largo spettro d'azione che consente di prevenire e combattere contemporaneamente diverse malattie delle piante coltivate come peronospora, muffa grigia, ticchiolatura, cercosporiosi, ruggine, marciume bruno, alternariosi, nerume, septoriosi, cladosporiosi, bolla, vaiolatura, antracnosi, marciume dei frutti, fusariosi, moniliosi, cancro dei rami delle drupacee, rizottoniosi. E' dotato di azione residua e resiste al dilavamento assicurando la protezione delle colture anche in condizioni difficili.

MODALITA' D'IMPIEGO.
Impiegare il prodotto alla dose di 150-250 g per 100 litri d'acqua. Prevenire le malattie bagnando bene le piante da proteggere con la poltiglia e ripetendo il trattamento ad ogni necessità in relazione al calendario di incubazione della malattia da combattere. Sulle piante di difficile bagnabilità è consigliabile l'aggiunta di g 30 per 100 litri d'acqua di BAGNANTE AMONN alla poltiglia.

PREPARAZIONE DELL POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri). La miscela con formulati liquidi non è sempre consigliabile.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può provocare fenomei di rugginosità su alcune varietà di melo Golden Delicious e su altre a buccia rossa. Su alcune colture da fiore più delicate è consigliabile eseguire saggi preliminari prima di trattare l'intera coltura.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
AMONN FITOCHIMICA SPA - Bolzano - via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
AMONN FITOCHIMICA SPA - Stabilimento di Bolzano - via Siemens 12

Registrazione N. 5735 del 27.01.1984 del Ministero della Sanità.

Contenuto kg 1

DA NON VENDERSI SFUSO

AMONN FITOCHIMICA SPA
BOLZANO, VIA PIAVE 2

5736

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

LIQUIDO EMULSIONABILE - Diserbante selettivo contro le avene selvatiche infestanti le colture di grano tenero e duro

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Benzoylprop-etil p.a. puro g 20,43
Tensioattivi e solventi q.b. a g 100
contiene «XILOLO»

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta. Gravi contaminazioni possono provocare letargo, depressione generale e salivazione; se ingerito, irritazione e bruciatura del cavo orale e della gola.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Togliere gli indumenti contaminati e lavare con acqua e sapone la pelle contaminata. Lasciare tranquillo il paziente. Somministrare in caso di ingestione carbone attivato in attesa del medico, che provvederà ad una lavanda gastrica evitando l'aspirazione, o a seconda dei sintomi.
Controindicazioni
In caso di ingestione, non provocare il vomito.

CARATTERISTICHE
L'AVENIX è un diserbante specifico contro le avene selvatiche (Avena ludoviciana, A. sterilis, A. fatua, A. barbata) con qualche azione anche contro Alopecurus myosuroides infestanti le colture di grano tenero e duro, da usarsi in post-emergenza. Assorbito per via fogliare provoca l'arresto della crescita dell'avena infestante che così resta nanizzata ed è poi soffocata per la concorrenza della coltura.

MODALITA' DI IMPIEGO
L'AVENIX si impiega in fase di post-emergenza della coltura e dell'infestante, nel periodo compreso fra lo stadio di inizio levata ed il 1° - 2° nodo palpabile, impiegando 6 lt/ha di formulato. Quando si ha una debole infestazione la dose può essere ridotta a 5 lt/ha, mentre nei casi di infestazioni abbondanti è opportuno aumentare la dose a 7,5 lt per ha. Distribuire la poltiglia diserbante con pompe a media pressione con volume normale in una soluzione pari a 500—600 lt/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Agitare la confezione prima dell'uso e versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
L'AVENIX non è miscibile con i più comuni diserbanti ormonici. Distanziare i trattamenti con questi di almeno 8 giorni.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per uccelli e pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2
OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N. 5736 del 27.1.84 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Lt 1-5-10.

5737

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

LIQUIDO EMULSIONABILE - Insetticida per la lotta contro i parassiti dei fruttiferi, della vite, dei cereali, delle colture industriali, ortive, ornamentali.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Fosalone p.a. puro g 24
Tensioattivi e solventi q.b. a 100 grammi.
Contiene «XILOLO».

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazione muscolare, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

CARATTERISTICHE
L'EXATONE® è un insetticida che agisce per contatto ed ingestione con azione polivalente sui parassiti sottoelencati. La sua efficacia perdura per 2-3 settimane. Esplica anche una certa azione frenante sugli acari.

MODALITA' D'IMPIEGO
Dosi per 100 litri di acqua cc 200-250.
Frutticoltura: Pomacee (melo e pero): contro Afidi, larve ricamatrici e defogliatrici, Carpocapsa, Antonomo; Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo): contro Cydia, Anarsia, Afidi; Agrumi: contro Tignola e Mosca bianca. Vite: contro le Tignole. Colture floreali ed ornamentali in pieno campo: contro Afidi, Nottue, Aleuroididi Tripidi. Barbabietola da zucchero: contro Afidi, Nottue, Cassidi, Cimici. Colture forestali in genere: contro la Processionaria e la Lymantria; Pioppo: contro Saperda, Tarlo vespa, Punteruolo.
Dosi in litri per ettaro: Cereali: 2 l/ha contro Afidi; Barbabietola da zucchero: 1,7 l/ha contro l'Altica, Cleono, Pegomia; Favetta: 2,5 l/ha contro Afidi neri.
Iniziare i trattamenti alla primissima comparsa dei parassiti.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Diluire il prodotto in poca acqua e versare il tutto lentamente e sotto agitazione nel serbatoio della irroratrice contenente la quantità necessaria di acqua o di poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
L'EXATONE® è compatibile con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N. 5737 del 2.2.84 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Lt 1 - 5

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

5739

CLASSE I^A

VELENO

RODAMON® G

ESCA RODENTICIDA - pronta per l'uso per la protezione delle colture agricole in aperta campagna.

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Chlorophacinone p.a. puro g 0,0075
Supporti vegetali, attraenti, conservanti, coloranti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 N. 1255.

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; — Conservare la confezione ben chiusa; — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; — Evitare di respirare i vapori; — Non operare contro vento; — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi; — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi; — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone; — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva); — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento grave per ingestione.
Sintomi di intossicazione : emorragie cutanee e delle mucose - ematuria. Neutralizza la vitamina K, per cui a livello epatico si blocca la formazione di protombina. La sintomatologia è pertanto prevalentemente emorragica.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
vitamina K, vitamina C e P, consigliabili emotrasfusioni in casi gravi.

CARATTERISTICHE
Il RODAMON® G è un'esca rodenticida a base di cereali, idrofuga e pertanto molto adatta per l'impiego in campo aperto, efficace contro le più comuni specie di ratti e topi. Questi rodono graminacee e leguminose da foraggio, così nei campi di cereali si formano chiazze nude. Attaccano tuberi di patate, radici di bietole, di rape e non risparmiano nemmeno la corteccia delle radici e del colletto delle piante da frutto. Causano danni tracciando gallerie sotterranee in ogni direzione. Anche sotto la neve continuano la loro azione scavatrice e roditrice. I roditori, una volta ingerita una sufficiente quantità di esca, muoiono per emoraggia interna senza dolorosa agonia. Il RODAMON® G non provoca nei ratti alcuna repulsione nè per l'esca nè per il veleno. Essi continueranno a cibarsi finchè lentamente ma sicuramente giungono alla morte.

MODALITA' D'IMPIEGO
Distribuire il RODAMON® G nei luoghi più battuti dai roditori in quantità abbondante - gr. 200-500 per luogo, in modo che tutti i roditori possano effettivamente cibarsene. L'esca, non assorbendo l'umidità in quanto idrofuga, non è soggetta a merciume, consigliamo però di coprirla con una scatola rovesciata ed alzata da un lato, oppure di disporla nei box appositamente studiati a tale scopo. Controllare di tanto in tanto se l'esca è stata completamente mangiata ed in tal caso rinnovarla.

Non toccare mai l'esca con le mani perchè i ratti ed i topi fiutano e diffidano di ogni odore estraneo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il RODAMON® G per la sua particolare formulazione e campo d'impiego non è miscibile con altri prodotti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il RODAMON® G è tossico per gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N. 5739 del 2.2.84 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto kg. 10 - 1 - 5

5756

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

Fungicida in polvere bagnabile dotato di azione sistemica e di copertura per la lotta contro le peronospore della vite, del tabacco, del pomodoro e della rosa

COMPOSIZIONE

Benalaxyl puro	g 8
Mancozeb puro	g 65
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. **del** 3.10.85

® Marchio registrato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

GALBEN M 8-65 è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi della vite e Alternaria e Septoria del pomodoro.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE

Peronospora (Plasmopara viticola): g 200-250

Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e, comunque, non più tardi della differenziazione dei grappoli florali (7-8 foglie).
I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe.
Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

TABACCO

Peronospora (Peronospora tabacina): g 250-300
Trattamenti a cadenza fissa quindicinale, iniziando gli interventi a partire dal superamento della crisi di trapianto.
Per evitare le infezioni durante la fase di trapianto, intervenire con un trattamento in semenzaio, alle dosi indicate, 1-3 giorni prima della messa a dimora delle piantine in campo.

POMODORO (solo fino alla prima fioritura)

Peronospora (Phytophthora infestans): g 250-300
Applicazioni in pieno campo a cadenza di 12-14 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.

ROSA

Peronospora (Peronospora sparsa): g 300
Trattare ogni 15 giorni irrorando accuratamente la vegetazione, a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgenza dell'infezione.

Preparazione della sospensione

Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DIVIETI D'IMPIEGO

— DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI
— DA NON IMPIEGARE IN SERRA
— DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità

Il GALBEN M 8-65 può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. È miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione, il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

— Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;
— conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;
— in caso di malessere, ricorrere al medico, mostrandogli questa etichetta;
— durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

Nei casi gravi, ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi, se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA

Consultare un Centro Antiveleni.

5757

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

GALBEN® F 8-50 BLU

Fungicida in polvere bagnabile dotato di azione sistemica e di copertura per la lotta contro le peronospore della vite, della patata, del pomodoro, della cipolla e delle colture ornamentali e da fiori

COMPOSIZIONE

Benalaxyl puro	g 8
Folpet puro	g 50
Bagnanti, disperdenti, coloranti e supporti inerti	q.b. a g 100

GRUPPO MONTEDISON
FARMOPLANT
Fitofarmaci Montedison

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento **BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.** Treviglio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità N. 5757 del 2.2.1984

® Marchio registrato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Il GALBEN F 8-50 BLU è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare una elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.
La presenza di Folpet attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Botrytis.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE

Peronospora (Plasmopara viticola): g 200-250
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e, comunque, non più tardi della differenziazione dei grappoli florali (7-8 foglie).
I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe.
Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

POMODORO

Peronospora (Phytophthora infestans): g 250-300
Trattare ogni 12-15 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione; nei trattamenti di chiusura usare fungicidi di copertura.

PATATA

Peronospora (Phytophthora infestans): g 250-300
Effettuare non più di 3 trattamenti: il primo al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione e gli altri distanziati di 14 giorni.
Nei trattamenti successivi usare fungicidi di copertura, i quali possono essere impiegati anche sin dall'inizio, nei casi di minore pericolo dell'infezione.
Non impiegare il sistemico come eradicante (ossia dopo la comparsa delle macchie) per il pericolo dell'insorgenza della resistenza.

CIPOLLA

Peronospora (Peronospora destructor): g 200-250
Trattare ogni 14 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione.
Per favorire l'attività del prodotto è consigliabile aggiungere alla sospensione fungicida un bagnante, es. FITOFIL 50 cc/hl.

PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORI: g 300
(Phytophthora, Peronospora, Bremia e Pythium)
Trattare ogni 15 giorni irrorando accuratamente la vegetazione, a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.

Preparazione della sospensione

Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea: diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il Galben F 8-50 BLU può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio.
È miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).
Non è miscelabile con Poltiglia Bordolese, polisolfuri ed olio bianco.
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con oli minerali e polisolfuri.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Per le piante ornamentali e da fiori, in considerazione dell'elevato numero di specie e varietà, si consiglia di eseguire prove preliminari per saggiarne la sensibilità.

Rischi di nocività

È tossico per gli insetti utili ed i pesci.
Sospendere i trattamenti su uve da vino almeno 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti e per le altre colture 10 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti.
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia

Lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro d'acqua) e digitale.

Avvertenza

Consultare un Centro Antiveleni.

5758

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con
prudenza

GALBEN® R 4-33 BLU

Fungicida in polvere bagnabile dotato di azione sistemica e di copertura per la lotta contro le peronospore della vite, della patata, del pomodoro, della cipolla e delle colture ornamentali e da fiori

COMPOSIZIONE

Benalaxyl puro	g 4
Rame metallico (sotto forma di ossicloruro)	g 33
Bagnanti, disperdenti, coloranti e supporti inerti	q.b. a g 100

GRUPPO MONTEDISON
FARMOPLANT
Fitofarmaci Montedison

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 5758 **del** 3.10.85

® Marchio registrato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

GALBEN R 4-33 BLU è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare una elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.
La presenza di Ramo attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Alternaria e Septoria.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE

Peronospora (Plasmopara viticola): g 400-500
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e, comunque, non più tardi della differenziazione dei grappoli florali (7-8 foglie).
I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe.
Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

POMODORO

Peronospora (Phytophthora infestans): g 500-600
Trattare ogni 12-14 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione; nei trattamenti di chiusura usare fungicidi di copertura.

PATATA

Peronospora (Phytophthora infestans): g 500-600
Effettuare non più di 3 trattamenti: il primo al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione e gli altri distanziati di 14 giorni.
Nei trattamenti successivi usare fungicidi di copertura, i quali possono essere impiegati anche sin dall'inizio, nei casi di minore pericolo dell'infezione.
Non impiegare il sistemico come eradicante (ossia dopo la comparsa delle macchie) per il pericolo dell'insorgenza della resistenza.

CIPOLLA

Peronospora (Peronospora destructor): g 400-500
Trattare ogni 14 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione.
Per favorire l'attività del prodotto è consigliabile aggiungere alla sospensione fungicida un bagnante, es. FITOFIL 50 cc/hl.

PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORI: g 600
(Phytophthora, Peronospora, Bremia e Pythium)
Trattare ogni 15-20 giorni irrorando accuratamente la vegetazione.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando sino ad ottenere la diluizione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Il GALBEN R 4-33 BLU può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. È miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura.
Per le piante ornamentali e da fiori, in considerazione dell'elevato numero di specie e varietà, si consiglia di eseguire prove preliminari per saggiarne la sensibilità.

Rischi di nocività
È tossico per i pesci:
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

5759

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con
prudenza

GALBEN® M8-65 BLU

Fungicida in polvere bagnabile dotato di azione sistemica e di copertura per la lotta contro le peronospore della vite, del pomodoro e della rosa

COMPOSIZIONE

Benalaxyl puro	g 8
Zineb puro	g 65
Bagnanti, disperdenti coloranti e supporti inerti	q.b. a g 100

GRUPPO MONTEDISON
FARMOPLANT
Ricerca Montedison

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (MI)

Registrazione Ministero della Sanità N. 5759 del 2.2.1984

® Marchio registrato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

GALBEN M 8-65 BLU è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.
La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi della vite e Alternaria e Septoria del pomodoro.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE

Peronospora (Plasmopara viticola): g 200-250
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e, comunque, non più tardi della differenziazione dei grappoli fiorali (7-8 foglio).
I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe.
Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

POMODORO (solo fino alla prima fioritura)

Peronospora (Phytophthora infestans): g 250-300
Applicazioni in pieno campo a cadenza di 12-14 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione

ROSA

Peronospora (Peronospora sparsa): g 300
Trattare ogni 15 giorni irrorando accuratamente la vegetazione, a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.

Preparazione della sospensione

Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DIVIETI D'IMPIEGO

— DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

— DA NON IMPIEGARE IN SERRA

— DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità

Il GALBEN Z 8-65 BLU può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. È miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) o fertilizzanti fogliari (Lilian).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg 1

Per la sua buona conservazione, il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

— Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto;
— conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;
— in caso di malessere, ricorrere al medico, mostrandogli questa etichetta;
— durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbo nervoso, bronchite.
Il contatto con la cute o le mucose provoca: irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

Nei casi gravi, ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi, se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute o delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA

Consultare un Centro Antiveleni.

5765

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO:

Il TERRAZOLE® 35% WP può essere impiegato sia tal quale che in sospensione acquosa. In quest'ultimo caso, si scioglierà la dose di prodotto necessaria in poca acqua, diluendo la pasta così ottenuta fino a raggiungere la concentrazione desiderata. Prima di effettuare il trattamento, agitare bene la sospensione, soprattutto se l'attrezzatura è priva di agitatore. Si sconsiglia l'uso di atomizzatori.

a) **Per la concia dei semi:** è consigliabile il trattamento in polvere secca, alla dose di gr. 20 di TERRAZOLE® 35% WP per kg. 10 di semi.

b) **Per la concia dei bulbi:** per la disinfezione dei bulbi è preferibile la concia liquida che si effettua immergendo i bulbi in una sospensione acquosa allo 0,2-0,3% di TERRAZOLE® 35% WP.

1) **Per la disinfezione del terreno, dei semenzai, dei vivai e dei terricciati:** nei terreni sciolti o ricchi di sostanze organiche, impiegare il prodotto in polvere secca alla dose di 40-100 kg/Ha, distribuendolo il più possibile uniformemente ed utilizzando, se necessario, un inerte quale sabbia o cenere nel rapporto di 1 a 10. Nei terreni compatti od argillosi, il TERRAZOLE® 35% WP si impiega alla dose di 80-100 kg/Ha. I trattamenti vanno effettuati prima della semina o del trapianto, su terreno ben sminuzzato. Dopo l'applicazione, il prodotto deve essere interrato ad una profondità di 10-20 cm. **AVVERTENZA: non applicare su colture in atto.**

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con i formulati a base di zolfo. Non può essere miscelato con prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese) e con emulsioni oleose (olii minerali ed olii di antracene). **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: In caso di dubbio e di varietà di colture poco diffuse o di recente acclimatazione, si consiglia di eseguire preventive prove parcellari.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo asciutto e fresco.

TERRAZOLE® 35% WP

FUNGICIDA IN FORMULAZIONE POLVERE BAGNABILE, STABILE ALLA TEMPERATURA E NON DEGRADABILE DALL'AZIONE DEI RAGGI ULTRAVIOLETTI E DALL'ESPOSIZIONE ALL'ARIA. SI IMPIEGA CONTRO PYTHIUM, PHYTOPHTHORA E FUSARIUM PER LA CONCIA DEI BULBI E DEI SEMI, PER LA DISINFEZIONE DEI SEMENZAI, DEI VIVAI, DEI TERRICCIATI E DEI TERRENI DESTINATI A COLTURE ORTOFLOROFRUTTICOLE

III CLASSE

Composizione:

ETRIDIAZOL puro	gr. 35
Coformulanti	q.b. a gr. 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Olin

OLIN CORPORATION
P.O. BOX 991
LITTLE ROCK, ARKANSAS 72203
(U.S.A.)

Registrazione N. 5765
del 12.9.85
del Ministero della Sanità

Rappresentata in Italia da:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA (BO)
Tel. 79.94.61/2 - Telex 511046

Stabilimento produttore:
OLIN CORPORATION
HIGHWAY 61 N.
LELAND, MISSISSIPPI 38756
(U.S.A.)

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Conservare la confezione ben chiusa • Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto • Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua • Non operare contro vento • Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti • Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

VERCHIM ASTERIAS

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

5766

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: l'ingestione di elevate quantità di permethrin può causare tremori.
Trattamenti terapeutici: indurre il vomito. Trattamenti sintomatici.

COMPATIBILITÀ
È compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi di uso comune.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
È tossico per le api e per i pesci.
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
mele, pesche, uva, ciliegie, prugne, agrumi: 10 giorni
pere: 5 giorni
olivo: 10 giorni
ortaggi (solanacee, brassicacee, cucurbitacee, lattuga, porri, carote, spinaci): 2 giorni
mais, frumento, tabacco, patate, barbabietola da zucchero: 10 giorni
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

'CAFERIN'

Insetticida in emulsione concentrata ad azione immediata e prolungata. Agisce per contatto ed ingestione contro una vasta gamma di insetti.

COMPOSIZIONE

Permethrin puro		g 5
Bagnanti, emulsionanti, solventi	q.b.a	g 100

(contiene trimetilbenzene tecnico)

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione:
ICI Plant Protection Division - Yalding, Kent (Inghilterra)
Registrazione Ministero della Sanità n. 5766 del 23-2-1984
'CAFERIN' - Marchio registrato ICI Solplant S.p.A.

Coltura	Parassiti	Dose consigliata (ml/100 litri)
Melo, pesco, ciliegio, susino	Litocollete, cemiostoma, minatrici, cydia, anarsia, afidi, tentredini, tingidi, tortrice, tignola, ricamatrici, mosca, cicadelle	100-200
Pero	Psilla	150-250
Vite	Tignola e tignoletta dell'uva, cicaline	150-200
Solanacee, brassicacee, cucurbitacee, lattuga, porri, carote, spinaci, patata	Cavolaia, nottue, mosca, afidi, tripidi, vanessa, mosca bianca	100-200
Fiori in pieno campo e in serra	Afidi, tripidi, mosca bianca, bega	150-200
Mais	Piralidi	150-200
Tabacco	Nottua	150-200
Frumento	Afidi, lema	150-200
Olivo	Mosca, tignola	100-200
Agrumi	Mosca, tignola	100-200
Barbabietola da zucchero	Afidi, mamestra, nottue	100-200

MODALITÀ DI IMPIEGO
1. Impiegare la dose maggiore nei casi di forte infestazione
2. Bagnare accuratamente tutte le parti della pianta.
3. Ripetere il trattamento secondo le necessità.
4. Si consiglia di aggiungere il bagnante 'AGRAL' ml 50/100 litri di acqua, contro psilla e per le colture ortive.
5. NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA.
6. Contro tignola della vite, microlepidotteri minatori, ecc. è necessario trattare prima che le larve penetrino nei tessuti vegetali.
7. Contro la psilla intervenire durante il periodo tra uova color arancio e inizio della melata
8. Per informazioni più dettagliate è consigliabile interpellare un tecnico di fiducia.
9. Conservare a temperatura superiore a 5°C

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON VENDERSI SFUSO **ml 10**

5770

BENAMON 50 P.B.

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

POLVERE BAGNABILE - Acaricida a lunga persistenza d'azione

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Fenbutatin p.a. puro g 50
Bagnanti, disperdenti ed inerti q.b. a grammi 100

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: Cefalea occipitale continua o parossistica, ronzii auricolari, iperacusia, vertigini, rachialgia, dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra, ritenzione urinaria, insufficienza respiratoria e di circolo, interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie e paralisi), dermatosi.
Consigli terapeutici: Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando, in relazione alla via di contaminazione, abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale, terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE
Il BENAMON 50 P.B. agisce per contatto sulle neanidi e gli adulti. L'attività acaricida del principio attivo aumentando progressivamente dopo il trattamento, consente al prodotto di mantenersi efficace per 3 - 4 settimane, controllando anche i ceppi resistenti ad altri acaricidi come Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini e Eotetranychus pomi.

MODALITA' DI IMPIEGO
Dosi per 100 litri di acqua:
60-80 grammi di prodotto formulato contro le forme mobili dei ragni rossi le uova alla schiusura e nei periodi successivi su : melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio, vite, agrumi, pomodoro, cetriolo, colture floricole ed ornamentali in pieno campo.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il BENAMON 50 P.B. è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari normalmente impiegati sulle colture citate.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi gravi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
In applicazione su colture di rose è raccomandabile eseguire dei saggi preliminari, poichè alcune varietà potrebbero risultare sensibili all'acaricida.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO FRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA
— 30 giorni per pomacee, drupacee, pomodoro, cetriolo;
— 45 giorni per la vite;
— 60 giorni per gli agrumi.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N. 5770 del 23.2.84 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto: Kg 1-5

5771

CLASSE I

VELENO

RODAMON® GF

ESCA RODENTICIDA - pronta per l'uso per la protezione delle colture agricole in aperta campagna.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
clorofacinone p.a. puro g 0,015
Supporto vegetale, attraenti, conservanti, coloranti ed inerti q.b. a 100 grammi.

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; — Conservare la confezione ben chiusa; — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; — Evitare di respirare i vapori; — Non operare contro vento; — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi; — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi; — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone; — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva); — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
avvelenamento per ingestione: grave
Sintomi d'intossicazione: emorragie cutanee e delle mucose - ematuria. Neutralizza la vitamina K per cui a livello epatico si blocca la formazione di protombina - la sintomatologia è pertanto prevalentemente emorragica.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Antidoto specifico: vitamina K - vitamina C e P, consigliabili emotrasfusioni in casi gravi.

CARATTERISTICHE
Il RODAMON ® GF è un'esca rodenticida a base di cereali, idrofuga e pertanto molto adatta per l'impiego in campo aperto, efficace contro le più comuni specie di ratti e topi. Questi rodono graminacee e leguminose da foraggio; nei campi di cereali si formano chiazze nude. Attaccano tuberi di patata, radici di bietola, di rape e non risparmiano nemmeno la corteccia delle radici e del colletto delle piante da frutto. Causano danni tracciando gallerie sotterranee in ogni direzione. Anche sotto la neve continuano la loro azione scavatrice e roditrice. I roditori, una volta che abbiano ingerito una sufficiente quantità di esca, muoiono per emorragia interna senza dolorosa agonia. Il RODAMON® GF non provoca nei ratti alcuna repulsione, nè per l'esca, nè per il veleno. Essi continueranno a cibarsi, finchè lentamente, ma sicuramente giungono a morte.

MODALITA' DI IMPIEGO
Distribuire il RODAMON® GF nei luoghi più battuti dai roditori in quantità abbondante (g. 200-500 per luogo) in modo che tutti i roditori possano effettivamente cibarsene. L'esca, non assorbendo l'umidità in quanto idrofuga non è soggetta a marciume, consigliamo però di coprirla con una scatola rovesciata ed alzata da un lato, oppure disporla nei box appositamente studiati a tale scopo.
Controllare di tanto in tanto se l'esca è statacompletamente mangiata ed in tal caso rinnovarla.
Non toccare mai l'esca con le mani, perchè i ratti e topi fiutano e diffidano di ogni odore estraneo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il RODAMON® GF è tossico per gli animali domestici,il bestiame ed i pesci.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N. 5771 del 23-2-84 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 0,5 - 5 - 20

5772

CLASSE IV

POLVERE BAGNABILE
Fungicida per combattere la Botrite, Monilia e Sclerotinia in viticoltura, frutticoltura, per colture orticole e floricole in pieno campo.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Vinclozolin puro g 50
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISICHE
Il PILNET è un fungicida organico attivo contro la Botrite, Monilia o Sclerotinia. Esso può essere impiegato non solo per prevenire queste malattie, ma anche per bloccarle ad infezione in atto.

MODALITA' DI IMPIEGO
Dosi per 100 litri di acqua
Vite: contro la Botrite 150-200 g distribuendo almeno 1000 l/ha di poltiglia.
La frequenza dei trattamenti è in relazione alle condizioni metereologiche. In condizioni favorevoli alle malattie si consigliano almeno quattro interventi ai seguenti stadi vegetativi: fine fioritura, prima della chiusura del grappolo, inizio invaiatura, tre o quattro settimane prima della raccolta. È indispensabile una abbondante irrorazione, fatta uniformemente, di tutta la vegetazione ed in particolare dei grappoli. Il PILNET non ha effetti negativi sulla fermentazione del mosto.
Fragola: contro la Botrite 150-200 g distribuendo almeno 1000 l/ha di poltiglia.
In condizioni favorevoli all'attacco della malattia intervenire nei seguenti stadi vegetativi: pre-fioritura, piena fioritura, 3 settimane prime della raccolta.
Drupacee: (pesco, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo): contro la Monilia 150-200 g - contro la Monilia dei rami e dei fiori effettuare trattamenti all'inizio e durante la fioritura con intervalli di 8-12 giorni. Contro la Monilia dei frutti intervenire 4-5 e 3 settimane prima della raccolta.
Insalate (lattuga, indivie e radicchio): contro la Sclerotinia e Botrite 150-200 g. Iniziare i trattamenti 10 giorni dopo il trapianto ed eventualmente ripeterlo.
Distribuire ca. 2-4 l di poltiglia per ogni 10 mq.
Aglio, cipolla, gladiolo e tulipano: trattamento dei bulbi contro la Botrite e Marciume Bianco (Sclerotium) delle liliacee ed iridacee g 400-500 per ogni quintale di bulbi.
Gerbera, ciclamino, geranio: contro la Botrite delle colture floricole in pieno campo 150-200 g in trattamenti preventivi ripetuti.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e versare il tutto nella quantità di acqua necessaria.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il PILNET è miscibile in via di massima con i più comuni prodotti antiparassitari fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia bordolese, Polisolfuri).
Insetticidi devono essere aggiunti solo immediatamente prima della distribuzione della poltiglia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2
OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione N. 5772 del 23.02.84 del Ministero della Sanità
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto kg 1-5-10

5773

RODAMON® P

POLVERE ADESIVA - pronta per l'uso per la protezione delle colture agricole in aperta campagna.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Clorofacione puro g 0,20
Coadiuvanti ed inerti q.b. a 100 g.

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'articolo 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Evitare di respirarne i vapori. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. — Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva). — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento grave per ingestione
Sintomi di intossicazione: emorragie cutanee e delle mucose - ematuria. Neutralizza la vitamina K per cui a livello epatico si blocca la formazione di protombina - la sintomatologia è pertanto prevalentemente emorragica.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Antidoto specifico: vitamina K - vitamine C e P, consigliabili emotrasfusioni in casi gravi.

CARATTERISTICHE
Il RODAMON® P è una polvere adesiva idrofuga. Essa aderisce sulle zampe dei ratti e topi che passano sui luoghi cosparsi della polvere. Gli animali usano, per il loro istinto di pulizia, leccarsi le zampe ingerendo in tal modo il prodotto.
Una volta che abbiano ingerito una sufficiente quantità di veleno, essi moriranno lentamente ma sicuramente per emorragia interna senza dolorosa agonia.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il RODAMON ® P è una polvere idrorepellente pronta per l'uso. Essa viene distribuita nei luoghi frequentati dai roditori oppure introdotta con soffietti nelle loro tane. Per la protezione delle piante fruttifere, impolverare abbondantemente la parte inferiore dei fusti in modo che il roditore, passandovi sopra si sporchi bene le zampe.
Rinnovare di tanto in tanto l'impolveramento fino a quando l'infestazione dei roditori è cessata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il RODAMON ® P per la sua particolare formulazione e modalità d'impiego deve essere distribuito da solo.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il RODAMON ® P è tossico per gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

Registrazione N. 5773 del 23.02.84 del Ministero della sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 0,5 - 5

5827

CLASSE I

VELENO

RODAMON® OLIO

CONCENTRATO OLEOSO PER LA PREPARAZIONE DI ESCHE FRESCHE.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
0,25 g di Clorofacinone puro;
99,75 g veicolo oleoso colorato.

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n.1255.

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici — Conservare la confezione ben chiusa — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua — Evitare di respirarne i vapori — Non operare contro vento — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva) — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento grave per ingestione

Sintomi di intossicazione: emorragie cutanee e delle mucose-ematuria. Si neutralizza la vitamina K, per cui a livello epatico si blocca la formazione di protombina - la sintomatologia è pertanto prevalentemente emorragica.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Antidoto specifico: vitamina K - vitamina C e P, consigliabili emotrasfusioni in casi gravi.

CARATTERISTICHE
Il RODAMON® OLIO è un ratticida concentrato che serve per la preparazione di esche avvelenate fresche da offrire ai roditori per avvelenarli mortalmente. La morte di questi roditori avviene nel giro di qualche giorno per emorragia interna senza dolorosa agonia. Non vi è pertanto alcun segno allarmante per gli altri roditori, che continueranno a cibarsi dell'esca, finchè giungeranno a morte a loro volta. Le esche preparate con il RODAMON® OLIO sono efficaci contro tutte le varietà di topi che infestano i campi: ratto grigio o ratto di fogna, ratto nero, topo campagnolo, muscardin, rat musquè.

MODALITA' D'IMPIEGO
Preparazione delle esche: il RODAMON® OLIO va adoperato tale quale e non c'è bisogno di aggiungere additivi.

VANTAGGIO: il concentrato oleoso intensamente colorato, permette di ottenere delle esche perfettamente omogenee e pertanto interamente efficaci. Si ha una doppia economia, perchè non è necessario umidificare l'esca e trattarla con olio di paraffina. Esso può essere usato per impregnare esche fresche (granaglia secca frantumata, cruscame, pane duro, formaggi duri, frutta secca, pesce secco, mele carote o altri cibi particolarmente graditi ai roditori). L'esca (non più di kg 10 per volta) prescelta viene posta in un recipiente (da distruggere dopo l'uso) ed addizionata con l'Olio ratticida nella quantità di cc 20 per ogni kg di esca. Versare lentamente l'Olio sull'esca, mescolando con una paletta o con un bastone (mai con le mani!) fino a che tutto l'Olio è stato completamente assorbito e distribuito uniformemente, fino ad ottenere una omogenea colorazione dell'esca stessa. L'esca così preparata può essere utilizzata subito oppure conservata in recipienti ben chiusi fino al momento dell'impiego.

Collocamento delle esche: l'esca così preparata va collocata nelle vicinanze delle tane o nei luoghi abitualmente frequentati dai roditori: fognature, ripe di fosse, canali, campi, frutteti, stive di navi, magazzini, granai, ripostigli agricoli, al fine di indurre i roditori a cibarsene. Disporre l'esca in mucchietti da 25-50 grammi o comunque in quantità sufficiente, affinchè tutti i roditori possano cibarsene abbondantemente. Controllare di tanto in tanto se l'esca è stata consumata e rimpiazzare se necessario.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.

**Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

Registrazione N. 5827 del 27.3.84 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto lt. 20 -1-5

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

5828

SEPRAFORM

INSETTICIDA IN POLVERE SECCA

Composizione: g 100 di prodotto contengono:
— DIAZINONE puro . . . . g 2
— CARBARYL puro (esente da B naftolo) . . . . g 4
— Coformulanti e inerti q.b. a . . . . g 100

CLASSE III

ATTENZIONE! MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone. Evitare di respirare i vapori.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni ed edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea praticare subito respirazione artificiale o assistita ed ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al Centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti e 0,2-1 mg per i bambini) ogni 10 minuti fino alla comparsa dei fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio e lavaggio cutaneo se vi è stato contatto.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, le ossine, latte, olio e grassi.

Caratteristiche: il **SEPRAFORM** è un insetticida a largo spettro d'azione adatto per trattamenti a secco sulle colture erbacee ed arbose e per la disinfestazione del terreno. Il prodotto viene anche vantaggiosamente impiegato per trattamenti insetticidi generici all'aperto, contro svariate specie di insetti. Distribuito uniformemente sulle parti delle piante da proteggere, agisce sui parassiti per contatto e per ingestione.
Indicazioni: il**SEPRAFORM** è indicato su: cavolo per **CAVOLAIA;** melo e pero per il **BACO;** melo e pero per **RICAMATRICI** (cacoccia, culia, cagne); vite per **TIGNOLA;** aranci per **TIGNOLA;** pesco e rusino per **TIGNOLA;** papata per **DORIFORA;** olivo per **TIGNOLA;** pioppo per **CRISOMELA** e **FARFALLA BIANCA;** garofano per **BEGA VERDE;** olivo e arancio per **COCCINIGLIA MEZZO GRANO DI PEPE;** mais per **PIRALIDE** e **SESAMIA;** olivo per **MOSCA;** ciliegio e pesco per **MOSCA;** sedano per **MOSCA;** garofano in pieno campo per **STRISCINO;** cavolo per **MAGGIOLINI, AFIDI, TRIPIDI, ACEURODI, FITONOMO** e **MISURINO.** Per la disinfestazione del terreno contro Cleono, Lixus e Cavallette.
Dosi e modalità d'impiego: kg 30 per ettaro, per trattamenti a secco delle colture erbacee; per le colture arboree, aumentare la dose in rapporto alla massa della vegetazione da trattare. E' consigliabile eseguire i trattamenti di primo mattino, in quanto l'umidità favorisce l'adesione del prodotto sulle foglie. Kg 70 per ettaro per geodisinfestazioni contro parassiti del terreno.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

Compatibilità: il **SEPRAFORM** è compatibile con i più comuni antiparassitari di sintesi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischio di nocività: è tossico per gli insetti utili. E' nocivo per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina ed i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Reg. Ministero Sanità n. 5828 **del** 27 - 03 - 84

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso g** 50

SEPRAN s.r.l.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) - Via Cogolla, 5
TEL. N.: (0444) 55.81.69 - 55.01.59

officina di produzione **DIACHEM S.p.A.**
ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

5831

II CLASSE

Panoctine

FUNGICIDA IN POLVERE PER LA DIFESA DEI CEREALI MEDIANTE LA CONCIA DELLE SEMENTI

COMPOSIZIONE

Guazatina pura g. 30
Coadiuvanti q. b. a g. 100

NATURA DEL RISCHIO

Intossicazione grave, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (ad esempio interrando in fosse profonde più di 1 metro cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle od oculare.

Sintomi di intossicazione:

Nausea, vomito, ipotensione, rallentamento del ritmo respiratorio, collasso vascolare, shock e morte.

Consigli terapeutici:

Consultare subito un Centro Antiveleni. In caso di ingestione lavanda gastrica, se in stato di incoscienza dopo aver intubato il paziente, in caso di contatto con la pelle, lavare a forti getti di acqua, dopo aver tolti tutti gli indumenti.
In tutti i casi posizione orizzontale del soggetto con testa abbassata: ossigenoterapia.
Trattamento dell'ipotensione con Efedrina 15/20 mg. sottocutaneo 1/3 volte al dì e di Angiotensina 3/10 mcg/min per via endovenosa.
La nor-adrenalina è controindicata. E' però preferibile ricoverare subito il soggetto in Centro di Rianimazione per il trattamento della ipotensione dello shock ed il sostegno del respiro, nonché una terapia diuretica per favorire l'eliminazione sotto controllo e la monitorizzazione della pressione arteriosa.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Concia delle sementi

Cereali, (contro Carie, Fusariosi, Septoriosi) g. 200 per quintale.

MODALITA' D'IMPIEGO

Concia a secco delle sementi di cereali mediante le operazioni più opportune ed i mezzi più adatti a seconda delle quantità da trattare, per realizzare il più uniforme impolveramento del seme. Il seme deve essere asciutto prima di introdurlo nella seminatrice.
Avvertenza: nel corso della manipolazione del prodotto indossare guanti ed occhiali.

COMPATIBILITA'

E' miscibile con la maggior parte degli antiparassitari di uso comune salvo che con quelli di spiccata reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA GENERALE

I semi trattati non devono essere destinati all'alimentazione dell'uomo e del bestiame.
Il prodotto è tossico per i pesci ed i volatili domestici; è nocivo per gli altri animali domestici, bestiame ed insetti utili.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

APA S.p.A. ANTIPARASSITARI PER AGRICOLTURA - ROVIGO V.le del Lavoro 10/B

STABILIMENTO DI PRODUZIONE

KENOGARD VT AB / SUNDSVALL (SVEZIA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5831 del 6-4-84

« PANOCTINE » trade mark KENOGARD AB - Sweden

Contenuto g 200

DA NON VENDERSI SFUSO.

5832

TRAMIZOL E.C.

CLASSE III
ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON
PRUDENZA

LIQUIDO EMULSIONABILE - acaricida con effetto anche su afidi, psille, cocciniglie e cicaline.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono: Amitraz p.a. puro g 20,5; Tensioattivi e solventi q.b. a g 100; contiene «XILOLO e CICLOESANONE».

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici — Conservare la confezione ben chiusa — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua — Non operare contro vento — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e per contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: irritazione della pelle e delle mucose. Vomito, cefalea, depressione del sistema nervoso centrale. Possibile alterazione di valori glicemici.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Togliere gli indumenti contaminati e lavare la pelle abbondantemente con acqua e sapone. Allontanare il paziente dall'ambiente contaminato. In caso di ingestione praticare lavanda gastrica con acqua. In caso di depressione respiratoria, ossigenoterapia e respirazione artificiale. Tenere il paziente in osservazione per 24 ore.

CARATTERISTICHE
Il TRAMIZOL E.C. è efficace contro gli acari che infestano le piante da frutto (melo, pero, susino, ciliegio, albicocco), agrumi, vite, colture ortive, colture floreali e ornamentali in pieno campo. Fra gli insetti controlla le psille (Psilla del pero), con qualche efficacia anche sugli afidi, cicaline, cocciniglie (Aspidiotus) e le larve di alcune specie di lepidotteri (Cydia pomonella, Spodoptera exigua, Plutella maculipennis) è efficace contro le popolazioni di acari resistenti e su tutti gli stadi del ragno rosso, ma particolarmente contro le uova estive e le neanidi.
Il TRAMIZOL E.C. è un acaricida-insetticida di contatto, ingestione ed asfissia con spiccata azione citotropica dotato di lunga permanenza.

MODALITA' D'IMPIEGO
Dosi per 100 litri d'acqua:
Frutticoltura: (melo, pero, pesco, susino, ciliegio, albicocco e agrumi) g 150-200. Contro gli acari intervenire alla schiusura delle uova invernali (caduta dei petali) o comunque alla prima comparsa effettuando almeno 2 trattamenti a distanza di 2-3 settimane. Contro la Carpocapsa iniziare i trattamenti alla caduta dei petali effettuando fino a 5 trattamenti a distanza di 2-3 settimane. Contro la Psilla inziare i trattamenti all'inizio dell'infestazione ripetendoli ad intervalli regolari secondo necessità.Contro la Cocciniglie degli agrumi (Saissetia, Ceroplaste, Aonidiella) effettuare i trattamenti agli stadi larvali ad intervalli regolari secondo necessità riducendo la dose per la sola Aonidiella a 100 g/hl. Contro gli altri insetti (afidi, cicaline, minatori) trattare alla loro comparsa ripetendo secondo necessità. Viticoltura: contro gli acari intervenire alla schiusura delle uova invernali (caduta dei petali) effettuando almeno 2 trattamenti. Contro gli afidi trattare alla loro comparsa. Colture ortive, (asparago, cucurbitacee, melanzana, fagiolo, pisello, patata) da fiore ed ornamentali in pieno campo: contro gli acari alla schiusura delle uova invernali oppure al più tardi alla prima comparsa effettuando i trattamenti ad intervalli di 2-3 settimane. Contro gli afidi trattare alla comparsa degli insetti ripetendoli secondo necessità. Quando il clima è freddo, aumentare la dose a 250-300 g/hl. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla poltiglia 50 g/hl BAGNANTE AMONN.
Il TRAMIZOL E.C. può essere impiegato anche a basso volume, purchè la quantità di prodotto per ettaro venga mantenuta costante.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nelle quantità d'acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'
Il TRAMIZOL E.C. è compatibile con i più comuni antiparassitari fatte eccezione per quelli a reazione alcalina (Polisolfuri e Poltiglia bordolese).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico delle miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
In caso di dubbio o di varietà poco diffuse o di recente acclimatizzazione si consiglia di eseguire preventive prove parcellari.
Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto; 28 giorni per mele e pere.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12

Registrazione N. 5832 del 27.3.84 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO.
Contenuto lt 1-5

DU PONT CONID SPA
AMONN FITOCHIMICA DIVISION

5880

BAGOR

Insetticida a base di Dimetoato

CONTIENE XILOLO

Composizione:

Dimetoato puro . . . . g. 38

Bagnanti ed emulsionanti . . q.b. a g. 1000

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

BASLINI

Baslini - Industrie Chimiche S.p.A.

Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782
··2 Milano

Stabilimento produttore:
Baslini Ind. Chim. S.p.A. Treviglio (BG)

Registrazione N. 5880 del 25-4-84 del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (ad esempio interrando in fosse profonde un metro e cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso.

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio o grassi.

AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il BAGOR è un insetticida citotropico e di superficie. Per la elevata capacità di penetrare nei tessuti vegetali è particolarmente indicato per il controllo di diversi insetti difficilmente raggiungibili con altri insetticidi.

OLIVICOLTURA:
gr. 150/hl contro la Mosca delle Olive in trattamenti preventivi o curativi da Giugno a Ottobre.
gr. 100-150/hl contro la Tignola delle Olivo da Marzo a Giugno.
gr. 125/hl contro Liotripido, Punteruolo e Oziorrinco.

FRUTTICOLTURA:
Ciliegie: impiegare 50-70 gr./hl contro Mosca all'invaiatura.
Albicocco e Pesco: impiegare 125 gr./hl contro Mosca della frutta.

AGRUMICOLTURA:
Arancio: gr. 125/hl contro Biancorossa e Cocciniglia cotonosa.
Limone: gr. 125/hl contro Cocciniglia bianca.

ORTICOLTURA:
Sedano: gr. 50-100/hl contro Mosca.
Spinacio: gr. 50-100/hl contro Mosca.
Asparago: gr. 50-100/hl contro Mosca.
Carciofo: gr. 50-100/hl contro Depressaria e Nottua.
Cavolo: gr. 50-100/hl contro Aleurodidi.
Pomodoro: gr. 50-100/hl contro Vasate.

COLTURE INDUSTRIALI:
Barbabietola: gr. 100/hl contro Afidi, Mosca e Sminturide.
Tabacco: gr. 100/hl contro Aleurodidi.
Erba medica: gr. 100/hl contro Sminturide.
Cereali: gr. 100/hl contro Sminturide.
Trifoglio: gr. 100/hl contro Sminturide.

FLORICOLTURA:
In serra: gr. 75/hl contro Aleurodidi.
Garofano (pieno campo): gr. 75/hl contro Striscino.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI:

COMPATIBILITÀ
Il BAGOR è compatibile con tutti gli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina e dei prodotti a base di Binapacryl, Propargil e Triclorfon.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

FITOTOSSICITÀ
Da non impiegare su cedro, arancio amaro, limone internodato, nocciolo e crisantemo. Evitare le irrorazioni a basso volume sulle seguenti varietà di Olivo: Coratina, Simona, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

5890

CLASSE II

Panoctine L

NOCIVO

FUNGICIDA LIQUIDO SOLUBILE PER LA DIFESA DEI CEREALI MEDIANTE LA CONCIA DELLE SEMENTI.

COMPOSIZIONE

Guazatina pura g. 30
Coadiuvanti q. b. a g. 100

NATURA DEL RISCHIO

Intossicazione grave per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (ad esempio interrando in fosse profonde più di 1 metro cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle od oculare.

Sintomi di intossicazione:

Nausea, vomito, ipotensione, rallentamento del ritmo respiratorio, collasso vascolare, shock e morte.

Consigli terapeutici:

Consultare subito un Centro Antiveleni. In caso di ingestione lavanda gastrica, se in stato di incoscienza dopo aver intubato il paziente. In caso di contatto con la pelle, lavare a forti getti di acqua, dopo aver tolti tutti gli indumenti.
In tutti i casi posizione orizzontale del soggetto con testa abbassata: ossigenoterapia.
Trattamento dell'ipotensione con Efedrina 15/20 mg. sottocutaneo 1/3 volte al dì e di Angiotensina 3/10 mcg/min per via endovenosa.
La nor-adrenalina è controindicata. E' però preferibile ricoverare subito il soggetto in Centro di Rianimazione per il trattamento della ipotensione dello shock ed il sostegno del respiro, nonché una terapia diuretica per favorire l'eliminazione sotto controllo e la monitorizzazione della pressione arteriosa.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Concia delle sementi
Cereali, (contro Carie, Fusariosi, Septoriosi) g. 200 per quintale

MODALITA' D'IMPIEGO

Concia delle sementi di cereali
Per grandi quantitativi la concia può essere effettuata esclusivamente servendosi degli appositi miscelatori; per piccole quantità si può effettuare ponendo il seme in un recipiente nel quale possa essere convenientemente conciato con PANOCTINE L.
Avvertenza: nel corso della manipolazione del prodotto indossare guanti ed occhiali.

COMPATIBILITA'

E' miscibile con la maggior parte degli antiparassitari di uso comune salvo che con quelli di spiccata reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA GENERALE

I semi trattati non devono essere destinati all'alimentazione dell'uomo e del bestiame.
Il prodotto è tossico per i pesci ed i volatili domestici; è nocivo per gli altri animali domestici, bestiame ed insetti utili
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

APA S.p.A. ANTIPARASSITARI PER AGRICOLTURA · ROVIGO V.le del Lavoro 10/B

STABILIMENTO DI PRODUZIONE

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5890 del 25-4-84

« PANOCTINE L » trade mark KENOGARD AB - Sweden

Contenuto

DA NON VENDERSI SFUSO.

5901

Natura dei rischi d'intossicazione: il prodotto è tossico per aspirazione ed ingestione. Non aspirare il fumo, non trattare controvento.
Norme precauzionali: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici, non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi con acqua e sapone.
Tenere lontano dalle fonti di calore.
Informazioni per il medico: in caso d'intossicazione chiamare il medico per i conseguenti interventi di pronto soccorso.
Modalità d'impiego: il talpacid va usato esclusivamente negli orti, giardini e prati.
Accendere la cartuccia, introdurla nella tana della talpa indi tappare con terra il foro. Tappare anche gli altri fori dai quali può uscire il fumo. Il gas uccide le talpe oppure le snida, dopodichè
TALPACID
evitano il terreno trattato.
Compatibilità o meno con altri principi attivi: il *talpacid* non va miscelato ad altri prodotti.
Rischi di nocività: il gas è nocivo verso gli insetti utili quindi non usarlo durante la fioritura.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Importatore esclusivo per l'Italia
RATTICIDA VENETA
Via del Bersagliere, 29 - Verona
OFFICINA DI PRODUZIONE:
ARASAN FIREWORKS FACTORY
SIVAKASI - INDIA
Registrazione Ministero della Sanità n.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contiene 4 cartucce peso gr. 80.
CARTUCCE FUMOGENE ANTITALPA
CLASSE TOSSICOLOGICA IV
TALPICIDA
TALPACID
PRODOTTO BREVETTATO
cartucce fumogene antitalpa
COMPOSIZIONE:
Zolfo puro (esente da selenio) gr. 33,75
Carbone vegetale e nitrato di potassio q.b. a gr. 100,00

5931

CLASSE I^A

VELENO

CARMETOL

POLVERE BAGNABILE
Insetticida - acaricida per la lotta contro parassiti in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e per la concia delle sementi di mais e bietola.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
50 g di Metiocarb p.a. puro
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; — Conservare la confezione ben chiusa; — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; — Evitare di respirarne i vapori; — Non operare contro vento; — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi; — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi; — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio bruciandole o interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva); — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi di intossicazione: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

CARATTERISTICHE
Il CARMETOL è attivo contro i ragnetti gialli (con una qualche azione anche contro i ragnetti rossi), cicaline, tignole della uva ed altre larve di lepidotteri, psilla del pero, capua, minatrici delle foglie, afidi, carpocapsa, dorifora della patata. Può essere usato anche per la concia di sementi di mais e bietola.

MODALITA' DI IMPIEGO
Frutticoltura (melo pero) **viticoltura, orticoltura** (lattuga, fagioli, fagiolini, piselli, cavoli, patata): g 200 per 100 litri di acqua.
Concia semi del mais e della bietola: dose di 1 Kg per q.le di seme.
Il seme va dapprima inumidito con una sostanza collante (per esempio 1/2 litro por q.le di latte intero magro o acido).
L'uso di olii è sconsigliabile in quanto questi possono ostacolare la germinabilità. Dopo aver inumidito i semi si distribuisce il prodotto rimescolando in modo che tutti i semi siano uniformemente ricoperti. La concia si può effettuare su una superficie impermeabile (plastica) oppure in una betoniera.
Attenzione: Semi trattati e non utilizzati per la semina non possono essere assolutamente destinati all'alimentazione umana o del bestiame.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e poi aggiungere la quantità di acqua necessaria mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile in via di massima con i più comuni antiparassitari fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri).
Non è consigliabile miscelarlo con i prodotti liquidi se la poltiglia viene utilizzata per il trattamento di varietà di melo soggette a rugginosità (Golden Delicious). La concia può essere effettuata anche con semi precedentemente trattati con fungicidi.
In caso di miscela deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico nel periodo della fioritura e per melo e pero fino a 30 giorni dopo la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesce e bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso e pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
DU PONT CONID SPA - AMONN FITOCHIMICA DIVISION - Stabilimento di Bolzano
Via Siemens 12
Registrazione n. 5931 del 21.6.84 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg 1-5

5968

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

R6 ERRESEI SB 30/M-12

Polvere bagnabile
Fungicida Cupro-organico per impieghi in viticoltura, su pomodoro, garofano e rosa

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 29,7 Rame puro (sottoforma di Ossicloruro Tetraramico)
Gr. 12 Mancozeb puro
Coadiuvanti e coloranti q.b. a 100.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni:
Alcool, olii, grassi.

Avvertenza:
Consultare un Centro antiveleni.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68

Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 5968 Ministero Sanità del 27-6-1984

3/85

MODALITÀ D'IMPIEGO

Stemperare il prodotto in poca acqua sino ad ottenere una poltiglia semiliquida e portare a volume con acqua corrente.

- **Vite**
  Contro Peronospora: gr. 350-400 per hl. d'acqua.
- **Pomodoro solo fino alla prima fioritura.**
  Contro Peronospora ed Alternaria: gr. 350-400 per hl. d'acqua.
- **Rosa e Garofano in pieno campo.**
  Contro malattie crittogamiche: gr. 400 per hl. d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con Sofril per la lotta contemporanea contro l'Oidio e la Peronospora e può essere miscelato con Kelthane, Zitiol, Parafene, Metilon, per la lotta contro Acari, Tignole, Sigario, Zigene.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

5969

BAKAR

Acaricida selettivo

Composizione:

Tetradifon puro	g. 5,7
Dicofol puro	g. 15,3
Solventi ed emulsionanti	q.b. a g. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

BASLINI

Baslini - Industrie Chimiche S.p.A.

Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782
20122 Milano

Officina di produzione:
Baslini Ind. Chim. S.p.A. - Treviglio (BG)

Registrazione N. 5969 del 19-7-84 del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione: vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.

Consigli terapeutici: intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante, somministrazione di purganti salini (gr. 25 di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi, hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.
Barbiturici (Lumital 0,1-0,2 g.) contro i tremori e le contrazioni muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni: la morfina, l'alcool o, per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina e l'efedrina.

AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

BAKAR è un acaricida dotato di azione citotropica per cui colpisce anche gli acari situati nelle pagine inferiori delle foglie.
BAKAR combatte il ragno rosso e il ragno giallo di fruttiferi, della vite, degli agrumi, delle colture ortive e floreali in pieno campo.

DOSE D'IMPIEGO: gr. 200-300 per 100 litri d'acqua.
Intervenire alla prima comparsa dei parassiti ripetendo il trattamento ad ogni nuovo attacco.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: BAKAR è miscibile con i comuni antiparassitari a reazione neutra.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici: qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 15 giorni.

« ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nell'epoca e per l'uso consentito: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia al trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

5995

® = MANCOKAR è marchio registrato della Rohm and Haas Company, Philadelphia, U.S.A.

FUNGICIDA AGRICOLO

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:

Principi attivi:

Mancozeb puro . . . . gr. 45
Dinocap tecnico costituito dal 78 % di Dinitro-(1-Metil-eptil) fenil crotonato e dal 22 % di altri prodotti della reazione, principalmente Dinitro (1-Metil-eptil) fenolo . . . . gr. 8

Sostanze inerti e coadiuvanti q.b. a gr. 100

CLASSE III°
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
— una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
— conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
— in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta
— durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Il prodotto è composto da un nitroderivato del fenolo e da un ditiocarbammato, sostanze chimiche aventi meccanismi tossicologici diversi. Si presume che l'intossicazione sia clinicamente dominata dal derivato del nitrofenolo; soltanto in caso di prolungato contatto con la cute e le mucose possono verificarsi irritazioni locali (dermatiti, congiuntivite, faringite, ecc.) dovute al ditiocarbammato.
Intossicazione per ingestione accidentale, inalazione e per assorbimento attraverso la pelle.
Sintomi di intossicazione: *Sudorazione, effetto antabuse simile, sete, nausea, vomito, diarrea, spossatezza o agitazione psico motoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertermia, emolisi acuta in portatori di deficit enzimatici congeniti (GG PD H), colorazione gialla delle sclere; la morte consegue ad edema cerebrale o paralisi respiratoria e circolatoria.*
Consigli terapeutici: *Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1 % ed iposolfito di sodio al 5 %.*
Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni all'esofago, molto frequenti nel caso di ingestione. Combattere l'ipertermia con bagni freddi e estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda. Trasfusioni e fleboclisi glucosate al 5 % di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o Propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, inalazioni di camomille, cure generiche delle dermatiti.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centri di rianimazione.
Consultare comunque subito il Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità - Il MANCOKAR è un fungicida ad ampio spettro d'azione efficace contro le malattie crittogamiche del grano che colpiscono il culmo ed il fogliame e cioè: Ruggini, Oidio, Fusariosi, Septoriosi e Cladosporiosi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per ottenere la migliore efficacia sono necessari due trattamenti con MANCOKAR, da effettuarsi nelle seguenti fasi fenologiche del grano:
1° trattamento: Nella fase compresa fra l'emissione del II° nodo e l'emissione dell'ultima foglia (botticella).
2° trattamento: Fra metà spigagione e la fine dell'emissione della spiga.

DOSI

Impiegare il MANCOKAR alla dose di Kg. 3,5 per Ha, distribuendo il prodotto con un volume d'acqua variante da 250 a 400 litri per Ha a seconda del tipo di pompa e dello sviluppo vegetativo del grano. In ogni caso è necessario curare una uniforme copertura della vegetazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA' - Il MANCOKAR è compatibile con gli insetticidi di comune impiego. Non è miscibile con formulati a reazione basica od alcalina (es. Poltiglia bordolese e polisolfuri), con oli minerali (estivi ed invernali), con formulati oleosi (Carbophenothion, Parathion) e Binapacryl. E' miscibile invece con cautela con Urea e, in quanto possono verificarsi fenomeni di flocculazione fitotossici, con: Endosulfan, Ethion, Chinomethionate, Dicloran, Zolfo.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

TOSSICITA' - E' tossico per acari ed insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Prodotto da:
ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A. - MILANO
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. 5995 del 21.6.1984
DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO KG.

5997

Classe III

ATTENZIONE manipolare con prudenza

GALBEN® Z 8-65 BLU

Fungicida in polvere bagnabile dotato di azione sistemica e di copertura per la lotta contro le peronospore della vite, del pomodoro e della rosa

COMPOSIZIONE

Benalaxyl puro	g 8
Zineb puro	g 65
Bagnanti, disperdenti coloranti e supporti inerti	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento J & A MARGESIN S.p.A. - Lana d'Adige (BZ)

Registrazione Ministero della Sanità N. 5997 del 21.6.1984

® Marchio registrato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

GALBEN Z 8-65 BLU è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.
La presenza di Zineb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Alternaria e Septoria.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE

Peronospora (Plasmopara viticola): g 200-250
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e, comunque, non più tardi della differenziazione dei grappoli florali (7-8 foglie).
I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe.
Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

POMODORO (solo fino alla prima fioritura)

Peronospora (Phytophthora infestans): g 250-300
Applicazioni in pieno campo a cadenza di 12-14 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione e fino e non oltre l'inizio della fioritura del primo palco.

ROSA

Peronospora (Peronospora sparsa): g 300
Trattare ogni 15 giorni irrorando accuratamente la vegetazione, a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.

Preparazione della sospensione

Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DIVIETI D'IMPIEGO

— DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

— DA NON IMPIEGARE IN SERRA

— DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità

Il GALBEN Z 8-65 BLU può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. È miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg 1

Per la sua buona conservazione, il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio .

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

— Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto;
— conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;
— in caso di malessere, ricorrere al medico, mostrandogli questa etichetta;
— durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

Nei casi gravi, ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi, se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA

Consultare un Centro Antiveleni.

In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

5998

CLASSE IV

Fungicida organico per la lotta contro la Muffa grigia (Botrytis cinerea), Monilia (Monilia laxa, M. fructigena) e Sclerotinia di numerose colture floreali

Composizione

Chlozolinate	g 50
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 5998 del 30.10.85

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

Caratteristiche tecniche: Il SERINAL PB 50 è un fungicida organico, in polvere bagnabile, dotato di azione preventiva e bloccante nel controllo delle principali forme di Botrite, Sclerotinia e Monilia, delle colture floreali.

Modalità e dosi d'impiego per litri 100 d'acqua in trattamenti a volume normale

BOTRITE E MARCIUME BIANCO (Sclerotium delle liliacee e iridacee): gladiolo e tulipano.
— g 400-500.
Trattamento ai bulbi: immersione per 30 minuti dei bulbi prima di porli a dimora, e quindi farli asciugare.
BOTRITE DELLE COLTURE FLORICOLE: gerbera, ciclamino, geranio e crisantemo.
— g 150-300.
Trattamenti preventivi distanziati di 12-15 gg.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una poltiglia omogenea, aggiungere quindi il quantitativo di acqua rimanente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità

Il SERINAL PB 50 è miscibile con i più comuni fungicidi attualmente in commercio come ad esempio Aspor, Tiezene, Mezene, Nespor, Nemispor e Zolfo polvere bagnabile o colloidale e con prodotti ad azione insetticida; questi ultimi devono essere aggiunti alla poltiglia immediatamente prima del trattamento. Il SERINAL PB 50 è miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in floricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

6018

BATOT

Diserbante totale

Composizione:

Simazina pura	g. 17,1
Dalapon puro	g. 57,8
2,4 -D puro (sotto forma di sale sodico)	g. 6,37
Coadiuvanti	q b a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

BASLINI

Baslini - Industrie Chimiche S.p.A.

Via G. Sorbelloni, 12
Telefono (02) 7782
20122 Milano

Officina di produzione:
Baslini Ind. Chim. S.p.A. - Treviglio (BG)

Registrazione N. 6018 del 19-7-84 del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo asciutto e fresco

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante lo impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Sintomi d'intossicazione: astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.
Consigli terapeutici: abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.

AVVERTENZA

Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il BATOT è un diserbante totale da usarsi in **assenza di colture**, contro le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni sia annuali che perenni. Esplica la propria azione principalmente per via fogliare e possiede inoltre una not· azione diserbante per via radicale portando in tal m· completa distruzione le infestanti in poco tempo.
Il BATOT si localizza nello strato superficiale del terre… impedendo la comparsa delle malerbe per un lungo periodo.
Il BATOT è indicato per il diserbo totale di tutti i luoghi incolti dei canali d'irrigazione e di bonifica, stagni, laghi, bacini artificiali, bordi stradali, aree industrial, sedi ferroviarie, parchi e giardini.
Il BATOT si impiega alle dosi di Kg. 20-30 per ettaro in 1000 litri di acqua in primavera quando le infestanti sono in piena crescita.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto è fitotossico per tutte le colture e, pertanto, evitare che il prodotto giunga a contatto con qualsiasi coltura, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

NOCIVITÀ: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

« ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nell'epoca e per l'uso consentito: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

6108

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

GALBEN® 5 Gr

Fungicida granulare ad azione sistemica, per la lotta contro la Peronospora del tabacco, peperone, pomodoro, fragola e delle colture ornamentali e da fiori.

COMPOSIZIONE

Benalaxyl puro	g 5
Coadiuvanti e supporti inerti	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - MILANO

Stabilimento DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n. 6108 del 8.10.1984

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

Caratteristiche tecniche
Il GALBEN 5 Gr è un fungicida sistemico che assorbito dalle radici e traslocato in tutte le parti della pianta, permette di ottenere con applicazioni al terreno, elevati livelli di difesa contro ficomiceti parassiti ed in particolare Phytophthora spp., Peronospora spp., Pythium spp., Aphanomyces spp., Bremia spp., Plasmopara spp., Pseudoperonospora spp., ecc., delle colture agrarie sottoindicate.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

TABACCO

Peronospora (Peronospora tabacina)
— Semenzai: kg 0,8-1,2/m² di terriccio
Intervenire immediatamente prima della semina distribuendo GALBEN 5 Gr uniformemonte sulla superficie da trattare ed interrandolo con una leggera lavorazione. Tale trattamento protegge la coltura per 30-40 giorni anche dagli attacchi di Pythium.
— Pieno campo: 40 Kg/ha
Intervenire dopo il superamento della crisi di traplanto, localizzando il prodotto lungo la fila, su una banda di 30÷40 cm., interrandolo quindi con una leggera lavorazione.
Dopo 30 giorni effettuare una seconda applicazione di GALBEN 5 Gr in coincidenza con la rincalzatura.

PEPERONE

Cancrena pedale (Phytophthora capsici): 40 Kg/ha
Iniziare gli interventi subito dopo il superamento della crisi di trapianto e ripeterli ad intervalli di 20÷30 giorni durante tutto il ciclo della coltura. Il prodotto va distribuito lungo la fila, su di una banda di 30÷40 cm. ed interrato con una leggera lavorazione.
In ogni caso, una irrigazione eseguita dopo l'interramento del prodotto ne favorisce l'assorbimento da parte delle piante.

POMODORO

Marciume del colletto (Phytophthora parassitica) e **Peronospora** (Phytophthora infestans): 40 Kg/ha
Intervenire prima del trapianto localizzando il prodotto lungo la fila, su una banda di 30÷40 cm, ed interrarlo a 6-10 cm di profondità.
Se necessario ripetere l'intervento con le stesse modalità dopo 20-30 giorni.

TERRENO DESTINATO A COLTURE DI FRAGOLA

Collasso (Phytophthora spp.): 40 Kg/ha
Intervenire prima del trapianto, localizzando il prodotto lungo la fila, su di una banda di 30-40 cm, ed interrando con una lavorazione superficiale.

TERRICCIATI PER SEMENZAI DI COLTURE ORTICOLE
Marciume del colletto e delle radici (Pythium spp., Phytophthora spp.): Kg 0,8-1,2/m² di terriccio.
Miscelare accuratamente il prodotto alla massa di terriccio prima della preparazione del letto di semina.

TERRICCIATI PER SEMENZAI E TALEAI DI COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORI
Pythium spp., Phytophthora spp., Aphanomyces spp., Bremia spp., Plasmopara spp., Pseudoperonospora spp., Peronospora spp.:
Kg 0,8 - 1,2/m² di terriccio
Miscelare accuratamente il prodotto alla massa di terreno prima della preparazione del letto di semina.

APPLICAZIONI AL SUOLO SU COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORI

Pythium spp., Phytophthora spp., Aphanomyces spp., Bremia spp., Plasmopara spp., Pseudoperonospora spp., Peronospora spp.:
4-8 g/m²
Effettuare due-tre trattamenti distanziati di 30 giorni circa, distribuendo il prodotto in maniera uniforme su tutta la superficie in fase di pre-semina o pre-trapianto, o su specifiche bande, localizzando lungo la fila con coltura in atto. In ogni caso la dose va riferita all'unità di superficie realmente trattata; il formulato deve essere interrato mediante leggera lavorazione.

TAPPETI ERBOSI (giardini, campi sportivi)
Pythium spp.: 150 - 300 g/1000 m²
Trattare i tappeti erbosi già esistenti ogni 2-3 settimane.
Nelle aree di nuovo impianto trattare immediatamente dopo la semina. Se si verificano condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni.
Applicare la dose più alta in caso di infezione elevata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il formulato viene usato da solo.
Fitotossicità: Per le piante ornamentali e da fiori, in considerazione dell'elevato numero di specie e varietà, si consiglia di eseguire prove preliminari per saggiarne la sensibilità.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta di peperone, pomodoro e 28 giorni prima di quella del tabacco.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

88

6127

Caratteristiche: fungicida organico endoterapico, localmente mobile nelle superfici vegetali verdi irrorate.

Malattie combattute: Oidi (Podosphaera leucotricha, Sphaerotecha pannosa, Sphaerotecha fuliginea, Sphaerotecha macularis, Erysiphe polygoni, Erysiphe cichocearum, Leveillula taurica, Mycrosphaera betae).

Colture protette: melo, pesco, melone, cocomero, zucchino, cetriolo, peperone, melanzana, pomodoro, fragola (fino alla prima fioritura), carciofo, pisello.

Dosi, epoche e modalità d'impiego: ogni 100 litri d'acqua.
- Melo: (solo oidio) cc. 35-40.
  Iniziare i trattamenti alle « orecchiette di topo » e ripeterli ogni 7-10 giorni in funzione dell'intensità dell'attacco.
- Pesco: (oidio) cc. 35-40 dalla sfioritura in poi per 2-3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni. Ricominciare gli interventi ai primi sintomi dell'eventuale infezione secondaria mantenendo un intervallo di 6-8 giorni.
- Melone, cocomero, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fragola (fino alla prima fioritura), pisello, carciofo (oidio): cc 20-40 alla prima comparsa dei sintomi della malattia. Ripetere gli interventi ogni 8-12 giorni. Se si impiegano meno di 10 Q.li d'acqua/Ha aumentare la concentrazione in modo da distribuire 200-400 cc. di RUMIDIN 12 EC/Ha

Modalità d'impiego: il RUMIDIN 12 EC si usa alle dosi indicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità d'acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Per l'impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro

Preparazione della miscela: versare la quantità richiesta di RUMIDIN 12 EC nella botte riempita a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l'aggiunta di bagnanti.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni fungicidi quali sali rameici, Captano, Mancozeb, Zineb, Ziram e con i più comuni insetticidi ed acaricidi impiegati nelle colture che figurano in questa etichetta. Dato l'elevato numero di possibili combinazioni con i numerosi formulati commerciali, si suggerisce di saggiare la compatibilità fisica di ciascuna miscela estemporanea preparandone una piccola quantità prima dell'uso. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: nel caso di miscele con altri principi attivi con i quali il RUMIDIN 12 EC è compatibile, fare attenzione alle eventuali controindicazioni riportate nelle etichette dei prodotti con i quali si è fatta la miscela. Non impiegare il RUMIDIN 12 EC su varietà soggette a rugginosità quali la Golden Delicious.

Sospendere i trattamenti 14 GIORNI prima del raccolto su pesco; 21 GIORNI sul melo e 7 GIORNI sulle altre colture.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

RUMIDIN® 12 EC

FUNGICIDA ORGANICO ENDOTERAPICO

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione:

FENARIMOL puro	gr.	12,27
Colormulanti	q.b. a gr.	100,00

• Contiene 2-etossietanolo •

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79 94 61/2 - Telex I 511046

Registrazione N. 6127
del 8.11.84
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bologna)

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.
Non conservare presso sorgenti di calore o fiamme.

NATURA DEL RISCHIO: sos za pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto co pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto so a chiave in luogo inacc bile ai bambini ed agli ar domestici ● Pericoloso se rito o assorbito attraver pelle ● Evitare il contat la pelle, gli occhi ed i v Dopo la manipolazione dotto ed in caso di coi zione, lavarsi accuratame acqua e sapone ● Non f non mangiare durante l' del prodotto ● Non usi tro vento ● Non respirai pori ● Conservare la coi ben chiusa ● Non cont alimenti o mangimi ● N taminare corsi d'acqua c plicazione diretta del p con la pulizia delle attre e con la eliminazione del

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione, c mare il medico per i consi interventi di pronto soccorsi

VERCHIM ASTERIAS

MARCA DA BOLLO LIRE 3000

DA NON VENDERSI SFUSO

ml.

6135

FIRODAL® C

Fungicida a largo spettro d'azione per la difesa del frumento da malattie fungine

Composizione
100 g di prodotto contengono:
25 g propiconazolo puro (rapporto isomerico cis/trans 1,42)
20 g carbendazim puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Varese)

Officina di produzione: SCAM, Modena

Registrazione Ministero della Sanità
n. 6135 del 29-11-84
® marchio registrato

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini od agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Sintomi di intossicazione:
Non si hanno informazioni di casi di avvelenamento nell'uomo.
Negli animali di laboratorio i sintomi di avvelenamento sono aspecifici: esoftalmo, posizione ventrale, laterale o curva, pelo arruffato.

Terapia:
Sintomatica. Non si conosce l'antidoto specifico.

FIRODAL C possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed eradicante, con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti meccanismi d'azione con riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali.

FIRODAL C è dotato di lunga persistenza (da 3 a 4 settimane), a seconda delle malattie e condizioni climatiche, che permette di proteggere la coltura da più malattie che per la loro biologia compaiono in momenti diversi.
Per effetto della combinazione delle proprietà specifiche e dei meccanismi d'azione delle due sostanze attive che lo costituiscono, FIRODAL C possiede uno spettro d'azione estremamente ampio e controlla tutti i più importanti e diffusi parassiti della parte aerea del frumento quali: oidio (= Erysiphe graminis), ruggini (= Puccinia graminis, striiformis, recondita), Fusarium, Septoria (Septoria tritici e nodorum), Cercosporella (Pseudocercosporella herpotrichoides).
Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni od alla comparsa delle prime pustole; per la protezione completa della coltura si rivelano per lo più opportune due applicazioni alla levata ed in fioritura, limitandosi eventualmente solo a quest'ultima nelle circostanze di minor pressione di infezione o sulle varietà meno sensibili.

Dosi d'impiego
500 g/ha in 300-500 lt di acqua.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con gli insetticidi ed anticrittogamici di più comune impiego su frumento, avendo l'avvertenza di versare il FIRODAL C nella botte riempita a metà e già contenente tali prodotti mantenuti in agitazione e completando successivamente il riempimento.
« Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg 1**

6449

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Erbicida di pre-emergenza del frumento tenero e duro, e di pre-semina e di pre-emergenza del girasole e della soia
Polvere Bagnabile

Composizione
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 30 Dinitramina pura
Gr. 20 Linuron puro
Coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Irritante per la cute. L'ingestione può provocare bruciori gastroesofagei, vomito, diarrea, subittero, albuminuria ed ematuria.

Terapia
Per la dermatosi pomate cortisoniche od antistaminiche.
Non è consigliabile la lavanda gastrica. Si consigliano fleboclisi glucosate, potassio, epato-protettori.

Avvertenza:
consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida selettivo:
— di pre-emergenza, per il diserbo del frumento tenero e duro;
— di pre-semina, e di pre-emergenza per il diserbo del girasole e della soia.
L'associazione dei due principi attivi (Dinitramina + Linuron) fornisce il controllo delle principali infestanti graminacee e dicotiledoni annuali.

Infestanti sensibili
a) Graminacee
Alopecurus, Apera, Lolium, Poa

b) Dicotiledoni
Alchemilla, Anagallis, Capsella, Cerastium, Matricaria, Papaver, Polygonum aviculare e convolvulus, Raphanus, Sinapis, Sonchus, Spergula, Stellaria, Thlaspi, Veronica.
Mediante sensibili sono Fumaria, Galium, Ranunculus, Viola.

MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI

A) Pre-emergenza
Frumento tenero e duro, girasole, soia:
Il trattamento va effettuato subito dopo la semina, prima dell'emergenza della coltura e delle infestanti.
Al momento del trattamento il terreno dev'essere ben sistemato, livellato, privo di zolle.
Il seme deve essere interrato a 3 cm. di profondità e ben ricoperto.

B) Pre-semina
Girasole e soia:
Il trattamento va effettuato prima della semina: entro 24 ore il prodotto deve essere incorporato nel terreno.
Dose: kg. 2,5/ha distribuiti con almeno 500 litri d'acqua.
Preparazione della poltiglia: mettere la dose in un recipiente; versarvi lentamente un volume doppio o triplo d'acqua mescolando; versare nell'irroratrice riempita a metà e portare a volume agitando.

Avvertenze
Non impiegare il prodotto su terreni filtranti, sabbiosi od estremamente compatti.
Al momento del trattamento il terreno deve possedere il giusto grado di umidità.
L'incorporazione nel terreno va eseguita soltanto dopo i trattamenti presemina.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Nel corso dei trattamenti, tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali»

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 6449 **Ministero della Sanità del** 4.7.85

8/84

6450

III CLASSE TOSSIC OGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

CIPOCLOR

Erbicida selettivo per il diserbo
della cipolla.
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 50 di Clortal-dimetile puro
gr. 20 di Propaclor puro
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **CIPOCLOR** è un erbicida selettivo di pre-emergenza per la cipolla, dotato di ampio spettro di attività.
Possiede un'azione antigermogliante sui semi delle infestanti annuali sensibili impedendone lo sviluppo.
Pertanto non esplica azione sulle infestanti già nate e sui loro semi già germogliati.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Spettro d'azione

a) **Infestanti annuali sensibili:**
Monocotiledoni: Alopecurus, Digitaria, Poa annua, Setaria.
Dicotiledoni: Amarantus, Anagallis, Chenopodium, Papaver, Portulaca, Stellaria, Senecio, Solanum, Veronica, Viola.

b) **Infestanti annuali medio resistenti:**
Capsella, Euphorbia, Fumaria, Matricaria, Poligonum spp.

c) **Infestanti annuali resistenti:**
Raphanus, Sinapis.
Sono resistenti inoltre le infestanti perenni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il **CIPOCLOR** va distribuito immediatamente dopo la semina della coltura.
Il terreno, prima del trattamento, deve essere ben lavorato, sminuzzato, livellato, ripulito da erbacce, e deve avere un sufficiente grado di umidità. Se si opera in terreno asciutto è opportuno effettuare un'irrigazione entro 8-10 giorni dal trattamento.

Dosi per ettaro:
— terreni filtranti, sciolti, sabbiosi: kg. 12;
— terreni di medio impasto: kg. 14;
— terreni pesanti, argillosi: kg. 16.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua, indi versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Evitare durante il trattamento che lo spruzzo giunga su colture vicine.

AVVERTENZE

Effettuare il trattamento in giornate senza vento.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

Reg. n. 6450 **Ministero della Sanità del** 4.7.85
5/84

6451

AGROIL è una emulsione a base di olio minerale raffinato specifico per la lotta contro le cocciniglie degli Agrumi, meli, peri, peschi, susini, albicocchi, piante ornamentali. È inoltre efficace contro uova di **ragno rosso** (specie in miscela) e **tripidi**.
Si può impiegare sia per trattamenti invernali che primaverili-estivi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Melo-Pero: Trattamenti invernali impiegare 3-3,5 kili per 100 litri di acqua.
Trattamenti primaverili-estivi impiegare 2 kili per 100 litri di acqua.
Agrumi: contro Cotonello e Iceria Kg. 3 per 100 litri di acqua contro cocciniglie (Biacarossa, a virgola, bianca, parlatoria) impiegare kg. 2 per 100 litri di acqua. Durante il periodo estivo ridurre le dosi a 1-1,5 kili.
Olivo: usare kg. 1,8-2 per 100 litri di acqua contro le Cocciniglie, quali: Cotonello, mezzo grano di pepe.
Piante ornamentali: in pieno campo 1-2 kili per 100 litri di acqua contro le Cocciniglie.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Può essere miscelato con tutti gli antiparassitari in commercio, salvo: polisolfuri, zolfi, antioidici, Captan, faltan, captafol. Usare cautela nel miscelare AGROIL con Carbaryl e TMTD.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg. 20

AGROIL

INSETTICIDA SOTTO FORMA DI EMULSIONE A BASE DI OLIO MINERALE

Composizione:

Olio Minerale (Con residuo insulfonabile minimo del 95%)	g. 80
Emulsionanti, diluenti	q.b.a g. 100

III CLASSE

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

Registrazione Ministero Sanità n. 6451 **del** 4.7.85

Officina di produzione: LABORATORI CHIMICI CIFA
S.S. Padana Superiore
CARAVAGGIO (Bergamo)

pavoni&c S.P.A.
Divisione antiparassitari
Via Francesco Crispi, 129
CATANIA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione, per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non mangiare e non fumare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Durante la preparazione e l'impiego usare, tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

6452

NATURA DEL RISCHIO: SOSTANZA PERICOLOSA PER INGESTIONE, PER INALAZIONE E PER CONTATTO CON LA PELLE

NORME PRECAUZIONALI:

- **Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;**
- **Conservare la confezione ben chiusa;**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;**
- **Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;**
- **Non operare contro vento;**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;**
- **Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il Medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

L'ORMEX DR è un fitoregolatore auxinico il cui impiego è consigliato per il diradamento chimico dei frutticini di melo. L'azione diradante consente di ottenere frutti con migliori caratteristiche organolettiche, di maggiore ed uniforme pezzatura e con maturazione più contemporanea. L'ORMEX DR è particolarmente indicato per la Golden Delicious della quale tende a ridurre anche il fenomeno della rugginosità.

L'ORMEX DR, come tutti i fitoregolatori, è influenzato nella sua azione dai fattori ambientali, si consiglia pertanto di operare i trattamenti con temperature attorno ai 18-20° C, in assenza di sole, forte vento e con umidità relativa non eccessivamente bassa né elevatissima.

EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO:

Il trattamento va effettuato quando i frutticini centrali di lamburde nate su legno vecchio hanno raggiunto un diametro medio di 7-8 mm.

Si tenga presente che l'effetto diradante è massimo su frutticini con diametro compreso tra 7 e 12 mm. Superato tale diametro del frutticino l'azione diradante va via via affievolendosi fino a manifestarsi un effetto anticascola quando i frutticini abbiano superato un diametro di 22-24 mm.

VARIETÀ	DOSI x 100 LT. ACQUA
GOLDEN DELICIOUS	GR. 160-170
STAYMAN RED, GRAVENSTEIN, WINESAP	GR. 140
JONATHAN	GR. 110-120

ORMEX DR

CLASSE TOSSICOLOGICA III

FITOREGOLATORE DIRADANTE DEL MELO

COMPOSIZIONE:

NAA Puro .... gr. 6
Coformulanti .... q.b. a gr. 100

TIPO DI FORMULAZIONE:
Polvere Solubile

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON
PRUDENZA

SUNCHEMICAL PRODOTTI CHIMICI E BIOLOGICI PER L'INDUSTRIA E L'AGRICOLTURA

S.a.S. - Via Lunga, 16/P - 40058 Crespellano (Bo) - Tel. (051) 969801-03

Sulle varietà non menzionate è opportuno effettuare dei saggi preliminari prima di estendere l'applicazione. Si consiglia l'impiego su DELICIOUS ROSSE e ROSA DI CALDARO.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Sciogliere la quantità indicata nella quantità d'acqua prevista e distribuire uniformemente con un comune atomizzatore badando a colpire con il getto la metà superiore della chioma. Si consiglia-no le prime ore del mattino o il tardo pomeriggio. Si consiglia inoltre di non diradare: piante giovani all'inizio dell'attività produttiva, piante soggette naturalmente ad abbondante cascola, piante non in buono stato di salute, piante i cui frutticini, subito dopo l'allegagione, si presentino uno solo o nessun seme.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: NON MISCELARE L'ORMEX DR CON ALCUN PRODOTTO.

INTERVALLO FRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 20 giorni minimo

ATTENZIONE
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRI USO È PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVATI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

Officina di produzione:
SCAM srl - Via Bellaria n° 164 - S. MARIA DI MUGNANO (MO)

Registrazione del Ministero della Sanità
N° 6452 del 4.7.85

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO KG. 0,500 AL NETTO DELLA CONFEZIONE

6453

NATURA DEL RISCHIO: SOSTANZA PERICOLOSA PER INGESTIONE, PER INALAZIONE E PER CONTATTO CON LA PELLE.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo non accessibile ai bambini e agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'uso del prodotto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il Medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO:
Talee legnose di pero, melo e vite
A SECCO: impolverare appena la parte terminale delle talee toccando la polvere con l'apice del taglio interessato alla radicazione, avendo cura di applicare tale procedimento ad ogni singola talea scuotendo via la parte eccedente del prodotto
Immergere poi la piantina, nel composto di terra preparata
IN SOLUZIONE: sciogliere 200 gr. di ORMEX RA in 10 litri di acqua
Immergere la talea per una profondità di 2-3 centimetri e lasciarla a bagno per circa 10-12 ore. Porla poi a dimora.
Per TALEE DI PIANTE LEGNOSE ANCORA ERBACEE:
A SECCO: impolverare appena la base della talea immergendola per circa 2-3 centimetri nella polvere ORMEX RA. Togliere l'eccesso di prodotto con un leggero scuotimento e mettere a dimora facendo attenzione di non asportare la polvere applicata.
IN SOLUZIONE: sciogliere 30-50 gr. di ORMEX RA per ogni 10 litri di acqua. Immergere la base delle talee per circa 2-3 centimetri nella soluzione così preparata e lasciarle a bagno per circa 4-5 ore. Porle poi a dimora.
Per TALEE DI PIANTE LEGNOSE NON COMPLETAMENTE LIGNIFICATE:
A SECCO: operare come nelle precedenti istruzioni.
IN SOLUZIONE: sciogliere 100 gr. di ORMEX RA in 10 litri di acqua.

ORMEX RA

CLASSE TOSSICOLOGICA III

ORMONE RADICANTE

COMPOSIZIONE:

NAA Puro	gr. 0,9
Coformulanti	q.b. a gr. 100

TIPO DI FORMULAZIONE:
Polvere

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON
PRUDENZA

SUNCHEMICAL PRODOTTI CHIMICI E BIOLOGICI PER L'INDUSTRIA E L'AGRICOLTURA
S.a.S. - Via Lunga, 16/P - 40056 Crespellano (Bo) - Tel. (051) 969801-03

Immergere la talea per circa 2-3 centimetri e lasciarla a bagno per circa 7-8 ore. Porle poi a dimora.
TALEE ERBACEE DI COLTURE FLOREALI: (azalea, ciclamino, fuxia, geranio) in vivaio:
A SECCO: impolverare appena la parte terminale della talea toccando con la polvere l'apice del taglio interessato alla radicazione, avendo cura di applicare tale procedimento ad ogni singola talea e scuotendo via la parte eccedente del prodotto. Immergere la piantina, nel composto di terra preparata.
IN SOLUZIONE: sciogliere 30-50 gr. di ORMEX RA in 10 litri di acqua ed immergere la base della talea per circa 2-3 centrimetri nella soluzione così preparata. Lasciarla a bagno per 5-6 ore e porla poi a dimora.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: NON MISCELARE L'ORMEX RA CON ALCUN PRODOTTO

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVATI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante ed agli animali.

Officina di produzione:
SCAM srl - Via Bellaria N° 164 - S. MARIA DI MUGNANO (MO)

Registrazione del Ministero della Sanità
N° 6453 del 4.7.85

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO KG **0,500** AL NETTO DELLA CONFEZIONE

6454

NATURA DEL RISCHIO: SOSTANZA PERICOLOSA PER INGESTIONE, PER INALAZIONE E PER CONTATTO CON LA PELLE.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo non accessibile ai bambini e agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'uso del prodotto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il Medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO E DOSI:
Diluire ORMEX AN in ragione di 100 cc. per ettolitro di acqua per le mele e 60 cc. per ettolitro di acqua per le pere. Con la soluzione ottenuta irrorare abbondantemente tutta la chioma 4-6 settimane prima del raccolto. Le dosi indicate si riferiscono ad una temperatura per circa 20°; per temperature più elevate diminuire proporzionalmente la concentrazione aggiungendo alla soluzione già preparata 15-20 litri di acqua per ettolitro ogni 5° in più di temperatura. Effettuare il trattamento nelle ore serali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: NON USARE IN MISCELA CON ALTRI PREPARATI

ORMEX AN

CLASSE TOSSICOLOGICA III

ORMONE ANTICASCOLA

COMPOSIZIONE:
NAA Puro ... gr. 3
Solvente e bagnante ... q.b. a gr. 100
Contiene glicole etilenico

TIPO DI FORMULAZIONE:
Liquido

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON
PRUDENZA

SUNCHEMICAL PRODOTTI CHIMICI E BIOLOGICI PER L'INDUSTRIA E L'AGRICOLTURA
S.a.S. - Via Lunga, 16/P - 40056 Crespellano (Bo) - Tel. (051) 969801-03

INTERVALLO DI TEMPO FRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 4 settimane

ATTENZIONE
DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: ogni altro uso è pericoloso.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Officina di produzione:
SCAM srl - Via Bellaria n° 164 - S. MARIA DI MUGNANO (MO)

Registrazione del Ministero della Sanità
N° 6454 del 1°11.7.1985

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO KG. 0,500 AL NETTO DELLA CONFEZIONE

6455

(ETICHETTA)

Dueci Gibberelline
Fitoregolatore
Classe III

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono: Acido Gibberellico di ISOMERO A_3 puro gr. 1,8 - Ecoipienti q.b. a gr. 100 - Contiene etilen-glicole-monometiletere.

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Per l'uso leggere attentamente le istruzioni nel foglietto illustrativo interno.

NATURA DEI RISCHI DI INTOSSICAZIONE: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione, per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI E RISCHI: Conservare il prodotto chiuso a chiave in luoghi inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti, bevande, corsi d'acqua. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'uso del prodotto. Evitare di ingerirlo e di portarlo a contatto con la bocca e gli occhi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Non operare contro vento.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: Stimolante ormonico dispersibile a base di acido gibberellico da impiegarsi in floro-orto-frutticoltura.

CONFEZIONE DA GR.50

REGISTRAZIONE MINISTERO SANITA' N. 6455... DEL 11-7-1985

Dueci S.r.l. - Industria Fitochimica
Via Enrico Mattei n. 4 - Castello d'Argile - (BO)

Officina di produzione propria. Castello d'Argile (BO)

(FOGLIO ILLUSTRATIVO)

DUECI
GIBBERELLINE
CLASSE III

FRAGOLA / CARCIOFO
VITE
PERO
CILIEGIO
ARANCIO - LIMONE

—

POMODORO
SEDANO

—

FLORICOLTURA

FITOREGOLATORE STIMOLANTE
AD AZIONE POLIVALENTE DA
IMPIEGARSI IN FLORO - ORTO -
FRUTTICOLTURA

DUECI GIBBERELLINE

STIMOLANTE ORMONICO DISPERSIBILE A BASE DI ACIDO GIBBERELLICO DA IMPIEGARSI IN FLORO-ORTO-FRUTTICOLTURA.

COMPOSIZIONE:

100 gr. di prodotto contengono:
Acido Gibberellico di ISOMERO A_3 puro gr. 1,8
eccipienti q.b. a gr. 100
contiene etilen-glicole-monometiletere

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza.

NATURA DEI RISCHI DI INTOSSICAZIONE: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione, per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI E RISCHI: Conservare il prodotto chiuso a chiave in luoghi inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti, bevande, corsi d'acqua. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'uso del prodotto. Evitare di ingerirlo e di portarlo a contatto con la bocca e gli occhi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non operare contro vento.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO:

Floricoltura - Utilizzare il prodotto alla dose di gr. 1 - 2 ogni 100 litri di acqua. Si consiglia di impiegare il prodotto alla comparsa dei primi boccioli. Tale intervento è [illegible] al fine di anticipare ed aumentare la fioritura con fiori [illegible] dimensioni superiori e maggiormente colorati. Particolarmente consigliato su: Azalea, Ciclamino, Fuchsia, Geranio, Ortensia, Crisantemo, Anemone, Fiordaliso.

ORTICOLTURA:

Carciofo - Per ottenere l'anticipo della maturazione si fanno trattamenti al formarsi del primo bozzo fiorale utilizzando il prodotto alla dose di gr. 1-2 ogni 100 litri di acqua. Per anticipare le produzioni, aumentare la dose a gr. 3 ogni 100 litri di acqua, trattando 20 giorni prima del periodo di maggior produzione.

Fragola - Per stimolare la produzione, versare gr. 2 in 100 litri di acqua e fare trattamenti poco prima della fioritura.

Pomodoro - Per migliorare l'allegagione, intervenire in fase di fioritura utilizzando il prodotto alla dose di gr. 1 ogni 100 litri di acqua.

Sedano - Per anticipare la raccolta e per l'incremento del peso effettuare un trattamento 30 giorni prima della raccolta alla dose di gr. 2 ogni 100 litri di acqua.

FRUTTICOLTURA:

Pero - Per migliorare l'allegagione dei frutti all'inizio della fioritura trattare alla dose di gr. 1-2 ogni 100 litri di acqua.

Vite - Per migliorare l'allegagione, per ottenere maggior uniformità, maggior ingrossamento degli acini e per avere un grappolo meno serrato, utilizzare il prodotto alla dose di gr. 1-3 ogni 100 litri di acqua.

Arancio - Per aumentare il peso del frutto e la qualità della buccia, effettuare uno o più trattamenti alla dose di gr. [illegible] ogni 100 litri di acqua dopo l'invaiatura.

Clementino - Per aumentare la pezzatura e l'allegagione, impiegare il prodotto alla dose di gr. 1 ogni 100 litri di acqua.

Limone - Per posticipare la raccolta ed aumentare la [illegible] bilità in magazzino effettuare i trattamenti prima della invaiatura alla dose di gr. 1 ogni 100 litri di acqua.

Ciliegio - Per migliorare l'allegagione e per diminuire la cascola, effettuare un trattamento prima della fioritura, avendo cura di ripetere due o tre volte ad allegagione avvenuta. Utilizzare il prodotto alla dose di gr. 1 ogni 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non miscelare il DUECI GIBBERELLINE con alcun prodotto.

L'INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA E' DI 20 GIORNI.

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI / OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVATI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali".

PRODOTTO E MESSO IN COMMERCIO DA DUECI s.r.l.-Industria Fitochimica-
Via Enrico Mattei n. 4 Castello d'Argile -BO-

REGISTRAZIONE MINISTERO SANITA' N............ DEL ....

DA NON VENDERSI SFUSO

6456

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche: attivo per azione di contatto. Devitalizza i giovani tessuti vegetali in rapido accrescimento producendo una necrosi selettiva.

Colture protette: tabacco.

Scopo dell'impiego: controllo selettivo dei germogli ascellari e pedali.

Concentrazioni e dosi d'impiego: nell'applicazione **manuale**, s'impiega alla dose di 4-6 litri di prodotto in 96-94 litri d'acqua, utilizzando 15-20 cc. di miscela per pianta, corrispondente a 50-60 piante per litro di miscela. Nell'applicazione **meccanica**, s'impiega alla dose di 3-5 litri di prodotto in 97-95 litri d'acqua, utilizzando da 800 a 1000 litri di miscela per ettaro. Le dosi inferiori si usano per i tabacchi di varietà chiara, le più alte per le varietà scure.

Epoche d'impiego: il prodotto può essere impiegato sia prima che dopo la cimatura. Nel **primo caso** il trattamento viene eseguito prima dell'apertura dei bottoni florali, cimando poi entro la settimana e asportando i germogli più lunghi di 3 cm. Nel **secondo caso** si cima allo stadio compreso fra l'allungamento dei bottoni florali e l'apertura dei fiori, asportando come regola i germogli lunghi più di 3 cm. e trattando entro 2 giorni, meglio entro le 24 ore, dalla cimatura.

Metodi d'applicazione: è determinante per il buon esito che il prodotto venga a contatto con i germogli, scorrendo lungo lo stelo della pianta; sia nell'applicazione manuale che meccanica debbono pertanto essere impiegati ugelli producenti un getto grossolano e mantenuti ad un'altezza tale da permettere che la miscela raccolta dalle foglie venga convogliata e scorra liberamente lungo il fusto delle piante fino alla base. Con mezzi d'irrorazione **manuali**, impiengado pompe a spalla, si mantenga nel serbatoio una debole pressione, appena sufficiente a fare uscire il liquido, mantenendo l'ugello, montato su un raccordo curvo, rivolto verso il basso a 15-20 cm. dalla cima delle piante. Con mezzi d'irrorazione **meccanici**, è importante l'accurata taratura della macchina affinché l'applicazione sia omogenea. Gli ugelli, tre per fila di piante e disposti a 20 cm. di distanza fra loro, sono rivolti verso il basso: quello centrale verticale e allineato con la fila delle piante, i laterali inclinati verso l'interno. L'altezza della barra deve essere tale da mantenere gli ugelli a 30-40 cm. dalla cima delle piante. La pressione assai bassa, 0,5-1 atm., permette la formazione di gocce grossolane. La velocità d'avanzamento deve essere tale da permettere che il giusto quantitativo di miscela venga raccolto da ogni pianta.

Numero d'applicazioni: nella normalità dei casi è sufficiente un solo trattamento per un adeguato controllo dei germogli ascellari; in caso di forte attività vegetativa può essere utile un secondo trattamento a 10 giorni dal primo. Un trattamento integrativo con un prodotto sistemico che inibisca la formazione di nuovi germogli è vivamente consigliato, specie nel caso di trattamenti meccanici.

Avvertenze per l'impiego:
- Prima dell'uso agitare il prodotto nel contenitore. Preparare la miscela, aggiungendo l'acqua al prodotto, subito prima dell'impiego e mantenerla agitata nel serbatoio dell'irroratore.
- Il prodotto agisce entro un'ora dal trattamento; un'eventuale pioggia dopo un'ora dal trattamento non ne pregiudica l'esito. Non trattare durante la pioggia o con le foglie bagnate.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: usare il prodotto da solo. Non eseguire trattamenti con antiparassitari nello stesso giorno d'applicazione dell'antigermoglio.

Fitotossicità:
- Evitare che la miscela bagni la pagina inferiore delle foglie delicata o soggetta a ustionarsi; non trattare in giornate ventose e su piante inclinate.
- Non trattare nelle ore più calde della giornata: al mattino attenere che la rugiada si sia asciugata, al pomeriggio che le piante si siano riprese dall'appassimento meridiano. Non trattare nella tarda serata.
- Non trattare piante ammalate, malnutrite o comunque sofferenti.
- Rispettare le dosi consigliate: esse comunque hanno carattere generico e vanno messe a punto caso per caso tenendo conto dei fattori ambientali.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

Attenzione! da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

litri

ROYALTAC 85

FITOREGOLATORE

Composizione:

Miscela di alcoli grassi C_6-C_{12} . . . . g. 85
(contenente 54% di n-decanolo)
Coformulanti . . . . q.b. a g. 100

Prodotto ad azione di contatto per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco.

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile.

IV CLASSE

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

UNIROYAL CHIMICA S.p.a.
Viale delle Industrie, 40
LATINA SCALO (LT)

Stabilimento produttore:

UNIROYAL CHIMICA s.p.a.
LATINA SCALO (LT)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 6456 del 1°11.7.1985

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

6457

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchiti, effetto Antabuse (in casi di assunzione di alcool), irritazione della cute e delle mucose in caso di contatto (dermatiti, congiuntiviti, faringiti, ecc.) nonchè manifestazioni allergiche cutanee e bronchiali.

Terapia:

Molti dei sintomi tossici possono essere provocati dai solventi organici presenti nel formulato; pertanto la terapia deve tener conto anche dei danni causati da questi.
I solventi possono provocare gravi lesioni epatiche, renali e a carico del sistema nervoso centrale e periferico (particolarmente i distillati del petrolio possono causare polmonioli chimiche); tutte queste forme richiedono idonee terapie sintomatiche.
Il vomito non va provocato. Somministrare grandi quantità di acqua.
Se il paziente vomita spontaneamente, somministrare ancora liquidi, dopo averlo intubato.
Se il paziente è incosciente non somministrare nulla per bocca.
Ricoverare il paziente in un centro di rianimazione.
La lavanda gastrica, a paziente intubato, va praticata con una soluzione di 200-300 ml di acqua in cui siano stati sciolti 30-60 g di carbone attivo.
Purganti salini. Terapie sintomatiche mirate.

Per le manifestazioni cutanee e mucose rimuovere gli abiti contaminati, lavaggio con abbondante acqua della pelle e degli occhi per almeno quindici minuti, pomate oftalmiche e dermatologiche.
Nel casi gravi o sospetti gravi, ricovero urgente in Centri di Rianimazione.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

ANTIGIAVONE L

Diserbante selettivo liquido emulsionabile specifico per eliminare il giavone in risaia

COMPOSIZIONE

Molinate puro . . .	g 72
Coadiuvanti e inerti .	q.b.a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

p. p. ICI SOLPLANT s.p.a.

ANTIGIAVONE L elimina le varie specie di giavone senza danneggiare il riso agendo per assorbimento radicale.

MODALITA' DI IMPIEGO

Epoca:

Alternativamente il trattamento può essere effettuato:

1) Pre-semina del riso:
a) su risaia asciutta da due settimane prima della semina sino al giorno della stessa
b) su risaia sommersa due o tre giorni prima della semina

2) Post-emergenza del riso: su risaia sommersa; da qualche giorno dopo l'emergenza del riso sino a 20-25 giorni dopo. Sempre prima dell'accestinamento del giavone.

Metodo:

Irrorazione uniforme della dose/ettaro emulsionata nella quantità di acqua che la irroratrice eroga sull'ettaro.

Pre-semina del riso

1-a) **su risaia asciutta:** su terreno precedentemente predisposto e privo di erbe infestanti.
Immediatamente dopo l'irrorazione provvedere all'interramento del prodotto con erpici a dischi o rotanti o con due passaggi incrociati di erpice a denti fissi. Sommergere, quindi la risaia e subito, o qualche giorno dopo, seminare preferibilmente a spaglio.
Per i 40 giorni successivi la risaia non deve essere messa in asciutta ed il livello dell'acqua deve essere mantenuto tale da non permettere affioramenti del terreno in corrispondenza dei quali il prodotto risulterebbe inefficace.

1-b) **su risaia sommersa:** allorchè a causa della eccessiva permeabilità del terreno, sia opportuno eseguire i lavori complementari (livellamento e costipamento), su risaia sommersa, l'Antigiavone L può essere distribuito subito dopo il compimento di tali lavori ad acqua ferma anche torbida.
Non procedere alla messa in asciutta per 40 giorni dal trattamento.

Post-emergenza del riso

2) **su risaia sommersa:** questo è il metodo più usato. Il trattamento viene effettuato da 15 a 25 giorni dopo la semina del riso allorchè i giavoni abbiano raggiunto lo stadio di 2-4 foglie e prima che accestiscano.
Antigiavone L deve essere distribuito su risaia sommersa con acqua alta 8-10 cm. Dopo il trattamento l'acqua sarà mantenuta ferma per 2-3 giorni per favorire la fissazione del diserbante nel terreno.
In seguito, il livello dell'acqua sarà mantenuto ad una altezza tale da non permettere affioramenti del terreno in corrispondenza dei quali l'azione del prodotto risulterebbe inefficace.

Mezzi: Irroratrici a bassa pressione e a medio volume.
Dosi: Identiche per le due epoche alternative (1-2)
Terreni argillosi - kg 6 di Antigiavone L per ha
Terreni torbosi - kg 6,5-7 di Antigiavone L per ha

Da non applicare con mezzi aerei

Attenzione: prendere tutte le misure perchè la nube di irrorazione non raggiunga colture sensibili limitrofe (viti, frutta, leguminose, colture industriali ed ortive).

COMPATIBILITA'

Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per tutte le altre colture.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - CRESPELLANO (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n° 6457 del 11.7.1985

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg

6458

METONEX

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI METOMIL.

CLASSE I

VELENO

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:

Metomil puro	gr. 25
Coformulanti q.b.a	gr. 100

CLASSE I

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968, n. 1255.

CARATTERISTICHE: Il Metonex controlla larve e adulti di alcuni insetti che attaccano fruttiferi, vite, colture industriali ed ortive.

NATURA DEL RISCHIO: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - conservare la confezione ben chiusa - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - evitare di respirarne i vapori - non operare contro vento - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi - dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i pezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva) - in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta - nel caso che il prodotto raggiunga incidentalmente gli occhi lavarli per 15 minuti con acqua abbondante - recarsi dal medico.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi di intossicazione: miosi, sudorazione profusa, debolezza, polso lento, nausea e vomito, tremori muscolari, visione confusa, crampi addominali e diarrea.
TRATTAMENTO: Nel caso di inalazione trasportare il paziente in ambiente non contaminato, nel caso di contatto togliere gli indumenti contaminati e lavare prontamente la pelle e gli occhi contaminati con acqua abbondante.
In caso di ingestione: lavanda gastrica. All'apparire di segni locali o sistemici o di sintomi di avvelenamento colinisterasico somministrare atropina.
Intossicazione leggera: 1,2-2 mg. per via intramuscolare o intravenosa, ripetendo il trattamento a intervalli di 10-30 minuti fino a comparsa di fenomeni di atropinizzazione.
Intossicazione severa: 2-4 mg. per via intravenosa ripetendo la somministrazione di 2 mg. ogni 3-10 minuti fino a scomparsa dei segni o dei sintomi.
Non somministrare Contrathion: controindicati anche la morfina e gli altri depressori della respirazione. Se necessario rimuovere le eccessive secrezioni e mantenere aperte le vie respiratorie. In caso di severa intossicazione praticare la respirazione artificiale o ossigenoterapia. Per alleviare le convulsioni nel caso che interferiscano con la respirazione e non siano alleviate dall'atropina, somministrare Sodio Thiopental (soluzione 2,5 %) intravena.
Pronto soccorso: Se ingerito provocare il vomito con acqua salata calda (un cucchiaio da tavola di sale in un bicchiere di acqua) ripetendo fino che il vomito non sia chiaro. Se inalato, allontanare dall'ambiente contaminato, far coricare e riposare calmo. In caso di contatto togliere gli abiti contaminati e lavare la pelle e gli occhi contaminati con abbondante quantità di acqua. Se il paziente mostra difficoltà respiratorie praticare immediatamente la respirazione artificiale. Somministrare 2 tavolette di atropina da 0,6 mg. per via orale o facendole sciogliere sotto la lingua se sono disponibili. In seguito ogni 10-15 minuti somministrare una tavoletta di atropina fino a che la gola e la pelle siano asciutte. Se necessario somministrare altre tavolette per mantenere asciutta la gola e la pelle.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleno.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO: Il Metonex si usa alla dose di gr. 150-200 per ettolitro di acqua con pompe a volume normale sulle seguenti colture:
MELO E PERO: contro: Afide brunastro e Afide verde - Cemiostoma, Litocolliete e Nepticula, applicandolo quando le larve di questi fitofagi sono al primo stadio.
VITE: contro: la Tignola alla sua prima comparsa (prima della fioritura).
POMODORO, FAGIOLI, PISELLI, MELANZANE e CUCURBITACEE: contro Afide verde, Nottua e Cavolaia.
FLORICOLTURA IN PIENO CAMPO:
- **ROSA:** contro Afide verde.
- **GAROFANO:** contro bega del garofano.
- **PIOPPO:** contro Afide verde, Afide nero e Rodilegno.
- **OLMO e SALICE:** contro Afide verde e Afide nero.
- **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:** contro Altica, Afidi e Nottue.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il Metonex è miscibile con tutti gli antiparassitari di comune impiego, ad eccezione dei polisolfuri e della poltiglia bordolese.
AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il pesce e il bestiame.
INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO FRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 14 GIORNI.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato ».
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali ».

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a — CENTO (Ferrara) — Tel. 906207

Stabilimento di produzione:
VISPLANT CHIMIREN s.r.l. - Via Salvi n. 1 - RENAZZO DI CENTO (FE)

Registrazione N. 6458 del 11.7.85 Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO PESO KG 1

6459

VITIRIL COMBI RAMATO

Fungicida cupro-organico sistemico e di contatto per trattamenti liquidi contro peronospora della vite, peronospora, alternaria e septoria del pomodoro, peronospora e alternaria della patata

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Vitiril Combi ramato contengono:
g 10 di oxadixil* puro
g 40 di folpet puro
g 15 di rame metallo (sotto forma di ossicloruro)
disperdenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomatologia: l'unica sintomatologia nota per l'Oxadixil è quella sperimentale: flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori. La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.

Il Folpet ha la seguente sintomatologia:
— azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea
— eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie
— possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

In caso di ingestione: far vomitare il paziente, ma mai se è in stato di incoscienza; quando non si verifica il vomito ed il paziente non è in stato d'incoscienza è raccomandata la lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua); digitale.

In caso di contaminazione degli occhi: lavare gli occhi con acqua corrente per circa 15 minuti. Se necessario somministrare pomata oftalmica anestetica o collirio. **In caso di inalazione:** atendere il paziente all'aria aperta e coprirlo bene tenendolo al caldo.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite, pomodoro e patata: 0,2-0,25% (200-250 g per 100 litri d'acqua).
N.B. - Su pomodoro il prodotto ha un'azione collaterale contro marciume grigio (Botrytis), disseccamenti e maculature batteriche.
I trattamenti si effettuano ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento stagionale. Nei trattamenti di chiusura intervenire con prodotti tradizionali di copertura.
Sulla **vite** si consigliano non più di quattro trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo; successivamente proseguire intervenendo con prodotti tradizionali cuproorganici o cuprici.
Su pomodoro e patata iniziare i trattamenti dal momento in cui si creano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Avvertenza: Usare la dose più elevata quando le condizioni ambientali e di suscettibilità della coltura sono particolarmente favorevoli. Usare sempre un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione impiegando 2-2,5 kg di formulato per ettaro.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare su vivai di vite

Compatibilità: Il Vitiril Combi Ramato è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; non miscibile con antiparassitari a reazione alcalina (poltiglia brodolese, polisolfuri ad es.) e olii minerali. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: si possono verificare fenomeni di fitotossicità se il trattamento viene eseguito a meno di 3 settimane da uno precedente con olii minerali.
Non intervenire durante la fioritura.
Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto; 40 giorni prima della vendemmia per le uve da vinificare per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: SANDOZ S.p.A. - Palazzolo Milanese (MI)

Registrazione Ministero Sanità n. 6459 **del** 11. 7. 85

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Kg

6460

RONILAN C COMBI

Fungicida polivalente

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

Clortalonil (*) puro	g. 50
Vinclozolin puro	g. 16,7
Coformulanti q.b. a	g. 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DISTRIBUZIONE E VENDITA:
BASF-Agritalia S.p.A., MILANO

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 LUDWIGSHAFEN/RHEIN
(Germania Federale)

Reg. Ministero della Sanità N. 6460 **del** 4.9.85

(*) Principio attivo della Diamond Shamrock Chemical

CARATTERISTICHE TECNICHE

Deriva dall'associazione di due principi attivi ad azione complementare: il Vinclozolin, particolarmente efficace contro le principali forme di Botrite, Sclerotinia e Monilia ed il Clortalonil, efficace contro una vasta gamma di funghi patogeni.
Il RONILAN C COMBI risulta particolarmente indicato nella maggior parte dei casi in cui, alla Botrite siano associati altri funghi patogeni.

IMPIEGHI E DOSI (per 100 litri di acqua)

Vite: Contro: Botrite - Peronospora - Escoriosi	g. 250-300
Fragola: Contro: Botrite - Vaiolatura	g. 200
Drupacee: Contro: Monilia - Bolla - Corineo - Ruggine - Ticchiolatura	g. 200
Pomodoro: Contro: Botrite - Peronospora - Alternaria - Cladosporiosi - Septoria - Sclerotinia	g. 100-150

Trattare iniziando dopo la prima fioritura e ripetere l'intervento ad intervalli di 10-15 gg.
Lattuga, Indivia, Radicchio: Contro: Peronospora - Sclerotinia - Botrite g. 150-200
Trattare iniziando dopo il trapianto quando le piantine hanno superato lo stadio di 6-8 foglie.
Distribuire il prodotto con almeno 1 litro di acqua per 10 mq.
DISINFEZIONE DI BULBI E SEMI: Fusarium, Botrite e Marciume bianco (Sclerotinia)
Aglio : 8-10 g. di prodotto per kg. di bulbilli (concia a secco)
Cipolla: 15-20 g. di prodotto per kg. di seme (concia a secco)
Bulbose da fiore: 400 g./100 l. - trattamento per immersione per circa 15'.
Non trattare semenzai o vivai

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

E' miscibile con i più comuni fungicidi attualmente in commercio. Si sconsiglia di miscelare a poltiglie fortemente alcaline e a liquidi emulsionabili.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

6461

Caratteristiche: liquido emulsionabile ad azione rapida per contatto. Distrugge selettivamente i tessuti molto giovani ed in rapido accrescimento dei germogli, senza danneggiare il fogliame.

Avversità combattute: germogli ascellari e pedali di lunghezza non superiore a 3 cm.

Colture protette: tabacco.

Dosi d'impiego:

— **Applicazione manuale:** preparare un'emulsione contenente il 4,5-5% di OFF-SHOOT-T 85 nel seguente modo: versare litri 4,5-5 di OFF-SHOOT-T 85 in 95,5-95 litri d'acqua e mescolare bene. Impiegare circa 15 cc della emulsione come sopra ottenuta per pianta, corrispondenti a litri 18-22 di OFF-SHOOT-T 85 per ettaro per il Beneventano ed il Nostrano del Brenta ed a litri 0 circa ad ettaro per il Kentucky.

— **Applicazione meccanica:** versare litri 4,5-5 di OFF-SHOOT-T 85 in 95,5-95 litri d'acqua e mescolare bene. Impiegare da 800 a 1000 litri d'emulsione ad ettaro a seconda del metodo di distribuzione usato e della varietà.

Epoche d'impiego: applicare l'OFF-SHOOT-T 85 nel periodo compreso fra 2 giorni prima e 2 giorni dopo la cimatura. Per ottenere i migliori risultati, cimare il tabacco allo stadio del bottone florale prima dell'apertura dei primi fiori. Durante la cimatura asportare gli eventuali germogli di lunghezza superiore a 3 cm.

Modalità d'impiego: trattare le piante dopo che la rugiada si è completamente asciugata, ma mai di tardo pomeriggio o di sera. Se piove dopo un'ora e mezzo dal trattamento non è necessario ripetere l'applicazione. L'OFF-SHOOT-T 85 può essere distribuito manualmente con qualsiasi tipo di pompa a spalla o meccanicamente con barre applicate alla trattrice. Per essere efficace, il prodotto deve giungere a contatto diretto con ciascun germoglio; per questo si distribuisce sulle foglie più alte della pianta. Tenere l'ugello o gli ugelli della pompa a distanza di circa 20 cm dalla cima nel caso di applicazione manuale e di cm. 30-40 nel caso di applicazione meccanica affinché i lembi fogliari, agendo da imbuto, raccolgano il prodotto e lo dirigano verso il fusto. In tal modo il prodotto scorre lungo il fusto della pianta e bagna successivamente tutti i germogli ascellari e pedali devitalizzandoli.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: non miscelare l'OFF-SHOOT-T 85 con altri prodotti e non applicare antiparassitari sulle piante lo stesso giorno del trattamento con questo antigermoglio.

Fitotossicità: impiegare l'OFF-SHOOT-T 85 quando la temperatura non supera i 35°C. La pagina inferiore delle foglie è sensibile al prodotto; evitare quindi che l'OFF-SHOOT-T 85 giunga a contatto con essa. Non trattare perciò con forte vento o con ugelli diretti dal basso all'alto.

Sospendere i trattamenti 7 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

OFF-SHOOT-T 85

ANTIGERMOGLIO PER IL TABACCO

IV CLASSE

Composizione:

Miscela di alcoli grassi C_6-C_{12} (contenenti 56% di n-decanolo) . gr. 85

Diluenti, emulsionanti . q.b. a gr. 100

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61 - 79.94.62
Telex: VERKIM 511046

Registrazione n. 6461 del 11.7.85 del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (BO)

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua • Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DA NON VENDERSI SFUSO

Litri

6462

PEAR FULL

Fitormone liquido per l'allegagione del pero

COMPOSIZIONE:

NAA puro	gr. 3,95
Coformulanti q.b. a . .	gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

- — Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- — Conservare la confezione ben chiusa;
- — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- — Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua;
- — Non operare contro vento;
- — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE:

Il PEAR FULL è un ormone vegetale che favorisce la allegagione su cultivar di pero. Favorisce la produzione dei frutti partenocarpici e stimola la formazione dei frutti a seme normale.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

Pero (William, Coscia, Abate Fétél, Decana del Comizio, Madernassa) cc. 100-150 / hl d'acqua quando i fiori assumono il caratteristico aspetto di palloncino ed hanno già iniziato per il 20-30% la loro apertura.

Le condizioni iniziali per il trattamento sono:
- — Temperatura fra 12 e 25° C.
- — Umidità dell'aria oltre il 70%.
- — Cielo coperto o sole tenue.

Durante le irrorazioni avere cura di bagnare tutta la chioma delle piante.

Non trattare su fiori già aperti né in giornate asciutte e ventose.

Sono consigliabili successivi trattamenti fogliari con forti unità di azoto.

DA NON APPLICÀRE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ:

Da non miscelare con altri antiparassitari.

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

DEMETRA ITALIA s.r.l.
Via S. Vitale, 5 - SESTO IMOLESE di Imola (Bo)

Officina di produzione: CIFO - S. Giorgio di Piano (Bo)

Reg. Ministero Sanità n. 6462 del 4.9.85

DA NON VENDERSI SFUSO lt. 1

6463

KELT E 18

ACARICIDA POLIVALENTE

COMPOSIZIONE
gr. 100 di prodotto contengono:

— DICOFOL puro gr. **18,5**
— Solventi ed emulsionanti q. b. a gr. **100**
Contiene XILOLO

CLASSE IIIª — **ATTENZIONE: Manipolare con prudenza**

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti, bevande, altre colture e corsi d'acqua. - Evitare di respirarne i vapori. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione: vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.

Consigli terapeutici: Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g. 25 di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questo acaricida hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1-0,2 g.) contro i tremori e le contrazioni muscolari fleboclisi di soluzione fisiologica contro la ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni: la morfina e l'alcool e, per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina e l'efedrina.

LA CHIMICA PER L'AGROZOOTECNIA
Stabilimento ed Uffici: TORRE DEL GRECO (NA)
Via Ponte della Gatta, 4 - Tel. (081) 8833711
Officina di Produzione: VISPLANT-CHIMIREN
Via Salvi, 1 - RENAZZO DI CENTO (FE)

Reg. N. 6463 del 4.9.85 del Ministero della Sanità

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

Il **KELT E 18** è un acaricida efficace contro i più importanti acari delle principali colture. La sua azione si estende a molte specie di acari resistenti agli altri acaricidi. Agisce per contatto contro gli adulti e le neanidi. Risulta meno efficace contro le uova, ma grazie alla sua azione residua agisce profondamente contro le ninfe in via di formazione. Il **KELT E 18** è caratterizzato da una rapida azione abbattente e da una lunga attività residua (da 1 a 2 mesi).

Il **KELT E 18** viene impiegato per la lotta contro le neanidi e gli adulti di Ragni rossi e gialli che infestano le piante da frutto quali: POMACEE - DRUPACEE - AGRUMI - VITE, le colture ortive quali: CARCIOFO - CUCURBITACEE - POMODORO - PEPERONE - PATATA - FINOCCHIO - BIETOLA - SEDANO - SPINACIO, le Colture Floreali in pieno campo o in serra e le Piante Ornamentali.

DOSE D'IMPIEGO: gr. 200/250 per 100 litri d'acqua.

Si consiglia di effettuare il trattamento all'inizio della Primavera alla schiusura della maggior parte delle uova invernali dei ragnetti rossi.

Per controllare gli attacchi durante l'estate, iniziare i trattamenti appena compaiono gli adulti.

Nel caso di forte infestazione e con la presenza di numerose uova, effettuare due trattamenti alla distanza di 10/14 giorni allo scopo di distruggere totalmente anche gli adulti nati successivamente.

Con i due trattamenti a breve distanza le piante rimarranno immuni per molto tempo. I migliori risultati si ottengono irrorando abbondantemente le piante in modo da ottenere una completa copertura. In caso di foglie difficilmente bagnabili, aggiungere gr. 50 di bagnante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Nei trattamenti Primaverili-Estivi il **KELT E 18** si può mescolare con un acaricida-ovicida. Il **KELT E 18**, inoltre, è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Si sconsiglia l'impiego del **KELT E 18** sulle melanzane perché fitotossico.

RISCHI DI NOCIVITA'

E' tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso Kg.**

6464

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Evitare di respirarne i vapori. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es. interrandole in fosse più profonde di un metro cospargendo di calce viva). - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.
Sintomi d'intossicazione: Sudorazione - Sete - Nausea - Spossatezza - Agitazione psicomotoria - Tachicardia - Dispnea - Notevole ipertermia - Colorazione gialla delle Sclere - La morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.
Consigli terapeutici: Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di Sodio all'1% ed Iposolfito di Sodio al 5%. - Emetici e Catartici se il paziente è cosciente. - Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago, molto frequenti nel caso di ingestione. - Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature di alcool, clisteri di acqua fredda. - Trasfusione e Fleboclisi glucosate al 5% o di soluzione elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. - Metil o Propiltiouracile per ridurre il Metabolismo basale. - Ossigeno, respirazione artificiale.
Controindicazioni: Atropina.

AVVERTENZA

Consultare un centro antiveleni.

SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO TUTTE LE FORME DI RAGNETTO ROSSO.

CLASSE II

NOCIVO

C O M P O S I Z I O N E

gr. 100 di prodotto contengono:

- BINAPACRYL puro gr. 38,4
— Solventi ed emulsionanti q. b. a gr. 100

Contiene XILOLO

THENODAN

italchimica S. r. l.

LA CHIMICA PER L'AGROZOOTECNIA
Stabilimento ed Uffici: TORRE DEL GRECO (NA)
Via Ponte della Gatta, 4 - Tel. (081) 8833711
Officina di Produzione: VISPLANT-CHIMIREN
Via Salvi, 1 - RENAZZO DI CENTO (FE)

Reg. N. 6464 del 4.9.85 del Ministero della Sanità

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

Il **THENODAN** combatte efficacemente tutte le forme (uova, larve ed adulti); di Ragno Rosso e Ragno Giallo.
Il **THENODAN** viene impiegato alle seguenti dosi:

FRUTTICOLTURA
Drupacee e Pomacee: Contro Acari:
— gr. 200 per Ettolitro d'acqua nei trattamenti pre-fiorali.
— gr. 150 per Ettolitro d'acqua nei trattamenti post-fiorali.

ORTICOLTURA
Pomodori - Fagioli - Cucurbitacee: Contro Acari:
— gr. 100-150 per Ettolitro d'acqua.

FLORICOLTURA in pieno campo o in serra: Contro Acari:
— gr. 100-150 per Ettolitro d'acqua.

Si consiglia di eseguire il trattamento alla comparsa degli adulti (quando per ciascuna foglia si notano 1 o 2 individui) ripetendo il trattamento dopo 8-10 giorni. Non irrorare nelle ore calde della giornata.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

Evitare di miscelare il **THENODAN** con esteri fosforici e con prodotti oleosi. Non aggiungere bagnanti.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, gli insetti utili, i pesci ed il bestiame. Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente meno di 20 giorni prima.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

6465

Natura dei rischi di intossicazione: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contato con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione: Vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astemia intensa, convulsioni.

Consigli terapeutici:

Intossicazione acuta, lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g. 25 di solfato di sodio). Per la liposubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0 1-0,2 g.) contro i tremori e le contrazioni muscolari fleboclisi di soluzione fisiologica conro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni: la morfina e l'alcol e per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina.

TEGITE

Acaricida - Ovicida

Composizione per 100 grammi di prodotto:

— Propargil puro . . . . g. 40
— Tetradifon puro . . . . g. 9,2
— Solventi ed emulsionanti . . . . q.b. a g. 100
(Contiene Xilolo)

CLASSE III

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

FITOCHIMICA GIULIANA

Corso Verdi, 69 - 34170 GORIZIA

Prodotto nello stabilimento CHEMIA spa di S. Agostino (Fe) - S. S. 255 - Km. 46

Reg. n. 6465 del 4.9.85 del Ministero della Sanità.

Peso Kg. 1 netto

Modalità d'impiego: prodotto acaricida-ovicida per la lotta contro ragnetti rossi, bruni, gialli infestanti fruttiferi· melo, nocciolo, mandorlo, ciliegio, pesco; agrumi: arancia, limone, mandarino, mandarancio, pompelmo; Colture orticole: pomodoro, patata, melanzana, peperone, zucca, melone, cocomero, zucchine; Colture floreali in pieno campo di serra: gladiolo, ciclamino, tulipano, crisantemo. Il prodotto è dotato di lunga persistenza di azione. Il prodotto s impiega alla dose di g. 80-100 per 100 lt. di acqua. La dose più elevata va usata nel caso di siccità, nel periodo estivo e contro forme resistenti.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodoto è tossico per i pesci e gli insetti utili.

Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 15 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

FITOCHIMICA GIULIANA

6466

TOPICIDA ITALCHIMICA

ESCA GRANULARE - SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO TOPI E RATTI

COMPOSIZIONE		
gr. 100 di prodotto contengono:		
— WARFARIN puro	gr.	0,025
— Sostanze appetibili	q. b. a gr.	100

CLASSE III*

ATTENZIONE!

Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per ingestione.

Sintomi di intossicazione: Emorragie cutanee e delle mucose - ematuria. Neutralizzano la vitamina K per cui a livello epatico si blocca la formazione di protrombina, la sintomatologia è pertanto prevalentemente emorragica.

Consigli terapeutici: Antidoto specifico: vitamina K 1 - vitamina C e P, consigliabili emotrasfusioni, in casi gravi.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il **TOPICIDA ITALCHIMICA** va posto nei punti di normale passaggio dei topi o nei punti riparati o nascosti frequentati normalmente dai topi.

E' indispensabile evitare di toccare l'esca con le mani: il topo potrebbe, all'odore che in essa vi rimane, fiutare l'inganno; per prenderla servirsi dell'accluso cucchiaino di plastica.

E' necessario continuare a somministrare l'esca per almeno una settimana. Il **TOPICIDA ITALCHIMICA** non agisce immediatamente, ma irrimediabilmente dopo alcuni giorni che viene ingerito.

E' consigliabile mettere vicino alle esche un piattino con acqua.

Qualora il punto dove viene posto il **TOPICIDA ITALCHIMICA** fosse di facile accesso per cani o gatti o altri animali domestici, è necessario coprire l'esca con una cassetta o qualsiasi altro oggetto che possa impedire agli animali domestici di consumare l'esca, senza precludere l'accesso ai topi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto si usa da solo.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, pesci e bestiame.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

italchimica S.r.l.

... gli specialisti per l'agricoltura

Uffici: TORRE DEL GRECO (NA) — Via Ponte della Gatta, 4 — Tel. (081) 883.37.11

Officina di Produzione: BIMEX S.p.A. — Via Cogolla — ISOLA VICENTINA (VI)

Reg. N. 6466 del 4.9.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

6467

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche: attivo per azione di contatto. Devitalizza i giovani tessuti vegetali in rapido accrescimento producendo una necrosi selettiva.

Colture protette: tabacco.

Scopo dell'impiego: controllo selettivo dei germogli ascellari e pedali.

Concentrazioni e dosi d'impiego: nell'applicazione **manuale**, s'impiega alla dose di 4-6 litri di prodotto in 96-94 litri d'acqua, utilizzando 15-20 cc. di miscela per pianta, corrispondente a 50-60 piante per litro di miscela. Nell'applicazione **meccanica**, s'impiega alla dose di 3-5 litri di prodotto in 97-95 litri d'acqua, utilizzando da 800 a 1000 litri di miscela per ettaro. Le dosi inferiori si usano per i tabacchi di varietà chiara, le più alte per le varietà scure.

Epoche d'impiego: il prodotto può essere impiegato sia prima che dopo la cimatura. Nel **primo caso** il trattamento viene eseguito prima dell'apertura dei bottoni florali, cimando poi entro la settimana e asportando i germogli più lunghi di 3 cm. Nel **secondo caso** si cima allo stadio compreso fra l'allungamento dei bottoni florali e l'apertura dei fiori, asportando come regola i germogli lunghi più di 3 cm. e trattando entro 2 giorni, meglio entro le 24 ore, dalla cimatura.

Metodi d'applicazione: è determinante per il buon esito che il prodotto venga a contatto con i germogli, scorrendo lungo lo stelo della pianta; sia nell'applicazione manuale che meccanica debbono pertanto essere impiegati ugelli producenti un getto grossolano e mantenuti ad un'altezza tale da permettere che la miscela raccolta dalle foglie venga convogliata e scorra liberamente lungo il fusto delle piante fino alla base. Con mezzi d'irrorazione **manuali**, impiengado pompe a spalla, si mantenga nel serbatoio una debole pressione, appena sufficiente a fare uscire il liquido, mantenendo l'ugello, montato su un raccordo curvo, rivolto verso il basso a 15-20 cm. dalla cima delle piante. Con mezzi d'irrorazione **meccanici**, è importante l'accurata taratura della macchina affinché l'applicazione sia omogenea. Gli ugelli, tre per fila di piante e disposti a 20 cm. di distanza fra loro, sono rivolti verso il basso: quello centrale verticale e allineato con la fila delle piante, i laterali inclinati verso l'interno. L'altezza della barra deve essere tale da mantenere gli ugelli a 30-40 cm. dalla cima delle piante. La pressione assai bassa, 0,5-1 atm., permette la formazione di gocce grossolane. La velocità d'avanzamento deve essere tale da permettere che il giusto quantitativo di miscela venga raccolto da ogni pianta.

Numero d'applicazioni: nella normalità dei casi è sufficiente un solo trattamento per un adeguato controllo dei germogli ascellari; in caso di forte attività vegetativa può essere utile un secondo trattamento a 10 giorni dal primo. Un trattamento integrativo con un prodotto sistemico che inibisca la formazione di nuovi germogli è vivamente consigliato, specie nel caso di trattamenti meccanici.

Avvertenze per l'impiego:
- Prima dell'uso agitare il prodotto nel contenitore. Preparare la miscela, aggiungendo l'acqua al prodotto, subito prima dell'impiego e mantenerla agitata nel serbatoio dell'irroratore.
- Il prodotto agisce entro un'ora dal trattamento; un'eventuale pioggia dopo un'ora dal trattamento non ne pregiudica l'esito. Non trattare durante la pioggia o con le foglie bagnate.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: usare il prodotto da solo. Non eseguire trattamenti con antiparassitari nello stesso giorno d'applicazione dell'antigermoglio.

Fitotossicità:
- Evitare che la miscela bagni la pagina inferiore delle foglie delicata e soggetta a ustionarsi; non trattare in giornate ventose e su piante inclinate.
- Non trattare nelle ore più calde della giornata: al mattino attenere che la rugiada si sia asciugata, al pomeriggio che le piante si siano riprese dall'appassimento meridiano. Non trattare nella tarda serata.
- Non trattare piante ammalate, malnutrite o comunque sofferenti.
- Rispettare le dosi consigliate: esse comunque hanno carattere generico e vanno messe a punto caso per caso tenendo conto dei fattori ambientali.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

Attenzione! da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

litri

SUCKER-OFF

FITOREGOLATORE

Composizione:

Miscela di alcoli grassi C_6-C_{12} . (contenente 54% di n-decanolo)		g. 85
Coformulanti	q.b. à	g. 100

Prodotto ad azione di contatto per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco.

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile.

IV CLASSE

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

AGRICO s.r.l.
Viale Masini, 22 - BOLOGNA

Stabilimento produttore:
SARIAF S.p.A. - Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 6467 **del** 4.9.85

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

6468

VELENO

CLASSE TOSSICOLOGICA 1ª

TRIFOCIDE PASTA

PRODOTTO DA USARSI SOLO COME DISERBANTE INVERNALE PER CEREALI

COMPOSIZIONE:
100 gr. di prodotto contengono:

DNOC puro gr. 46
Emulsionanti, solventi e bagnanti q.b. a gr. 100

CARATTERISTICHE:
Il Trifocide pasta è perfettamente selettivo anche sui cereali più sensibili; consente trattamenti precoci, evitando sottrazioni di sostanze nutritizie al terreno nel periodo in cui le basse temperature impediscono l'impiego di altri diserbanti. E' attivo contro le dicotiledoni annuali come: capsella, ederella, ranucolo, papavero, veccia, fumaria, veronica, camomilla, convolvolo è attivo contro la cuscuta dei medicai.

NATURA DEL RISCHIO:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - conservare la confezione ben chiusa - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - evitare di respirare i vapori - non operare contro vento - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi - dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva) - in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta.

Registrazione n. 6468 del Ministero della Sanità 4.9.85

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, ipertermia, colorazione gialla delle sclere.
TERAPIA: in caso di intossicazione acuta, ricorrere alla lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5% (non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni all'esofago, molto frequenti in caso di ingestione). Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda. Analettici (tipo simpatolo, veritolo e coramina) somministrati per via parenterale, se esiste una lieve sindrome ipotensiva; qualora questa fossa di grado elevato il paziente va ricoverato in reparto di rianimazione per trattamento più idoneo. Trasfusioni o fleboclisi glucosate ml. 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche in caso di collasso ed ipotensione grave. Metil e propiltiouracile fa ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale.
È controindicata l'atropina.

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

EPOCA - DOSE - MODALITÀ DI IMPIEGO:
Cereali: kg. 5 per ettaro in 800-1000 litri di acqua, per trattamento in dicembre-gennaio. kg. 6-8 per ettaro in 800-1000 litri di acqua, per trattamento in febbraio. kg. 10-12 per ettaro in 1000 litri di acqua all'epoca dell'accestimento.
Il momento più favorevole per il trattamento è determinato da: primo stadio di sviluppo dei cereali (da tre a quattro foglie in inverno, da 4 a 6 in primavera, temperatura fra i 5° e 20° C., umidità dell'aria elevata possibilmente oltre il 70%

Medica: kg. 1 per 100 metri quadrati in 30 litri di acqua (contro la cuscuta). Trattare 15 giorni prima della semina oppure su colture in atto sfalciando preventivamente il medicaio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: diluire la dose richiesta in poca acqua, agitare ed aggiungere il restante quantitativo d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ:
Non è compatibile con altri principi attivi - Va usato da solo.

IL PRODOTTO PUÒ ESSERE FITOTOSSICO PER LE COLTURE NON INDICATE IN ETICHETTA

RISCHI DI NOCIVITÀ:
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DA RISPETTARE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE AL CONSUMO: 20 giorni.

ATTENZIONE:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO Confezione da kg.: 5

DECCO-RODA S. p. A.
Via Emilia - C.P. 7 - 47032 BERTINORO (Forlì)

Officina di produzione:
PENNWALT HOLLAND B.V.
Casella Postale 7120 - ROTTERDAM
OLANDA

6469

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande e corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
ESTERI FOSFORICI: Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO: In caso di evidente ipossia con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al Centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa dei fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion ecc. somministrato per iniezione endovena lenta.
Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA:
Consultare un Centro antiveleni.

CARATTERISTICHE:
GEO-KOL è un insetticida microgranulare del terreno, attivo per contatto, asfissia ed ingestione. Viene impiegato contro Miriapodi (millepiedi, Blaniulus, Scutigerella) e contro gli insetti del terreno, dannosi soprattutto nel primo e più delicato periodo di vegetazione delle piantine come: larve di Ditteri (Phorbia, Bibionidi, Tipule), Coleotteri (Elateridi, Maggiolino), Lepidotteri (Nottue), Mosche resistenti agli insetticidi clorurati (larve delle mosche della carota, del cavolo, della cipolla), la prima generazione della Piralide del Mais, parassiti delle risaie quali Coppette, Chironomidi, larve di risaia, Hidrellia. GEO-KOL può essere impiegato in cerealicoltura, orticoltura, bieticoltura, floricoltura.

GEO-KOL

GEODISINFESTANTE AL 5% DI DIAZINONE
INSETTICIDA MICROGRANULARE
PER IL TERRENO

Composizione:
Diazinone puro g 5
Supporti granulari inerti q. b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Officine di produzione proprie:
KOLLANT INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Sede Legale: PADOVA - Italy
Uffici e Stabilimenti: VIGONOVO (VE)
Via C. Colombo, 7-7/A
Tel. (049) 50.28.55 - Telex 430813 KIC

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:
GEO-KOL si applica a pieno campo alla dose di 40-60 Kg/ha.
GEO-KOL è idoneo ad un impiego localizzato sulla fila da effettuare con apparecchi microgranulatori opportunamente tarati, che consentono un'uniforme distribuzione ed il necessario incorporamento nel terreno.
Questo tipo di applicazione, a seconda delle colture e delle attrezzature disponibili, può essere effettuato nei solchi di semina ai lati delle file.
Mais
— trattamento alla semina 20-25 Kg/ha
— trattamento, con attrezzature a trampolo, contro la prima generazione della Piralide, alla comparsa dei primi fori sulle foglie più giovani ancora in parte arrotolate (seconda metà di giugno) 30-35 Kg/ha
Patata - alla semina 20-25 Kg/ha
Tabacco - al trapianto 20-25 Kg/ha
Vivai di ornamentali (conifere, magnolia, oleandro, prunus, azalea, platano) 8-10 g/mq
Risaia - alla comparsa dei primi attacchi 10-15 Kg/ha
Barbabietola da zucchero - si consiglia l'impiego localizzato:
GEO-KOL deve essere distribuito a pieno campo prima della semina 40-60 Kg/ha
GEO-KOL va incorporato nello strato superficiale del terreno; tale operazione può venire effettuata sia durante la distribuzione del prodotto sia successivamente, mediante una leggera erpicatura od un'irrigazione.

AVVERTENZA:
Nei terreni leggeri vanno sempre usate le dosi più basse. Si sconsiglia l'impiego di GEO-KOL sia su terreni sabbiosi sia su quelli dove si possono formare ristagni d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':
Si sconsiglia la miscelazione con altri formulati.

RISCHI DI NOCIVITA':
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6469 del 4.9.85

PESO NETTO: kg

6470

DUECI ANTICASCOLA

Anticascolante liquido a base di acido alfanaftalenacetico per prevenire la caduta delle pomacee.

CLASSE III

Composizione: 100 gr. di prodotto contiene:
NAA puro gr. 1
Eccipienti q.b. a gr. 100

ATTENZIONE

Manipolare con prudenza.

NATURA DEI RISCHI DI INTOSSICAZIONE

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione, per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il prodotto chiuso a chiave in luoghi inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti, bevande, corsi d'acqua. Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'uso del prodotto, evitare di ingerirlo e di portarlo a contatto con la bocca e gli occhi. Dopo la manipolazione, in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO

DUECI ANTICASCOLA va usato normalmente 2-6 settimane prima della raccolta dei frutti in ragione di 25-35 gr/hl per le pere, 40-50 gr/hl per le mele. Indipendentemente che il trattamento sia effettuato su pero o melo, se dopo una settimana dall'intervento continuasse la caduta dei frutti, ripetere la somministrazione di DUECI ANTICASCOLA!
Per varietà precoci è preferibile intervenire circa 7/8 giorni prima della normale caduta.

"DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI"

COMPATIBILITÀ

Non miscelare DUECI ANTICASCOLA con alcun prodotto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA PER GLI USI CONSENTITI. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali".

DUECI s.r.l. Via E. Mattei, 4 - CASTELLO D'ARGILE (BO)

Officina di produzione:
DUECI s.r.l. Via E. Mattei, 4 - CASTELLO D'ARGILE (BO)

"DA NON VENDERSI SFUSO"

CONTENUTO: gr. 850

Registrazione Ministero Sanità n° 6470 del 4.9.

6471

Classe III

ATTENZIONE manipolare con prudenza

GALBEN® M 3-24
Sospensione Concentrata (Flowable)

Fungicida liquido dotato di azione sistemica e di copertura per la lotta contro la peronospora della vite del pomodoro e del tabacco

COMPOSIZIONE

Benalaxyl puro	g 3
Mancozeb puro	g 24
Veicoli disperdenti, bagnanti, coloranti e diluenti (contiene glicole monoetilenico)	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 6471 **del** 4.9.85

® Marchio registrato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

GALBEN M 3-24 Sospensione Concentrata (Flowable) è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare una elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso garantisce infatti una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.
La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi della vite e Alternaria e Septoria del pomodoro.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.

VITE

Peronospora (Plasmopara viticola): g 500

Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria. I successivi si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe.
In assenza di piogge infettanti un trattamento andrà, comunque, effettuato non più tardi della differenziazione dei grappoli florali (7-8 foglie). Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

TABACCO

Peronospora (Peronospora tabacina): g 700-800.
Trattamenti a scadenza fissa quindicinale, iniziando gli interventi a partire dal superamento della crisi di trapianto.
Per evitare le infezioni durante la fase di trapianto, intervenire con un trattamento in semenzaio, alle dosi indicate, 1-3 giorni prima della messa a dimora delle piantine in campo.

POMODORO

Peronospora (Phytophthora infestans): g 700-800

Applicazioni in pieno campo a cadenza fissa quindicinale a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione e fino e non oltre l'inizio della fioritura del primo palco.

Preparazione della sospensione

Stemperare il prodotto in poca acqua; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DIVIETI DI IMPIEGO
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità

Il GALBEN M 3-24 Sospensione Concentrata (Flowable) può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. È miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificasse casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

AGITARE PRIMA DELL'USO

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
- Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto;
- conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dell'umidità e dal calore;
- in caso di malessere, ricorrere al medico, mostrandogli questa etichetta;
- durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchiti, effetto Antabuse (in casi di assunzione di alcool), irritazione della cute e delle mucose in caso di contatto (dermatiti, congiuntiviti, faringiti, ecc.) nonchè manifestazioni allergiche cutanee e bronchiali.

Terapia:
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in Centri di Rianimazione.
Molti dei sintomi tossici possono essere provocati dai solventi organici presenti nel formulato, pertanto la terapia deve tener conto anche dei danni causati da questi.
I solventi possono provocare gravi lesioni epatiche, renali e a carico del sistema nervoso centrale e periferico (particolarmente i distillati del petrolio possono causare polmoniti chimiche); tutte queste forme richiedono idonee terapie sintomatiche.
Il vomito non va provocato. Somministrare grandi quantità di acqua.
Se il paziente vomita spontaneamente, somministrare ancora liquidi, dopo averlo intubato.
Se il paziente è incosciente non somministrare nulla per bocca.
Ricoverare il paziente in un centro di rianimazione.
La lavanda gastrica, a paziente intubato, va praticata con una soluzione di 200-300 ml di acqua in cui siano stati sciolti 30-60 g. di carbone attivo.
Purganti salini. Terapie sintomatiche mirate.
Per le manifestazioni cutanee e mucose rimuovere gli abiti contaminati, lavaggio con abbondante acqua della pelle e degli occhi per almeno quindici minuti, pomate oftalmiche e dermatologiche.
Controindicazioni: Alcool, olii, grassi.
AVVERTENZA:
Consultare un Centro antiveleni.

6472

HEMORAT AGRICOLO

- Topicida-Ratticida in zollette per la lotta contro i roditori dei campi.
- **COMPOSIZIONE:** Warfarin puro gr. 0,035
  appetenti q.b.a. gr. 100
- **CLASSE III.**
- **ATTENZIONE:** MANIPOLARE CON PRUDENZA.

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessbile ai bambini ed agli animali domestici;
- Conservare la confezione ben chiusa;
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- Non operare contro vento;
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Avvelenamento grave per ingestione.
Sintomi da intossicazione.
Emorragie cutanee e delle mucose - ematuria. Neutralizzano la vitamina K per cui a livello epatico si blocca la formazione di protrombina, la sintomatologia è pertanto prevalentemente emorragica.

Consigli terapeutici:
Antidoto specifico: vitamina K1 - vitamina C e P, consigliabili emotrasfusioni, in casi gravi.

AVVERTENZA

Consultare un centro antiveleni !

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO:

- Il prodotto è formulato in zollette (pellets) di colore giallo-verdastro.
- Le zollette sono racchiuse in sacchetti di polietilene "pronte per l'uso".
- L'involucro non va aperto e serve a difendere l'Hemorat Agricolo dagli agenti atmosferici, senza d'altra parte impedire ai roditori l'alimentazione con le esche.
- Si possono inizialmente impiegare 2 Kg. di Hemorat Agricolo per ogni ettaro di superfice distribuendo uniformemente i sacchettini con le zollette, in gruppi di 2 o 3 e reintegrando le medesime mano a mano che vengono consumate dai roditori.
- Il trattamento ha termine quando si osserva che le zollette non vengono più consumate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI:

Compatibilità: il prodotto và usato da solo.

RISCHI DI NOCIVITÀ:

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, pesci e bestiame.
Attenzione: da impiegare escusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato".
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- Provifarm-Ditta Individuale di Terracciano Anacleto. Roma - Viale Adriatico, 143
- Officina di produzione: Agrozoofarm di Mortegliano-Udine.
- Numero di registrazione 6472 Data 4.9.85
- Da non vendersi sfuso.
- Kg. 5

PROVIFARM
Viale Adriatico, 143
00141 ROMA -Tel. 8179251 - 8176655

6473

Composizione:

Zolfo puro (esente da selenio) gr. 33,75
Coformulanti q.b.a gr. 100

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luoghi non accessibili ai bambini ed agli animali domestici • non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

TALPAX

antitalpa

MODALITÀ D'IMPIEGO:
la cartuccia fumogena deve essere applicata immediatamente dopo che avete constatato le prime gallerie o i primi mucchi di terra sui vostri campi onde evitare che le talpe si fissino definitivamente nel vostro terreno.
Un'applicazione troppo tardiva causerà un risultato insufficiente.
Appena constatata la presenza delle talpe nel vostro terreno, procedete in modo da rendere agevole l'introduzione completa della cartuccia fumogena nella cavità senza incontrare ostacoli.

ISTRUZIONI PER L'USO:
- per accendere la cartuccia fumogena sfregarne la testa nera contro la striscia scura posta nella parte inferiore della scatola fino a provocarne l'accensione
- introdurre la cartuccia accesa nella cavità fatta dalla talpa;
- richiudere immediatamente la cavità con la terra impedendo così la dispersione dei fumi.

CARTUCCIA FUMOGENA

AVVERTENZA:
non trattare controvento • evitare di respirare i fumi • non accendere la cartuccia fumogena in luogo chiuso • conservare il prodotto lontano da fiamme libere o fonti di calore.

classe IV

Il prodotto si usa tale e quale.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".
"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali"

Registrazione Ministero Sanità N.6473 del 12.9.85

Da non vendersi sfuso
Contenente N. 6 Cartucce fumogene
peso netto gr 150

INDUSTRIA PIROTECNICA PANZERA
SEDE: Corso Trieste 27 - 10024 Moncalieri (Torino)
STABILIMENTO: Regione Olmi 78 - 10041 Carignano (Torino-Italy)
Tel. (011) 9697300-9690317-Telex 212404 PIROPA I

6474

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

TAIREL® Z8-65 BLU

Fungicida in polvere bagnabile dotato di azione sistemica e di copertura per la lotta contro le peronospore della vite, del pomodoro, della rosa e del garofano.

COMPOSIZIONE

Benalaxyl puro	g 8
Zineb puro	g 65
Bagnanti, disperdenti coloranti e supporti inerti	q.b. a g 100

GRUPPO MONTEDISON
FARMOPLANT
Fitofarmaci Montedison

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 6474 **del** 12.9.85

• Marchio registrato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

TAIREL Z 8-65 BLU è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.
La presenza di Zineb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Alternaria e Septoria.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE

Peronospora (Plasmopara viticola): g 200-250
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e, comunque, non più tardi della differenziazione dei grappoli florali (7-8 foglie).
I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe.
Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

POMODORO (solo fino alla prima fioritura)

Peronospora (Phytophthora infestans): g 250-300
Applicazioni in pieno campo a cadenza di 12-14 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione e fino e non oltre l'inizio della fioritura del primo palco.
Successivamente si consiglia di intervenire con fungicidi di copertura.

ROSA E GAROFANO

Peronospora: g 300.
Trattare ogni 15 giorni irrorando accuratamente la vegetazione, a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.

Preparazione della sospensione

Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DIVIETI D'IMPIEGO

— DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI
— DA NON IMPIEGARE IN SERRA
— DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità

Il TAIREL Z 8-65 BLU può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. È miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione, il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

— Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto;
— conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dell'umidità e dal calore;
— in caso di malessere, ricorrere al medico, mostrandogli questa etichetta;
— durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

Nei casi gravi, ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi, se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA

Consultare un Centro Antiveleni.

In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

6475

Classe III

ATTENZIONE manipolare con prudenza

Fungicida granulare ad azione sistemica, per la lotta contro la Peronospora del tabacco, peperone, pomodoro, fragola e delle colture ornamentali e da fiori.

COMPOSIZIONE

Benalaxyl puro	g 5
Coadiuvanti e supporti inerti	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 6475 **del** 12.9.85

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

Caratteristiche tecniche
Il TAIREL 5 Gr è un fungicida sistemico che assorbito dalle radici e traslocato in tutte le parti della pianta, permette di ottenere con applicazioni al terreno, elevati livelli di difesa contro ficomiceti parassiti ed in particolare Phytophthora spp., Peronospora spp., Pythium spp., Aphanomyces spp., Bremia spp., Plasmopara spp., Pseudoperonospora spp., ecc., delle colture agrarie sottoindicate.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

TABACCO

Peronospora (Peronospora tabacina)
— Semenzai: kg 0,8-1,2/m² di terriccio
Intervenire immediatamente prima della semina distribuendo TAIREL 5 Gr uniformemente sulla superficie da trattare ed interrandolo con una leggera lavorazione. Tale trattamento protegge la coltura per 30-40 giorni anche dagli attacchi di Pythium.
— Pieno campo: 40 Kg/ha
Intervenire dopo il superamento della crisi di trapianto, localizzando il prodotto lungo la fila, su una banda di 30÷40 cm., interrandolo quindi con una leggera lavorazione.
Dopo 30 giorni effettuare una seconda applicazione di TAIREL 5 Gr in coincidenza con la rincalzatura.

PEPERONE

Cancrena pedale (Phytophthora capsici): 40 Kg/ha
Iniziare gli interventi subito dopo il superamento della crisi di trapianto e ripeterli ad intervalli di 20÷30 giorni durante tutto il ciclo della coltura. Il prodotto va distribuito lungo la fila, su di una banda di 30÷40 cm. ed interrato con una leggera lavorazione.
In ogni caso, una irrigazione eseguita dopo l'interramento del prodotto ne favorisce l'assorbimento da parte delle piante.

POMODORO

Marciume del colletto (Phytophthora parassitica) e
Peronospora (Phytophthora infestans): 40 Kg/ha
Intervenire prima del traplanto localizzando il prodotto lungo la fila, su una banda di 30÷40 cm, ed interrarlo a 6-10 cm di profondità.
Se necessario ripetere l'intervento con le stesse modalità dopo 20-30 giorni.

TERRENO DESTINATO A COLTURE DI FRAGOLA

Collasso (Phytophthora spp.): 40 Kg/ha
Intervenire prima del traplanto, localizzando il prodotto lungo la fila, su di una banda di 30-40 cm, ed interrando con una lavorazione superficiale.

TERRICCIATI PER SEMENZAI DI COLTURE ORTICOLE
Marciume del colletto e delle radici (Pythium spp., Phytophthora spp.): Kg 0,8-1,2/m³ di terriccio.
Miscelare accuratamente il prodotto alla massa di terriccio prima della preparazione del letto di semina.

TERRICCIATI PER SEMENZAI E TALEAI DI COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORI
Pythium spp., Phytophthora spp., Aphanomyces spp., Bremia spp., Plasmopara spp., Pseudoperonospora spp., Peronospora spp.:
Kg 0,8 - 1,2/m³ di terriccio
Miscelare accuratamente il prodotto alla massa di terreno prima della preparazione del letto di semina.

APPLICAZIONI AL SUOLO SU COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORI

Pythium spp., Phytophthora spp., Aphanomyces spp., Bremia spp., Plasmopara spp., Pseudoperonospora spp., Peronospora spp.:
4-8 g/m²
Effettuare due-tre trattamenti distanziati di 30 giorni circa, distribuendo il prodotto in maniera uniforme su tutta la superficie in fase di pre-semina o pre-trapianto, o su specifiche bande, localizzando lungo la fila con coltura in atto. In ogni caso la dose va riferita all'unità di superficie realmente trattata; il formulato deve essere interrato mediante leggera lavorazione.

TAPPETI ERBOSI (giardini, campi sportivi)
Pythium spp.: 150-300 g/1000 m²
Trattare i tappeti erbosi già esistenti ogni 2-3 settimane.
Nelle aree di nuovo impianto trattare immediatamente dopo la semina.
Se si verificano condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni.
Applicare la dose più alta in caso di infezione elevata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il formulato viene usato da solo.
Fitotossicità: Per le piante ornamentali e da fiori, in considerazione dell'elevato numero di specie e varietà, si consiglia di eseguire prove preliminari per saggiarne la sensibilità.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta di peperone, pomodoro e 28 giorni prima di quella del tabacco.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

6476

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

TAIREL® M8-65 BLU

Fungicida in polvere bagnabile dotato di azione sistemica e di copertura per la lotta contro le peronospore della vite, del pomodoro e della rosa

COMPOSIZIONE

Benalaxyl puro	g 8
Zineb puro	g 65
Bagnanti, disperdenti coloranti e supporti inerti	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 6476 **del** 12.9.85

® Marchio registrato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

TAIREL M 8-65 BLU è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.
La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi della vite e Alternaria e Septoria del pomodoro.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE

Peronospora (Plasmopara viticola): g 200-250
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e, comunque, non più tardi della differenziazione dei grappoli florali (7-8 foglie).
I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe.
Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

POMODORO (solo fino alla prima fioritura)

Peronospora (Phytophthora infestans): g 250-300
Applicazioni in pieno campo a cadenza di 12-14 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.

ROSA

Peronospora (Peronospora sparsa): g 300
Trattare ogni 15 giorni irrorando accuratamente la vegetazione, a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.

Preparazione della sospensione

Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DIVIETI D'IMPIEGO

— DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

— DA NON IMPIEGARE IN SERRA

— DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità

Il TAIREL M 8-65 BLU può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. È miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione, il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

- Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto;
- conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;
- in caso di malessere, ricorrere al medico, mostrandogli questa etichetta;
- durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

Nei casi gravi, ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi, se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA

Consultare un Centro Antiveleni.

6477

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

TAIREL® M 8-65

Fungicida in polvere bagnabile dotato di azione sistemica e di copertura per la lotta contro le peronospore della vite, del tabacco, del pomodoro della rosa e del garofano

COMPOSIZIONE

Benalaxyl puro	g 8
Mancozeb puro	g 65
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 6477 del 12.9.85

® Marchio registrato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

TAIREL M 8-65 è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi della vite e Alternaria e Septoria del pomodoro.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE

Peronospora (Plasmopara viticola): g 200-250

Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e, comunque, non più tardi della differenziazione dei grappoli florali (7-8 foglie).
I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe.
Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

TABACCO

Peronospora (Peronospora tabacina): g 250-300

Trattamenti a cadenza fissa quindicinale, iniziando gli interventi a partire dal superamento della crisi di trapianto.
Per evitare le infezioni durante la fase di trapianto, intervenire con un trattamento in semenzaio, alle dosi indicate, 1-3 giorni prima della messa a dimora delle piantine in campo.

POMODORO (solo fino alla prima fioritura)

Peronospora (Phytophthora infestans): g 250-300

Applicazioni in pieno campo a cadenza di 12-14 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.
Successivamente si consiglia di intervenire con fungicidi di copertura.

ROSA e GAROFANO

Peronospora: g 300.

Trattare ogni 15 giorni irrorando accuratamente la vegetazione, a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgenza dell'infezione.

Preparazione della sospensione

Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DIVIETI D'IMPIEGO

- DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI
- DA NON IMPIEGARE IN SERRA
- DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità

Il TAIREL M 8-65 può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. È miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione, il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

- Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto;
- conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;
- in caso di malessere, ricorrere al medico, mostrandogli questa etichetta;
- durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

Nei casi gravi, ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi, se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA

Consultare un Centro Antiveleni.

6478

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

TAIREL® F 8-50 BLU

Fungicida in polvere bagnabile dotato di azione sistemica e di copertura per la lotta contro le peronospore della vite, della patata, del pomodoro, della cipolla e delle colture ornamentali e da fiori

COMPOSIZIONE

Benalaxyl puro	g 8
Folpet puro	g 50
Bagnanti, disperdenti, coloranti e supporti inerti	q.b. a g 100

GRUPPO MONTEDISON
FARMOPLANT
Fitofarmaci Montedison
S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 6478 **del** 12.9.85

® Marchio registrato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Il TAIREL F 8-50 BLU è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare una elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.
La presenza di Folpet attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Botrytis.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.

VITE

Peronospora (Plasmopara viticola): g 200-250
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e, comunque, non più tardi della differenziazione dei grappoli florali (7-8 foglie).
I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe.
Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

POMODORO

Peronospora (Phytophthora infestans): g 250-300
Trattare ogni 12-15 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione; nei trattamenti di chiusura usare fungicidi di copertura.

PATATA

Peronospora (Phytophthora infestans): g 250-300
Effettuare non più di 3 trattamenti: il primo al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione e gli altri distanziati di 14 giorni.
Nei trattamenti successivi usare fungicidi di copertura, i quali possono essere impiegati anche sin dall'inizio, nei casi di minore pericolo dell'infezione.
Non impiegare il sistemico come eradicante (ossia dopo la comparsa delle macchie) per il pericolo dell'insorgenza della resistenza.

CIPOLLA

Peronospora (Peronospora destructor): g 200-250
Trattare ogni 14 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione.
Per favorire l'attività del prodotto è consigliabile aggiungere alla sospensione fungicida un bagnante.

PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORI: g 300
(Phytophthora, Peronospora, Bremia e Pythium)
Trattare ogni 15 giorni irrorando accuratamente la vegetazione, a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.

Preparazione della sospensione

Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea: diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il TAIREL F 8-50 BLU può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio.
È miscibile anche con biostimolanti e fertilizzanti fogliari.
Non è miscelabile con Poltiglia Bordolese, polisolfuri ed olio bianco.
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Per le piante ornamentali e da fiori, in considerazione dell'elevato numero di specie e varietà, si consiglia di eseguire prove preliminari per saggiarne la sensibilità.

Rischi di nocività

È tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti su uve da vino almeno 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti e per le altre colture 10 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti.

Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia

Lavanda gastrica con magnesia usta (g3 0 per litro d'acqua) e digitale.

Avvertenza

Consultare un Centro Antiveleni.

6479

Classe III

ATTENZIONE manipolare con prudenza

TAIREL® R 4-33 BLU

Fungicida in polvere bagnabile dotato di azione sistemica e di copertura per la lotta contro le peronospore della vite, della patata, del pomodoro, della cipolla e delle colture ornamentali e da fiori

COMPOSIZIONE

Benalaxyl puro	g 4
Rame metallico (sotto forma di ossicloruro)	g 33
Bagnanti, disperdenti, coloranti e supporti inerti	q.b. a g 100

GRUPPO MONTEDISON FARMOPLANT Fitofarmaci Montedison

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N6479 del 12.9.85

® Marchio registrato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

TAIREL R 4-33 BLU è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare una elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.
La presenza di Rame attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Alternaria e Septoria.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE

Peronospora (Plasmopara viticola): g 400-500
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e, comunque, non più tardi della differenziazione dei grappoli florali (7-8 foglie).
I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe.
Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

POMODORO

Peronospora (Phytophthora infestans): g 500-600
Trattare ogni 12-14 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione; nei trattamenti di chiusura usare fungicidi di copertura.

PATATA

Peronospora (Phytophthora infestans): g 500-600
Effettuare non più di 3 trattamenti: il primo al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione e gli altri distanziati di 14 giorni.
Nei trattamenti successivi usare fungicidi di copertura, i quali possono essere impiegati anche sin dall'inizio, nei casi di minore pericolo dell'infezione.
Non impiegare il sistemico come eradicante (ossia dopo la comparsa delle macchie) per il pericolo dell'insorgenza della resistenza.

CIPOLLA

Peronospora (Peronospora destructor): g 400-500
Trattare ogni 14 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione.
Per favorire l'attività del prodotto è consigliabile aggiungere alla sospensione fungicida un bagnante.

PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORI: g 600
(Phytophthora, Peronospora, Bremia e Pythium)
Trattare ogni 15-20 giorni irrorando accuratamente la vegetazione, a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione.

Preparazione della sospensione

Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando sino ad ottenere la diluizione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il TAIREL R 4-33 BLU può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. È miscibile anche con biostimolanti e fertilizzanti fogliari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Non si deve trattare durante la fioritura.
Per le piante ornamentali e da fiori, in considerazione dell'elevato numero di specie e varietà, si consiglia di eseguire prove preliminari per saggiarne la sensibilità.

Rischi di nocività

È tossico per i pesci:
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

6480

CYCOCEL 5 C

Fitoregolatore

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

Clormequat puro	g. 41,2
Coformulanti q.b. a	g. 100

(Contiene Cloruro di colina)

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomatologia
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale. L'ingestione di alte dosi, sugli animali di laboratorio, provoca crampi tonico-clonici (sintomi colinergici).

Terapia
In caso di contaminazione cutanea, togliere gli abiti e lavare abbondantemente con acqua le parti contaminate.
In caso di ingestione provocare il vomito, o meglio praticare lavanda gastrica. Somministrazione di carbone medicinale. Arieggiare l'ambiente ed in caso di svenimento porre il paziente in posizione stabile laterale e se necessario praticare la respirazione artificiale. L'eventuale ulteriore terapia è sintomatica.
La somministrazione per via orale (mai per via endovenosa) di cloruro di colina come antidoto è raccomandabile con prudenza. Comunque, in caso di intossicazione grave o presunta grave consultare un centro antiveleni e trasferire l'intossicato, quanto più rapidamente possibile, in un centro di rianimazione.

Controindicazioni
Cloruro di colina per via endovenosa. Latte, grassi ed alcool.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il CYCOCEL 5 C è un regolatore di crescita che ostacolando temporaneamente la formazione delle sostanze che determinano l'allungamento delle cellule e quindi l'accrescimento, induce un minor sviluppo in lunghezza dei culmi e dei germogli, favorisce la formazione di piante più resistenti alle avversità ambientali e parassitarie ed esalta la capacità produttiva della coltura, in quanto contenendo lo sviluppo vegetativo favorisce la fase riproduttiva.
Il CYCOCEL 5 C, oltre al principio attivo Clormequat, contiene il Cloruro di colina, sostanza normalmente impiegata come antidoto in caso di intossicazione da CCC. Questo composto determina una minore pericolosità per l'utilizzazione durante la manipolazione e distribuzione del prodotto.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Grano tenero: 2 - 3 l/ha.

Grano duro: 2,5 - 3,5 l/ha.
Trattamento per via fogliare allo stadio di fine-accestimento-inizio levata.

Segale: 2 - 3 l/ha.
Trattamento all'inizio della fase di levata.

Avena: 2 - 3 l/ha.
Trattamento nella fase in cui la spiga si rende evidente sul culmo (piante di 40-50 cm. di altezza).

Orzo: 3 - 4 l/ha.
Trattamento nella fase di accestimento-inizio levata.

Vite: 1,5 - 2 l/ha.
Epoca d'intervento da 15 a 5 giorni prima della fioritura. In caso di fioritura scalare o di previsione incerta della fioritura, frazionare la dose sopra indicata in due interventi.

Pomodoro da industria (in pieno campo): 1 - 1,5 l/ha.
Ad inizio-piena fioritura, ripetendo il trattamento 2-3 volte a distanza di 15-20 giorni, secondo lo sviluppo e la vigoria delle varie Cultivars in relazione all'andamento climatico.

Semenzai di pomodoro: 1 g/l all'emissione delle prime 2 foglie vere; 1-2 interventi a distanza di 14 giorni.

Melo - Pero (piante di età fra i 3 ed i 5 anni): 300 cc/hl, due trattamenti distanziati di tre settimane, effettuando il primo due settimane circa dopo la piena fioritura su melo e 4-6 settimane dopo la piena fioritura su pero.

Piante ornamentali e da fiore
Il CYCOCEL 5 C viene impiegato in floricoltura per ottenere piante più basse e compatte, steli più vigorosi e resistenti ai marciumi, foglie e fiori di colorazione più intensa, fioritura più precoce e formazione di un maggior numero di fiori.
— **Stella di Natale:** 0,15 - 0,25% dopo la spuntatura 2-3 interventi a distanza di circa 14 giorni.
— **Geranio:** 0,1 - 0,15% dopo la spuntatura 1-2 interventi a distanza di 14 giorni.
— **Begonia:** 0,1% dopo il radicamento nel vaso definitivo.
— **Crisantemo:** 0,25% 15 giorni dopo la cimatura 1-2 trattamenti a distanza di 14 giorni.
— **Kalankloe:** 0,5 - 1% intervenendo alla fine del trattamento a foto-periodo breve.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il CYCOCEL 5 C è miscibile con i diserbanti, i fungicidi ed i concimi fogliari della BASF previsti per i cereali. I prodotti dovranno essere miscelati nel serbatoio dell'irroratrice immediatamente prima della distribuzione.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il CYCOCEL 5 C è selettivo verso le leguminose foraggere consociate al frumento. Su piante giovani di erba medica il prodotto può procurare lievi ustioni fogliari, che risultano, peraltro, di rapida soluzione.
Si sconsiglia l'impiego del CYCOCEL 5 C su seminati sofferenti per carenze nutrizionali e avversità ambientali o parassitarie.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

I.

DISTRIBUZIONE E VENDITA:

BASF-Agritalia S.p.A. - MILANO

Officina di produzione:

BASF Aktiengesellschaft
6700 LUDWIGSHAFEN/RHEIN
(Germania Federale)

Reg. Min. San. N° 6480 **del** 12.9.85

6481

NATURA DEL RISCHIO: SOSTANZA PERICOLOLSA PER INGESTIONE, PER INALAZIONE E PER CONTATTO CON LA PELLE.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo non accessibile ai bambini e agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'uso del prodotto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il Medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
L'ORMEX ST è un fitoregolatore in polvere la cui azione è quella di favorire la radicazione di talee erbacee, legnose di vite, pero, melo, fiori e colture ornamentali.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Talee di pero, melo e vite
Talee di colture floreali: (azalea, ciclamino, fuxia, geranio) in vivaio.
Impolverare appena la parte terminale delle talee, toccando la polvere con l'apice del taglio interessato alla radicazione, avendo cura di applicare tale procedimento ad ogni singola talea scuotendo via la parte eccedente del prodotto. Immergere la piantina nel composto di terra preparata.

ORMEX ST

CLASSE TOSSICOLOGICA III

FITOREGOLATORE STIMOLANTE LA RADICAZIONE

COMPOSIZIONE:

NAA Puro	gr 0,23
Coformulanti	q.b. a gr. 100

TIPO DI FORMULAZIONE:
Polvere

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON
PRUDENZA

SUNCHEMICAL PRODOTTI CHIMICI E BIOLOGICI PER L'INDUSTRIA E L'AGRICOLTURA
S.a.S. - Via Lunga, 16/P - 40058 Crespellano (Bo) - Tel. (051) 969801-03

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: NON MISCELARE L'ORMEX ST CON ALCUN PRODOTTO

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante ed agli animali.

Officina di produzione:
SCAM srl - Via Bellaria n° 164 - S. MARIA DI MUGNANO (MO)

Registrazione del Ministero della Sanità
N° 6481 del 12.9.85

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO KG **0,500** AL NETTO DELLA CONFEZIONE

6482

ARELON-combi L [*]

(dispersione)

COMPOSIZIONE: Isoproturon puro g 21,3, Mecoprop (da sale dimetilamminico) puro g 35,1, coformulanti quanto basta a 100

CLASSE III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.
Consigli terapeutici: abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.
Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Roussel-Hoechst Agrovet S.p.A.
20100 Milano - Casella Postale 1847
Officina di produzione S.I.L.I.A. - Società Italiana
Lavorazioni Industriali Aprilia S.p.A. - Aprilia (Latina)

Registrazione n. 6482 **del** 12.9.85 **del Ministero della Sanità**

[*] Marchio reg. della Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s/Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s/Meno

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- **Frumento tenero e orzo a semina autunnale:** in post-emergenza 5-6 lt/ha secondo la natura del terreno ed il grado di infestazione in 400-600 litri d'acqua. Il trattamento si effettua a partire dall'inizio accestimento dei cereali fino all'inizio della levata.

CARATTERISTICHE

ARELON-combi L è un erbicida in dispersione, selettivo per colture di orzo e di frumento, per la lotta contro la maggior parte delle infestanti annue sia graminacee (Alopecurus spp., Apera spica venti, Poa spp., Lolium spp.) che a foglia larga (dicotiledoni quali: Senape, Mercuriale, Veronica, Fumaria, Chenopodio, Rafano, Matricaria, Poligoni, Fiordaliso, Lamium, Stellaria). ARELON-combi L esplica la sua azione per via radicale e per assorbimento fogliare.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

ARELON-combi L è miscibile con Aretit flüssig e Complesal Fluid. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi e i floreali in genere. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

1.385 lt. 1

6483

DUECI RADICANTE LIQUIDO
RADICANTE LIQUIDO PER TALEE ERBACEE E LEGNOSE, A BASE DI ACIDO ALFANAFTALENACETICO, DI VITE, MELO, PERO, FIORI E COLTURE ORNAMENTALI.
COMPOSIZIONE
100 gr. di prodotto contengono:
NAA Puro .... gr. 0,50
eccipienti .... q.b. a gr. 100
III CLASSE
ATTENZIONE
Manipolare con prudenza
NATURA E RISCHI DI INTOSSICAZIONE
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione, per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI E RISCHI
Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti, bevande, corsi d'acqua. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare, non mangiare durante l'uso del prodotto, evitare di ingerirlo e di portarlo a contattò con la bocca e gli occhi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
MODALITÀ D'IMPIEGO
Talee di pero, melo e vite: diluire 10-20 gr. di DUECI RADICANTE LIQUIDO (pari a 3-6 tappi misurino) in un litro di acqua avendo cura di immergere le talee per 3-4 cm. e lasciarle nella soluzione per circa 12 ore. Ad operazione avvenuta si consiglia di risciacquare le talee e di porle a dimora.
Talee di colture floricole (Azalea, ciclamino, fucsia, geranio) in vivaio: diluire 3-6 gr. di DUECI RADICANTE LIQUIDO in un litro di acqua avendo cura di immergere le talee per 2 cm. e di lasciarle nella soluzione per circa 5-6 ore. Ad operazione avvenuta si consiglia di risciacquare le talee e di porle a dimora.
COMPATIBILITÀ
Non miscelare il DUECI RADICANTE LIQUIDO con alcun prodotto.
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVATI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.
"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per eventuali danni alle piante, alle persone, agli animali".
DUECI s.r.l. Via E. Mattei 4 - Castello D'Argile (BO)
Officina di Produzione
DUECI s.r.l. Via E. Mattei 4 - Castello D'Argile (BO)
Registrazione Ministero della sanità n. [illegible] del 12.9.85
Confezione: Kg. 0,850
"DA NON VENDERSI SFUSO"
Dueci Radicante liquido

6484

CLASSE I^A

CLORFOS 45

VELENO

INSETTICIDA EMULSIONABILE - Specifico per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Diclorvos puro g. 45
Emulsionanti, tensioattivi e solventi quanto basta a 100 grammi
«CONTIENE XILOLO»

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. agosto 1968, n. 1255

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
-Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. -Conservare la confezione ben chiusa. -Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. -Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. -Evitare di respirarne i vapori. -Non operare contro vento. -Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. -Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. -Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. -Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva). -In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE

Insetticida per la lotta contro Tortricidi, Minatrici, Tignole, Cicadelle, Aleurodidi, Tentredini, Tripidi e Cocciniglie.

MODALITA' D'IMPIEGO
Dosi per 100 litri d'acqua.
Frutticoltura (drupacee, pomacee): cc 150-200 contro larve di Tortricidi (Capua, Pandemis, Carpocapsa). Di Minatrici (Litocollete, Nepticola) e di altri Lepidotteri (Geometridi, Orgia). Contro larve di Minatrici usare la dose massima ed iniziare la lotta nella fase iniziale dell'infestazione.
Floricoltura in pieno campo: cc 150 contro Cicadelle, Aleurodi, larve di Lepidotteri, di Tentredini, Thrips, larve di Cocciniglie, larve di mosche minatrici.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità di acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria già preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il CLORFOS 45 è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese). La miscela con prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piú lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI PER LA FAUNA UTILE
Il CLORFOS 45 è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. (È molto velenoso per le api, pertanto è consigliabile tenere lontane il più possibile le arnie dai luoghi trattati e non effettuare trattamenti durante la fioritura).
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.
Far trascorrere lo stesso periodo (7 gg.) prima di far pascolare il bestiame in zone trattate od alimentarlo con prodotti che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
AMONN FITOCHIMICA SpA - Bolzano - Via Piave 2.

OFFICINA DI PRODUZIONE
AMONN FITOCHIMICA SpA - Stabilimento di Bolzano, Via Siemens, 12

Registrazione Nr. 6484 del 12.9.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Lt. 1

AMONN FITOCHIMICA SPA
BOLZANO, VIA PIAVE 2

6485

Carbofuran Terranalisi
Carboter

INSETTICIDA GRANULARE PER LA DISINFESTAZIONE DEL TERRENO DESTINATO ALLA COLTURA DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO.

COMPOSIZIONE: 100 gr. di Carboter contengono:

Carbofuran puro	gr.	4,5
Coformulanti q.b.a	gr.	100

CLASSE I

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I^A

VELENO

NATURA DEL RISCHIO: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - conservare la confezione ben chiusa - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - evitare di respirarne i vapori - non operare contro vento - evitare il contatto con la pelle o gli occhi - durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere o occhiali protettivi - dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - rendere inutilizzabili dopo l'uso e con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto schiacciandole e poi interrandolo in fosse profonde circa 1 metro. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi di intossicazione: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi o sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

Controindicazioni: Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

AVVERTENZA: Sentire un centro antiveleni.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:

1) Trattamento parziale del terreno: 10-12 Kg/Ha distribuendo il prodotto alla semina, localizzata lungo le file a mezzo microgranulatori.

2) Trattamento generale del terreno: 40-60 Kg/Ha distribuendo il prodotto uniformemente a mezzo di spandiconcimi e quindi interrando.

Il CARBOTER non trasmette alcun odore o sapore alle piante che crescono sul terreno trattato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto può essere distribuito in miscela con concimi granulari.

Nocività: il prodotto è tossico per gli animali domestici, i pesci e il bestiame e gli insetti utili. Il CARBOTER va usato solo in pre-emergenza.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per le colture sopra indicate. Ogni altro uso è pericoloso.

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali ».

TERRANALISI s.n.c.
VIA DONIZETTI, 2/A — CENTO (FERRARA) — TEL. 906207

Stabilimento di produzione:
SARIAF S.p.A. - FAENZA (RA)

Registrazione n. 6485 del 12.9.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO KG

6486

CLASSE I^A

VELENO

SOLUZIONE EMULSIONABILE - Insetticida per contatto ed ingestione per la lotta alla Dorifora della patata, Mosca del cavolo, Mosca della carota, Piralide del mais e Ditteri-Sciaridi nelle fungaie.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
18 g di Chlorfenvinphos puro
Diluenti e solventi quanto basta a 100 grammi
Contiene «XILOLO»

Attenzione: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato, munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3.8.1968 n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare il prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Evitare di respirarne i vapori. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. - Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti di gomma, maschere ed occhiali protettivi. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es. interrandole in fosse profonde più di un metro cospargendo di calce viva). - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso - In caso di evidente ipossia con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al Centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per adulti, 0,2-1 mg per bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il CLORAMON è un insetticida fosforganico che agisce per contatto ed ingestione ed è dotato di una lunga persistenza. È poco volatile e la sua azione è lenta, tuttavia non lascia residui, nè sul suolo, nè sulle piante. Fra i suoi campi di impiego i più importanti sono la lotta ai diversi insetti terricoli, ditteri (come la Mosca del cavolo e della carota) ed ai Nottuidi.
Il formulato emulsionabile trova impiego anche nelle applicazioni fogliari contro tutti gli stadi di sviluppo della Dorifora della patata.

MODALITÀ DI IMPIEGO
a) **Trattamenti fogliari** (dose per 100 litri di acqua)
Patata: contro la Dorifora (Doryphora decemlineata): g 170-190. Distribuire 600-700 litri di poltiglia per ettaro. In caso di forte infestazione, ripetere il trattamento a 2-3 settimane di distanza. Contro la Tignola (Gnorimoschema operculella): g 170-350. Contro le larve giovani di Nottuè: g 250.
Mais: contro la Piralide (Pyrausta o Ostrinia nubilalis): g 250.
Cavolo: contro gli Afidi: g 200-400. Distribuire ca. 600 litri di poltiglia per ettaro. Contro la Mosca (Chortophila brassicae): g 300-350. Irrorare la base delle piantine ed il terreno circostante nei mesi di aprile, maggio ed immediatamente dopo il trapianto, distibuendo 1/2 litro di poltiglia per 8 piantine. Contro le larve giovani di Nottue: g 250.
Carota: contro gli Afidi: g 200-400. Contro la Mosca (Psyla rosae): g 200-250. Distribuire ca. 600 litri di poltiglia per ettaro.
Sedano: contro la Mosca (Phylophylla heraclei): g 200-250.
b) **Esche inumidite:** mescolare 1 kg di CLORAMON con 1 kg di melasso o zucchero in 100 kg di crusca.
c) **Miscelato al substrato di coltivazione:** nelle fungaie per la lotta alle forme larvali di alcuni Ditteri-Sciaridi: g 0,5-1 di prodotto per ogni 10 kg di substrato.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare il prodotto in poca acqua e portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITÀ
Il CLORAMON può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia bordolese, Polisolfuri).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci, il bestiame e la selvaggina.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
AMONN FITOCHIMICA S.p.A. - Bolzano, via Piave, 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
AMONN FITOCHIMICA S.p.A. - Stabilimento di Bolzano, via Siemens, 12

Registrazione N. 6486 del 12.9.85 del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto lt. 1

AMONN FITOCHIMICA SPA
BOLZANO, VIA PIAVE 2

6487

I CLASSE TOSSICOLOGICA

OXAMYL B.P.D. VYDATE

Nematocida - Insetticida Granulare
per terreni destinati a colture di barbabietola
da zucchero

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 4,92 di Oxamyl puro
Ingredienti inerti quanto basta a 100.
Contiene Dimetilformammide

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Evitare di respirare i vapori.
Non operare contro vento.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Togliersi e lavare gli indumenti contaminati prima di usarli nuovamente.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (es.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Nel caso che il prodotto raggiunga incidentalmente gli occhi, lavarli per 15 minuti con acqua abbondante.
Recarsi dal medico.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
Il prodotto produce effetti associati con attività anticolinesterasiche che possono includere spossatezza, annebbiamento, cefalea, nausea, crampi addominali, diarrea, oppressione toracia, costrizione delle pupille, sudorazione, polso lento, tremori muscolari.

Trattamento:
- *Nel caso di inalazione, trasportare il paziente in ambiente non contaminato.*
- *Nel caso di contatto, togliere gli abiti contaminati e lavare prontamente la pelle e gli occhi contaminati con acqua abbondante.*
- *Nel caso di ingestione, applicare una lavanda gastrica.*
- *Alla comparsa di segni locali o sistemici o di sintomi di avvelenamento colinesterasico, somministrare atropina: 1,2 - 2 mg. per via intramuscolare o intravenosa, ripetendo il trattamento ad intervalli di 10-30 minuti fino alla comparsa di fenomeni di atropinizzazione.*
- *Non somministrare 2-PAM; controindicati anche la morfina e gli altri depressori della respirazione.*

Pronto soccorso:
Se ingerito provocare il vomito con acqua calda (1 cucchiaio da tavola di sale in un bicchiere d'acqua), ripetendo fino a che il vomito non sia chiaro.
Se inalato allontanare il paziente dall'ambiente contaminato, far coricare e riposare calmo.
In caso di contatto togliere gli abiti contaminati e lavare la pelle e gli occhi contaminati con abbondante quantità di acqua.
Se il paziente mostra difficoltà respiratoria praticare immediatamente la respirazione artificiale.
Somministrare 2 tavolette di atropina da 0,6 mg. per via orale o facendole sciogliere sotto la lingua, se sono disponibili. In seguito ogni 10-15 minuti somministrare una tavoletta di atropina fino a che la gola e la pelle sono asciutte. Se necessario somministrare altre tavolette per mantenere asciutte la gola e la pelle.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un nematocida-insetticida in formulazione granulare al 5% di principio attivo Oxamyl, dotato di azione sistemica con traslocazione dal basso verso l'alto.
Quando viene applicato al suolo esso controlla i nematodi del terreno ed inoltre è traslocato dalla radice alla parte aerea della pianta controllando i nematodi fogliari e agendo anche su alcuni insetti ed acari. La sua distribuzione deve essere effettuata preferibilmente con le comuni macchine usate per lo spargimento dei granulari. I trattamenti possono essere effettuati con diverse modalità:
- in pre-semina, con incorporazione su tutta la superficie o a strisce;
- al momento della semina, in localizzazione con il seme.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Nematodi radicicoli del tipo Heterodera Schachtii: distribuire 25-35 Kg di prodotto per ettaro, al momento della semina in localizzazione con il seme.
Prima di iniziare lo spargimento avere cura di tarare l'apparecchio di distribuzione in modo da distribuire esattamente la dose indicata.
Il prodotto può anche essere impiegato in pre-semina, con incorporazione, su tutta la superficie del terreno, alle dose di 140-160 Kg per ettaro, oppure a strisce, impiegando una dose proporzionale alla superficie trattata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto si impiega da solo.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, gli animali selvatici, gli animali domestici, il bestiame e gli insetti utili.
Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni.

Durante il trattamento tenere lontani dalla zona le persone non protette animali e bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 6487 **del Ministero della Sanità del** 12.9.85
10/84

6488

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - conservare la confezione ben chiusa - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - non operare contro vento - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:

FRUMENTO: Il Ceresan L si usa alla dose di 3-4 Kg. per ettaro in 500-800 litri di acqua, in autunno subito dopo la semina, per combattere le infestanti graminacee: Alopecurus, Poa e le infestanti a foglia larga: Camomilla, Veronica, Stellaria, Senape, Garofano - Kg. 1,5-2 per ettaro a fine inverno prima della fine dell'accestimento.

PISELLO - GIRASOLE: Kg. 3-4 per ettaro in 500-600 litri di acqua contro le comuni infestanti; intervenendo in pre-emergenza delle colture. Seminare alla profondità di 5 cm e limitare i dosaggi nei terreni più sciolti.

AGLIO: Kg. 3-4 per ettaro in 500-600 litri di acqua, in autunno in pre-emergenza delle colture a fine inverno.

ERBA MEDICA: Kg. 3-4 per ettaro in 500-600 litri di acqua in autunno dopo l'ultimo sfalcio, nella fase del riposo vegetativo della coltura.

MAIS: Kg. 4-5 per ettaro in 500-600 litri di acqua, in pre-emergenza della coltura, contro le graminacee e le dicotiledoni nate da seme.

DISERBANTE SELETTIVO IN FORMULAZIONE LIQUIDA AUTOSOSPENSIBILE PER FRUMENTO, PISELLO, GIRASOLE, AGLIO, ERBA MEDICA, MAIS.

Composizione: 100 gr. di prodotto contengono:

Metabenztiazuron puro	gr. 40
Coformulanti q.b.a	gr. 100

(Contiene glicole monoetilenico)

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

TERRANALISI s.n.c.
44042 — C E N T O (Ferrara)
Via Donizetti, 2/a - Telef. 90.62.07

Stabilimento di produzione:
Renazzo di Cento (Ferrara) - Via IV Novembre

Registrazione N. 6488 del 12.9.85 Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg. 1**

AVVERTENZE: Il diserbo con Ceresan L non deve essere eseguito su terreno torboso. Non si deve fare il trattamento di fine inverno prima di 15 giorni da una concimazione azotata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto nel trattamento di fine inverno può essere associato con diserbanti ormonici (Fitonex 54D - Fitonex Comby - Fitonex MC30 - Fitonex MP). Nel diserbo del mais è possibile la miscela con diserbanti a base di atrazina (Terrazina).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali ».

6489

GRAZON *

(SOLUZIONE EMULSIONABILE)

Erbicida che agisce per assorbimento fogliare e radicale per il controllo delle infestanti erbacee a foglia larga, arbusti ed essenze legnose.

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Clopyralid (Acido 3,6 - dicloropicolinico) puro	g 5,41
Triclopyr puro (sotto forma di estere butossiglicolico)	g 30,05
Coformulanti	q.b. a g 100,00

III CLASSE

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

Il GRAZON è un prodotto che, per assorbimento fogliare e radicale, controlla una vasta gamma di infestanti a foglia larga come Ortiche spp., Romici spp., Cirsium e arbustive come Rovi spp., Ginestre spp., Aceri spp., Betulle spp., Frassini spp., Quercie spp.

Dosi e modalità d'impiego

Il prodotto si impiega quando le piante sono in pieno sviluppo evitando comunque temperature troppo basse o troppo elevate.
Diluire il prodotto in 300-400 litri di acqua per ettaro bagnando le piante fino a sgocciolamento. È obbligatorio l'uso di occhiali e guanti durante la preparazione e l'impiego della soluzione diserbante.

Trattamento su aree incolte e pascoli:

Ortiche spp.:

Impiegare il formulato alla dose di 3 lt./Ha quando le infestanti si trovano in pieno sviluppo vegetativo preferibilmente prima della fioritura.

Romici spp.:

Impiegare il formulato alla dose di 4 lt./Ha trattando preferibilmente quando le infestanti presentano un'altezza di 15-20 cm. In zone fortemente infestate è consigliabile un secondo trattamento nell'anno successivo.

Cirsium spp.:

Impiegare il formulato alla dose di 3 lt./Ha trattando quando le infestanti sono in piena attività vegetativa prima della fioritura quando presentano un'altezza di 15 cm. Per Cirsium più sviluppato aumentare la dose a 4 lt./Ha.

Infestanti arbustive:

Impiegare il formulato alla dose di 3 lt./Ha trattando in Maggio-Luglio quando si trovano in piena attività vegetativa e comunque prima della stasi autunnale. È importante che i cespugli vengano irrorati abbondantemente per ottenere i migliori risultati.

Trattamenti localizzati:

Quando non sia necessario effettuare il trattamento a pieno campo per una scarsa presenza di infestanti si può procedere a trattamenti localizzati sulle infestanti impiegando 60 ml di formulato per 10 litri di acqua irrorando abbondantemente la pianta da eliminare.

Avvertenze

Per trattare i pascoli essi devono essere impiantati da almeno 2 anni. Tenere lontano animali dai pascoli trattati per almeno 28 giorni. Evitare che il prodotto venga a contatto con colture edibili poichè potrebbe danneggiarle.
Evitare la deriva durante il trattamento.

"Da non applicare con mezzi aerei"

Compatibilità

Il prodotto, qualora sia necessario, può essere miscelato con altri diserbanti.

"Avvertenza": In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora di verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il prodotto è fitotossico per le colture edibili e le piante ornamentali.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per i pesci.

"Attenzione": da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

* Marchio registrato - The Dow Chemical Company

Prodotto nello stabilimento di: King's Lynn - Inghilterra della The Dow Chemical Co.

Dow Chemical S.p.A.
Via R. Lepetit, 8 - Milano
Registrazione del Ministero della Sanità
n. 6489 del 12.9.85

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto lt.

6490

VITIRIL S

Fungicida organico sistemico e di contatto per trattamenti liquidi contro peronospora della vite e del pomodoro

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Vitiril S contengono:
g 8 di oxadixil puro
g 56 di propineb puro
disperdenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

— Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
— Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
— Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomatologia: l'unica sintomatologia nota per l'oxadixil è quella sperimentale: flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori. La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.
Il Propineb ha la seguente sintomatologia:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose e bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite ecc.).
Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii e grassi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite: 0,25-0,3% (250-300 g per 100 litri d'acqua).
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura): 0,25% (250 g per 100 litri d'acqua).
Su vite e pomodoro i trattamenti si effettuano ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento stagionale. Sulla vite si consigliano non più di quattro trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo; successivamente proseguire intervenendo con prodotti tradizionali cuproorganici o cuprici.
N.B. - Usare la dose più elevata quando le condizioni ambientali e di suscettibilità della coltura sono particolarmente favorevoli. Usare sempre un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione impiegando 2,5-3 kg di formulato per ettaro.

Da non applicare con mezzi aerei

— Non impiegare su vivai di vite.
— Non impiegare in serra.
— Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità: il Vitiril S è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; sconsigliabile l'uso in miscela con antiparassitari a reazione alcalina. Per la miscela con altro formulato, stemperare prima il Vitiril S in poca acqua e in altro recipiente l'altro formulato; poi versare l'altro formulato così preparato nel recipiente contenente Vitiril S, sempre agitando e portare a volume con acqua. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Filago (BG)
Registrazione Ministero Sanità n.6490 **del** 12.9.1985

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg

6491

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ISOTRIL S

Erbicida selettivo di post-emergenza del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale
Emulsione

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 29,3 di Isoproturon puro
gr. 6,3 di Inoxynil puro (da sale sodico)
gr. 14,5 di Mecoprop puro (da sale sodico)
Coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, ingestione e contatto cutaneo.

Sintomatologia:

Casi lievi:

Calore, sudorazione intensa, vasodilatazione, volto arrossato, astenia.

Casi gravi:

Astenia, sudorazione profusa, iperscialorrea, vomito, cianosi labiale, iperpiressia, tremori, disturbi del ritmo cardiaco, ipotensione, cefalea, vertigini, irrequietezze, convulsioni, edema polmonare.

Terapia:

In caso di contatto lavare la pelle abbondantemente con acqua e sapone. Se presente forma eczematosa applicare pomate al cortisone.

In caso di ingestione: lavanda gastrica con carbone assorbente. La lavanda gastrica è controindicata se esistono convulsioni; in tale caso, se si vuole praticare la lavanda gastrica, il paziente va intubato e va iniziata la terapia a base di anticonvulsivanti. Ossigeno al bisogno.

In caso di iperpiressia non somministrare antipiretici ma raffreddare il paziente senza mezzi farmacologici. Eseguire ECG ed eventuale correzione dei disturbi del ritmo.

Eseguire controllo degli elettroliti e pH ematico per una eventuale correzione. Se presenti convulsioni iniziare il trattamento con sedativi (clorazepam); qualora non si ottenessero risultati somministrare Na-thiopental 2,5% e.v. Somministrare liquidi e.v. per facilitare l'escrezione del prodotto.

Avvertenza:

Nei casi gravi ricovero urgente in Centro di rianimazione. Consultare un centro antiveleni.

RAVIT S.p.A. .

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
V.le degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.78.041 (5 linee)
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68

STAB.: Paganica (L'Aquila)

Reg. n. 6491 **Ministero della Sanità del** 20.9.85

12/84

CARATTERISTICHE

L'ISOTRIL-S è un erbicida selettivo di post-emergenza del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale, contro infestanti annuali graminacee (Alopecurus, Apera, Avena fatua e ludoviciana, Falaris, Lolium, Poa) e contro le infestanti annuali dicotiledoni, quali Bifora r., Centaurea c., Chrisanthemum s., Fumaria o., Galeopsis sp., Geranium sp., Galium sp., Lamium sp., Matricaria sp., Papaver r., Polygonum a., Poligonum c., Poligonum p., Raphanus r., Ranunculus sp., Sinapis a., Stellaria m., Veronica sp., Vicia sp.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato dopo il periodo delle forti gelate dall'inizio alla fine dell'accestimento dei cereali.

Per la distruzione delle Avene, del Lolium e della Falaris è necessario intervenire entro lo stadio di due-quattro foglie delle infestanti, prima che le stesse inizino l'accestimento.

Dosi: — contro Alopecurus, Apera, Poa litri 4-5 per ettaro;
— contro Avena, Falaris e Lolium litri 5-6 per ettaro.

Distribuire la dose di prodoto con 600-800 litri d'acqua per ettaro.

Preparazione della miscela: Immettere il prodotto direttamente nel serbatoio dell'irroratrice già riempita d'acqua. Tenere agitata la poltiglia durante il trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Trattare in assenza di vento, per non danneggiare, anche sottoforma di vapori portati dal vento, le colture vicine sensibili quali: Vite, Alberi da frutto, Ortaggi, ecc..

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto litri

6492

MALTIONOX 50

Insetticida emulsionabile dotato di energica azione di contatto, per ingestione e per inalazione

Composizione *(riferita a g. 100)*:

- Malathion puro g. 49,2
- Coformulanti (contiene mesitilene) q.b. a g. 100,0

III CLASSE

Attenzione: manipolare con prudenza

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico:

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:

Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogoin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:

Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

« AVVERTENZA »: consultare un centro antiveleni.

Dosi e modalità d'impiego:

Il MALTIONOX 50 controlla una vasta gamma di insetti in numerose colture intervenendo alla loro comparsa. I trattamenti si effettuano con pompe a volume normale alle seguenti dosi:

Agrumi: Alla dose di 200-300 g/hl contro neanidi di cocciniglie, cimice verde, empoasca.

Pomacee (melo, pero): Alla dose di 250-300 g/hl contro psilla, tignole, afidi, carpocapsa, neanidi di cocciniglie, mosca della frutta, tingidi, tripidi, tentredini, tortrici.

Drupacee (pesco, susino, albicocco, ciliego): Alla dose di 250-300 g/hl contro cydia, anarsia, mosca delle ciliegie, monostelra, afidi, tentredini.

Orticole (patata, pomodoro, peperone, pisello, sedano, zucchino, carciofo, carota, cavolo, cocomero, fagiolo, melanzana, fragola): Alla dose di 200-250 g/hl contro afidi, nottue, cavolaia, punteruolo, cimici, tripidi, aleurodidi, altiche, apion, casside, criocere, tortricidi.

Olivo: Alla dose di 200-300 g/hl contro tignole, moscerini, neanidi di cocciniglie.

Vite: Alla dose di 200-300 g/hl contro oziorrinco, tignole, sigaraio.

Floricole e ornamentali (in pieno campo): Alla dose di 250 g/hl contro bega, afidi, tripidi, neanidi di cocciniglie, tentredini, tortrici, aleurodidi, cecidomie, cicaline.

Leguminose foraggere: Alla dose di 200-250 g/hl contro afidi, apion, fitonomo, misurino.

Pioppo: Alla dose di 500-600 g/hl contro microlepidotteri minatori, afidi, limantria.

Cereali (escluso riso): Alla dose di 150-250 g/hl contro afidi, cecidomie, nottua gialla, tripidi.

Bietola da zucchero: Alla dose di 200-250 g/hl contro afidi, cimici, tripidi.

Tabacco: Alla dose di 200-250 g/hl contro afidi, cimici, tripidi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità:

Il MALTIONOX 50 è compatibile con la generalità degli antiparassitari, eccezion fatta per i polisolfuri di calcio e di bario.

« **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta ».

Rischi di nocività — Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Intervallo di sicurezza. Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Prodotto in Francia nello stabilimento della Prochim Courchelettes (Nord) B.P. 239 59506 Douai 56 B 57

Dow Chemical S.p.A.
Via R. Lepetit, 8 - Milano
Registrazione del Ministero della Sanità N. 6492 del 12.9.85
Confezione da lt. 5

DA NON VENDERSI SFUSO

6493

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con
prudenza

DIEFESAN CVC®

Fungicida sistemico in polvere bagnabile per combattere le malattie fungine delle piante da fiore o ornamentali in pieno campo o serra.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Carbossina pura	g 20
Captano puro	g 40
Chinosol puro	g 12,5
Bagnanti e coadiuvanti	q. b. a g 100

GRUPPO MONTEDISON
FARMOPLANT
Fitofarmaci Montedison

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 6493 **del** 12.9.85

® Marchio Registrato

Caratteristiche

Diefesan è un fungicida ottenuto dalla combinazione della Carbossina e del Chinosol, ad azione sistemica, con il Captano, ad azione di contatto.
Il prodotto viene impiegato sia nella irrorazione delle piante che nella disinfezione del terreno.
I prodotti sistemici vengono assorbiti dalle piante sia attraverso le radici (trattamenti al terreno) che per mezzo delle foglie (irrorazioni alle piante) persistendo a lungo e risultando efficaci anche a seguito di irrigazioni.
Il Diefesan CVC risulta efficace contro le crittogame: **Rhizoctonia solani, Ruggini, Carboni, Septoria, Fusarium, Alternaria, Botritys, Pythium,** sulle colture floricole intensive in pieno campo ed in serra e in particolare sulle seguenti colture: Dieffenbachia, Ciclamino, Begonia, Garofano, Rosa, Crisantemo, Pelargonium, Dalia, Giacinto, Arum, Poinsettia, Gladioli, Iris, Tulipani.

ISTRUZIONI PER L'USO

Nella irrorazione delle piante il Diefesan CVC si impiega alle seguenti dosi: 200 g per 100 litri di acqua nei **trattamenti preventivi**, 250-300 g per 100 litri di acqua nei **trattamenti curativi**. I trattamenti preventivi vanno ripetuti alla distanza di 10-15 giorni; i trattamenti curativi in numero di 3-4, vanno ripetuti alla distanza di 8-10 giorni fino al completo controllo della malattia. Nel trattamento al terreno il prodotto si impiega alla dose di 5-7 g/m² di superficie, sciolti in 4-5 litri di acqua. Il trattamento va ripetuto alla distanza di 15 giorni. Sulle piante giovani e quando al trattamento al terreno segue la semina, si raccomandano le dosi minori.

Preparazione della miscela

Sospendere la dose del prodotto in poca acqua e mescolare fino ad ottenere un fluido omogeneo; versare gradualmente questa poltiglia nel quantitativo totale di acqua richiesto ed agitare ripetutamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il Diefesan CVC è compatibile con i più comuni insetticidi, acaricidi e fungicidi.
— Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri ecc.) con olii e con zolfi.

Avvertenze

In caso di miscela con altri formulati, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Evitare di respirare i vapori.

Avvertenza: durante la manipolazione del prodotto usare occhiali protettivi date le proprietà irritanti del principio attivo Carbossina.

Informazioni per il medico

Sintomi di intossicazione: azione irritante sul tratto gastrointestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro di acqua) e digitale.

Rischio di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci.

Attenzione

Da impiegare esclusivamente in floricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco. 87

6494

SANDOFAN® CF

Anticrittogamico che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite, del pomodoro e della patata

Composizione
gr. 10 di oxadixil puro
gr. 40 di folpet puro
gr. 15 di rame metallo (sotto forma di ossicloruro tetraramico)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- è obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
- Sintomatologia
  L'unica sintomatologia nota per l'Oxadixil è quella sperimentale: flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori.
  La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.
  Il Folpet ha la seguente sintomatologia:
  azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.
  Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
  Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmie.

In caso di ingestione
Far vomitare il paziente, ma mai se in stato di incoscienza; quando non si verifica il vomito ed il paziente non è in stato di incoscienza è raccomandata la lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua); digitale.

In caso di contaminazione degli occhi
Lavare gli occhi con acqua corrente per circa 15 minuti.
Se necessario somministrare pomata oftalmica anestetica o collirio.

In caso di inalazione
Stendere il paziente all'aria aperta e coprirlo bene tenendolo al caldo.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in 100 litri di acqua
Vite	Peronospora	0,2 – 0,25 % = gr. 200–250
Pomodoro	Peronospora	0,2 – 0,25 % = gr. 200–250
Patata	Peronospora	0,2 – 0,25 % = gr. 200–250

La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza, permettono al SANDOFAN CF di controllare la Peronospora intervenendo ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento delle piogge.
In viticoltura si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni, da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm. e la pre-chiusura del grappolo.
Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame.
Su pomodoro e patata intervenire ogni 14 giorni dal momento in cui si creano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. SANDOFAN CF per la presenza del folpet e del rame è attivo contro le malattie secondarie come Alternaria, Septoria e Botrytis ed ha anche un'azione collaterale verso disseccamenti e maculature batteriche. Nei trattamenti di chiusura intervenire con prodotti tradizionali di copertura.
Impiegare la dose alta qualora le condizioni ambientali siano particolarmente favorevoli allo sviluppo della malattia.
Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati e un consumo di formulato di 2 – 2,5 kg. per ettaro.

Da non impiegare sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari Sandoz a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con prodotti oleosi; in caso di trattamenti con questi ultimi, distanziare l'intervento con SANDOFAN CF di 2–3 settimane.
SANDOFAN CF non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
AVVERTENZA: devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura.

Rischi di nocività
E' tossico per i pesci e gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO

Dipartimento Agro

Officina di produzione
PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 6494 del 20.9.1985 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO — Contenuto netto kg.

6495

SANDOFAN® F10-35

Anticrittogamico che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite, del pomodoro e della patata.

Composizione
gr. 10 di oxadixil puro
gr. 35 di folpet puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- è obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;

Informazioni per il medico
- **Sintomatologia**
  L'unica sintomatologia nota per l'Oxadixil è quella sperimentale:
  flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori.
  La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.
  Il Folpet ha la seguente sintomatologia:
  azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.
  Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
  Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmie.

In caso di ingestione
Far vomitare il paziente, ma mai se è in stato di incoscienza; quando non si verifica il vomito ed il paziente non è in stato di incoscienza è raccomandata la lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua); digitale.

In caso di contaminazione degli occhi
Lavare gli occhi con acqua corrente per circa 15 minuti.
Se necessario somministrare pomata oftalmica anestetica o collirio.

In caso di inalazione
Stendere il paziente all'aria aperta e coprirlo bene tenendolo al caldo.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	0,2 – 0,25% - gr. 200–250
Pomodoro	Peronospora	0,2 – 0,25% - gr. 200–250
Patata	Peronospora	0,2 – 0,25% - gr. 200–250

La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza, permettono al SANDOFAN F 10-35 di controllare la Peronospora intervenendo ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento delle piogge.

In viticoltura si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm. e la pre-chiusura del grappolo.
Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame.

Su pomodoro e patata intervenire ogni 14 giorni dal momento in cui si creano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. SANDOFAN F 10-35 per la presenza del folpet è attivo anche contro le malattie secondarie come Alternaria, Septoria e Botrytis.
Nei trattamenti di chiusura intervenire con prodotti tradizionali di copertura.

Impiegare la dose alta qualora le condizioni ambientali siano particolarmente favorevoli allo sviluppo della malattia.

Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati e un consumo di formulato di 2 – 2,5 kg. per ettaro.

Da non impiegare sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari Sandoz a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con prodotti oleosi; in caso di trattamenti con questi ultimi, distanziare l'intervento con SANDOFAN F 10-35 di 2–3 settimane.
SANDOFAN F 10-35 non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.

AVVERTENZA: devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
E' tossico per i pesci e gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta per la vite.
Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti. Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta per pomodori e patate.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO

Dipartimento Agro

Officina di produzione
PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 6495 del 20.9.1985 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO — Contenuto netto kg.

6496

SANDOFAN® PRO 25-10-15

Anticrittogamico che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite e del pomodoro.

Composizione

gr. 10 di oxadixil puro
gr. 25 di propineb puro
gr. 15 di rame metallo (sotto forma di ossicloruro)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- è obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;
- conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;
- in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;
- durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Informazioni per il medico

- Sintomatologia
  L'unica sintomatologia nota per l'Oxadixil è quella sperimentale:flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori.
  La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.
  Il Propineb ha la seguente sintomatologia:
  l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose e bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
- Terapia
  Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
  Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini.
  Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
- Controindicazioni: alcool, olii e grassi.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	0,2 – 0,25 % = gr. 200–250
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora	0,2 – 0,25 % = gr. 200–250

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

I trattamenti si effettuano ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento stagionale.
Su vite si consigliano non più di quattro trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm. e la pre-chiusura del grappolo; successivamente intervenire con prodotti cuproorganici tradizionali o cuproorganici a base di cymoxanil.

N.B.- Usare la dose più elevata quando le condizioni ambientali e di suscettibilità della coltura sono particolarmente favorevoli. Usare sempre un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione impiegando 2–2,5 kg. di formulato per ettaro.

Da non impiegare sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità

Il SANDOFAN PRO 25-10-15 è miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra; sconsigliabile l'uso in miscela con antiparassitari a reazione alcalina. Per la miscela con altro formulato, stemperare prima il SANDOFAN PRO 25-10-15 in poca acqua e in altro recipiente l'altro formulato; poi versare l'altro formulato così preparato nel recipiente contenente SANDOFAN PRO 25-10-15, sempre agitando e portare a volume con acqua.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Non impiegare durante la fioritura.

Rischi di nocività

E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO

Dipartimento Agro

Officina di produzione
PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 6496 del 20.9.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO — Contenuto netto kg. 1

6497

SANDOFAN PRO 56-10

Anticrittogamico che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite e del pomodoro

Composizione
gr. 10 di oxadixil puro
gr. 56 di propineb puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
conservare la confezione ben chiusa;
non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
non operare contro vento;
evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
è obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto;
dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;
conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;
in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;
durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Informazioni per il medico

Sintomatologia
L'unica [illegible] nota per l'Oxadixil è quella sperimentale flaccidità, astenia, posizione [illegible] lato laterale, tremori.
La sostanza [illegible] inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.
Il Propineb [illegible] sintomatologia:
l'ingestione [illegible] conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose e bronchite;
il contatto [illegible] le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, [illegible]).

Terapia
Nei casi [illegible] in centro di rianimazione.
Negli altri [illegible] è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda [illegible] il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda [illegible] intubazione. Purganti salini.
Cure [illegible] della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, [illegible].

Controindicazioni [illegible]

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dose di impiego in litri 100 di acqua
Vite	[illegible]	0,20 – 0,25 % = gr. 200–250
Vite	Peronospora	0,20 – 0,25 % = gr. 200–250
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora	0,20 % = gr. 200

Su vite e pomodoro i trattamenti si effettuano ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento stagionale. Sulla vite si consigliano non più di quattro trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo; successivamente proseguire intervenendo con prodotti cuproorganici tradizionali o cuproorganici contenenti cymoxanil.

N.B. - Usare la dose più elevata quando le condizioni ambientali e di suscettibilità della coltura sono particolarmente favorevoli. Usare sempre un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione impiegando 2–2,5 kg. di formulato per ettaro.

Da non impiegare sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
Il SANDOFAN PRO 56-10 è miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra, sconsigliabile l'uso in miscela con antiparassitari a reazione alcalina. Per la miscela con altro formulato, stemperare prima il SANDOFAN PRO 56-10 in poca acqua e in altro recipiente l'altro formulato; poi versare l'altro formulato così preparato nel recipiente contenente SANDOFAN PRO 56-10, sempre agitando e portare a volume con acqua.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione
PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 6497 del 20.9.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO — Contenuto netto kg. 1

6498

SANDOFAN® CM

Anticrittogamico che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite e del pomodoro

Composizione
gr. 10 di oxadixil puro
gr. 25 di mancozeb puro
gr. 15 di rame metallo (di cui:
gr. 10 sotto forma di ossicloruro tetreramico
gr. 5 sotto forma di solfato tetraramico tricalcico)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- è obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;
- conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;
- in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;
- durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Informazioni per il medico
- Sintomatologia
  L'unica sintomatologia nota per l'Oxadixil è quella sperimentale: flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori.
  La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.
  Il mancozeb ha la seguente sintomatologia:
  l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose e bronchite.
  Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
- Terapia
  Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
  Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini.
  Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
- Controindicazioni: alcool, olii e grassi.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	0,2 – 0,25 % = gr. 200–250
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora	0,2 – 0,25 % = gr. 200–250

La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza, permettono al SANDOFAN CM di controllare la Peronospora intervenendo ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento delle piogge.

In viticoltura si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni, da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm. e la pre-chiusura del grappolo.
Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame.

Impiegare la dose alta qualora le condizioni ambientali siano particolarmente favorevoli allo sviluppo della malattia.

Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati e un consumo di formulato di 2–2,5 kg. per ettaro.

Da non impiegare sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
SANDOFAN CM è compatibile con tutti gli antiparassitari Sandoz a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con TMTD.
Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio SANDOFAN CM + TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di SANDOFAN CM da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando.
Per la miscelazione del SANDOFAN CM con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di SANDOFAN CM, già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Su pomodori è bene evitare trattamenti con SANDOFAN CM miscelato a concimi fogliari contenenti boro.
Non si deve trattare durante la fioritura.

Rischi di nocività
E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO

Dipartimento Agro

Officina di produzione:
PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 6498 del 20.9.[illegible] del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO — Contenuto netto kg. 1

6499

SANDOFAN® MET 10-56

Fungicida ad azione sistemica e di contatto per la lotta contro la Peronospora della vite e del pomodoro.

Composizione
gr. 10 di oxadixil puro
gr. 56 di metiram puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- è obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;
- conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;
- in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;
- durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Informazioni per il medico
- Sintomatologia
  L'unica sintomatologia nota per l'Oxadixil è quella sperimentale: flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori.
  La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.
  Il metiram ha la seguente sintomatologia:
  l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose e bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
- Terapia
  Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
  Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica, solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini.
  Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
- Controindicazioni: alcool, olii e grassi.

Caratteristiche tecniche
SANDOFAN MET 10-56 è un antiperonosporico che deriva dall'associazione di due sostanze attive ad azione combinata: l'una, l'oxadixil, che agisce per via sistemica ed ha azione specifica, preventiva e curativa, di lunga durata; l'altra, il metiram, che agisce per contatto, ed ha azione polivalente. SANDOFAN MET 10-56 consente l'adozione di programmi di lotta antiperonosporica indipendenti dall'andamento delle piogge e dallo sviluppo della superficie fogliare.

Dosi e modalità di impiego
Peronospora della vite: 200–250 gr. per 100 litri d'acqua (2–2,5 kg. per ettaro).

Il primo trattamento si effettua quando si verificano le condizioni idonee per l'infezione primaria; i trattamenti successivi ad intervalli di 14 giorni fino alla pre-chiusura del grappolo. Si consiglia di non effettuare più di quattro trattamenti. Per eventuali trattamenti supplementari utilizzare invece prodotti tradizionali.

Non impiegare su vivai di vite.

Peronospora del pomodoro: 200 gr. per 100 litri d'acqua (solo fino alla prima fioritura).

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Divieto di impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
SANDOFAN MET 10-56 è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione fortemente alcalina e con concimi fogliari ad elevato contenuto di boro.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione
PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 6499 del 20.9.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO — Contenuto netto kg. 1

6500

6500

SANDOFAN®PRO

Anticrittogamico che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite e del pomodoro.

Composizione
gr. 8 di oxadixil puro
gr. 58 di propineb puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- è obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;
- conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;
- in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;
- durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Informazioni per il medico

- Sintomatologia
  L'unica sintomatologia nota per l'Oxadixil è quella sperimentale: flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori.
  La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.

  Il Propineb ha la seguente sintomatologia:
  l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose e bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
- Terapia
  Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
  Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini.
  Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomata oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
- Controindicazioni: alcool, olii e grassi.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	0,25 – 0,3 % = gr. 250–300
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora	0,25 % = gr. 250

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Su vite e pomodoro i trattamenti si effettuano ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento stagionale. Sulle vite si consigliano non più di quattro trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo; successivamente proseguire intervenendo con prodotti cuproorganici tradizionali o cuproorganici contenenti cymoxanil.

N.B.- Usare la dose più elevata quando le condizioni ambientali e di suscettibilità della coltura sono particolarmente favorevoli. Usare sempre un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione impiegando 2,5–3 kg. di formulato per ettaro.
Da non impiegare sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità

Il SANDOFAN PRO è miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra; sconsigliabile l'uso in miscela con antiparassitari a reazione alcalina. Per la miscela con altro formulato, stemperare prima il SANDOFAN PRO in poca acqua e in altro recipiente l'altro formulato; poi versare l'altro formulato così preparato nel recipiente contenente SANDOFAN PRO, sempre agitando e portare a volume con acqua.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.P.A. - MILANO

Dipartimento Agro

Officina di produzione
PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 6500 del 20.9.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO — Contenuto netto kg.

6501

SANDOFAN® M8-56

Anticrittogamico che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite e del pomodoro. 6501

Composizione

gr. 8 di oxadixil puro
gr. 56 di mancozeb puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- è obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;
- conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;
- in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;
- durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Informazioni per il medico

- Sintomatologia
  L'unica sintomatologia nota per l'Oxadixil è quella sperimentale: flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori.
  La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.

  Il mancozeb ha la seguente sintomatologia:
  l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose e bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

- Terapia
  Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
  Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini.
  Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

- Controindicazioni: alcool, olii e grassi.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	0,25 – 0,30 % = gr. 250–300
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora	0,25 % = gr. 250

La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza, permettono al SANDOFAN M 8-56 di controllare la Peronospora, della vite e del pomodoro, intervenendo ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento delle piogge.

In viticoltura si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni, da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm. e la pre-chiusura del grappolo.
Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame.

Impiegare la dose alta qualora le condizioni ambientali e di suscettibilità della coltura siano particolarmente favorevoli.

La dose consigliata va distribuita in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati e con un consumo di formulato di 2,5–3 kg. per ettaro.

Da non impiegare sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità

SANDOFAN M 8-56 è compatibile con tutti gli antiparassitari Sandoz a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con concimi fogliari ad elevato contenuto di boro.

Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio SANDOFAN M 8-56 + TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di SANDOFAN M 8-56 da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione del SANDOFAN M 8-56 con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di SANDOFAN M 8-56, già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Su pomodoro è bene evitare trattamenti con SANDOFAN M 8-56 miscelato a concimi fogliari contenenti boro.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO

Dipartimento Agro

Officina di produzione:
PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 6501 del 20.9.76 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO Contenuto netto kg.

6502

SANDOFAN® C

Anticrittogamico che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite, del pomodoro e della patata

Composizione

gr. 10 di oxadixil puro
gr. 40 di rame metallo (sotto forma di ossicloruro tetraramico)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- è obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

- Sintomatologia
  L'unica sintomatologia nota per l'Oxadixil è quella sperimentale: flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori.
  La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua	
Vite	Peronospora	0,2 – 0,25%	– gr. 200–250
Pomodoro	Peronospora	0,25%	– gr. 250
Patata	Peronospora	0,25%	– gr. 250

La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza, permettono al SANDOFAN C di controllare la Peronospora intervenendo ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento delle piogge.

In viticoltura si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni, da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm. e la pre-chiusura del grappolo.
Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame.
Impiegare la dose alta qualora le condizioni ambientali siano particolarmente favorevoli allo sviluppo della malattia.

Su pomodoro e patata intervenire ogni 14 giorni dal momento in cui si creano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Nel o nei trattamenti di chiusura intervenire con prodotti tradizionali di copertura.

SANDOFAN C per la presenza del rame è attivo contro le malattie secondarie come Alternaria ed ha anche un'azione collaterale verso disseccamenti e maculature batteriche.

Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati e un consumo di formulato di 2–2,5 kg. per ettaro.

Da non impiegare sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari Sandoz a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con TMTD.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Non si deve trattare durante la fioritura.

Rischi di nocività

E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO

Dipartimento Agro

Officina di produzione
PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 6502 del 20.9.1985 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO — Contenuto netto kg.

6503

SANDOFAN® MET

Fungicida ad azione sistemica e di contatto per la lotta contro la Peronospora della vite e del pomodoro.

Composizione
gr. 8 di oxadixil puro
gr. 68 di metiram puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- è obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;
- conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;
- in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;
- durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Informazioni per il medico
- **Sintomatologia**
  L'unica sintomatologia nota per l'Oxadixil è quella sperimentale: flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori.
  La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.

  Il metiram ha la seguente sintomatologia:
  l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose e bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
- **Terapia**
  Nei casi gravi ricovero urgente in centri di rianimazione.
  Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini.
  Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
- **Controindicazioni**: alcool, olii e grassi.

Caratteristiche tecniche
SANDOFAN MET è un antiperonosporico che deriva dall'associazione di due sostanze attive ad azione combinata; l'una, l'oxadixil, che agisce per via sistemica ed ha azione specifica, preventiva e curativa, di lunga durata; l'altra il metiram, che agisce per contatto, ed ha azione polivalente. SANDOFAN MET consente l'adozione di programmi di lotta antiperonosporica indipendenti dall'andamento delle piogge e dallo sviluppo della superficie fogliare.

Dosi e modalità di impiego

Peronospora della vite: 250—300 gr. per 100 litri d'acqua (2,5—3 kg. per ettaro).

Il primo trattamento si effettua quando si verificano le condizioni idonee per l'infezione primaria; i trattamenti successivi ad intervalli di 14 giorni fino alla pre-chiusura del grappolo. Si consiglia di non effettuare più di quattro trattamenti. Per eventuali trattamenti supplementari utilizzare invece prodotti tradizionali.

Non impiegare su vivai di vite.

Peronospora del pomodoro: 250 gr. per 100 litri d'acqua (solo fino alla prima fioritura).

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Divieto di impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
SANDOFAN MET è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione fortemente alcalina e con concimi fogliari ad elevato contenuto di boro.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Evitare le miscele con concimi fogliari contenenti boro.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO

Dipartimento Agro

Officina di produzione
PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 6503 del 20.9.1985 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO Contenuto netto kg.

6504

METOGRAN

Diserbante di post-emergenza del frumento tenero

COMPOSIZIONE

- Metoprotrina puro . . . . g 23,75
- Ioxynil puro (sotto forma di estere ottanoico) . . . . g 10,65
- Disperdenti, bagnati, sospensivanti e inerti . . . . q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.**
- **Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE:
Casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, faccia rossa.
Casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea.
Casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.
CONSIGLI TERAPEUTICI
Primo soccorso: mettere subito il paziente in stato di assoluto riposo in luogo fresco. Togliere ed isolare gli indumenti contaminati. Lavare pelle e capelli con acqua e sapone nel caso in cui siano stati a contatto con l'erbicida. Se il paziente riesce a bere, somministrargli generosamente acqua o the, ma non latte. Per i pazienti in coma aggiungere glucosio al 5%. L'iperpiressia va combattuta raffreddando il corpo del paziente (togliere gli indumenti, portare l'infortunato in luogo fresco, applicare compresse bagnate di alcool). Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato. Come sedativi si possono adoperare, a piccole dosi, la cloropromazina (25 mg) e la promazina (50 mg), ma tali farmaci possono provocare un aumento dell'ipertermia.
In caso di ingestione: lavanda gastrica con carbone attivo adsorbente, oppure con soluzione al 5% di bicarbonato di sodio. Purgare con solfato di sodio. Durante il trasporto in ospedale il paziente deve rimanere immobile e tranquillo (eventualmente con l'impiego dei sedativi già ricordati). Si somministreranno liquidi per via parenterale e si praticherà respirazione artificiale. Ossigenoterapia. In ospedale, in base alle determinazione degli elettroliti e ad altri controlli ematici, si potrà regolare esattamente il bilancio elettrolitico.
ALCUNE CONTROINDICAZIONI: morfina, atropina, barbiturici, purganti oleosi.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

METOGRAN è un diserbante di post-emergenza selettivo nei confronti del frumento tenero.
È attivo, per assorbimento radicale e fogliare, contro le più comuni infestanti graminacee e dicotiledoni del grano: Alopecurus myosuroides, Apera spica venti, Phalaris spp., Bifora radians, Fumaria officinalis, Galeopsis tetrahit, Galium aparine, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Bylderdykia (Polygonum) convolvolus, Polygonum persicaria, Ranunculus spp., Raphanus raphanistrum, Sinapis spp., Stellaria media, Veronica spp.
A distanza di 20-25 giorni dal trattamento è possibile eseguire la trasemina di leguminose foraggere.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Intervenire nel periodo compreso tra la 4ª foglia del frumento e la fine dell'accestimento, impiegando le dosi più elevate con infestazione prevalentemente costituita da graminacee: 4-5 kg/ha.
Per una più efficace attività diserbante, trattare quando le infestanti si trovano nei primi stadi di sviluppo.
Distribuire il prodotto senza sovrapposizioni. Non trattare con temperature inferiori a 7-8 °C e nei giorni immediatamente successivi ad un periodo di intenso gelo.
Distanziare di almeno 7-8 giorni l'applicazione di **METOGRAN** da concimazioni azotate di copertura.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: METOGRAN è compatibile con la generalità dei diserbanti.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non applicare il prodotto su terreni sciolti, sabbiosi, ghiaiosi e su terreni dove di norma si possono formare ristagni d'acqua, al fine di evitare l'insorgere di fenomeni fitotossici.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA

EniChemAgricoltura S.p.A. A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione: CHEMIA S.p.A.
Stabilimento di S. Agostino - Ferrara 6504 20.9.85
Registrazione del Ministero della Sanità n. ___ del ___

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

6505

NOKAD

Fitoregolatore diradante del melo e anticascola del melo e del pero

COMPOSIZIONE

– NAA puro . . . . g 4
(sotto forma di sale sodico)

– Solventi, Adesivanti, Bagnanti . . . . q.b. a g. 100
(Contiene cellosolve).

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.**
- **Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

NOKAD è un fitoregolatore auxinico che distribuito sulle piante di melo subito dopo l'allegagione esplica effetto diradante sui frutticini; mentre se irrorato in prossimità della maturazione, previene od arresta la cascola naturale pre-raccolta delle mele e delle pere.
NOKAD si impiega, come diradante, su alcune varietà di melo, e in particolare sulla "Golden delicious". L'effetto diradante consente di ottenere frutti con elevate caratteristiche organolettiche, di maggiore ed uniforme pezzatura. Il fitoregolatore stimola anche direttamente la differenziazione a fiore, con conseguente progressiva eliminazione dell'alternanza di produzione.
NOKAD si impiega come anticascola su tutte le varietà di melo e pero ed in particolare su quelle notoriamente soggette alla cascola pre-raccolta: Gravenstein, Delicious rosse, Renetta del Canada, Granny Smith, stayman Winesap; Guynot, William, Abate Fetel, Kaiser, Butirra Clairgeau, Passa Crassana. Determina un anticipo di maturazione (da 2 a 3 giorni), accentua la colorazione dei frutti. Il fitoregolatore viene assorbito rapidamente e può esplicare l'effetto anticascola entro 1-2 giorni dall'applicazione.
NOKAD essendo un fitoregolatore, è influenzato nella sua azione dai fattori ambientali (temperatura, umidità); dallo stato della coltura (nutrizionale, sanitario); dalla varietà.

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO

Effetto diradante (melo)
Trattare quando i frutticini centrali di Lamburde poste sul legno vecchio hanno un diametro medio di 10-12 mm.
Golden Delicious **25-40 cc/hl d'acqua**

Le dosi maggiori si impiegano su piante molto cariche e vigorose e nel caso si desideri un effetto diradante più intenso.

Effetto anticascola (melo, pero)
L'epoca di applicazione di **NOKAD** è in relazione al periodo di maturazione dei frutti.
Varietà a maturazione precoce (estive)
Trattare 7-8 giorni prima della raccolta
– MELO: **40-50 cc/hl d'acqua**
– PERO: **30-40 cc/hl d'acqua**

Varietà a maturazione media o tardiva
Trattare 15-20 giorni prima della raccolta
– MELO: **80-100 cc/hl d'acqua**
– PERO: **80-90 cc/hl d'acqua**

AVVERTENZE

Impiego come diradante
Distribuire la soluzione con uniformità, bagnando solamente la parte medio-alta della pianta, dopo aver chiuso gli ugelli inferiori dell'atomizzatore. Si consiglia di non diradare: piante giovani, all'inizio dell'attività produttive, soggette ad abbondante cascola naturale; piante deboli, non in buono stato nutrizionale e sanitario; quando, subito dopo l'allegagione, numerosi sono i frutticini con un solo o nessun seme, che cadranno successivamente; quando si è superata la fase ottimale di intervento. Temperature tra 15 e 20°C., elevata umidità relativa ed in generale un clima caldo-umido, nuvoloso e con assenza di vento, sono le condizioni migliori per l'assorbimento del fitoregolatore e per la sua efficacia diradante. È preferibile, inoltre, eseguire il trattamento nelle prime ore del mattino.

Impiego come anticascola

Operare nelle ore meno calde della giornata. Non superare le dosi indicate; quelle minori si riferiscono a trattamenti effettuati con temperature superiori a 20°C. Nell'eventualità che la cascola riprendesse, effettuare immediatamente una seconda applicazione. Una pioggia che intervenga 4-5 ore dopo il trattamento non ne pregiudica l'efficacia. Bagnare in modo uniforme il fogliame ed i frutti. Trattare piante sane con l'apparato fogliare non danneggiato da parassiti: in questi casi l'assorbimento del fitoregolatore viene ridotto.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: Il prodotto deve essere impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ: Non trattare piante malate o deperite.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA

EniChemAgricoltura S.p.A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Prodotto negli stabilimenti della Società ANICAGRICOLTURA
Unità di Carrara-Avenza (MS) 6505
Registrazione del Ministero della Sanità N. ___ **del** 20.9.85

DA NON VENDERSI SFUSO **VOLUME LITRI**

6506

CALOGRAN

Diserbante selettivo per cereali

COMPOSIZIONE

– Ioxynil puro .... g 9
(sotto forma di estere ottanoico)

– Mecoprop acido puro .... g 27
(sotto forma di estere butossietanolico)

– Emulsionanti, solventi .... q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

– Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
– Conservare la confezione ben chiusa.
– Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
– Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
– Non operare contro vento.
– Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
– Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, ingestione, contatto cutaneo.

SINTOMATOLOGIA

CASI LIEVI: Calore, sudorazione intensa, vasodilatazione, volto arrossato, astenia.

CASI GRAVI: Astenia, sudorazione profusa, iperscialorrea, vomito, cianosi labiale, iperpiressia, tremori, disturbi del ritmo cardiaco, ipotensione, cefalea, vertigini, irrequietezza, convulsioni, edema polmonare.

TERAPIA: In caso di contatto lavare la pelle abbondantemente con acqua e sapone. Se presente forma eczematosa applicare pomate al cortisone.
In caso di ingestione lavanda gastrica con carbone assorbente. La lavanda gastrica è controindicata se esistono convulsioni; in tale caso, se si vuole praticare la lavanda gastrica, il paziente va intubato e va iniziata la terapia a base di anticonvulsionanti. Ossigeno al bisogno. In caso di iperpiressia non somministrare antipiretici ma raffreddare il paziente senza mezzi farmacologici. Eseguire ECG ed eventuale correzione dei disturbi del ritmo. Eseguire controllo degli elettroliti e pH ematico per una eventuale correzione. Se presenti convulsioni iniziare il trattamento con sedativi (clorazepam); qualora non si ottenessero risultati somministrare Na-thiopental 2,5% e. v. Somministrare liquidi e. v. per facilitare l'escrezione del prodotto.

Nei casi gravi ricovero urgente in Centro di Rianimazione.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

CALOGRAN è un diserbante di post-emergenza selettivo verso frumento, orzo, segale, caratterizzato da un ampio periodo di intervento e da un vasto spettro d'azione nei confronti delle malerbe a foglia larga. È infatti attivo sia contro le infestanti dicotiledoni sensibili agli auxinici come fiordaliso, capsella, chenopodio, veccia, rafano, ranuncolo sia contro quelle resistenti quali ad es. bifora, gallio, alcuni ceppi di camomilla, di stellaria, di veronica e di papavero.
CALOGRAN è efficace anche alle temperature di 8-10° e viene assorbito rapidamente.

EPOCA, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il trattamento con **CALOGRAN** si effettua dalla 3ª-4ª foglia sino a fine levata dei cereali con temperature superiori agli 8°C., comunque durante le ore calde della giornata.
Trattamenti precoci (3ª-4ª foglia-inizio accestimento), impiegando 300-400 litri di acqua/ha: 2-2,5 litri/ha
Trattamenti tardivi (accestimento fine-levata): 2,5-3 litri/ha
È preferibile impiegare almeno 400-600 litri di acqua onde bagnare bene la vegetazione.
È in ogni caso consigliabile (particolarmente in presenza di infestazioni di camomilla, papavero, canapa selvatica, crisantemo) anticipare il trattamento il più possibile in modo da ottenere un risparmio di prodotto, un miglior controllo delle infestanti ed una diminuzione dei danni provocati dalla competizione delle infestanti. Si sconsiglia di trattare quando la temperatura all'ombra è superiore ai 25°C.
Effettuato il trattamento lavare abbondantemente l'apparecchiatura. Le parti in legno o in gomma, venute a contatto con l'erbicida, non potranno essere bonificate in alcun modo ed andranno adibite al solo diserbo.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: Il **CALOGRAN** è compatibile con la generalità dei diserbanti.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA

EniChemAgricoltura S.p.A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di produzione SIAPA S.p.A.
Stabilimento di S. Vincenzo di Galliera - Bologna
Registrazione del Ministero della Sanità N. 6506 del 20.9.1985

DA NON VENDERSI SFUSO **VOLUME LITRI**

6507

METAM SODIO

ANTICRITTOGAMICO, INSETTICIDA, NEMATOCIDA ED ERBICIDA PER LA DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRENO, IN FORMULAZIONE LIQUIDA

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione:

METAM-SODIUM puro . . gr. 32,7
Coformulanti . . q.b. a gr. 100,0

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' D'USO

Il prodotto è un fumigante ad azione anticrittogamica, insetticida, nematocida ed erbicida per la disinfezione e disinfestazione del terreno da funghi, insetti, nematodi e da infestanti annuali da seme ed a radice perenne.
S'impiega su terreni destinati a **colture floricole, vivai in genere, reimpianto di pescheti o di fragole, semenzai, letti caldi, cassoni, serre, piante ornamentali ed officinali, colture ortive** quali: crucifere (cavoli, ravanello, rapa), cucurbitacee (melone, zucchino, zucca, cetriolo, cocomero), solanacee (melanzana, pomodoro, peperone, patata), composite (cicoria, lattuga, indivia, radicchio, carciofo, cardo), leguminose (fagiolo, cece, pisello, fava, lenticchia), ombrellifere (finocchio, carota, sedano), cipolla, agliò, spinacio, porro, asparago, bietola da costa e fragola.

La dose normale d'impiego è di kg. 1000/ha; su terreni pesanti o fortemente infestati da fialoforosi e verticillosi si usa alla dose di kg. 1500–2000/ (a temperature basse usare le dosi più alte).

L'epoca d'impiego del prodotto è 25-30 giorni prima della semina o del trapianto delle colture.
Prima di eseguire il trattamento il terreno deve essere ben sminuzzato, livellato e privo di residui radicali provenienti dalla coltura precedente; quindi, bagnare il terreno e mantenerlo umido per una settimana. Al momento del trattamento la temperatura del terreno deve essere fra i 15°C ed i 32°C: a temperature inferiori coprire il terreno con teloni di plastica mentre a temperature superiori effettuare irrigazioni. Al momento del trattamento il terreno deve essere umido. Subito dopo il trattamento innaffiare il suolo (50-100 litri d'acqua ogni 10 m²) oppure eseguire una rullatura.
Il prodotto può essere applicato: con pali iniettori praticando iniezioni profonde circa 10 cm. ogni 25-30 cm. di distanza; **con sistemi d'irrigazione** impiegando 50-60 lt. d'acqua per 1 lt. di prodotto; **con annaffiatoi a mano** impiegando lt. 1-2 di prodotto in 20-25 lt. d'acqua per trattare una superficie di 10 m² e distribuendo uniformemente; **con pompe irroratrici** diluendo 1 lt. di prodotto in 40-50 lt. d'acqua; **con macchine fumigatrici** seguendo le indicazioni delle Case costruttrici dell'apparecchio.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: si consiglia di usare il prodotto da solo.

Fitotossicità: eseguire una lavorazione superficiale del terreno dopo 8-15 giorni dal trattamento (15 giorni se la temperatura è bassa) per facilitare la fuoriuscita del prodotto ed evitare fitotossicità per le colture che dovranno essere impiantate. Attendere poi 9-12 giorni prima della semina o del trapianto (aumentare questo periodo a 15-20 giorni se il trattamento viene fatto a terreni umidi, freddi, organici) e rispettare questo intervallo prima di impiantare la coltura, onde evitare fenomeni di fitotossicità. Per i trattamenti in serra, non trattare se in questa c'è una coltura in atto ed evitare infiltrazioni di gas nelle serre vicine. Inoltre, se la temperatura del terreno al momento del trattamento è inferiore al 14°C e rimane tale per vari giorni, ricorrere al controllo delle piante spia prima di eseguire la semina. Evitare di trattare ad una distanza inferiore a 1 mt. da piante arboree od erbacee.

Il prodotto è tossico per i pesci.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

Raffinerie ALMAGIA' S.p.A.

Via Magazzini Posteriori, 31 - 48100 RAVENNA

Stabilimento produttore:
LABORATORI CHIMICI CIFA - CARAVAGGIO (Bergamo)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6507 **del** 26/9/85

6508

Classe III

ATTENZIONE manipolare con prudenza

TAIREL® 35 SEMENTI

Fungicida dotato di azione sistemica per la concia umida delle sementi di girasole

Composizione

Benalaxyl puro	g 35
Bagnanti, adesivanti, inerti e coloranti q.b. a	g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 6508 del 26.9.85

® Marchio registrato

APPLICAZIONE

— Girasole **(Plasmopara halstedii)**

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

— Concia umida: 6 g/kg di seme, da diluire in 10 - 15 cc. d'acqua.

— Con miscelatori meccanici (betoniera): sospendere la quantità stabilita di TAIREL 35 SEMENTI nell'acqua indicata.
Versare metà della sospensione nel miscelatore e farlo ruotare, così da ottenere una distribuzione uniforme del prodotto sulla parete interna.
Inserire la semente nel miscelatore e, mentre questo ruota lentamente, aggiungere, sempre lentamente, la rimanente sospensione.
Continuare a far funzionare il miscelatore sino ad ottenere una concia uniforme dei semi.

— Metodo manuale: accumulare i semi su una superficie pulita (cemento, o terra su cui è distesa un foglio di Polietilene).
Versare un quarto della sospensione, preparata secondo la metodologia indicata, sulla cima del mucchio e mescolare i semi con una pala. Ripetere l'operazione per altre 3 volte, distribuendo ogni volta una parte del quantitativo rimasto, continuando a mescolare con la pala, finchè tutti i semi sono uniformemente conciati.

Oppure:

versare la sospensione, precedentemente preparata, in un sacco di plastica, fare in modo che aderisca alla superficie interna del sacco, aggiungere i semi e, tenendo chiuso il sacco, farlo rotolare fino ad ottenere una uniforme distribuzione del prodotto sui semi.

Compatibilità: Il formulato viene usato da solo.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- Conservare la confezione ben chiusa;
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- Non operare contro vento;
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

6509

VITIRIL Pr RAMATO

Fungicida cupro-organico sistemico e di contatto per trattamenti liquidi contro peronospora della vite e del pomodoro

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Vitiril Pr ramato contengono:
g 10 di Oxadixil* puro
g 25 di propineb puro
g 15 di rame metallo (sotto forma di ossicloruro)
disperdenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

— Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
— Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
— Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomatologia: l'unica sintomatologia nota per l'oxadixil è quella sperimentale: flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori.
La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.
Il Propineb ha la seguente sintomatologia:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose e bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite ecc.).
Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione provocare il vomito.
Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii e grassi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite: 0,2-0,25% (200-250 g per 100 litri d'acqua).
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura): 0,2-0,25% (200-250 g per 100 litri d'acqua.
I trattamenti si effettuano ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento stagionale.
Su vite si consigliano non più di quattro trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase del germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo; successivamente proseguire intervenendo con prodotti tradizionali cuproorganici o cuprici.
N.B. - Usare la dose più elevata quando le condizioni ambientali e di suscettibilità della coltura sono particolarmente favorevoli. Usare sempre un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione impiegando 2-2,5 kg di formulato per ettaro.

Da non applicare con mezzi aerei

— Non impiegare su vivai di vite.
— Non impiegare in serra.
— Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità: il Vitiril Pr ramato è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; sconsigliabile l'uso in miscela con antiparassitari a reazione alcalina. Per la miscela con altro formulato, stemperare prima il Vitiril Pr ramato in poca acqua e in altro recipiente l'altro formulato; poi versare l'altro formulato così preparato nel recipiente contenente Vitiril Pr ramato, sempre agitando e portare a volume con acqua. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non impiegare durante la fioritura.
Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: SANDOZ S.p.A. - Palazzolo Milanese (MI)

Registrazione Ministero Sanità n. 6509 **del** 11.7.85

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Kg

6510

BAYFIDAN BCM

FUNGICIDA ORGANICO

per la lotta contro le malattie del piede, l'oidio, la septoria e le ruggini del grano, il mal bianco (oidio) e la monilia delle pesche e nettarine

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Bayfidan BCM contengono:
g 11,3 di triadimenol puro;
g 22,5 di carbendazim puro;
coformulanti quanto basta a 100.
(contiene glicoletilenico)

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e ! avande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Consigli terapeutici di massima condizionati al caso: sintomatici, lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro d'acqua) e digitale. Controllare la funzione del fegato e dei reni ed eseguire la relativa terapia.
Controindicazioni: latte, olii, alcool, carbonati e bicarbonati.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Grano: 1 lt/ha diluito in 600-800 litri d'acqua.
Epoca di impiego: a) **inizio levata:** per combattere « le malattie del piede » (Fusarium, Cercosporella), con azione contemporanea contro oidio, Septoria tritici, attacchi precoci di ruggini. b) **in spigatura:** contro oidio, ruggini e Fusarium sp., con buona azione collaterale contro Septoria nodorum.
Drupacee (pesco e nettarine): 0,1-0,14% (100-140 ml in 100 litri d'acqua) intervenendo in primavera-estate, contro oidio e monilia.
Avvertenza: l'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il Bayfidan BCM può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra e, in caso di intervento all'inizio levata, anche con erbicidi ormonici. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto per grano e 15 giorni prima del raccolto per pesche e nettarine

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: I.R.C.A. - Albano S. Alessandro (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. 6510 **del** 3.10.85

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo

lt -

6511

Natura dei rischi di intossicazione: sostanza nociva per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto orale, nausea, vomito, coliche addominali, dirrea profusa, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea, (La morte avviene in piena coscienza per paralisi respiratoria).

Consigli terapeutici: lavanda gastrica con fosfato di sodio o magnesio, analettici cardiorespiratori, spasmolitici, fleboclisi con aspartato di potassio (1-3 mEq: K flebo).

Insetticida - Anticrittogamico

Polisolfuro di Bario - Liquido

Composizione per 100 grammi di prodotto:

— Polisolfuro di calcio tecnico minimo . . . . g. 26 (corrispondenti a g -15 di Zolfo attivo)

— Inerti q. b. a g. 100

II CLASSE

FITOCHIMICA GIULIANA

di DARIO MULITSCH

Corso Verdi, 69

34170 GORIZIA

Prodotto nello stabilimento CHEMIA spa di S. Agostino (Fe) - S S. 255 - Km. 46

Reg. n. 6511 del 3.10.85 del Ministero della Sanità.

Peso Kg.

Dosi e modalità d'impiego: Il ZOLFOSOL 15 è un polisolfuro di baria liquido che contiene uno zolfo altamente attivo che è particolarmente indicato per la lotta conto le cocciniglie (aspidiotus, diaspis, cocciniglie di S. Josè), contro le uova invernali di insetti e contro afidi, psille, e contro malattie crittogamiche come ticchiolatura e mal bianco.

Lo ZOLFOSOL 15 si impiega, prima dell'apertura delle gemme, sulle pomacee (melo, pero) alle dosi di kg. 15 - 20/hl. di acqua e alle dosi di kg. 10 - 15/hl. di acqua per i trattamenti sulle drupacee (pesco, susino, albicocco, ciliegio). Su olivo si impiega alla dose di kg. 6/hl. di acqua in primavera e a fine esate contro fumagini, occhio del pavone e cocciniglie.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto non deve essere mescolato con gli oli e gli eventuali trattamenti con olio minerale devono essere distanziati di almeno 15 gg.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le culture indicate in etichetta.

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattameto e la raccolta: 30 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

6512

Natura dei rischi di intossicazione: sostanza nociva per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto orale, nausea, vomito, coliche addominali, dirrea profusa, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea, (La morte avviene in piena coscienza per paralisi respiratoria).

Consigli terapeutici: lavanda gastrica con fosfato di sodio o magnesio, analettici cardiorespiratori, spasmolitici, fleboclisi con aspartato di potassio (1-3 mEq: K flebo).

Zolfosol 25

Insetticida - Anticrittogamico

Polisolfuro di Bario - Liquido

Composizione per 100 grammi di prodotto:

— Polisolfuro di calcio tecnico . . . . g. 30
(corrispondenti a g. 15 di Zolfo attivo)

— Coformulanti: . . . . q.b. a g. 100

II CLASSE

FITOCHIMICA GIULIANA

di DARIO MULITSCH

Corso Verdi, 69

34170 GORIZIA

Prodotto nello stabilimento CHEMIA spa di S. Agostino (Fe) - S.S. 255 - Km. 46

Reg. n. 6512 del 3.10.85 del Ministero della Sanità.

Peso Kg. -

Dosi e modalità d'impiego: lo ZOLFOSOL 25 è un polisolfuro di bario liquido che contiene uno zolfo altamente attivo che è particolarmente indicato per la lotta contro le cocciniglie (aspidiotus, diaspis, cocciniglie di S. José), contro le uova invernali di insetti e contro afidi, psille, e contro malattie crittogamiche come ticchiolatura e mal bianco.

Lo ZOLFOSOL 25 si impiega, prima dell'apertura delle gemme, sulle pomacee (melo, pero) alle dosi di kg. 15 - 20/hl. di acqua e alle dosi di kg. 10 - 15/hl. di acqua per i trattamenti sulle drupacee (pesco, susino, albicocco, ciliegio). S. impiega alla dose di kg. 6/hl. di acqua in primavera e a fine estate contro fumagine, occhio del pavone e cocciniglie dell'ulivo.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto non deve essere mescolato con gli oli e gli eventuali trattamenti con olio minerale devono essere distanziati di almeno 15 gg.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le culture indicate in etichetta.

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 30 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

6513

Natura dei rischi di intossicazione: sostanza nociva per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: eritemi, congiuntiviti, irritazioni delle mucose, vomito, coliche, addominali, diarrea, crampi muscolari, dispnea, disturbi cardiocircolatori.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: lavanda gastrica con solfato di magnesio e carbone attivo, analettici, cardiorespiratori, spasmolitici, ossigenoterapia, lobelina.

Insetticida - Anticrittogamico
Polisolfuro di calcio - liquido

Composizione per 100 grammi di prodotto:

— Polisolfuro di calcio tecnico . . . . g. 32
(corrispondenti a g. 23 di Zolfo attivo)
— Coformulanti: . . . . q.b. a g. 100

II CLASSE

FITOCHIMICA GIULIANA

di DARIO MULITSCH
Corso Verdi, 69
34170 GORIZIA

Prodotto nello stabilimento CHEMIA spa
di S. Agostino (Fe) - S S. 255 - Km 46
Reg. n. 6513 del 3.10.85 del Ministero della Sanità.

Peso Kg.

Dosi e modalità d'impiego: Il Policalcio 30 è un polisolfuro di calcio liquido che contiene uno zolfo altamente attivo che è particolarmente indicato per la lotta contro le cocciniglie (aspidiotus, diaspis, cocciniglie di S. Josè), contro le uova invernali di insessi e contro afidi, psille, e contro malattie crittogamiche come ticchiolatura e mal bianco. Il Policalcio 30 si impiega, prima dell'apertura delle gemme, sulle pomacee (melo, pero) alle dosi di Kg. 15 - 20/hl. di acqua e alle dosi di Kg. 10 - 15/hl di acqua per i trattamenti sulle drupacce (pesco, susino, albicocco, ciliegio, ulivo: si impiega alla dose di Kg 6/hl di acqua in primavera e a fine estate contro fumagine, occhio del pavone e cocciniglie.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Il prodotto non deve essere mescolato con gli oli e gli eventuali trattamenti con olio minerale devono essere distanziati di almeno 15 gg.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le culture indicate in etichetta.

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 30 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

6514

Natura dei rischi di intossicazione: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico: avvelenamento acuto orale, nausea, vomito, coliche addominali, diarrea profusa, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea (la morte avviene in piena coscienza per paralisi respiratoria).

Consigli terapeutici: lavanda gastrica con solfato di sodio o magnesio, analettici cardiorespiratori, spasmolitici, fleboclisi con aspartato di potassio (1 - 3 mEq: K flebo).

Insetticida - Anticrittogamico

Polisolfuro di Bario - Liquido

Composizione per 100 grammi di prodotto:

— Polisolfuro di bario tecnico . . . . g. 25
(corrispondente a g. 13 di zolfo attivo)

— Coformulanti: . . . . q.b. a g. 100

CLASSE III

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

FITOCHIMICA GIULIANA
di DARIO MULITSCH
Corso Verdi, 69
34170 GORIZIA

Prodotto nello stabilimento CHEMIA spa
di S. Agostino (Fe) - S. S. 255 - Km. 46

Reg. n. 6514 del 3.10.85 del Ministero della Sanità.

Peso Kg.

Dosi e modalità d'impiego: Il COCCIN S è un polisolfuro di bario liquido che contiene una buona percentuale di zolfo attivo, che gli consente una prolungata azione insetticida e anticrittogamica. Il COCCIN S viene impiegato come segue:

Trattamenti invernali effettuati prima della schiusura delle gemme: alla dose di kg. 6 - 8/hl. di acqua sulle drupacee (pesco, susino, albicocco, ciliegio) contro cocciniglie ticchiolatura e bolla; alla dose di kg. 8 - 10/hl. di acqua sulle pomacee (melo, pero) contro cocciniglie, ticchiolatura e mal bianco.

Trattamenti primavrili - estivi nel periodo da aprile a luglio alla dose di kg. 0,6 - 0,8/hl. di acqua contro ticchiolatura e mal bianco delle drupacee (pesco, susino, albicocco, ciliegio) e kg. 0,8 - 1/hl. di acqua contro ticchiolatura e mal bianco del melo e del pero. Si impiega alla dose di kg. 6/hl. di acqua in primavera e a fine estate cntro fumagini, e cocciniglie dell'ulivo. Esplica anche una certa azione contro l'occhio del pavone.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Il prodotto non deve essere mescolato con gli oli e gli eventuali trattamenti con olio minerale devono essere distanziati di almeno 15 gg.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le culture indicate in etichetta.
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattameto e la raccolta: 30 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

6515

BASOZEB - RAME

Fungicida cuprorganico

Composizione:

Mancozeb puro	g. 32
Rame metallo (sotto forma di ossicloruro tetrarameico)	g. 15
Coformulanti	q.b. a g. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

BASLINI
Baslini - Industrie Chimiche S.p.A.

Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782
20122 Milano

Officina di produzione:
Visplant Chimiren S.p.A.
Renazzo di Cento (FE)

Registrazione N. 6515 del 3.10.85 del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini od agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cura sintomatiche.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA

Consultare un Centro antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Anticrittogamico misto ad azione preventiva dotato di buona persistenza nel tempo, di pronta efficacia.

Vite: gr. 250-350/hl contro: Peronospora, Antracnosi, Marciume nero e Escoriosi.

Pero-Melo: gr. 300/hl contro: Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria e Glomerella.

Pomodoro (solo fino alla prima fioritura): gr. 300-400/hl contro: Peronospora, Antracnosi, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi.

Garofano: gr. 300-400/hl contro la Ruggine.

"DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI".
NON IMPIEGARE IN SERRA.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare, specie in fioritura varietà sensibili, come melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e pero (Butirra precoce Morettini,, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi Zecchermann, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, E.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Buritta Giffard). Il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per i pesci.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 28 giorni.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto

Kg.

6516

Malattie combattute e colture protette:
Melo: Oidio (Podosphaera leucotricha), Ticchiolatura (Venturia inaequalis) - **Pero:** Ticchiolatura (Venturia pirina).
Dosi d'impiego: gr. 100-120 per hl di acqua.
Epoche d'impiego: impiegare RUMIDIN BLEND a 7-8 giorni d'intervallo dall'apertura delle gemme fino al frutto noce e, successivamente, ad intervalli di 8-12 giorni in relazione all'andamento stagionale.
Modalità d'impiego: il prodotto si usa alle dosi sopraindicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Per l'impiego con irroratrici a basso volume la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.
Preparazione della miscela: versare la quantità richiesta di RUMIDIN BLEND nella botte riempita a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l'aggiunta di bagnanti. Iniziare il trattamento entro due ore dalla preparazione della miscela.
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità: RUMIDIN BLEND è compatibile con i più comuni fungicidi, insetticidi ed acaricidi impiegati su melo e pero ad eccezione di quelli a reazione alcalina e Clorobenzilati. Non è consigliabile miscelarlo con Carbaryl, Dimetoato, Metilazinfos, Diclorvos. Le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici ed olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensività. Trattamenti effettuati a temperature inferiori a 5°C possono determinare soltanto una ridotta bagnabilità, mentre l'efficacia del prodotto rimane inalterata. Evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C. Si consiglia comunque di effettuare prove di compatibilità fisica prima di effettuare miscele estemporanee preparandone una piccola quantità prima dell'uso. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non usare su varietà soggette a rugginosità quale la Golden Delicious.
Tossicità: il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci. **AVVERTENZE:** da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.
Sospendere i trattamenti 14 GIORNI prima della raccolta delle pere; e 21 GIORNI prima della raccolta delle mele.
Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. -

RUMIDIN® BLEND

MISCELA DI FUNGICIDI AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA PER LA LOTTA ALLA TICCHIOLATURA DEL MELO E DEL PERO ED ALL'OIDIO DEL MELO

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione:

FENARIMOL puro	gr. 4
DODINA pura	gr. 35
Coformulanti ed inerti . . q.b. a	gr. 100

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61 - 79.94.62
Telex 511046

Registrazione N. 6516
del 3.10.85
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bologna)

Conservare il prodotto chiuso
nel contenitore originale,
in luogo asciutto e fresco.

VERCHIM ASTERIAS

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Conservare la confezione ben chiusa • Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto • Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua • Non operare contro vento • Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti • Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei resistenti alle terapie a causa della fotosensibilizzazione.
Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: *lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua) e digitale.*
AVVERTENZA: *consultare un centro antiveleni.*

6517

LENTAGRAN(R) COMBI

Diserbante in formulazione liquida emulsionabile di post-emergenza della coltura del riso.
Si impiega contro le seguenti infestanti: Alisma, Butomus, Cipollino (Scirpus maritimus) e Quadrello (Scirpus mucronatus).

COMPOSIZIONE

- Piridate [1] puro .... g 32
- MCPA [2] estere tioetilico puro .... g 10 (corrispondente ad MCPA acido g 8,2)
- Propanil puro .... g 10
- Coadiuvanti e solventi: quanto basta a .... g 100 -contiene Cicloesanone

(R) Marchio registrato Chemie Linz AG
(1) sostanza attiva originale della Chemie Linz AG Linz (Austria)
(2) sostanza attiva originale della Hokko Chem.Co. Tokyo (Giappone)

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano
Officina di produzione
Salerano sul Lambro

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 6517 del 3.10.85 Ministero della Sanità

Natura del rischio : sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali : conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione:
Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

Consigli terapeutici :
Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.
Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.

Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto è un erbicida di post-emergenza che agisce soprattutto per assorbimento fogliare. E' attivo contro le seguenti infestanti della coltura del riso: Alisma, Butomus, Cipollino (Scirpus maritimus) e Quadrello (Scirpus mucronatus).
Si impiega alla dose di 2—3 Kg/Ha diluiti in 3-6 o più ettolitri di acqua su riso in accestimento e su infestanti sviluppate almeno allo stadio di 3-5 foglie. Il prodotto non ha effetto per assorbimento radicale quindi non controlla le infestanti non ancora emerse.
Prima di effettuare il trattamento occorre abbassare il livello dell'acqua mantenendolo basso per 1-2 giorni - senza scoprire le radici del riso - alzando nuovamente il livello dell'acqua dopo il trattamento onde migliorare l'azione del prodotto.

Preparazione della poltiglia : versare la prestabilita dose di prodotto direttamente nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità : il prodotto è compatibile con i più comuni diserbanti onde ampliarne lo spettro d'azione.
Il prodotto non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi, ed altri antiparassitari e non deve essere distribuito 6 giorni prima o dopo l'impiego di questi prodotti altrimenti il riso può subire delle bruciature. Non eseguire il trattamento nel caso in cui si preveda una pioggia a distanza di 3-6 ore.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto di colture sensibili vicine anche sotto forma di vapori portati dal vento. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe e i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione della poltiglia erbicida, prima di utilizzarle per altri trattamenti.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione : da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Lt.

6518

VITAVAX® MC

FUNGICIDA SISTEMICO IN POLVERE BAGNABILE PER COMBATTERE LE MALATTIE FUNGINE DELLA ROSA E DEL GAROFANO IN PIENO CAMPO

CLASSE III

ATTENZIONE! Manipolare con prudenza

Composizione: gr 100 di prodotto contengono:
- carbossina pura . . . gr 15
- mancozeb puro . . . gr 50
- chinosol puro . . . gr 12,5
- bagnanti, disperdenti, inerti . . . q.b. a 100

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- Conservare la confezione ben chiusa;
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- Non operare contro vento;
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
- Evitare di respirare i vapori;
- Durante la manipolazione del prodotto si dovranno usare occhiali protettivi date le proprietà irritanti del p.a.

Prescrizioni particolari:
- Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto;
- Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;
- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Informazioni per il medico:

Sintomi d'intossicazione: L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per la irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni.

Caratteristiche:
Il VITAVAX MC è un fungicida ottenuto dalla combinazione della carbossina e del chinosol, ad azione parzialmente sistemica, con il mancozeb, ad azione di contatto. Il prodotto viene impiegato sia nella irrorazione delle piante che nella disinfezione del terreno.
Sulla rosa, il VITAVAX MC risulta efficace contro le crittogame come le *Ruggini*, i *Verticillium*, l'*Alternaria*, la *Botrytis* e il *Diplocarpon rosae*.
Sul garofano, il VITAVAX MC risulta efficace contro la *Rhyzoctonia solani*, i *Pythium*, la *Botrytis*, i *Verticillium*, i *Fusarium*, lo *Sclerotium rolfsii*, le *Ruggini*, i *Carboni*, l'*Alternaria*, la *Septoria*.

REGISTRAZIONE N. 6518 DEL 3.10.85 DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

® Marchio Registrato Soc. UNIROYAL INC. - New York (USA)

Dosi e modalità d'impiego:
Nella irrorazione delle piante, il VITAVAX MC si impiega alle seguenti dosi: 200 gr per 100 litri d'acqua nei **trattamenti preventivi**, 250-300 gr per 100 litri d'acqua nei **trattamenti curativi**. I trattamenti preventivi vanno ripetuti alla distanza di 10-15 giorni; i trattamenti curativi, in numero di 3-4, vanno ripetuti alla distanza di 8-10 giorni, fino al completo controllo della malattia.
Per garantire un buon risultato, si raccomanda di bagnare abbondantemente le piante in modo da assicurare anche la copertura della zona del colletto.
Nel trattamento al terreno, il prodotto si impiega alla dose di 3-5 gr/m² di superficie, sciolti in 4-5 litri d'acqua. Il trattamento va ripetuto alla distanza di 15 giorni. Il terreno va bagnato uniformemente; in caso di terreno molto secco, diluire in un volume maggiore di acqua; se al trattamento dovesse seguire la semina, usare la dose più bassa.
Nel caso in cui il trattamento venga eseguito con piante già presenti, distribuire la miscela nella zona di terreno attorno al colletto.
In caso di disinfezione dei terricciati, usare 30-50 gr di VITAVAX MC, diluiti in 40-50 litri di acqua, per ogni metro cubo di terriccio; in caso di disinfezione di vasetteria, bagnare bene i vasi con una miscela di 300 gr di VITAVAX MC per 100 litri di acqua.

Preparazione della miscela: Sciogliere la dose del prodotto in poca acqua e mescolare fino ad ottenere un fluido omogeneo; versare gradualmente questa poltiglia nel quantitativo totale di acqua richiesto ed agitare ripetutamente.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

« DA NON IMPIEGARE IN SERRA »

« NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE »

Compatibilità: Il VITAVAX MC è compatibile con i più comuni insetticidi, acaricidi e fungicidi.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischio di nocività: Il prodotto è tossico per i pesci.

« SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA »

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali ».

UNIROYAL

UNIROYAL CHIMICA S.p.A.
Via delle Industrie, 40
04013 LATINA SCALO

Officina di produzione: CIFA - S.S. Padana Superiore - CARAVAGGIO (Bergamo)

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO DELLA CONFEZIONE: KG 0,2**

6519

to make up to 100 g.

NATURE OF RISK:
Risk of lethal intoxication through inhalation, ingestion or direct contact with the skin.

SAFETY PRECAUTIONS:
Keep this product sealed and under lock and key, out of reach of children and domestic animals; keep the package well-sealed; do not smoke or eat while using the product; avoid contaminating other cultivations, foods, drinks or waterways; avoid inhaling its fumes; do not use against the wind; avoid contact with skin and eyes; wear overalls, gloves, protective masks and glasses during preparation and use of the product; after handling, or in case of contamination, wash thoroughly with soap and water; after use, dispose of the packages in a suitable manner; in case of sickness, seek medical advice and show this label.

MEDICAL INFORMATION:
Serious poisoning due to inhalation, ingestion or direct contact with the skin.

Symptoms of intoxication: haemorrhage of the skin and mucous membranes. Symptoms are mainly haemorrhagic.
General and particular therapeutic advice: in case of accidental ingestion, induce vomiting with hot salted water. In serious cases, call for medical aid, blood transfusions and endovenous injections of Vitamin K against the anticoagulant effect of the product.

Contra-indications: anticoagulants.

RECOMMENDATION:
Consult an anti-poison centre.

INSTRUCTIONS FOR USE:
RATIBROM is a mouse-killing and rat-killing bait, ready for use to destroy mice and rats of any species and size; it is also effective against anticoagulant-resistent mice and rats.
RATIBROM performs its toxic action through ingestion, even in very small quantities, causing the rodents' death after three to five days due to internal haemorrhage, without pain and therefore without giving rise to alarm or suspicion in its similars, thus making a complete disinfestation possible. Once intoxicated, the rats are overcome by a sense of suffocation which makes them seek air and therefore they tend to go and die out in the open.
RATIBROM must be sprinkled in little piles where mice and rats are known to pass or to be present, taking care not to touch the bait with the hands and to hide it from domestic animals.

DO NOT SCATTER THE PRODUCT FROM THE AIR.

COMPATIBILITY:
The product must be used alone.

RISKS OF NOXIOUSNESS:
The product is toxic for man, domestic animals, useful insects, fish and livestock.

CAUTION:
For use in open-field or under-glass flower growing. Any other use is dangerous.
Whoever uses the product is responsible for any damage caused through its improper use.

Ministry of Health Registration No. .... of

NOT TO BE SOLD LOOSE

NETT WEIGHT 25 kg

KOLLANT CHEMICAL INDUSTRIES S.p.A.
Registered office: PADOVA - ITALY
Offices and production plants: VIGONOVO (Venice)
Via C. Colombo, 7-7A
Telephone (049) 502.855
Telex 430813 KIC I

MOUSE-KILLER - RAT-KILLER

CLASS I **CLASSE I**

RATIBROM

ESCA TOPICIDA RATTICIDA PRONTA ALL'USO
UCCIDE TOPI E RATTI CON UNA SOLA INGESTIONE

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del 3 agosto 1968, n. 1255.

READY-TO-USE MOUSE-KILLING AND RAT-KILLING BAIT.
-KILLS MICE AND RATS WITH THE FIRST SWALLOW.

WARNING: As the product is highly toxic, it must only be used by qualified personnel with a licence according to item 23 of Decree No 1255 of August 3rd 1968.

KOLLANT Industrie Chimiche S.p.A.

Officina di produzione

VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (BO)

CLASSE I

VELENO

COMPOSIZIONE: 100 g di Ratibrom contengono:
Bromadiolone puro g 0,005; sostanze appetenti ed adescanti q.b. a 100.

NATURA DEL RISCHIO:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; Conservare la confezione ben chiusa; Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; Evitare di respirarne i vapori; Non operare contro vento; Evitare il contatto con la pelle e gli occhi; Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto; In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: emorragie cutanee e delle mucose. La sintomatologia è prevalentemente emorragica.
Consigli terapeutici di massima e condizionali al caso: In caso di ingestione accidentale provocare il vomito con acqua salata calda. Nei casi gravi ricorrere al medico perché pratichi trasfusioni di sangue ed endovenose di Vitamina K contro l'azione anticoagulante del prodotto.
Controindicazioni: Anticoagulanti.

AVVERTENZA:
Consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI E MODALITA' D'IMPIEGO:
RATIBROM è un'esca topicida e ratticida pronta all'uso per la distruzione di topi e ratti di qualsiasi specie e dimensione; efficace anche contro topi e ratti resistenti agli anticoagulanti.
RATIBROM svolge la sua azione tossica per ingestione, anche di pochi grammi, causando la morte dei roditori dopo 3-5 giorni per emorragie interne, senza agonia e quindi senza suscitare allarme e diffidenza nei consimili, il che permette la totale disinfestazione. I topi, una volta intossicati, presi da senso di soffocamento cercano l'aria e pertanto tendono ad andare a morire all'aperto.
RATIBROM va sparsa a mucchietti ove si nota presenza o passaggio di topi e ratti, avendo cura di non toccare l'esca con le mani e di mascherarla agli animali domestici.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA':
Il prodotto si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA:
Il prodotto è tossico per l'uomo e per gli animali domestici, insetti utili, pesci e bestiame.

ATTENZIONE:
Da impiegare nelle colture floricole in pieno campo o in serra. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Registrazione del Ministero della Sanità N. 6519 del 3.10.'85

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO NETTO 25 kg

KOLLANT INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Sede legale: PADOVA - ITALY
Uffici e Stabilimenti: VIGONOVO (VE)
Via C. Colombo, 7-7A
tel. (049) 502.855
Telex 430813 KIC I

6520

Contenuto Kg.

III CLASSE

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

MAISPEN*

POLVERE BAGNABILE DISERBANTE PER L'IMPIEGO PRE-EMERGENZA SU MAIS

Presidio Sanitario
Registrazione Min. Sanità n. 6520 del 3.10.85

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
— pendimethalin puro . . . . g 37,5
— atrazina pura . . . . g 25,0
— coformulanti (bagnanti, disperdenti, inerti) q.b. a 100

* Marchio registrato AMERICAN CYANAMID COMPANY, WAYNE, New Jersey (USA)

AVVERTENZE

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici — Conservare la confezione ben chiusa — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto — Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua — Non operare contro vento — Evitare di respirarne i vapori, il nebulizzato e le polveri — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E GAMMA D'AZIONE

Il MAISPEN è un diserbante specifico per il diserbo selettivo pre-emergenza del mais mediante distribuzione sul terreno ove svolge la sua azione tossica verso i semi ed i germinelli delle più importanti infestanti annuali sia graminacee che dicotiledoni (delle quali ultime controlla anche le plantule purché non abbiano superato lo stadio di 2-3 foglie vere:

Graminacee: Digitaria, Echinochloa, Panicum, Setaria, Sorghum hal. (da seme)

Dicotiledoni: Abutilon, Amaranthus, Anagallis, Atriplex, Capsella, Chenopodium, Fumaria, Linaria, Mercurialis, Polygonum, Portulaca, Ranunculus, Raphanus, Sinapis, Solanum, Sonchus, Spergula, Thlaspi, Veronica.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Il MAISPEN deve essere distribuito sul terreno alla dose di **3,2 kg/Ha** nel periodo compreso **fra la semina e l'emergenza del mais.**

In presenza di terreni compatti, ricchi di sostanza organica oppure notoriamente soggetti a forti infestazioni di Panicum dichotomiflorum e di Sorghum halepense è consigliabile aumentare la dose a **4-5 kg/Ha.**

PREPARAZIONE DELLA MISCELA E ISTRUZIONI PER L'USO

Al fine di permettere al MAISPEN di esplicare al meglio la sua attività diserbante e la sua selettività verso il mais **attenersi scrupolosamente alle seguenti modalità operative:**

— effettuare una buona preparazione del letto di semina in modo da operare su terreno perfettamente livellato e privo di zolle (meglio se fresato e rullato dopo le semine) provvedendo altresì ad una irrigazione se non sopravviene una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento, in modo da favorire la penetrazione del prodotto nello strato superficiale del terreno;

— effettuare le semine in maniera uniforme e regolare **ad una profondità di almeno 4 cm** avendo altresì cura di evitare che alcuni semi rimangano scoperti o a pelo di terra;

— stemperare la calcolata dose di prodotto in poca acqua agitando la miscela e poi, sempre continuando ad agitare, aggiungere lentamente il restante quantitativo di acqua necessario per raggiungere la concentrazione voluta. Effettuare il trattamento non appena sia stata preparata la miscela. Se questa viene lasciata a riposo per parecchie ore, è consigliabile rimescolarla bene poco prima dell'impiego;

— distribuire la miscela, **senza incorporarla**, con un quantitativo di acqua oscillante fra 3 e 8 hl/Ha (mediamente 4-6 a seconda del tipo di pompa disponibile), in modo da assicurare una completa ed uniforme bagnatura del terreno senza lacune e senza sovrapposizioni;

— il trattamento può essere effettuato a pieno campo oppure (specialmente per gli interventi estivi su mais di 2° raccolto) localizzato sulle file di semina per una larghezza di 30 cm (riferendo, in questo caso, la dose consigliata all'ettaro di superficie trattata);

— dopo la distribuzione lavare accuratamente con acqua e sapone attrezzature, utensili e recipienti adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto;

— nei casi di **forzate risemine** su terreni già trattati con MAISPEN evitare il contatto del diserbante con i nuovi semi riseminando ad almeno 4 cm di profondità **senza rimuovere il terreno** oppure **effettuando un'aratura profonda almeno 20 cm**, la quale è altresì necessaria se anziché riseminare mais di secondo raccolto si voglia seminare grano.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non si consigliano miscele di MAISPEN con altri prodotti.

FITOTOSSICITA'

Si consigliano prove parcellari per le varietà poco note e di recente acclimatazione. Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili successive occorre un intervallo di 5 mesi per il grano e di almeno 10 mesi per altre colture (es. tabacco, bietole). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

Il prodotto svolge la sua azione a carico di semi e germinelli localizzati nello strato superficiale del terreno. Pertanto, ai fini della selettività verso il mais, è indispensabile **attenersi alle consigliate modalità e profondità di semina.** In caso di semine superficiali ed irregolari la selettività può essere ridotta specialmente se forti piogge sopravvengono subito dopo il trattamento. Il prodotto può essere fitotossico verso le colture non indicate in questa etichetta. Non trattare in terreni sciolti privi di sostanza organica.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CYANAMID ITALIA S.p.A. - Divisione Fitofarmaci - Roma
Sussidiaria dell'AMERICAN CYANAMID COMPANY, WAYNE, New Jersey (USA)
Officina di produzione: VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - Ozzano Emilia (BO)

Codice

Lotto

6521

TIOMARE

Zolfo ventilato

CLASSE IV

COMPOSIZIONE:

Zolfo puro (esente da selenio) g. 75
Coformulanti q.b. a 100

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici – Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE:

Il TIOMARE a base di zolfo consente di ottenere una valida azione contro l'oidio della vite grazie alla elevata purezza e finezza di lavorazione dello zolfo contenuto nel prodotto.

EPOCA DI APPLICAZIONE:

Eseguire una prima solforazione quando i tralci misurano da 5 a 10 centimetri e ripetere il trattamento se la stagione avversa non consente allo zolfo una completa azione di difesa. Un secondo trattamento al momento della fioritura.
Tre–quattro solforazioni da luglio in avanti quando gli acini sono ben formati.

DOSI DI IMPIEGO:

Impolverare quanto basta operando di preferenza al mattino quando le viti sono coperte di rugiada.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ:

Il TIOMARE non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.)con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, Diclofluamide.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA: Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

FITOTOSSICITÀ:

Può arrecare danno alla seguente cultivar di vite: Sangiovese.
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 5 giorni.

ATTENZIONE:

Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6521 del 3.10.85

Prodotto nello stabilimento "DIACHEM S.p.A." di Albano S. Alessandro (Bergamo)

DA NON VENDERSI SFUSO **Sacchetti da Kg.**

6522

ID 5702

III CLASSE

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Miscela di fungicidi ad azione preventiva e curativa per la lotta alla ticchiolatura del melo e del pero ed all'oidio del melo

COMPOSIZIONE:

FENARIMOL puro	g. 4
DODINA pura	g. 35
Coformulanti ed Interti . . . q.b. a	g. 100

ELI LILLY ITALIA S.p.A. - Divisione ELANCO
Via Gramsci, 733
50019 SESTO FIORENTINO (Firenze)
Tel. 49731 - Telex 570194 ELICOR

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
40064 OZZANO EMILIA (BO)

Registrazione N. 6522 del 3.10.85
del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

® RUBIGAN - Marchio registrato ELANCO PRODUCTS
Divisione della ELI LILLY and COMPANY
Indianapolis, 6 - Indiana (U.S.A.)

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei resistenti alle terapie a causa della fotosensibilizzazione. Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua) e digitale. **AVVERTENZA:** Consultare un centro antiveleni.

MALATTIE COMBATTUTE E COLTURE PROTETTE: Melo: Oidio (Podosphaera leucotricha), ticchiolatura (Venturia inaequalis) - **Pero:** Ticchiolatura (Venturia pirina).

Dosi d'impiego: g. 100-120/hl.

Epoche d'impiego: impiegare il RUBIGAN® BLEND a 7-8 giorni d'intervallo dall'apertura delle gemme fino al frutto noce e, successivamente, ad intervalli di 8-12 giorni in relazione all'andamento stagionale.

Modalità d'impiego: il prodotto si usa alle dosi sopraindicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Per l'impiego con irroratrici a basso volume la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.

Preparazione della miscela: versare la quantità richiesta di RUBIGAN® BLEND nella botte riempita a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento.

DA NON VENDERSI SFUSO

Non è necessaria l'aggiunta di bagnanti. Iniziare il trattamento entro 30 minuti dalla preparazione della miscela.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il RUBIGAN® BLEND è compatibile con i più comuni fungicidi, insetticidi ed acaricidi impiegati su melo e pero ad eccezione di quelli a reazione alcalina e Clorobenzilati. Non è consigliabile miscelarlo con Carbaryl, Dimethoato, Azinphosmetile e DDVP. Le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici ed olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensività. Evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C. Si consiglia comunque di effettuare prove di compatibilità fisica prima di effettuare miscele estemporanee preparandone una piccola quantità prima dell'uso. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: può essere fitotossico per la Golden Delicious se applicato a dosi superiori allo 0,05%.

Nocività a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente od accidentalmente prima che non siano trascorsi almeno 10 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 14 GIORNI prima della raccolta delle pere e 21 GIORNI prima della raccolta delle mele.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

g.

6523

ZOLFO BAGNABILE 90%

anticrittogamico idrosospendibile

COMPOSIZIONE — 100 gr. di prodotto contengono:
90 gr. di zolfo puro(esente da selenio)
10 gr. di inerti, bagnanti, disperdenti.

CLASSE TOSSICOLOGICA IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

EPOCA DI APPLICAZIONE
Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici

DOSI DI IMPIEGO

Per ogni 100 litri d'acqua:
Melo - Pero gr. 450 - 250

Viticoltura gr. 350 - 250

MODALITA' DI IMPIEGO
Stemperare in poca acqua la quantità voluta di ZOLFO BAGNABILE 90% sino ad ottenere una poltiglia semidensa ed omogenea, indi aggiungere acqua sino alla concentrazione voluta. Nebulizzare con ugelli a getto sottilissimo. Evitare il trattamento nelle ore calde.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Non e compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali, con Captano. con Binapaeril, diclofluanide.
Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono in'oltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

FITOTOSSICITA'
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla Bianca - Commercio - Golgen Delicious - Jonathan - Imperatore - Renette - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.
PERE: Buona Luisa Davranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.
VITE: Sangiovese.
Per queste varietà adoperare le dosi ridotte.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO
TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI CINQUE
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

CONTENUTO
Netto Kg. 1

SOLFOCHIMICA

di PIETRO INCARDONA
Via Stazione Bassa, 54 - AGRIGENTO
STABILIMENTO:
Via Contrada Serra Polizzi - REALMONTE (AG)
Registrazione Ministero della Sanità n. 6523 del 3.10.85

DA NON VENDERSI SFUSO

6524

FOLTISAN* 50

(Anticrittogamico in polvere bagnabile)

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Folpet puro	g 49,5
Coformulanti	q.b. a g 100,0

CLASSE IV

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico:

Sintomi di intossicazione:
azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Modalità d'impiego

Il FOLTISAN 50 si impiega alla dose di 150 - 250 g per 100 litri di acqua per ottenere un'azione preventiva e curativa contro le seguenti malattie fungine:

Vite:

Contro Botrytis e Peronospora. I trattamenti vanno iniziati alla prima comparsa delle malattie e ripetuti ogni 10 - 15 giorni.

Melo e pero:

Contro Ticchiolatura effettuare trattamenti settimanali fino all'allegagione. Successivamente si può intervenire ogni 10 giorni.

Orticoltura:

Contro Phytophthora e Alternaria della patata e del pomodoro; Septoria del sedano; Botrytis della fragola. I trattamenti vanno iniziati alla comparsa dei sintomi (alla fioritura per la fragola), ripetendoli ogni 7 - 10 giorni secondo necessità.

Floricoltura:

Il prodotto si impiega sulle colture floreali contro Botrytis.

Concia dei semi:

Per la disinfezione dei semi contro Pythium, Phytophthora, Botrytis, Rhizoctonia, Fusarium il prodotto si impiega alla dose di 200 - 250 g/q.le di seme (pisello, cocomero, mais).

Trattamento bulbi:

Contro Marciumi e Fusariosi immergere i bulbi per 20 minuti in una sospensione contenente 150 - 200 g di prodotto per 100 litri di acqua. Asciugare i bulbi prima della messa a dimora.

Trattamento barbatelle:

Contro Marciumi (Phytophthora, Rhizoctonia, Botrytis) immergere le radici delle piantine per 20 minuti in una sospensione contenente 400 g di prodotto per 100 litri di acqua. Asciugare prima della messa a dimora.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità

Il FOLTISAN 50 è compatibile con la generalità degli insetticidi e fulgicidi in commercio; non è miscibile con Poltiglia Bordolese, Polisolfuri e olio bianco.

"Avvertenza": in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il prodotto è fitotossico per le varietà di pere Butirra d'Anjou. Non impiegare il prodotto sul melo dopo la fioritura poichè può manifestarsi fitotossicità.

Avvertenza:

Far trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri prima di trattare con FOLTISAN 50.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 10 girni prima del raccolto.
Sulle uve da vino i trattamenti vanno sospesi 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, ed agli animali.

* Marchio registrato - The Dow Chemical Company

DOW*

Prodotto Fabbricato in Francia dalla PROCHIM S.A.
Stabilimento di Courchelettes (Nord) P. B. 239 - 59506 Douai 56 B 57 Francia

Dow Chemical S.p.A.
Via R. Lepetit, 8 - Milano
Registrazione del Ministero della Sanità
n. 6524 del 3.10.85

DA NON VENDERSI SFUSO

Confezione da Kg

6525

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare a confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

1) ESTERI FOSFORICI
Avvelenamento acuto per ingestione inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1 - 2 mg. per gli adulti 0,2 - 1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione, può essere continuata per 24 - 48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopan chloride, Pam Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

INSETTICIDA DUE

Insetticida - Afficida

Composizione per 100 grammi di prodotto:

Formothion puro	g. 47,5
Coformulanti q. b. a.	g. 100,0

Contiene Xilolo

CHEMIA S.p.A.

Prodotto nello stabilimento CHEMIA S.p.A. di S. Agostino (FE) - S.S. 255 - Km. 46

Registr. n. 6525 del 3.10.85 del Ministero della Sanità

Peso netto g.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto possiede una azione citotropica per cui penetra nei tessuti dei vegetali esplicando la sua azione tossica anche contro i parassiti più nascosti.

Dosi d'impiego:

L'INSETTICIDA è impiegato in pieno campo su:
Ciliegio contro: mosca alla dose di g. 50-100/Hl. di acqua (effettuare il trattamento quando i frutti cambiano colore);
Olivo contro: mosca, tignola, tripidi, punteruolo, oziorrinco, cocciniglia alla dose di g. 50-100/Hl. di acqua. (Per la mosca i trattamenti si eseguono all'inizio della ovoposizione quando si notano le prime punture);
barbabietola da zucchero contro: mosca, afidi alla dose di kg. 0,5 - 1/Hl. di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci eccezion fatta per quelli a reazione alcalina: polisolfuri e solfato di rame.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, i pesci, il bestiame e per gli insetti utili e pertanto non trattare durante la fioritura.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 21 giorni per l'ulivo e 15 giorni per frutta e barbabietola da zucchero.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

6526

TOBACOL

Fitoregolatore antigermoglio del tabacco

COMPOSIZIONE

– Miscela di Alcoli grassi C_8-C_{10} (Contenente 57% di n-decanolo) .... g 80

– Solventi, emulsionanti .... q.b. a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

– Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
– Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
– Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

TOBACOL esplica un'azione per contatto, causticando le gemme ascellari e bloccandone lo sviluppo.

TOBACOL si impiega su tutte le cultivar di tabacco sottoposte a cimatura, da quelle tradizionalmente cimate (Kentucky, Nostrano del Bronta, Beneventano, Avana) alle altre sulle quali tale operazione non è generalizzata (Burley, Bright).

EPOCA D'IMPIEGO

L'emulsione si distribuisce sulle piante entro le 24-48 ore che precedono o che seguono la cimatura, che va fatta quando compare il bottone florale, prima dell'apertura dei fiori. Se le piante dell'appezzamento hanno fioritura scalare, dopo aver cimato quelle più avanti, si dovrà attendere che le altre raggiungano lo stadio di sviluppo idoneo per la cimatura e solo dopo trattare, eliminando però tutti i germogli di lunghezza superiore a 2-3 cm. In ogni caso il massimo effetto inibitorio si ottiene su coltivazioni uniformi e quando, al momento del trattamento, non vi sono germogli lunghi più di 2-3 cm.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

La concentrazione d'uso è del 4-5% (4-5 litri di prodotto per ettolitro d'acqua), dando ad ogni pianta 15-25 cc di emulsione. Il trattamento si esegue con pompa a spalla a bassa pressione (non superiore a 1 atmosfera), dotata di ugello a gocce grosse, irrorando l'emulsione dall'alto (15-20 cm dalla cima) in modo che essa, per gravità e con moto a spirale, raggiunga tutte le ascelle fogliari, comprese quelle basali. È possibile anche impiegare taniche o bottiglie munite di beccuccio, purchè l'emulsione sia uniformemente distribuita. L'uso di apparecchiature più complesse (barra portata da trattrice a trampolo) è subordinato alla conoscenza delle numerose variabili tecniche.

AVVERTENZE: Operare su vegetazione asciutta, nelle ore meno calde della giornata ed in assenza di vento. Evitare il contatto della emulsione con la pagina inferiore delle foglie. Una pioggia che si verifica 2 ore dopo il trattamento non ne diminuisce l'efficacia.

Impiegare attrezzature pulite; non miscelare il **TOBACOL** con altri prodotti e non effettuare l'intervento antigermoglio su piante appena irrigate e/o trattate con antiparassitari.

L'emulsione va utilizzata poco dopo la sua preparazione o, se trascorrono parecchie ore, mescolare prima dell'uso.

Se le piante sono inclinate od allettate sarà necessario raddrizzarle in modo che il prodotto colpisca tutte le ascelle fogliari.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: Il **TOBACOL** deve essere impiegato da solo

FITOTOSSICITÀ: Non trattare piante malate o deperite.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA

EniChemAgricoltura S.p.A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Prodotto negli stabilimenti della Società ANICAGRICOLTURA
Unità di Carrara-Avenza (MS)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6526 del 3.10.85

DA NON VENDERSI SFUSO **VOLUME LITRI**

6527

BIRGIN C

per impedire la germogliazione delle patate da tavola

COMPOSIZIONE

CLASSE IV

g 100 di Birgin C contengono:
g 1 di clorprofam puro
eccipienti quanto basta a 100.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.
Avvertenze: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

I migliori risultati si ottengono se il trattamento viene eseguito all'immagazzinamento, su patate completamente asciutte.
Il BIRGIN C deve essere cosparso uniformemente sui tuberi disposti in strati non superiori a 10-20 cm, in proporzione di 200 g ogni 100 kg di patate. Dopo il trattamento, coprire con teloni o sacchi o carta. Se l'immagazzinamento viene eseguito in cassette, è consigliabile rivestire preventivamente con carta l'interno delle cassette stesse.
Prima dell'immissione al consumo delle derrate trattate, provvedere alla eliminazione dell'antigermogliante residuo mediante lavaggio con acqua.
N.B. - Il prodotto non conferisce alcun odore o sapore alle patate trattate.
Compatibilità: dato il suo specifico campo d'impiego, il prodotto deve essere usato da solo.
Fitotossicità: il prodotto essendo un antigermogliante, non deve essere impiegato su patate da seme.
Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Le patate possono essere immesse al consumo
60 giorni dopo il trattamento

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Filago (BG)

Registrazione Ministero Sanità n. 6527**del** 3.10.85

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

6528

DIPTEREX 80 Polvere Solubile

INSETTICIDA

CLASSE II

per irrorazioni in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, fragolicoltura, bieticoltura, agrumicoltura, olivicoltura, maiscoltura e soia

NOCIVO

COMPOSIZIONE

g 100 di Dipterex 80 polvere solubile contengono:
g 80 di triclorfon puro
coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi di acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto, schiacciandole e poi interrando in fosse profonde circa un metro, cospargendo con calce viva. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi di impiego: 0,1-0,3% a seconda del parassita da combattere.
Frutticoltura: ciliegio: contro la mosca: 0,1%; **pesco:** contro la cidia e la anarsia: 0,2-0,25%.
Viticoltura: contro le tignole e la tortrice: 0,1%; contro l'Eulia pulchellana: 0,15-0,25%.
Orticoltura: sedano, cipolla, aglio: contro la mosca: 0,2-0,3%.
Fragolicoltura: contro i tortricidi (Pandemis dumetana, Argyroploce lacunana Choristoneura lafauryana) 2-2,5 kg/ha in 1000-1200 lt d'acqua.
Barbabietola da zucchero: contro le nottue (Mamestra sp, Agrotis sp, Laphigma sp): 2 kg/ha in 1200-1500 lt d'acqua. Contro la mosca: 0,6 kg/ha in 500-700 lt d'acqua.
Agrumicoltura: contro la tignola, la cimice verde e gli adulti della mosca della frutta: 0,2-0,3%.
Olivicoltura: contro la tignola e la mosca: 0,2-0,3%.
Maiscoltura: contro la seconda generazione della piralide: 2 kg/ha.
Soia: contro mosca (Hylemia), nottue e tortricidi: 0,2-0,3%.
N.B.: Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: Il Dipterex 80 polvere solubile è miscibile con antiparassitari a reazione neutra. Non è possibile invece miscelare il Dipterex 80 polvere solubile con prodotti a reazione alcalina come la poltiglia bordolese, la poltiglia solfocalcica, la calce. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non irrorare su fiori aperti.
Nocività: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Filago (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. 6528 del 3.10.85

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg

6529

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ICI Solplant SpA

'PHYOMONE'

Ormone anticascola specifico per meli e peri

COMPOSIZIONE

NAA puro . .	g 10
Coformulanti .	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

PHYOMONE è un ormone anticascola in polvere solubile per trattamenti a meli e peri contro la cascola dei frutticini e la cascola pre-maturazione dei frutti.
Consente di ottenere frutta più colorata e di pezzatura uniforme.
Può essere usato su tutte le cultivar di melo e di pero.

DOSI DI IMPIEGO

10 g per 100 litri di acqua.
Stemperare il prodotto in un po' di acqua fino ad ottenere una poltiglia omogenea; indi versarlo nella quantità di acqua necessaria per ottenere la diluizione stabilita.

EPOCA E MODALITA' DI TRATTAMENTO

La lotta contro la cascola dei frutticini va effettuata con due trattamenti a distanza di 10-15 giorni l'uno dall'altro. Nessuno di tali due trattamenti può essere omesso o sostituito.
Iniziare i trattamenti quando si verificano le prime sporadiche cadute di frutti sani.
L'epoca del primo trattamento è in relazione con le condizioni ambientali, con l'andamento stagionale e con la cultivar. In linea di massima coincide con la fase di frutticini già alquanto ingrossati, e cioè all'incirca un mese prima della raccolta.
Effettuare l'irrorazione possibilmente nelle ore più calde della giornata (ad es. verso mezzogiorno), su frutticini del tutto asciutti.
Impiegare per il trattamento pompe perfettamente pulite.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

E' sempre consigliabile usare PHYOMONE da solo.

AVVERTENZE

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione: ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 6529 3.10.85
'PHYOMONE' Marchio registrato Imperial Chemical Industries PLC

DA NON VENDERSI SFUSO

6530

NATURA DEL RISCHIO

Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirare i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Nocivo per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione:
Cefalea occipitale continua o parossistica, ronzii auricolari, iperacusia, vertigini, rachialgia, dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra, ritenzione urinaria, insufficienza respiratoria e di circolo, interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie e paralisi), dermatosi.

Consigli terapeutici:
Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando in relazione alla via di contaminazione, abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale. Terapia sintomatica.

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

ICI Solplant SpA

'NIENTERAGNO' 25 FL

Acaricida in formulazione "Flowable" (pasta liquida) a lunga persistenza specifico per la lotta contro le forme mobili (neanidi e adulti) degli acari parassiti delle piante di melo, pero, floreali ed ornamentali in pieno campo.

COMPOSIZIONE

Cyexatin puro	g 25
Coformulanti	q.b. a g 100
(Contiene glicole monoetilenico)	

II CLASSE

CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO

'NIENTERAGNO' 25 FL è un acaricida in formulazione "flowable" (pasta fluida) specifico per la lotta contro le forme mobili (neanidi ed adulti) degli acari che infestano il **pero e il melo**, i **fiori** (garofano, rosa in pieno campo) e le **piante ornamentali** in pieno campo.
Agisce per contatto ed ingestione. La sua azione è persistente.
Efficace contro gli acari resistenti agli acaricidi tradizionali, risulta scarsamente tossico per i predatori degli acari fitofagi.

MODALITA' DI IMPIEGO

Epoca : 1° trattamento; alla comparsa dei primi acari (1-2 acari per foglia). Successivamente, ad intervalli di 2-4 settimane secondo l'andamento ed il grado delle infestazioni.

Dosi : g 80-120/100 litri di acqua.
Avvertenza
Impiegare la dose più bassa in caso di infestazioni lievi; dosi più alte in presenza di infestazione più grave, in caso di siccità e contro acari resistenti.

Metodo : Irrorazione a volume normale (10-12 hl/ha). Bagnare accuratamente ed abbondantemente la vegetazione.
Per preparare la miscela: versare 'NIENTERAGNO' 25 FL nel serbatoio della pompa già parzialmente riempito di acqua, aggiungere quindi la rimanente quantità di acqua ed agitare con energia.

Mezzi : Irroratrice ad alta pressione e ad alto volume.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

'NIENTERAGNO' 25 FL è miscibile con i più comuni insetticidi e fungicidi purchè siano emulsionabili e non siano a reazione alcalina (Poltiglia bordolese, Polisolfuri).
Si precisa che, come per gli altri acaricidi, è buona norma impiegare 'NIENTERAGNO' 25 FL da solo.
In ogni caso mai miscelarlo con più di un altro prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare 'NIENTERAGNO' 25 FL su garofani a fiore aperto.
Per le colture ornamentali effettuare saggi preliminari prima di estendere i trattamenti.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 30 giorni

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione:
ICI SOLPLANT S.p.A. - CRESPELLANO (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n° 6530 del 3.10.85
'NIENTERAGNO' - Marchio depositato ICI Solplant S.p.A.

DA NON VENDERSI SFUSO

g

6531

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NOME PRECAUZIONALI:
— conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: L'Acared OM si impiega versando lentamente e sotto agitazione la quantità necessaria in tutta l'acqua da irrorare alle seguenti dosi:

In Frutticoltura: contro il ragno rosso delle pomacee (escluso il pero), nella fase iniziale dell'infestazione, e delle drupacee: gr. 80 in 100 litri di acqua; in caso di forte infestazione gr. 100 in 100 litri di acqua.

Viticoltura: contro il ragno rosso e ragno giallo gr. 80-100 in 100 litri di acqua.

Agrumicoltura: contro ragnetto rosso, acaro rugginoso, eriofidi - gr. 80-100 in 100 litri di acqua.

Colture industriali: orticole (pomodoro, patata, e floricole in pieno campo: contro ragnetti rossi, eriofidi, tarsonemidi gr. 80-100 in 100 litri di acqua.

ACARED OM

ACARICIDA A LUNGA PERSISTENZA IN FORMULAZIONE LIQUIDA EMULSIONABILE.

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:

Propargil puro	gr. 57
Coformulanti q.b.a	gr. 100

(Contenente Xilolo)

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

TERRANALISI s.n.c.
Sede CENTO (FE) - Via Donizetti, 2/A
Telefono 906.207

Stabilimento di produzione:
Renazzo di Cento (Ferrara) - Via IV Novembre

6531 3.10.85
Registrazione n...... del .... del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg. 1**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Miscibilità: L'Acared OM è miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.).

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati, deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: a causa dei fenomeni fitotossici non trattare fragole, pero, cucurbitacee, fagioli e rosa nonché la cultivar di melo Golden, Delicius. Dopo un trattamento con oli, lasciare trascorrere un mese prima di effettuare applicazioni con ACARED OM

SULLA VITE NON TRATTARE IN PREFIORITURA

Rischio di nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

6532

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - conservare la confezione ben chiusa - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - non operare contro vento - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:

GRANO: il Ceresan si usa alla dose di Kg. 2-3 per ettaro in 500-800 litri di acqua, in autunno subito dopo la semina, per combattere le infestanti graminacee: Alopecurus, Poa e le infestanti a foglia larga: Camomilla, Veronica, Stellaria, Senape, Garofano - Kg. 1,5-2 per ettaro a fine inverno prima della fine dell'accestimento.

PISELLO - GIRASOLE: Kg. 2-3 per ettaro in 500-600 litri di acqua contro le comuni infestanti, intervenendo in preemergenza delle colture.

AGLIO: Kg. 2-3 per ettaro in 500-600 litri di acqua, in autunno in preemergenza delle colture o a fine inverno.

ERBA MEDICA: Kg. 2-3 per ettaro in 500-600 litri di acqua in autunno dopo l'ultimo sfalcio, nella fase del riposo vegetativo della coltura.

MAIS: Kg. 3-4 per ettaro per 500 litri di acqua, in preemergenza della coltura, contro le graminacee e le dicotiledoni nate da seme.

CERESAN

DISERBANTE SELETTIVO IN POLVERE BAGNABILE PER FRUMENTO, PISELLO, GIRASOLE, AGLIO, ERBA MEDICA, MAIS.

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:

Metabenztiazuron puro	gr.	70
Coformulanti q.b.a	gr.	100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a - Telef. 90.62.07
44042 — CENTO (Ferrara)

Stabilimento di produzione:
SABIAF S.p.A. - FAENZA (RA)

Registrazione n. 6532 del 3.10.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg. 1**

AVVERTENZE: Il diserbo con Ceresan non deve essere eseguito su terreno torboso. Non si deve fare il trattamento di fine inverno prima di 15 giorni da una concimazione azotata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto nel trattamento di fine inverno può essere associato con diserbanti ormonici (Fitonex 54D - Fitonex Comby - Fitonex MC30 - Fitonex MP).
Nel diserbo del mais è possibile la miscela con diserbanti a base di atrazina (Tetrazina).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

6533

GUSATHION MS

INSETTICIDA

per irrorazioni in frutticoltura e barbabietola da zucchero

CLASSE I

VELENO

COMPOSIZIONE

g 100 di Gusathion MS contengono:
g 21,3 di azinfos-metile puro;
g 6,3 di demeton-S-metilsolfone puro;
coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto, schiacciandole e poi interrando in fosso profondo circa 1 metro. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di Ossime come Toxogonin, Protopamchloride, Pam, Contrathion, ecc., somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dose d'impiego: 0,23-0,35% (230-350 g in 100 lt d'acqua).

Campo d'azione:

Frutticoltura: Pomacee (melo e pero): contro ricamatrici della frutta (Cacoecia e Capua), afidi, minatrici delle foglie, psilla, verme delle mele e delle pere, cimici, cicaline e cocciniglie.
Drupacee (pesco): contro cidia, anarsia, afidi, tentredini, tripidi e cocciniglie.

Barbabietola da zucchero: contro cleono, lixus, altica, afidi e punteruolo.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il Gusathion MS è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Filago (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. 6533 **del** 3.10.85

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg

6534

CIDRAN 5/5 G

Diserbante granualre selettivo per fruttiferi

COMPOSIZIONE

– Diuron puro . . . . g 4,85
– Clorprofam puro . . . . g 4,9
– Adesivanti e inerti . . . . q.b. a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

– Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
– Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
– Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo(inibitore della colinesterasi)
SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.
CONTROINDICAZIONI: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

CIDRAN 5/5 G è un diserbante ad azione residua per il controllo di infestanti annuali e perenni, in fase di germinazione e cotiledonare, presenti nelle colture arboree.
Può essere applicato con assoluta selettività su impianti di pero, melo, vite, agrumi, olivo.
Il **CIDRAN 5/5 G** trova impiego nei trattamenti primaverili, prima dell'emergenza delle infestanti, dopo una lavorazione, in quanto esplica la sua azione prevalentemente per assorbimento radicale. nel caso di applicazioni autunno-invernali è possibile trattare anche in presenza delle infestanti, che vengono distrutte in quanto le piogge consentono l'approfondimento dell'erbicida e lo mettono a contatto dell'apparato radicale delle erbe.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il **CIDRAN 5/5 G**si può applicare con i normali distributori per granulari, alla dose di **50-60 kg/ha**. Se il trattamento viene localizzato lungo i filari, o nel caso degli agrumi nelle conche, la dose di prodotto verrà proporzionalmente ridotta, tenendo conto della effettiva superficie che si vuo diserbare.
Il **CIDRAN 5/5 G** può essere impiegato anche all'impianto dei frutteti riducendo la dose a **30-50 kg/ha**.
Avvertenze. Nei terreni leggeri vanno sempre usate le dosi più basse. Si sconsiglia l'impiego di **CIDRAN 5/5 G** sia sui terreni sabbiosi sia su quelli dove si possono formare ristagni d'acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: Se ne sconsiglia la miscela con altri formulati.

FITOTOSSOCITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Non contaminare mangimi ed acqua pescose o destinate all'abbeveramento bestiame. Evitare di immettere animali domestici e bestiame nelle zone trattate.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA

EniChem Agricoltura S.p.A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione SILIA S.p.A.
Stabilimento di Roma

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6534 ..... 3.10.85

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

6535

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

TURBON

Erbicida selettivo di pre-emergenza del frumento tenero

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 50 Isoproturon puro
gr. 25 Dinitramina pura
Coformulanti quanto basta a 100

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida selettivo di pre-emergenza, per il diserbo del frumento tenero.

L'associazione dei due principi attivi (Isoproturon più Dinitramina) fornisce il controllo delle principali Dicotiledoni e Graminacee annuali.

Infestanti sensibili

a) **Graminacee:** Agrostis, Alopecurus, Avena Ludoviciana, Avena fatua (a nascita autunnale), Lolium (nascite autunnali), Poa annua e Poa trivialis.

b) **Dicotiledoni:** Adonis, Anagallis, Chenopodium, Papaver, Polygonum (nascite precoci), Ranunculus, Stellaria, Veronica.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato subito dopo la semina del frumento tenero, prima dell'emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSI:

— contro Dicotiledoni e Graminacee annuali compresa l'Avena (a nascita autunnale): Kg. 3,5/ha.
— contro Dicotiledoni e Graminacee annuali, esclusa l'Avena: Kg. 3/ha.

Distribuire il prodotto con almeno 500 litri di acqua per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68

Stabilim.: Paganica (Aq)

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 6535 **Ministero della Sanità del** 3.10.85

Contenuto netto Kg.

4/85

6536

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

GARTREL P

Erbicida per la lotta contro le infestanti Ciperacee ed Alismatacee del riso Emulsione

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 14,4 di Triclopyr puro (come estere butossiglicolico)
gr. 24 di Propanile puro
Coformulanti quanto basta a 100
Contiene Xilolo

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida per la lotta contro le infestanti Ciperacee ed Alismatacee del riso.

Infestanti sensibili:

Scirpus maritimus
Scirpus mucronatus
Butomus umbellatus (parte epigea)

MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI

Il prodotto s'impiega alla dose di litri 4,5 per ettaro, distribuiti con 400-500 litri d'acqua.
L'applicazione può essere effettuata in due momenti:
1) in post-emergenza del riso, prima dell'accestimento, su risaia non in asciutta, ma con livello dell'acqua di cm. 0,5-1 (in modo che il terreno sia ricoperto d'acqua e le infestanti siano emerse al momento del trattamento);
2) dopo l'accestimento, o meglio alla sua conclusione, circa 50-55 giorni dopo la semina, molto prima della fase di botticella, su infestanti emerse ed in attiva crescita.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.
Il prodotto non deve essere usato in miscele con fertilizzanti, insetticidi ed altri antiparassitari e non deve essere distribuito 5 giorni prima e dopo l'impiego di questi prodotti altrimenti il riso potrebbe subire delle bruciature.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Trattare in giornate senza vento in modo che la soluzione nebulizzata non raggiunga colture sensibili (viti, bietole, ecc.).

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 6536 **del Ministero della Sanità del** 3.10.85

6537

CLASSE III

POLVERE CHIMIPLANT

Anticrittogamico a base di rame per la lotta contro varie crittogame delle piante da fiore, ornamentali, fruttiferi e ortaggi.

COMPOSIZIONE:

RAME METALLO (sotto forma di ossicloruro) gr. 16

Disperdenti, coadiuvanti q.b. a gr. 100

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare il prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa;

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;

Non operare contro vento;

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE:
La POLVERE CHIMIPLANT è un prodotto rameico per la lotta contro la Peronospera della vite, della patata, pomodoro, cipolla, cavolo, spinacio, delle colture floreali; la Cercosporiosi della Barbabietola da zucchero; la Ticchiolatura dei fruttiferi (melo, pero, nespolo); la Bolla ed il Corineo del pesco; l'Occhio di pavone dell'olivo.

Piante da fiori e ornamentali per combattere peronospera, ticchiolatura, antracnosi, ruggine, septoriosi, su colture di: rosa, crisantemi, garofani, cinerarie, begonie, ortensie, aucube, salici, pioppi, bagolari, platani, ippocastani.

La POLVERE CHIMIPLANT trova inoltre applicazione per la concia a secco delle sementi, in particolare per la disinfezione anticarie del grano.

La micronizzazione delle particelle consente al prodotto un'azione valida.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:

— primaverili - estivi: Kg. 1 -1,500 per 100 l. di acqua;

— autunno - invernali: Kg. 2,5 - 3 per 100 l. di acqua.

Sospendere la dose di POLVERE CHIMIPLANT in poca acqua e mescolare sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea; Versare gradualmente nel quantitativo totale di acqua richiesto agitando ripetutamente.

Concia a secco del grano: gr. 200 di prodotto tal quale per quintale di seme.

Mescolare omogeneamente il prodotto al cereale prima della semina.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': la POLVERE CHIMIPLANT è compatibile con la generalità degli antiparassitari.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura:

Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza "Belfort", Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fètel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passa Grassana, B. C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA': la POLVERE CHIMIPLANT è tossica per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI VENTI GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, ed agli animali.

CHIMIPLANT s.r.l. Via Statale Anoia Superiore (RC)
Stabilimento di produzione: ENOTRIA SpA SS 193, Km 8, MELILLI (SR)
Registrazione del Ministero della Sanità N. 6537 del 3.10.85
DA NON VENDERSI SFUSO

PESO Kg. 1

RAMBLU

CLASSE III

FUNGICIDA POLVERE BAGNABILE A BASE DI OSSICLORURO DI RAME

COMPOSIZIONE:

Rame Metallo (sotto forma di Ossicloruro Tetramico) gr. 50

Disperdenti, coadiuvanti q.b. a gr. 100

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;

Conservare la confezione ben chiusa;

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua;

Non operare contro vento;

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;

Evitare di respirare i vapori.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: Il RAMBLU è una formulazione cuprica. Il prodotto risulta idoneo per il controllo della peronospera della vite, ticchiolatura delle pomacee, bolla e corineo delle drupacee (solo in tratamenti invernali), cercospora della Barbabietola da zucchero, antracnosi, alternariosi e septoriosi delle colture orticole ed ornamentali, occhio di pavone dell'olivo.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO - dosi per 100 l. di acqua:

VITE: Peronospera gr. 250-500;

AGRUMI: Allupatura, mal secco, antracnosi, fumaggine gr. 300;

MELO E PERO: Cancro delle pomacee gr. 800-1000;

— ticchiolatura: trattamenti invernali gr. 800-1000;
  trattamenti primaverili: all'ingrossamento delle gemme gr. 250-300;
  alla comparsa di mazzetti floreali gr. 200-250;

regolarsi in seguito secondo l'andamento stagionale e le varietà (vedere alla voce Fitotossicità le varietà cuprosensibili).

PESCO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO, MANDORLO: Bolla, corineo, sclerotinia, scopazzi, ruggine

— alla caduta delle foglie gr. 700-750;

— a fine inverno gr. 600-700;

— a gemme rigonfie gr. 300-400.

OLIVO:

Occhio di pavone, fumaggine, lebbra e antracnosi gr. 300-350;
Sono generalmente sufficienti un trattamento in marzo-aprile e uno a fine agosto-settembre.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:

Cercospora e peronospera Kg. 3/ha. Un trattamento alla comparsa dei primi sintomi della malattia (verso la metà di giugno) e un secondo circa 20 giorni dopo. In caso di raccolte tardive può essere opportuno un terzo intervento rispettando un intervallo di venti giorni.

COLTURE ORTIVE:

— CAVOLO: alternaria e peronospera gr. 200-250;

— Cipolla: peronospera gr. 200-250;

— Fagiolo: antracnosi e peronospera gr. 300-350;

— Patata: peronospera gr. 250-300;

— Pomodoro: peronospera, alternaria, septoria gr. 250-300;

— Sedano: septoria gr. 250-300.

COLTURE FLOREALI:

— Crisantemo e Garofano: septoriosi, aleternariosi, ruggine gr. 200;

— Rosa: ticchiolatura o macalatura nera gr. 150.

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale. Quando si effettuano trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela un adesivo bagnante. Per la preparazione della miscela si consiglia di diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua ed agitare fino ad ottenere una pasta cremosa; aggiungere poi il resto dell'acqua continuando ad agitare fino a raggiungere la concentrazione desiderata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto RAMBLU è compatibile con i più comuni antiparassitari di sintesi.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura:

Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein, Jonatham, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avanches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibile il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA': Il RAMBLU è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, ed agli animali.

CHIMIPLANT s.r.l. Via Statale Anola Superiore (RC)
Stabilimento di produzione: ENOTRIA SpA SS 193, Km 8, MEGALI (RC)
Registrazione del Ministero della Sanità N. 6538 del 3.10.85
DA NON VENDERSI SFUSO
PESO Kg. 1

6538

6539

PLANTIL-P

CLASSE III

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE SECCA A BASE DI RAME E ZOLFO.

COMPOSIZIONE:

Zolfo puro (esente da selenio)	gr. 59,7
Rame metallo (sottoforma di ossicloruro)	gr. 1,00
Disperdenti, coadiuvanti q. b. a	gr. 100

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSE D'IMPIEGO: Kg. 20-25 circa per ha.

IMPIEGO: trattamenti a secco contro: l'Oidio della Vite delle colture ortive ed ornamentali in pieno campo;

Mal Bianco delle drupacee e delle pomacee - azione complementare dei trattamenti liquidi contro la Peronospera della Vite e la ticchiolatura delle Pomacee.

Il prodotto è una polvere con finezza rilevante che la rende adatta ad essere distribuita con moderni impolveratori o con i solforatori comuni. Ben distribuito assicura su tutta la vegetazione una razionale ed uniforme difesa. In presenza di umidità, si fissa meglio su tutte le parti della pianta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Non è compatibile (o miscelabile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacyl, diclofluanide.

AVVERTENZA: deve essere impiegato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura:
Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein, Jaonathan, Rome Beauty, Morgendft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tal casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI VENTI GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

«Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato».

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, ed agli animali».

CHIMIPLANT s.r.l. Via Statale Anola Superiore (RC)

Stabilimento di produzione: ENOTRIA SPA, SS 193, Km 8, MELILLI (SR)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 6539 del 3.10.85

DA NON VENDERSI SFUSO

Confezioni da Kg. 1

6540

BRUSKOR

ERBICIDA PER IL CONTROLLO DELLE GRAMINACEE PERENNANTI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono.

– **Principi attivi**

OXYFLUORFEN puro	g	5.2
DALAPON puro	g	55.2
– **Sostanze inerti e coadiuvanti** q.b. a	g	100.0

CLASSE III^a^

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. E' obbligatorio l'uso di guanti e maschera durante l'operazione di miscelamento e trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

L'inalazione e/o il contatto dermale può dare luogo ad irritazione delle mucose. L'ingestione può provocare nausea, vomito, vertigini, tremiti ed obnubilamento del sensorio.

Interventi di pronto soccorso - ***In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. In caso di contatto con la pelle lavare accuratamente con acqua e sapone.***

AVVERTENZA: ***Consultare un centro antiveleni.***
In casi gravi, o sospetti gravi, ricovero urgente in centro di rianimazione.
In caso di ingestione non somministrare nulla per via orale a persona inconscia.
Lavanda gastrica. Somministrare Carbone attivo (30 g), far seguire purgante salino (Solfato di Magnesio).
Ulteriori cure sono sintomatiche.

CARATTERISTICHE

Il BRUSKOR è un erbicida da impiegarsi per combattere l'infestazione nei terreni senza coltura, in aree industriali e civili, su bordi stradali e su argini.

BRUSKOR agisce principalmente per contatto e per assorbimento fogliare nel controllo in post-emergenza di graminacee perennanti quali: Cynodon dactylon, Agropyron repens, Sorghum halepense, Phragmites sp., Lolium perenne.

BRUSKOR possiede altresì azione residua agendo come antigerminello nei confronti di specie annuali graminacee e dicotiledoni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità - Il BRUSKOR si impiega in post-emergenza delle infestanti curando la loro completa bagnatura. Intervenire quando le infestanti graminacee sono in fase di attiva crescita ed hanno sviluppato una sufficiente superficie fogliare.
Per il diserbo di Sorghum halepense o Phragmites sp., trattare le infestanti quando sono alte 70-90 cm e non oltre l'inizio emissione della infiorescenza.
L'eventuale impiego di un bagnante come Triton® B-1956 può migliorare l'efficacia erbicida.
BRUSKOR non va impiegato durante i periodi siccitosi quando il terreno è arido e la vegetazione è ferma.

Dosi per ettaro - Kg. 20-25 distribuiti in 600-1200 litri di acqua in funzione dello sviluppo vegetativo e della intensità di infestazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità - Ad esclusione dell'uso di un buon bagnante il prodotto va impiegato solo.

Fitotossicità - Il prodotto è fitotossico per colture arboree in genere; evitare che la nube irrorante giunga a contatto con tali colture.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

20124 MILANO (ITALY) - VIA VITTOR PISANI, 26
TELEFONO (02) 65.97.946 - TELEX 310510

Formulato da:
ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
Confezionato da:
SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. 6540 del 3.10.85
DA NON VENDERSI SFUSO
Peso Netto Kg. 5

6541

FANKOR

ERBICIDA SELETTIVO PER ESSENZE FORESTALI, PIOPPO ED EUCALIPTO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono.

— **Principio attivo:**
OXYFLUORFEN puro . . . . g 23,6

— **Sostanze inerti e coadiuvanti** q. b. a . . . . g 100,0

Contiene Xilolo e Cicloesanone

CLASSE III^a

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. E' obbligatorio l'uso di guanti e maschera durante l'operazione di miscelamento e trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
L'inalazione e/o il contatto dermale può dare luogo ad irritazione delle mucose.
L'ingestione può provocare nausea, vomito, vertigini, tremiti ed obnubilamento del sensorio.

Interventi di pronto soccorso - *In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. In caso di contatto con la pelle lavare accuratamente con acqua e sapone.*

AVVERTENZA: *Consultare un centro antiveleni.*
In casi gravi, o sospetti gravi, ricovero urgente in centro di rianimazione.
In caso di ingestione non somministrare nulla per via orale a persona inconscia.
Lavanda gastrica. Somministrare Carbone attivo (30 g), far seguire purgante salino (Solfato di Magnesio).
Ulteriori cure sono sintomatiche.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità: FANKOR è un erbicida che si impiega in pre-emergenza nel controllo delle infestanti annuali ed in post-emergenza nel contenimento del Convolvolus arvensis e Convolvolus sepium.
FANKOR è selettivo nel diserbo di vivai e giovani impianti di essenze forestali, di taleai, piantonai e giovani impianti di Pioppo ed Eucalipto.

Modalità d'uso: impiegare prima della emergenza delle infestanti annuali trattando uniformemente la superficie da diserbare. Nel diserbo del Convolvolo effettuare due trattamenti, il primo all'inizio della fioritura ed il secondo su ricacci lunghi 40-50 cm. Su essenze resinose il prodotto può essere distribuito sulla vegetazione ma prima della emissione dei nuovi germogli.
Su pioppo ed eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa.

Dosi: 5-8 kg/lt per ettaro in 400-800 litri d'acqua a seconda del tipo di infestazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità - Il FANKOR è compatibile con Paraquat, Diquat e Dalapon.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Rischi di nocività - Il FANKOR è nocivo per i pesci e gli uccelli.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

20124 MILANO (ITALY) - VIA VITTOR PISANI, 26
TELEFONO (02) 65.97.946 - TELEX 310510

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. 6541 del 3.10.85
DA NON VENDERSI SFUSO
Peso Netto Kg. 1

6542

GRANKOR

ERBICIDA SELETTIVO PER ESSENZE FORESTALI, PIOPPO ED EUCALIPTO (GRANULARE)

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
— **Principio attivo:** OXYFLUORFEN puro .... g 2
— **Sostanze inerti e coadiuvanti:** q. b. a .... g 100

CLASSE III^a^
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. E' obbligatorio l'uso di guanti e maschera durante l'operazione di miscelamento e trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
L'inalazione e/o il contatto dermale può dare luogo ad irritazione delle mucose. L'ingestione può provocare nausea, vomito, vertigini, tremiti ed obnubilamento del sensorio.

INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO - In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti - In caso di contatto con la pelle lavare accuratamente con acqua e sapone.

AVVERTENZA: *Consultare un centro antiveleni.*

In casi gravi, o sospetti gravi, ricovero urgente in centro di rianimazione. In caso di ingestione non somministrare nulla per via orale a persona inconscia.
Lavanda gastrica: Somministrare Carbone attivo (30 g.), far seguire purgante salino (Solfato di Magnesio).
Ulteriori cure sono sintomatiche.

MODALITA' DI IMPIEGO

GENERALITA'
Il GRANKOR è un erbicida selettivo per il diserbo dei vivai di piante forestali (pino, abete, larice), taleai e piantonai di pioppo ed eucalipto, nonchè per i giovani impianti di essenze forestali.
Il GRANKOR è un erbicida di pre-emergenza con lunga azione residua, efficace contro graminacee ed erbe a foglia larga annuali.

MODALITA' D'USO
Distribuire uniformemente il GRANKOR in pre-emergenza delle infestanti su tutta la superficie interessata. Nel caso di vivai e piantonai di essenze resinose il prodotto può cadere anche sulla vegetazione in quanto è perfettamente tollerato dalla stessa.
Nel caso di taleai e piantonai di pioppo ed eucalipto, distribuire il GRANKOR prima della ripresa vegetativa e cioè su talee e piantine ancora prive di foglie.

IRRIGAZIONE
Affinchè il prodotto possa agire, è necessario far seguire alla distribuzione una irrigazione. Una eventuale buona pioggia può fare evitare l'irrigazione.
Di norma un trattamento per stagione è sufficiente ad assicurare il controllo delle infestanti sino alla fine della stessa. Tuttavia, specie nei giovani piantonai di essenze forestali, dove si richiede un elevato controllo di infestanti per tutto l'anno, può essere utile un secondo trattamento, da effettuarsi quando si notano nuove nascite di malerbe.

DOSI
Kg 50-70 per Ha. La dose più elevata si impiega ove si preveda una forte infestazione di graminacee estive (Setaria, Digitaria) oppure se si desidera un'azione residua prolungata.
Per un eventuale secondo trattamento, impiegare la dose di Kg. 50/Ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con urea, concimi fosfatici ed antiparassitari granulari.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

20124 MILANO (ITALY) - VIA VITTOR PISANI, 26
TELEFONO (02) 65.97.946 - TELEX 310510

Formulato da:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di LAUTEBOURG (F)
Confezionato da: SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Registrazione Ministero della Sanità N. 6542 del 3.10.85
DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto kg. 5

6543

IV CLASSE

SIABORD

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE
A LUNGA PERSISTENZA

Registrazione Ministero Sanità n. 6543 **del** 3.10.85
Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Captafol puro	g 24
— Rame metallico (sotto forma di solfato neutralizzato con calce spenta)	g 9
— Coformulanti	q.b. a g 100

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi. Evitare il contatto diretto con il prodotto puro o diluito, ed anche di sollevare polveri nel maneggio del prodotto.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie, possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro d'acqua) e digitale.

AVVERTENZA

Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il SIABORD è una formulazione caratterizzata da un'alta efficacia e persistenza, in grado di controllare numerose malattie delle piante.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

— Bolla del pesco e del mandorlo, gommosi e cancro delle drupacee:
500-600 g/Hl per i trattamenti al bruno e
350 g/Hl per i trattamenti al verde

— Occhio di pavone dell'olivo: 400-500 g/Hl.

Effettuare 2 trattamenti: il 1° in pre-fioritura ed
il 2° ai primi di Settembre.
Con andamento stagionale piovoso, il 2° trattamento dovrà essere anticipato di 2-3 settimane.

— Cancri del legno del melo e del pero: 400 g/Hl, da applicarsi nella fase di « orecchiette di topo » per il melo e di « mazzetti affioranti » per il pero.
A questo primo trattamento dovranno seguirne altri due, di cui il primo all'inizio della caduta delle foglie ed il secondo a defogliazione completa.

— Fusariosi del garofano: 250 g/Hl.
Immergere le talee nella sospensione ottenuta, prima di trapiantarle. Qualora lo si desideri il prodotto potrà essere applicato, alla stessa dose, per irrorazione sulle piantine già trapiantate, avendo cura di bagnare bene il terreno intorno alle stesse.

— Concia secca dei semi: applicare 400 g/Hl per riso, grano, orzo, avena, segale e mais. Per la barbabietola da zucchero, la dose di SIABORD per q.le di seme dovrà essere di 1.200 g.

Il prodotto è efficace contro le principali malattie trasmesse dal seme, quali: carie, elmintosporiosi e mal del piede dei cereali, brusone del riso, elmintosporiosi del mais, cercosporiosi e mal del piede della barbabietola da zucchero.

— Altre malattie che si combattono con il SIABORD:
Muffa grigia e Peronospora della vite, 240-300 g/Hl. (sulle uve bianche il prodotto può dar luogo, in alcuni casi, a fenomeni fitotossici sugli acini se impiegato nel periodo che segue immediatamente la fioritura); Ticchiolatura del melo e pero 150-300 g/Hl; Marciume bruno dell'albicocco, del ciliegio e del mandorlo, 500 g/Hl nei trattamenti al « bruno ». 200-300 g/Hl nei trattamenti al « verde »; Ruggine del pesco e del susino 300 g/Hl; Cilindrosporiosi del ciliegio 200 g/Hl. Allupatura e Melanosi degli agrumi 300 g/Hl; Gommosi del colletto degli agrumi mediante pennellature con una sospensione al 10%; Ticchiolatura del nespolo 300 g/Hl; Peronospora e Ticchiolatura della rosa 200 g/Hl; Ruggine del garofano 300 g/Hl; Muffa grigia della fragola 400 g/Hl; Peronospora, Alternariosi, Septoriosi del pomodoro 300-400 g/Hl; Peronospora e Alternariosi della patata 400 g/Hl; Antracnosi, Cladosporiosi, Septoriosi, Alternariosi, Fusariosi, Peronospore, Cercospore degli ortaggi (insalate, sedano, cucurbitacee, solanacee, fagiolo, fagiolino, cipolla, porro) 300-400 g/Hl; Alternariosi del pero 150 g/Hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il SIABORD è compatibile con la generalità dei fungicidi, insetticidi ed acaricidi in commercio. Da escludere le miscele con prodotti a reazione alcalina e con gli olii. AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.
Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa mantovano) e di pero (Abate fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dr. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO (SULLE UVE DA VINO 40 GG.).

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.
prodotto nello stabilimento di
SILIA S.p.A. - APRILIA (LATINA)

Contenuto Kg.

6544

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SILMITRAZ COMBI

LIQUIDO EMULSIONABILE
INSETTICIDA-ACARICIDA A VASTO SPETTRO DI AZIONE

Registrazione Ministero Sanità n. 6544 **del** 3.10.85

Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Amitraz puro	g 15
— Diflubenzuron puro	g 5
— Coformulanti *	q.b. a g 100
* Contiene Xilolo e Cicloesanone	

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione:
Irritazione della pelle e delle mucose, vomito, cefalea, depressione del sistema nervoso centrale. Possibile alterazione dei valori glicemici.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Togliere gli indumenti contaminati e lavare la pelle abbondantemente con acqua e sapone. Allontanare il paziente dall'ambiente contaminato. In caso di ingestione praticare lavanda gastrica con acqua. In caso di depressione respiratoria: ossigenoterapia o respirazione artificiale. Tenere il paziente in osservazione per 24 ore.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il Silmitraz Combi controlla la generalità degli insetti che infestano il melo, il pero, le floricole e le ornamentali in genere.
Il prodotto esplica anche una notevole azione acaricida contro tutte le specie di acari parassiti delle anzidette colture. La sua azione insetticida ed acaricida si esplica per contatto ed ingestione.
La lunga persistenza d'azione garantisce la protezione della coltura per un lungo periodo di tempo.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Melo: Fillominatori (Lithocolletis; Cemiostoma etc...):
effettuare il trattamento durante il volo degli adulti, in coincidenza con la deposizione delle uova. Qualora lo si desideri il trattamento potrà essere effettuato anche all'apparire delle mine fogliari, purché queste non abbiano superato il diametro di 2 mm.
Dose applicativa: 300-400 g/Hl.
Ricamatrici (Capua sp.; Archips sp.; Pandemis sp.).
Trattare al primo apparire delle ovature.
Dose applicativa: 300-400 g/Hl.
Carpocapsa pomonella: 300-400 g/Hl secondo il normale calendario.
Per tutti gli altri parassiti, quali afidi, acari, tignole etc...: trattare al 1° apparire dei parassiti, ripetendo l'applicazione secondo la necessità.
Dose applicativa: 300-400 g/Hl.

Pero: Psilla (Psilla pyri): applicare 300-400 g/Hl alla deposizione delle prime uova;
Afidi, Eriofidi (Eriophyes pyri), Cocciniglie, Acari: applicare 300-400 g/Hl al primo apparire dei parassiti, ripetendo il trattamento in caso di reinfestazione.

Garofano (in pieno campo): per la lotta alle baghe (Cacoecia pronubana, Dianthoecia capta, Epicorlstotes ecorbella) impiegare 300-400 g/Hl. Trattare preventivamente, prima della comparsa delle ovature, o appena inizia la deposizione.

Il Silmitraz Combi può essere utilizzato alla dose di 300-400 g/Hl per il controllo degli insetti e degli acari che infestano le seguenti colture in pieno campo:
— rosa, gerbera, lilium, crisantemo, Bouvardia, Poinsetia, Aralia, Asparagus da fronda, ciclamino, camelia, azalea.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari fatta eccezione dei prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 45 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SILIA S.p.A.
prodotto nello stabilimento di
APRILIA - (LATINA)

Contenuto Lt.

6545

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

ISOCOB

Erbicida selettivo di pre-emergenza del frumento tenero

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 50 Isoproturon puro
gr. 25 Dinitramina pura
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

L'ISOCOB è un erbicida selettivo di pre-emergenza, per il diserbo del frumento tenero.
L'associazione dei due principi attivi (Isoproturon più Dinitramina) fornisce il controllo delle principali Dicotiledoni e Graminacee annuali.

INFESTANTI SENSIBILI

a) **Graminacee:** Agrostis, Alopecurus, Avena Ludoviciana, Avena fatua (a nascita autunnale), Lolium (nascite autunnali), Poa annua e Poa trivialis.

b) **Dicotiledoni:** Adonis, Anagallis, Chenopodium, Papaver, Polygonum (nascite precoci), Ranunculus, Stellaria, Veronica.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato subito dopo la semina del frumento tenero, prima dell'emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSI:
- contro Dicotiledoni e Graminacee annuali compresa l'Avena (a nascita autunnale): Kg. 3,5/ha.
- contro Dicotiledoni e Graminacee annuali, esclusa l'Avena: Kg. 3/ha.

Distribuire il prodotto con almeno 500 litri di acqua per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Ravit

Reg. n. 6545 **Ministero della Sanità del** 9.10.85

Contenuto netto kg.

3/85

6546

RELDAN * 50 PB

(POLVERE BAGNABILE)

Insetticida per la difesa di alcuni fruttiferi, della vite, del mais, di alcune orticole e del pioppo.

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Chlorpyrifos-metile puro		g 50,0
Coformulanti	III CLASSE	q.b. a g 100,0

Attenzione: manipolare con prudenza

SOSTANZA PERICOLOSA PER INGESTIONE, PER INALAZIONE E PER CONTATTO CON LA PELLE

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico:

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè e presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

Modalità d'impiego:

Il RELDAN 50 PB è un insetticida fosforganico in polvere bagnabile che agisce per contatto ed ingestione. Il RELDAN 50 PB è particolarmente indicato per combattere le larve di Lepidotteri e le neanidi di Cocciniglie. Esplica inoltre un'azione frenante lo sviluppo delle popolazioni di Acari tetranichidi come Panonychus, Tetranychus e Eotetranychus. I trattamenti devono essere effettuati alla comparsa dei primi insetti e ripetuti ogni 15 giorni secondo necessità.

Dosi di impiego (per 100 lt. di acqua)

Frutticoltura: (melo, pero, pesco, aranci)

G 100 contro Lepidotteri tortricidi (Capua, Cacoecia, Pandemis, Eulia), Tignola orientale (Laspeyresia), Anarsia (Anarsia).
G 100-120 contro neanidi di Cocciniglie (Aspidiotus, Aonidiella, Mytilococcus, Chrisomphalus, Saissetia, Ceroplastes, Pseudococcus).

Viticoltura:

G 100 contro Tignole dell'uva (Clysia, Lobesia). Il prodotto potrebbe risultare fitotossico per alcune varietà sensibili; si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.

Orticoltura: (pomodoro, pisello, lattuga, carciofo, cavoli, melanzana, ravanello, patata)

Kg 0,700-1 per ettaro contro Nottue (Agrotis, Mamestra), Cavolaia (Pieris), Macaone (Papilio), Dorifora (Leptinotarsa).

Mais (in campo)

G 130 contro Piralide (Ostrinia), Nottue (Agrotis) ed Elateridi.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità

Il RELDAN 50 PB è miscibile con i più comuni fungicidi, acaricidi ed insetticidi ad esclusione di quelli a reazione alcalina.

"Avvertenza": In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto

Attenzione

Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

* Marchio registrato - The Dow Chemical Company

Prodotto nello stabilimento di: King's Lynn - Inghilterra della The Dow Chemical Co.

Dow Chemical S.p.A.
Via R. Lepetit, 8 - Milano
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6546 del 29.10.85

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg 20

6547

ERKOR

DISERBANTE PER AREE INDUSTRIALI, TERRENI NON SOGGETTI A COLTURA, ARGINI E BORDI STRADALI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

— Principi attivi

OXYFLUORFEN puro	g	14.0
DALAPON puro	g	43.4
— Sostanze inerti e coadiuvanti: q.b. a	g	100.0

CLASSE III^a

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. E' obbligatorio l'uso di guanti e maschera durante l'operazione di miscelamento e trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
L'inalazione e/o il contatto dermale può dare luogo ad irritazione delle mucose.
L'ingestione può provocare nausea, vomito, vertigini, tremiti ed obnubilamento del sensorio.

Interventi di pronto soccorso - *In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. In caso di contatto con la pelle lavare accuratamente con acqua e sapone.*

AVVERTENZA: *Consultare un centro antiveleni.*
In casi gravi o sospetti gravi, ricovero urgente in centro di rianimazione.
In caso di ingestione non somministrare nulla per via orale a persona inconscia.
Lavanda gastrica. Somministrare Carbone attivo (30 g), far seguire purgante salino (Solfato di Magnesio).
Ulteriori cure sono sintomatiche.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità: ERKOR è un diserbante particolarmente indicato per la lotta contro le infestanti graminacee perennanti quali Cynodon sp., Agropyron sp., Lolium sp., Sorghum halepense, Bromus sp.

ERKOR agisce in post-emergenza, quando le infestanti sono già sviluppate e possiede azione di pre-emergenza sulle infestanti annuali che nascono dopo il trattamento.

EPOCA DI INTERVENTO
Impiegare ERKOR a fine primavera-inizio estate quando le infestanti graminacee perennanti (Cynodon sp., Agropyron sp., ecc.) sono già ben sviluppate e cioè con germogli aventi lunghezza minima di 25-30 cm.
Il trattamento va effettuato quando le condizioni climatiche fanno sì che le infestanti siano in attiva crescita e succulente.

NON trattare con terreno arido.

DOSI DI IMPIEGO
Kg/Ha 10-12 in sospensione con 1000-1400 litri d'acqua a seconda dello sviluppo e della intensità dell'infestazione.
Nel diserbo del Sorghum halepense, migliorare l'azione dell'ERKOR addizionando Kg/Ha 10 di Dalapon (85% p.a.).

NOTA
Al fine di ottenere i migliori risultati è indispensabile effettuare una accurata bagnatura di tutta la vegetazione. E' opportuno quindi operare, oltrechè con un elevato quantitativo di acqua, anche con una sufficiente pressione della pompa, che consenta la penetrazione della nube irrorata fino alla parte basale delle infestanti.
Aggiungere un buon bagnante/adesivo quando la vegetazione delle infestanti è molto densa o non sufficientemente succulenta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' - ERKOR è miscibile con Dalapon.
FITOTOSSICITÀ - Il prodotto è fitotossico per le colture arboree; evitare che la nube irrorante giunga a contatto con tali colture.
Attenzione - Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

20124 MILANO (ITALY) - VIA VITTOR PISANI, 28
TELEFONO (02) 65.87.846 - TELEX 310510

Formulato da:
ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
Confezionato da:
SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. 6547 del 29.10.85
DA NON VENDERSI SFUSO
Peso Netto Kg. 10

6548

NAWOROL

DISERBANTE SELETTIVO PER IL MAIS

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di NawOrol contengono:
g 43 di alachlor puro;
emulsionanti e solventi quanto basta a 100.
(contiene monoclorobenzolo)

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare di respirarne i vapori; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto agisce per assorbimento radicale sui semi delle infestanti annuali da seme in via di germinazione, soprattutto graminacee (Giavone, Poa), comprese Digitaria, Setaria, Panico americano (Panicum dicothomiflorum) nonchè su alcune dicotiledoni (Amaranto, Capsella, Camomilla, Porcellana, Senape, Veronica). Il prodotto è poco efficace su Stellaria, Ortica, Poligonacee ed è inoltre inefficace sulle malerbe perennanti munite di rizomi, bulbi, bulbilli, stoloni (Gramigna, Convolvolo, Sorghetta, Stoppione, Artemisia).

Il diserbo si può effettuare su tutta la superficie del campo oppure in forma localizzata a fasce larghe cm 25 lungo le file; in quest'ultimo caso la dose di impiego va rapportata all'effettiva superficie trattata.

— Preparare il terreno accuratamente in modo che non rimangano zolle e zollette.
— Impiegare il prodotto immediatamente dopo la semina o entro qualche giorno ma prima della nascita delle infestanti alla dose di litri 3 in associazione a kg 2 di Atrazina 50%. Il prodotto può essere usato anche da solo dove predominano le graminacee resistenti all'Atrazina o nel mais di secondo raccolto alla dose di litri 6 per ettaro, che possono essere ridotti a litri 5 nei terreni sciolti o aumentati a litri 7-8 nei terreni organici.
— Diluire il prodotto in 4-5 ettolitri di acqua e distribuire uniformemente a mezzo delle comuni irroratrici a mano o meccaniche.
— Perchè il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che entro due settimane dal trattamento cada una pioggia di almeno 9-10 mm, altrimenti occorre effettuare una irrigazione a pioggia superficiale.
— Eventuali sarchiature che vengono effettuate dopo il trattamento devono essere molto superficiali per non fare affiorare terreno non contenente il Naworol.

Preparazione della poltiglia: versare il totale quantitativo del prodotto nell'acqua, rimescolando con cura.

Avvertenze: le coltivazioni di mais trattate con Naworol non possono essere consociate con altre colture. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e per la distribuzione della poltiglia erbicida, prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: Il Naworol è miscibile con Atrazina polvere e liquida e con Simazina. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: evitare che il prodotto venga a contatto con colture non indicate in etichetta. Alle dosi normali di impiego non si hanno residui dannosi per le colture seminate successivamente purchè dall'applicazione del diserbante alla semina intercorrano 3-4 mesi e si proceda ad una buona aratura prima della semina.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Bayer AG-Leverkusen (Germ. Occ.)

Registrazione Ministero Sanità n.6548 **del** 29.10.85

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

lt 5

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

6549

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Non conservare presso sorgenti di calore o di fiamme - Pericoloso se ingerito o assorbito attraverso la pelle - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e i vestiti - Dopo la manipolazione del prodotto e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Non fumare e non mangiare durante l'applicazione - Non usare il prodotto contro vento - Non respirare i vapori; conservare il prodotto ben chiuso - Non contaminare alimenti o mangimi - Non contaminare corsi d'acqua con l'applicazione diretta del prodotto, con la pulizia delle attrezzature o con l'eliminazione dei rifiuti.
INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione rivolgersi al medico per le prime cure di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: Il Trifluran controlla una vasta gamma di infestanti uccidendone i semi all'atto della germinazione.
Infestanti controllate: Graminacee: Digitaria sanguinalis - Sorgum halepense - Poa annua - Setaria glanca - Alopecurus agrestis - Alopecurus miosuroides - Setaria viridis - Lolium temulentum.
Infestanti a foglia larga: Portulaca oleracea - Polygonum convolvulus - Polygonum ovlculare - Papaver rhoeas - Amarantus retroflexus - Galium aparine - Chenopodium album - Stellaria - Veronica - Urtica urens - Atriplex patula - Galeopsis laudanum.
MODALITA' DI IMPIEGO: Il Trifluran deve essere interrato subito dopo l'impiego con frese o erpici a dischi.
Dopo l'impiego autunnale sui cereali non si devono effettuare altre semine prima di 12 mesi.
Dopo l'impiego primaverile devono passare almeno 5 mesi.
COLTURE PROTETTE E DOSI DI IMPIEGO: Pomodoro e Peperone da trapianto - Indivia, lattuga da trapianto - carota - finocchio - sedano e prezzemolo da trapianto. Interrare il Trifluran da 1 mese a 1 giorno prima del trapianto.
Dosi: Kg 1 per ettaro in terreni leggeri - Kg 1,5/ha in terreni medio impasto - Kg 2/ha in terreni argillosi.
Cavolo, cavolfiore, cipolla da trapianto: interrare il Trifluran da 15 giorni a 1 giorno prima del trapianto.
Dosi: Kg 1/ha in terreni leggeri - Kg 1,5/ha in terreni medio impasto - Kg 2/ha in terreni argillosi.
Fagiolo, fagiolino, carota, finocchio, sedano e prezzemolo da semina, aglio, girasole, carota, arachide e soia: interrare il Trifluran da 6 settimane a 1 giorno prima della semina.
Dosi: Kg 1/ha in terreni leggeri - Kg 1,5/ha medio impasto Kg 2/ha in terreni pesanti.
Pomodoro da semina: trattare irrorando direttamente il terreno tra le file all'epoca del diradamento - Interrare immediatamente.
Dosi: Kg 1/ha per terreni leggeri - Kg 1,5/ha per terreni medio impasto - Kg 2/ha per terreni argillosi.
Pisello: interrare il Trifluran da 6 settimane a 1 giorno prima della semina.
Dose: Kg 1,2 - 1,5/ha per tutti i terreni.

DISERBANTE SELETTIVO IN FORMULAZIONE LIQUIDA EMULSIONABILE PER IL CONTROLLO IN PREEMERGENZA DI INFESTANTI GRAMINACEE E DICOTILEDONI DI VARIE COLTURE.

COMPOSIZIONE: 100 gr di prodotto contengono:

Trifluralin puro	gr	45
Coformulanti q.b. a	gr	100

C L A S S E I V

T E R R A N A L I S I s. n. c.
Sede CENTO (FE) - Via Donizetti, 2/A
Telefono 906.207

Stab. di produzione: RENAZZO (FE) - Via IV Novembre
Reg. n. 6549 del 29.10.85 Min. della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO KG 1**

Cavolo, cavolfiore da semina: interrare il Trifluran da 3 settimane a 1 giorno prima della semina.
Dose: Kg 1/ha nei terreni leggeri - Kg 1,5 per i terreni medio impasto - Kg 2/ha per terreni argillosi.
Barbabietola: Applicare il Trifluran su pieno campo quando le piante hanno raggiunto le 4-6 foglie vere, interrare immediatamente nell'interfila.
Dosi: Kg 1,2/ha per terreni leggeri e medio impasto Kg 1,5/ha per terreni argillosi.
Erba medica: (dopo l'ultimo sfalcio del primo anno).
Il Trifluran va applicato e interrato durante la stagione di riposo.
Dosi: Kg 1,5/ha per terreni leggeri - Kg 2/ha per terreni pesanti.
Melone, cocomero, cetriolo: Applicare il prodotto al momento del diradamento quando la coltura ha raggiunto lo stadio vegetativo di 3-4 foglie, interrando subito dopo.
Dose: Kg 1/ha per terreni leggeri - Kg 1,5/ha per terreni medio impasto - Kg 2/ha per terreni pesanti.
Patata: applicare e interrare il Trifluran dopo la piantagione dei tuberi nel terreno ad essi sovrastante.
Dose: Kg 1/ha nei terreni leggeri - Kg 1,5/ha nei terreni medio impasto - Kg 2/ha nei terreni argillosi.
Frumento, orzo, segale (a semina autunnale) il trifluran va applicato in preemergenza, senza incorporazione nel terreno.
Dose: Kg 1,2/ha in terreni leggeri - Kg 1,5 in terreni medi e argillosi.
ISTRUZIONI SPECIALI: Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Trifluran e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio.
Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.), nella primavera successiva all'applicazione del prodotto.
Non deve essere applicata in terreni contenenti l'8 % o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto va impiegato da solo.
FITOTOSSICITA': Può essere fitotossico per le colture indicate in etichetta.
AVVERTENZA: Evitare il congelamento del prodotto conservandolo in locali a temperatura non inferiore ai 5 °C.
Per i trattamenti in post-emergenza sospendere le applicazioni 30 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - Ogni altro uso è pericoloso - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

6550

BAYCOR CP

FUNGICIDA ORGANICO

per la lotta contro ticchiolatura delle pomacee con azione collaterale contro mal bianco del melo, contro monilia e perforazione delle foglie (gommosi) delle drupacee, ruggine ed oidio degli ortaggi (fagiolo, zucchino, cetriolo), peronospora, ticchiolatura, oidio e ruggine delle piante ornamentali e da fiore in pieno campo e in serra

CLASSE III

ATTENZIONE Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Baycor CP contengono:
g 7,5 di bitertanolo puro;
g 32 di captano puro;
coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Si raccomanda l'uso di maschera durante l'impiego del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pomacee (melo e pero): contro ticchiolatura con azione collaterale contro mal bianco del melo: 0,2-0,3% (200-300 g in 100 lt d'acqua) effettuando gli interventi ad intervalli di 7-8 giorni a partire dalla fase di apertura delle gemme fino alla fase di frutto-noce e successivamente ad intervalli di 8-12 giorni in dipendenza dell'andamento climatico. Il prodotto è particolarmente indicato per il pero e la Golden Delicious.
Drupacee (pesco, susino, albicocco, mandorlo): contro monilia: 0,25-0,3% (250-300 g in 100 lt d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti, prima, durante e dopo la fioritura, ripetendoli alla comparsa dei primi sintomi della malattia ad intervalli di 6-8 giorni impiegando la dose più elevata e gli intervalli più brevi nei periodi climatici più favorevoli allo sviluppo della malattia.
Contro oidio e perforazione delle foglie (gommosi): 0,2% (200 g in 100 lt d'acqua) effettuando trattamenti preventivi con inizio alla fase della scamiciatura dei frutti alla cadenza di 7-10 giorni circa; in caso sia necessario intervenire con infezione in atto, elevare la dose allo 0,25% (250 g in 100 lt d'acqua).
Ortaggi (fagiolo, zucchino e cetriolo): contro antracnosi, ruggine e mal bianco: 0,25% (250 g in 100 lt d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti ad intervalli di 7-8 giorni, effettuando il primo all'inizio dell'attacco.
Piante ornamentali e da fiore in pieno campo e in serra: contro peronospora, ticchiolatura e ruggine della rosa e delle altre piante ornamentali e da fiore: 0,25% (250 g in 100 lt d'acqua). Contro oidio o mal bianco: 0,30% (300 g in 100 lt d'acqua).
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Diluire il prodotto in una quantità d'acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Il Baycor CP può essere miscelato con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra. Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con olii e con zolfi. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anyou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto degli ortaggi e 21 giorni prima del raccolto della frutta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Filago (BG)

Registrazione Ministero Sanità n. 6550 **del** 30.10.85

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo

Kg 1

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Commissionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

6551

HEDONAL DP-M

DISERBANTE ORMONICO SELETTIVO

per la lotta contro le erbe infestanti a foglia larga dei prati inglesi

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Hedonal DP-M contengono:
g 37,1 di Diclorprop acido
g 18,6 di MCPA acido
coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.
Consigli terapeutici: abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per la dermatosi.
Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dose ed epoca di impiego: 3-6 litri/ha, diluiti in 1000-1500 litri d'acqua (10-15 litri di soluzione per 100 m²) intervenendo in primavera dopo la ripresa vegetativa del tappeto erboso, e ripetere il trattamento dopo 10-15 giorni.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: l'Hedonal DP-M deve essere impiegato da solo.
Fitotossicità: la temperatura al momento del diserbo deve essere non inferiore ai 12 °C o superiore a 30 °C. Eseguire il diserbo preferibilmente in giornate senza vento, avendo cura di distribuire la soluzione uniformemente su tutta la superficie da trattare. Evitare che la soluzione giunga a contatto di ortaggi, fiori, viti, fruttiferi ecc. anche sotto forma di vapori portati dal vento.
A lavoro ultimato lavare accuratamente con acqua bollente e soda le pompe ed i recipienti usati per la preparazione della soluzione e quindi risciacquarli ripetutamente con acqua. In genere è consigliabile non usare per i trattamenti con Hedonal DP-M le pompe ed i recipienti (soprattutto quelli in legno) destinati a trattamenti a piante da frutto e viti.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per gli impieghi non indicati in etichetta.
Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Filago (BG)
Registrazione Ministero Sanità n.6551 del 30.10.85

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo

1 Litro

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Commissionaria
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

6552

LUXAN ANTI - GERME IN POLVERE Antigerminante per patate

Composizione:
Profam puro gr. 0,5 - Clorprofam puro gr. 0,5 - Coformulanti q.b. a gr. 100.

CLASSE TOSSICOLOGICA III

« ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA »

Questa sostanza è pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in un luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso ri contaminazione, lavarsi accuratamente.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi di intossicazione:
nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, brachicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nel caso di bambini.
Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione.
Ossigeno-terapia se vi è cianosi.
Controindicazioni:
Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

AVVERTENZA:

Consultare un centro antiveleni.

Modalità di impiego:

Le patate da trattare devono essere asciutte e secche per quanto possibile, libere da residui di terra. La buccia deve essere alquanto dura. I tuberi malati o quasi devono essere eliminati prima del trattamento. Il prodotto non deve essere usato prima di circa due mesi dal raccolto delle patate e nello stesso tempo si consiglia di applicare il prodotto prima che si sia constatato l'inizio del processo di formazione dei germogli. Se la conservazione viene effettuata in fosse, si può applicare la polvere, nella misura di 2 kg. ogni 1.000 kg. di patate, durante il ribaltimento delle patate nelle fosse, guardando di spargerla uniformemente. Se la conservazione viene effettuata in celle magazzino o celle raffreddate ad aria alla temperatura di 5-6° C, si può polverizzare il prodotto strato per strato ed anche eventualmente sui nastri trasportatori ma sempre in modo tale che la polvere venga distribuita uniformemente.

Questo prodotto in rapporto all'uso agricolo per cui è previsto, non è compatibile con altri principi attivi.
Non sono quindi applicabili miscele con altri principi attivi.

« Attenzione »: non conservare patate da semina e sementi di alcun genere dove è stato effettuato il trattamento per patate da consumo con questo prodotto.

Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, per il pesce e per il bestiame.

Dopo il trattamento è necessario conservare le patate per 50 giorni prima dell'immissione in commercio per il consumo.

« Attenzione: impiegare il prodotto solo in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del prodotto ».

Il rispetto delle predette istruzioni è la condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare rischi alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione Ministero Sanità N. 6552
del 30.10.85

QUESTO PRODOTTO NON SI VENDE SFUSO.

I materiali di imballaggio combustibili devono essere bruciati in luoghi sufficientemente sicuri al fine di non causare inconvenienti alle persone, agli animali, alle piante, né per il fuoco alle costruzioni, né per il fumo ed i vapori.

Contenuto della confezione al netto Kg. 5

B. V. CHEMISCHE PHARMACEUTISCHE INDUSTRIE LUXAN

con sede in Elst (Gdl) Olanda - P.O. Box n. 9.

Prodotto fabbricato in Olanda presso la fabbrica della Ditta suindicata che si trova in INDUSTRIEWEG n. 2 - 6662 P A-ELST (Gdl) Olanda.

6553

BETOZON(R) SL

Diserbante selettivo in pasta liquida di impiego in pre-semina, pre-emergenza e post-emergenza su Bietola da zucchero, da foraggio e da orto.

COMPOSIZIONE		
— Cloridazon puro	g	45,5
— Coadiuvanti ed inerti: quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM — Milano

SIPCAM — Soc. It. Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE IV

Registrazione n. 6553 del 30.10.85 Ministero della Sanità

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali e viene assorbito sia per via radicale che per via fogliare dai semi in germinazione o dalle plantule appena spuntate dal terreno purché al momento del trattamento presentino le foglie cotiledonari e non più di 1-3 foglie vere; il prodotto è selettivo per la bietola in quanto viene da questa rapidamente trasformato in metaboliti non dannosi.

Infestanti molto sensibili sono: Matricaria chamomilla, Veronica sp., Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Lamium sp., Stellaria media, Thlaspi arvense, Chenopodium album, Atriplex sp., Galinsoga parviflora, Solanum nigrum, Urtica urens, Capsella bursa pastoris, Linaria sp., Polygonum convolvulus, Polygonum lapathifolium: **sono mediamente sensibili:** Euphorbia sp., Fumaria officinalis, Galium aparine, Papaver rhoeas, Poa sp., Senecio vulgaris, Mercurialis annua, Polygonum aviculare, **sono mediamente resistenti:** Alopecurus sp., Anagallis arvensis, Avena fatua, Lolium sp., Rumex sp., Vicia sp., Aiuga sp., **sono resistenti :** invece tutte le malerbe perenni quali Cirsium arvense, Agropyrum repens, Cynodon dactylon, Convolvulus sp., Equisetum sp., Sorghum halepense, Cyperus sp..

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega in pre-semina e pre-emergenza a dosi variabili di **3,5—7 Kg/ha** in funzione della natura del terreno:
su terreni leggeri : 3,5 Kg/ha
su terreni di medio impasto : 4,5 Kg/ha
su terreni pesanti : 6.5—7 Kg/ha
Il prodotto si impiega anche in post-emergenza con infestanti nella fase di plantula alla dose di **3,5—4 Kg/ha.** Nei terreni torbosi il diserbante viene bloccato dalla sostanza organica e difficilmente si riesce ad ottenere un'azione erbicida soddisfacente; si può tuttavia intervenire in post-emergenza dopo la nascita delle infestanti.
Diluire la prestabilita quantità di prodotto in 4—6 o più ettolitri di acqua per ettaro, irrorando con pompe a volume normale.
Il prodotto si può impiegare anche localizzato, riducendo la dose di impiego alla effettiva superficie di terreno trattato.
Il prodotto si impiega dal momento della semina fino a quando le infestanti si trovano alla fase di plantula: su infestanti più sviluppate (4 o più foglie) si ha un'azione soltanto parziale.
Il trattamento in post-emergenza si può anche effettuare dopo una zappatura o dopo il diradamento purché le infestanti non siano presenti, oppure si trovino al massimo alla fase di 1-3 foglie.
Preparare il terreno perfettamente affinato effettuando il diserbo su terreno fresco e umido ovvero assicurandosi che a breve distanza cada una pioggia per permettere al prodotto di distribuirsi uniformemente sullo strato superficiale del terreno e di venire così assorbito dalle radici delle infestanti.
Qualora si debba operare su terreno asciutto e non si abbiano successive piogge, è necessario procedere ad un'irrigazione entro 8-10 giorni dal diserbo.

Preparazione della poltiglia: agitare la confezione prima dell'uso, diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con erbicidi ed insetticidi previsti per allargare l'azione contro le malerbe e per la lotta contro gli insetti.
Non sono miscibili in genere gli insetticidi in formulazione liquida emulsionabile.
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Si sconsiglia il trattamento nel periodo che va dall'emergenza della bietola fino all'emissione della seconda foglia vera. La selettività del prodotto può essere compromessa da attacchi di insetti o di malattie fungine che determinano lesioni sulle radici o sulle foglie aprendo vie alla penetrazione del prodotto. Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture sensibili vicine.
Se è necessaria una ricoltivazione è sconsigliabile la semina o il trapianto di Pomodoro, Colza, Ravizzone, Cavoli e Cavolfiori.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO CONTENUTO 1 Lt

6554

BAGNANTE ANTISCHIUMA NT

Bagnante per uso agricolo.
Conferisce bagnabilità e sospensività alle poltiglie.
Impedisce la formazione della schiuma.

COMPOSIZIONE

– Nonilfenolo etossilato puro	g	20
– Coadiuvanti,Inerti:quanto basta a	g	100

SIPCAM – Soc.It.Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano
CLASSE IV
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)
Registrazione n. 6554 del 30.10.85 Ministero della Sanità

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Si impiega alla dose normale di g 50 per ogni ettolitro di poltiglia.
Il prodotto va agitato prima dell'uso e versato direttamente nelle poltiglie di antiparassitari già preparate, rimescolando con cura.
E' utile l'aggiunta alle poltiglie antiparassitarie del BAGNANTE ANTISCHIUMA NT in quanto ne accentua l'efficacia conferendo alle stesse una maggiore bagnabilità e sospensività ed impedendo nello stesso tempo la formazione della schiuma.
E' utile l'aggiunta del BAGNANTE ANTISCHIUMA NT quando si debbono combattere infestazioni di parassiti quali Acari, Afidi, Psille ed altri fitofagi, che sono protetti esternamente da secrezioni cerose o dalla naturale tomentosità delle piante.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità : è miscibile con tutte le poltiglie antiparassitarie.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: la eventuale fitotossicità è quella dell'antiparassitario cui il prodotto viene aggiunto.

Sospendere i trattamenti secondo le indicazioni dell'antiparassitario cui il prodotto viene aggiunto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO 1 Lt

6556

® K-OTHRINE GRAINS PP

Insetticida in polvere secca a lunga durata di protezione per la disinfestazione dei cereali in granella immagazzinati

COMPOSIZIONE: Deltametrina pura g 0,2, conformulanti quanto basta a 100.

CLASSE III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— conservare il prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti;
— dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: in caso di ingestione accidentale, segni di nervosismo, ansietà, tremori, convulsioni e danni respiratori.
Consigli terapeutici:
— cure di pronto soccorso
  - evitare il raffreddamento del paziente;
  - trattare le irritazioni con creme lenitive-rinfrescanti o a base di Chinisocaina cloridrato o antistaminiche;
  - in caso di contatto cutaneo, lavare abbondantemente con acqua;
  - evitare l'esposizione alla luce viva;
  - in caso di ingestione accidentale, provocare il vomito, a meno che sia incosciente.
— Cure sotto controllo medico (in caso di intossicazione grave):
  - in caso di inalazione somministrare per aerosol per 15 minuti un derivato della cisteina;
  - in caso di ingestione praticare una lavanda gastrica. Somministrare poi carbone attivo o in mancanza Attapulgite;
  - in caso di intossicazione grave o di sintomi neurologici trattare il soggetto con Amobarbital per iniezione intramuscolare;
  - nei casi più gravi, ospedalizzazione in un centro di rianimazione.

Roussel-Hoechst Agrovet S.p.A.
20100 Milano - Casella Postale 1847
Officina di produzione HOECHST AG
Hoechst, Francoforte s/Meno (Germania Occ.)

Registrazione n. 6556 del Ministero della Sanità del 7.11.1985

® Marchio registrato della Roussel Uclaf S.A. - Parigi

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s. Meno

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Contro Sitophilus spp (Calandra), Oryzaephilus surinamensis (Silvano), Tribolium spp (Tribolio), Rhisopertha dominica (Cappuccino), Sitotroga cerealella, Ephestia Kuehniella, Plodia interpunctella (Tignole), Tenebroides mauritanicus (Struggigrano), Tenebrio molitor (Tenebrione), Trogoderma spp (Trogoderma), Stegobium paniceum (Stegobio del pane), Bruchus spp (Tonchi), 0,5 Kg/ton di derrata da disinfestare.
K-OTHRINE GRAINS PP deve essere distribuita uniformemente nella massa della derrata all'atto dell'immagazzinaggio, mediante pale e rastrelli. Nei silos distribuire il prodotto sulle coclee e nastri trasportatori all'atto dell'insilamento o nel passaggio da una cella all'altra.

CARATTERISTICHE

K-OTHRINE GRAINS PP è un insetticida per la prevenzione e la cura delle infestazioni dei cereali.
K-OTHRINE GRAINS PP agisce per contatto ed ingestione contro tutti gli insetti che infestano i cereali in granella immagazzinati.
K-OTHRINE GRAINS PP assicura una lunga protezione (6-12 mesi).
K-OTHRINE GRAINS PP non trasmette alcun odore alle derrate trattate e non altera la germinabilità dei semi.

COMPATIBILITA'

K-OTHRINE GRAINS PP si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci e nocivo per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 42 GIORNI PRIMA DELL'IMMISSIONE AL CONSUMO DEI CEREALI.

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

15.985

KG 1

6557

® K-OTHRINE GRAINS CE

Insetticida concentrato emulsionabile a lunga durata di protezione per la disinfestazione dei cereali in granella immagazzinati

COMPOSIZIONE: Deltametrina pura g 2,66, Piperonilbutossido puro g 23,9, coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE III

ATTENZIONE manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- conservare il prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti;
- dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: In caso di ingestione accidentale, segni di nervosismo, ansietà, tremori, convulsioni e danni respiratori.
Consigli terapeutici:
- cure di pronto soccorso
  - evitare il raffreddamento del paziente;
  - trattare le irritazioni con creme lenitive-rinfrescanti o a base di Chinisocaina cloridrato o antistaminiche;
  - in caso di contatto cutaneo, lavare abbondantemente con acqua;
  - evitare l'esposizione alla luce viva;
  - in caso di ingestione accidentale, provocare il vomito, a meno che sia incosciente.
- Cure sotto controllo medico (in caso di intossicazione grave):
  - in caso di inalazione somministrare per aerosol per 15 minuti un derivato della cisteina;
  - in caso di ingestione praticare una lavanda gastrica. Somministrare poi carbone attivo o in mancanza Attapulgite;
  - in caso di intossicazione grave o di sintomi neurologici trattare il soggetto con Amobarbital per iniezione intramuscolare;
  - nei casi più gravi, ospedalizzazione in un centro di rianimazione.

Roussel-Hoechst Agrovet S.p.A.
20100 Milano - Casella Postale 1847
Officina di produzione PROCIDA S.A.
Saint-Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)

Registrazione n. 6557 del Ministero della Sanità del 7.11.1985

® Marchio registrato della Roussel Uclaf S.A. - Parigi

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s. Meno

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

— Trattamento diretto alle derrate
Contro Sitophilus spp (Calandra), Oryzaephilus surinamensis (Silvano), Tribolium spp (Tribolio), Rhizopertha dominica (Cappuccino), Sitotroga cerealella, Ephestia Kuehniella, Plodia interpunctella (Tignole), Tenebroides mauritanicus (Struggigrano), Tenebrio molitor (Tenebrione), Trogoderma spp (Trogoderma), Stegobium paniceum (Stegobio del pane), Bruchus spp (Tonchi), 10-20 ml/ton. La dose più bassa si impiega per ottenere una protezione di 6 mesi circa, la più alta per una protezione di 9-12 mesi. Diluire 1-2 lt di K-OTHRINE GRAINS CE in 100 litri di acqua e distribuire uniformemente 1 litro di emulsione per ogni tonnellata di cereali all'atto dell'immagazzinamento mediante una attrezzatura idonea alla spruzzatura su nastro trasportatore, coclea, elevatore. Per ottenere i migliori risultati è indispensabile una distribuzione uniforme. Prima di introdurre le derrate si consiglia di effettuare un'accurata pulizia e disinfestazione di silos, magazzini.

— Trattamento diretto ai sacchi di cereali.
Diluire 1 lt di K-OTHRINE GRAINS CE in 100 litri di acqua e distribuire, mediante pompa a pressione, 1 litro di emulsione ogni 20 mq di superficie da disinfestare.

CARATTERISTICHE

K-OTHRINE GRAINS CE è un insetticida per la prevenzione e la cura delle infestazioni dei cereali.
K-OTHRINE GRAINS CE agisce per contatto ed ingestione contro tutti gli insetti che infestano i cereali in granella immagazzinati.
K-OTHRINE GRAINS CE assicura una lunga protezione (6-12 mesi).
K-OTHRINE GRAINS CE non trasmette alcun odore alle derrate trattate e non altera la germinabilità dei semi.

COMPATIBILITA'

K-OTHRINE GRAINS CE si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci e nocivo per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 42 GIORNI PRIMA DELL'IMMISSIONE AL CONSUMO DEI CEREALI.

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

15.985 II1

6560

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

NACTRAN P

Erbicida per la lotta contro le infestanti
Ciperacee ed Alismatacee del riso
Emulsione

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 14,4 di Triclopyr puro (come estere butossiglicolico)
gr. 24 di Propanile puro
Coformulanti quanto basta a 100
Contiene Xilolo

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida per la lotta contro le infestanti Ciperacee ed Alismatacee del riso.

Infestanti sensibili:
Scirpus maritimus
Scirpus mucronatus
Butomus umbellatus (parte epigea)

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.69
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 6560 **Ministero della Sanità del** 7.11.85

2/84

MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI

Il prodotto s'impiega alla dose di litri 4,5 per ettaro, distribuiti con 400-500 litri d'acqua.

L'applicazione può essere effettuata in due momenti:

1) in post-emergenza del riso, prima dell'accestimento, su risaia non in asciutta, ma con livello dell'acqua di cm. 0,5-1 (in modo che il terreno sia ricoperto d'acqua e le infestanti siano emerse al momento del trattamento);
2) dopo d'accestimento, o meglio alla sua conclusione, circa 50-55 giorni dopo la semina, molto prima della fase di botticella, su infestanti emerse ed in attiva crescita.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

Il prodotto non deve essere usato in miscele con ferilizzanti, insetticidi ed altri antiparassitari e non deve essere distribuito 5 giorni prima e dopo l'impiego di questi prodotti altrimenti il riso potrebbe subire delle bruciature.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Trattare in giornate senza vento in modo che la soluzione nebulizzata non raggiunga colture sensibili (viti, bietole, ecc.).

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

6561

CYANAMID ITALIA S.p.A.
V. Pres. Amm. Delegato
(... Colombini)

III CLASSE

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

FLUTRIN*

insetticida liquido

Presidio Sanitario

Registrazione Ministero Sanità n. 6561 del 21 NOV. 1985

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Flucitrinate puro	g. 2
— Dimetoato puro	g. 20
— Coformulanti inerti	q.b. a g. 100
(contiene Cicloesanone)	

* Marchio registrato AMERICAN CYANAMID COMPANY, Wayne, N.J. (USA)

AVVERTENZE

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non applicare contro vento e non respirare i vapori nebulizzati - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva) - In caso di intossicazione ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

CONSIGLI DI PRIMO SOCCORSO: Chiamare un medico. Nell'attesa: Se ingerito: non provocare il vomito.

In caso di contatto: lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti gli occhi e le altre parti del corpo eventualmente contaminate - Togliere abiti e scarpe se contaminati e lavarli accuratamente prima di usarli di nuovo - Nel caso di irritazione spalmare come lenitivi degli olii vegetali (p. es. olio di oliva o di semi).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso. Se ingerito: nei casi lievi somministrare 1-2 bicchieri d'acqua e provocare vomito. Non somministrare niente per bocca e non indurre vomito se il paziente è privo di sensi. Praticare gastrolusi nei casi più importanti e se il paziente è incosciente far precedere intubazione. In caso di contatto: lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti gli occhi e le altre parti del corpo eventualmente contaminate.
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente presso un Centro di Rianimazione.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Il FLUTRIN è un insetticida che agisce per contatto ed ingestione provvisto di penetrazione citotropica che permette di colpire, ad infestazione in atto, anche le forme di parassiti (specialmente Afidi, Tignole e Ditteri minatori) eventualmente protette dalla vegetazione o comunque non direttamente raggiungibili dal getto irrorante.
Alle sottoindicate dosi d'impiego il FLUTRIN è consigliato per la lotta contro Afidi, Aleurodi, Carpocapsa, Fillominatori, Psille, Ricamatrici, Tignole e Tripidi che infestano le seguenti colture:

		ml/hl di acqua
MELO	Afidi	150-200
	Carpocapsa, Ricamatrici	200
	Psille, Fillominatori	200
PERO	Afidi	150-200
	Psille	200
	Carpocapsa	200
PESCO	Afidi	150-200
VITE	Tignole	150
PEPERONE, POMODORO	Afidi, Aleurodi	100-150
ORNAMENTALI E DA FIORE IN SERRA E IN PIENO CAMPO	Afidi, Aleurodi, Tripidi	150-200

Contro Afidi, Aleurodi e Tripidi adottare la dose più elevata in caso di forti infestazioni in atto. In ogni caso intervenire alla prima comparsa dei parassiti ripetendo i trattamenti ad opportuni intervalli in funzione dell'andamento stagionale e del grado d'infestazione.
Alle dosi consigliate il FLUTRIN esplica anche una collaterale azione acaro-frenante dovuta alla presenza del piretroide flucitrinate esaltata dall'azione larvo-adulticida del dimetoato.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua e poi, sempre continuando ad agitare: aggiungere lentamente il quantitativo di acqua necessario a raggiungere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Non è comunque garantita la compatibilità con i formulati di altre Ditte.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Per gli impieghi su varietà di recente costituzione e su colture in serra sono sempre consigliabili saggi preliminari al fine di accertare la specifica rispondenza varietale in funzione delle microcondizioni ambientali. Non usare su Crisantemo.

NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci e per le api.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA PER GLI USI E NELLE EPOCHE CONSENTITE. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO NETTO: ml. 100

CYANAMID ITALIA S.p.A. - Divisione Fitofarmaci - Roma
Sussidiaria dell'AMERICAN CYANAMID COMPANY, WAYNE, New Jersey (USA)
Officina di produzione: VERCHIM - ASTERIAS S.p.A. - OZZANO EMILIA (BO)

Codice

Lotto

6564

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

EDRIZAR® COMBI

PASTA
INSETTICIDA-ACARICIDA A VASTO SPETTRO DI AZIONE

21 NOV. 1985

Registrazione Ministero Sanità n. 6564

Marchio depositato n. 274382

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
Amitraz puro	g. 15
Diflubenzuron puro	g. 5
Coformulanti *	q.b. a g. 100
* Contiene Xilolo e Cicloesanone.	

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:
Irritazione della pelle e delle mucose.
Vomito, cefalea, depressione del sistema nervoso centrale. Possibile alterazione dei valori glicemici.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Togliere gli indumenti contaminati e lavare la pelle abbondantemente con acqua e sapone. Allontanare il paziente dall'ambiente contaminato.
In caso di ingestione praticare lavanda gastrica con acqua.
In caso di depressione respiratoria: ossigenoterapia e respirazione artificiale.
Tenere il paziente in osservazione per 24 ore.

AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'EDRIZAR COMBI controlla la generalità degli insetti che infestano il melo, il pero, le floricole e le ornamentali in pieno campo.
Il prodotto esplica anche una notevole azione acaricida contro tutte le specie di acari parassiti delle anzidette colture. La sua azione insetticida ed acaricida si esplica per contatto ed ingestione.
La lunga persistenza d'azione garantisce la protezione della coltura per un lungo periodo di tempo.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Melo: Fillominatori (Lithocolletis; Cemiostoma etc.):
Effettuare il trattamento durante il volo degli adulti, in coincidenza con la deposizione delle uova. Qualora lo si desideri il trattamento potrà essere effettuato anche all'apparire delle mine fogliari, purché queste non abbiano superato il diametro di 2 mm.
Dose applicativa: 300-400 g/Hl.
Ricamatrici (Capua sp.; Archips sp.; Pandemis sp.).
Trattare al primo apparire delle ovature.
Dose applicativa: 300-400 g/Hl.
Carpocapsa pomonella: 300-400 g/Hl secondo il normale calendario.
Per tutti gli altri parassiti, quali afidi, acari, tignola: trattare al 1° apparire dei parassiti, ripetendo l'applicazione secondo le necessità.
Dose applicativa: 300-400 g/Hl.
Pero: Psilla (Psilla pyri): applicare 300-400 g/Hl alla deposizione delle prime uova;
Afidi, Eriofidi (Eriophyes pyri), Cocciniglie, Acari: applicare 300-400 g/Hl al primo apparire dei parassiti, ripetendo il trattamento in caso di reinfestazione.
Garofano (in pieno campo): per la lotta alle beghe (Cacoecia pronubana, Dianthoecia capta, Epicoristotes acerbella) impiegare 300-400 g/Hl.
Trattare preventivamente, prima della comparsa delle ovature, o appena inizia la deposizione.
L'EDRIZAR COMBI può essere utilizzato alla dose di 300-400 g/Hl per il controllo degli insetti e degli acari che infestano le seguenti colture:
— rosa, gerbera, lilium, crisantemo, Bouvardia, Poinsetia ,Aralia, Asparagus da fronda, ciclamino, camelia, azalea.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari fatta eccezione dei prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 45 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

San Vincenzo di Galliera (Bologna)

Contenuto **Lt. 1**

6565

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. In caso di contaminazione togliere subito gli indumenti.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Il formulato contiene una sostanza emetica di sintesi.

Attenzione: i sintomi dell'intossicazione, qualunque sia la via di introduzione nell'organismo, possono non comparire subito, ma manifestarsi anche dopo alcuni giorni (latenza prolungata).
L'introduzione nell'organismo anche di poche gocce del prodotto può essere fatale: non attendere la comparsa dei sintomi per procedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione perchè sia praticata l'emodialisi. Nel frattempo, nel caso di ingestione, provocare il vomito, se non è già comparso (attenzione ad eventuali lesioni esofagee), e somministrare una sostanza adsorbente come il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, la bentonite, il caolino, la terra a follone, la terra di Fuller, ecc.

Intossicazione per ingestione e per inalazione.

I primi sintomi sono: epistassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà della deglutizione, dolori nella bocca e nella gola.
Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare con positività dei tests di funzionalità respiratoria.

Dopo 2-3 giorni possono comparire dispnea ed edema polmonare con segni di lesioni epatorenali.
L'edema polmonare evolve verso una fibrosi polmonare grave, sino alla morte per insufficienza respiratoria.
L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile, non appena si abbia il sospetto della presenza di Paraquat nel sangue.

Intossicazione per contatto

Occhi: forte irritazione della cornea e della congiuntiva con possibili striature (comparsa in 12-24 ore).

Cute: irritazione con comparsa anche molto tardiva, di vescicole.

Unghie: macchie bianche con lesioni trasversali e caduta.

Terapia sintomatica, da praticarsi esclusivamente dal medico.

In ogni caso ulteriori informazioni sulla tossicologia del Paraquat e sulla terapia possono essere richieste direttamente alla società produttrice di questo presidio sanitario.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA — ICI

'MONDABIETOLA'

Diserbante pre-semina o pre-emergenza in formulazione 'COL' specifico per la barbabietola da zucchero

COMPOSIZIONE

Cloridazon puro	g 30
Paraquat puro	g 5
Bagnanti e diluenti (contiene una sostanza emetica)	q.b. a g 100

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n° 1255.

p. p. ICI SOLPLANT s.p.a.

ICI Solplant S.p.A. 6565
Stabilimento di produzione: ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (Bologna)
Registrazione Ministero della Sanità n° del
'MONDABIETOLA' Marchio registrato ICI Solplant S.p.A.

6565

CARATTERISTICHE

Diserbante specifico per applicazioni pre-semina o pre-emergenza sulla barbabietola da zucchero.
Grazie all'azione combinata del paraquat e del cloridazon, il 'MONDABIETOLA' non solo elimina rapidamente le infestanti presenti sul letto di semina (paraquat) senza dover intervenire con lavorazioni meccaniche che ne altererebbero il buon assetto strutturale e quindi la ottimale germinabilità del seme, ma anche la maggior parte delle erbe infestanti che stanno germinando negli strati più superficiali del terreno (cloridazon).
Avvertenza: su terreni torbosi il 'MONDABIETOLA' pur agendo sulle infestanti presenti sul letto di semina esplica attività limitata sui semi germinanti del terreno.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Epoca

Solo nelle seguenti epoche, alternativamente:

Pre-semina della Barbabietola da zucchero

Questa è l'epoca più favorevole. Su terreni già definitivamente preparati che si siano successivamente inerbiti. Dopo l'applicazione è necessario incorporare il prodotto nel terreno mediante una leggera erpicatura per migliorare l'azione erbicida della frazione cloridazon.
Tale operazione deve essere eseguita non prima che siano passate almeno 48 ore dal trattamento. Ciò permette l'azione di contatto del paraquat.

Pre-emergenza della Barbabietola da zucchero

Dopo la semina, prima dell'emergenza della barbabietola da zucchero, su terreno inerbito.

Dosi:

Le dosi medie sono di kg 11-12/ha. Nei terreni argillosi e organici tali dosi devono essere elevate a kg 13-14/ha. Nei terreni sabbiosi la dose di 'MONDABIETOLA' deve essere ridotta a kg 7/ha per garantire, stante la natura del terreno, la selettività del pirazon.
Inoltre in tale circostanza si consiglia di aggiungere alla miscela kg 1,5-2/ha di 'GRAMOXONE'.

Metodo:

Irrorazione uniforme della dose / ettaro miscelata con:

400-500 litri di acqua per ettaro in caso di terreni poco infestati da infestanti poco sviluppate;

600-800 litri di acqua per ettaro in caso di terreni molto infestati da infestanti più sviluppate.

Avvertenza: aggiungere alla miscela il bagnante AGRAL in ragione di g 700-800 per 100 litri d'acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILIÀ

È sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi; con gli erbicidi, se indispensabile, eseguire dopo aver condotto prove preliminari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Trattandosi di un erbicida impiegarlo solo sulle colture consigliate. Evitare che vengano colpite le colture limitrofe o comunque sensibili.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. La lepre è particolarmente sensibile. Perciò, tenendo conto delle sue abitudini, si consiglia, in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

It 1

6568

SALVIN PS

ANTICRITTOGAMICO-ANTIBOTRITICO in polvere secca

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono:

— Folpet puro . . . . gr. 4
— Rame metallo (sotto forma di ossicloruro tetraramico) gr. 6
— Zolfo puro (esente da selenio) . . . . gr. 50
— Coformulanti . . . . q.b.a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza.

Sostanza pericolosa per ingestione. inalazione e contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua) e digitale.

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO: Il SALVIN PS è un anticrittogamico con azione contro la Botrytis cinerea (Muffa grigia) della Vite, del Pomodoro, della Melanzana.

In viticoltura consente di combattere la Botrytis della caliptra floreale. infezione che costituisce il maggior inoculo all'interno del grappolo e la causa principale degli attacchi massicci di muffa grigia all'inizio della maturazione.

Il SALVIN PS esplica pure una specifica azione antioidica per il suo alto contenuto di Zolfo.

Il SALVIN PS si impiega alla dose di 30-40 Kg. per ettaro.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il SALVIN PS non è miscibile con antiparassitari alcalini (poltiglia bordolese. polisolfuri), olii minerali, Captano, DDVP, Binapacryl, Diclofuanide.

Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego di olii minerali e del Captano. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione di olii minerali e polisolfuri.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura; il prodotto è fitotossico su vite « Sangiovese ».

NOCIVITA: è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni; sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

field farm s. r. l.
Via S. Pietro, 2 — 66010 TOLLO (Chieti)

Officina di produzione: SARIAF S.p.A. - Via S. Silvestro, 1 - 48018 FAENZA (RA)

Registrazione N. 6568 del 21 NOV. 1985 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO KG.** 25

6569

Caratteristiche

Il TRAPEXIDE è un liquido fumigante pronto all'impiego da applicarsi prima della messa in coltura del terreno per combattere:

Funghi parassiti del terreno: es. Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Thielaviopsis, Verticillium.

Nematodi: nematodi liberi (Pratylenchus, Paratylenchus), nematodi formanti galle sulle radici (Meloidogyne), nematodi degli steli (Ditylenchus), delle foglie (Aphelencoides) e nematodi formanti cisti (Heterodera).

Insetti del terreno: Elateridi, larve di Maggiolino, di Nottue, di Tipula.

Erbe infestanti annuali e perennanti: Stellaria, Galinsoga, Capsella, Ortica, Polygonum, Convolvolo, Cardi, Gramigne, Giavoni, Equiseti.

DOSE DI IMPIEGO

40-60 cc/metro quadrato per la disinfezione del terreno.
180-250 cc/metro cubo per la disinfezione dei terricciati.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto deve essere applicato con temperature del terreno superiori a 0°C. Evitare temperature troppo elevate. Il terreno non deve essere troppo asciutto (eventualmente irrigare una settimana prima del trattamento), deve essere ben preparato, finemente lavorato, privo di zolle grossolane e residui della cultura precedente. La distribuzione può essere effettuata sia per mezzo di pali iniettori, sia con fumigatori a traino, sia versando direttamente il prodotto entro solchi scavati da un aratro. La distanza tra le iniezioni o tra i solchi deve essere di 20 cm.
Dopo il trattamento, per aumentare l'efficacia del prodotto, chiudere le aperture superficiali del terreno con una rullatura o un'irrigazione. Operando con temperature elevate, ricoprire il terreno con un foglio di plastica. Tenersi almeno ad 1 metro di distanza dalle radici di colture vicine e non trattare sotto la chioma di alberi o arbusti. Se si opera in serra, questa deve essere completamente libera da colture e senza comunicazioni con altre serre.
Se possibile, effettuare una lavorazione superficiale dopo una settimana dal trattamento (specie nei terreni pesanti); in tal modo si aumenta l'efficacia erbicida del prodotto. In ogni caso lavorare il terreno dopo 10-14 giorni per ottenere una più rapida fuoriuscita del gas.
Con temperature del terreno intorno al 5°C effettuare questa lavorazione almeno 4 settimane dopo il trattamento avendo cura di lavorare profondamente anche 2 volte successive.

Tempo di attesa fra trattamento e impianto della cultura:

40 giorni con temperature del terreno comprese tra i 10° e i 18C°
al di sotto di 10°C attendere almeno 6-8 settimane.
Per maggior sicurezza il controllo della possibilità di mettere in coltura il terreno può essere fatto impiegando qualche piantina di pomodoro (senza pane di terra) oppure per mezzo della prova con **semi di crescione** posti a germinare in vasi a tenuta ermetica riempiti a metà con terra trattata.

Avvertenze: l'azione del TRAPEXIDE può risultare ridotta dal letame, calciocianamide, dalle Scorie Thomas o dalla calce viva; non impiegare queste sostanze entro 30 giorni precedenti il trattamento o subito dopo.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il TRAPEXIDE è un prodotto già completo e pertanto non sono raccomandate miscele con altri prodotti.

Rischi di nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non vendersi sfuso.

Contenuto l. 50

TRAPEXIDE

Fumigante per il terreno ad azione funghicida, insetticida, erbicida e nematocida

Composizione su g 100:

Metilisotiocianato puro	g 40,4
Solventi e bagnanti	q.b. a 100

— Contiene Xilolo —

CLASSE II

II CLASSE

NOCIVO

NOCIVO

SCHERING S.p.A.
Divisione Agricoltura
20131 MILANO - VIA MANCINELLI, 11

Officina della Schering AG di Wolfenbüttel (Germania Occidentale)

Registrazione N. 6569 del 21 NOV. 1985
del Ministero della Sanità

Natura del rischio:

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- *Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;*
- *Conservare la confezione ben chiusa;*
- *Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;*
- *Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;*
- *Evitare di respirarne i vapori;*
- *Non operare contro vento;*
- *Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;*
- *Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;*
- *Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es. interrandole in fosse profonde almeno un metro e cospargendo della calce viva);*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sostanza nociva per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione:

cefalea, vertigini, dispnea, eritemi e edemi localizzati.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

terapia sintomatica, asciugare e lavare abbondantemente. Lavaggio degli occhi con bicarbonato di sodio al 5% e trattamento con idrocortisone. Ossigenoterapia.

AVVERTENZA

Consultare un centro antiveleni.

6572

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER LA DIFESA DEL MELO E DEL PERO, DELLE PIANTE FORESTALI E ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO

Composizione: 100 gr di prodotto contengono:
- — Diflubenzuron puro gr 5
- — Bagnanti, disperdenti e inerti q.b. a gr 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI:
- — Conservare questo prodotto chiuso in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.
- — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- — Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: Il DIMITER provoca la morte degli insetti in fase di muta. È efficace contro i microlepidotteri minatori e i lepidotteri ricamatori del melo; la carpocapsa, l'orgia e la psilla del pero.
Sulle piante forestali combatte la processionaria del pino, la limantria dispari, la pristifora abietina.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO.
Meli e Peri: gr 200-300 per ettolitro di acqua, contro cemiostoma e letocolletis, intervenendo nella fase dell'ovodeposizione;
- — gr. 400 per ettolitro di acqua contro la psilla del pero nella fase della schiusura delle uova;
- — gr 400 per ettolitro di acqua contro orgia antiqua, capua reticulana, carpocapsa, durante la deposizione delle uova.

Piante forestali e ornamentali in pieno campo: gr 250-350 per ettolitro, contro processionaria del pino, limantria dispari, pristifora abietina, intervenendo durante l'ovodeposizione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il DIMITER è miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).
AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 45 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

« Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».
ATTENZIONE: Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

TERRANALISI s.n.c.
Sede CENTO (FE) - Via Donizetti, 2/A
Telefono 906.207

Registrazione n. 6572 del 21 NOV. 1985 del Ministero della Sanità

Stabilimento di produzione
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA s.p.a. - Torrenieri di Montalcino (SI)

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO KG 1**

6573

TILT® CF

Fungicida a largo spettro d'azione per la difesa dei cereali (frumento, orzo, avena, segale) da malattie fungine.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
12,5 g propiconazolo puro
(rapporto isomerico cis/trans 1,42)
60 g captafol puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi.
Evitare il contatto diretto con i prodotti puri o diluiti, ed anche di sollevare polveri durante il maneggio del prodotto.

Informazioni per il medico

Sintomi di intossicazione
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia
Lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.

Avvertenza
Nei casi gravi, o sospetti gravi, consultare un Centro Antiveleni e ricoverare l'intossicato presso il più vicino Centro di Rianimazione per eventuali necessari trattamenti rianimativi cardiologici.

TILT CF risulta dalla miscela di due sostanze attive dalle caratteristiche complementari: propiconazolo e captafol.
L'attività altamente sistemica, curativa oltrechè preventiva del propiconazolo si abbina all'efficacia di tipi preventivo e di copertura del captafol.
Per effetto della combinazione delle proprietà specifiche e dei meccanismi d'azione delle due sostanze attive che lo costituiscono, TILT CF possiede uno spettro d'azione estremamente ampio, controllando i più importanti e diffusi parassiti della parte aerea dei cereali quali: oidio (= Erysiphe graminis) dell'orzo, frumento, segale, avena, ruggini (Puccinia graminis, striiformis, recondita, dispersa, hordei e coronata) e Fusarium su frumento, orzo, avena, Septoria (Septoria tritici e nodorum) del frumento, Cercosporella, Rhynchosporium secalis e Pyrenophora (Drechslera) teres dell'orzo, Pseudocercosporella herpotrichoides del frumento e dell'orzo.
Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni od alla comparsa delle prime pustole; per la protezione completa della coltura si rivelano per lo più opportune due applicazioni: alla levata ed in fioritura, limitandosi eventualmente solo a quest'ultima, nelle circostanze di minor pressione di infezione o sulle varietà meno sensibili.

Dosi d'impiego
0,8-1 Kg/ha in 300-500 litri di acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con gli insetticidi ed anticrittogamici di più comune impiego.
« **Avvertenza** »: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg 5**

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: LIGTERMOET CHEMIE, Roosendaal (Olanda)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6573 del 21 NOV. 1985

® marchio registrato

6576

Soluzione emulsionabile
insetticida

Composizione
100 g di prodotto contengono:
10 g profenofos puro
5 g cipermetrina pura
q.b. a 100 g coformulanti
(contiene xilolo)

CLASSE III
ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: IRCA, Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 6576 del 13 DIC 1985
® marchio registrato

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
In caso di avvelenamento da dosi elevate, domina l'inibizione della colinesterasi da fosforganici. I sintomi osservati nell'uomo sono, nausea, diarrea, bocca e naso gocciolanti, salivazione eccessiva, crampi allo stomaco, sudorazione eccessiva, tremori, mancanza di coordinamento muscolare, spasmi muscolari, confusione mentale, obnubilazione della vista, difficoltà respiratoria, tosse, polso rapido, colorito giallo o arrossato, lacrimazione.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di ingestione di prodotto, provocare il vomito se il paziente è cosciente.
Il vomito è provocato o meccanicamente o somministrando una soluzione salina calda (2 cucchiai di sale in una tazza di acqua calda). Somministrare una abbondante quantità di carbone medicinale attivato.
Non somministrare mai niente per bocca ad un paziente in stato di incoscienza.
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche
È un insetticida a largo spettro d'azione che alle caratteristiche proprie di un piretroide unisce l'attività abbattente e traslaminare del profenofos.

Campi di applicazione e dosi d'impiego
Pesco: 0,1-0,12% (100-120 cc/hl di acqua) contro afidi, cocciniglie, Anarsia, Cidia, tripidi.

Arancio / limone: 0,1-0,12% (100-120 cc/hl di acqua) contro afidi, Tignola, cocciniglie.

Barbabietola da zucchero: 1,5 l/ha contro afidi, Altica, Cleono, Lisso, nottue,
in 600-1000 litri di acqua

Patata: 1,5 l/ha contro afidi, Dorifora, nottue,
in 600-1000 litri di acqua

Mais: 1,5 l/ha contro nottue, Piralide e altri insetti terricoli,
in 600-1000 litri di acqua

Fagiolino: 0,1% (100 cc/hl di acqua) contro Afide nero.

Cavolo cappuccio / cavolfiore: 0,1% (100 cc/hl di acqua) contro Mamestra, afidi, nottue, Cavolaia.

Colture floreali (in pieno campo): 0,1-0,12% (100-120 cc/hl di acqua) contro afidi, aleurodidi, nottue, tortricidi, tripidi.

Pioppo: 0,15% (150 cc/hl di acqua) contro afidi, crisomelidi, Sesamia;
0,25% (250 cc/hl di acqua) contro Saperda, Punteruolo, Rodilegno.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione spiccatamente alcalina.
« Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti:
14 giorni per patate;
21 giorni per fagiolino e cavoli;
28 giorni per mais;
70 giorni per arancio e limone;
64 giorni per barbabietola da zucchero.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO lt 1

6577

POLYTRIN® EC

Soluzione emulsionabile
Insetticida - Acaricida

Composizione
100 g di prodotto contengono:
37 g profenofos puro
3,7 g cipermetrina pura
q.b. a 100 g coformulanti
(contiene xilolo)

II CLASSE

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità 13 DIC 1985
n. 6577 del
® marchio registrato

Natura del rischio
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
In caso di avvelenamento da dosi elevate, domina l'inibizione della colinesterasi da fosforganici. I sintomi osservati nell'uomo sono, nausea, diarrea, bocca e naso gocciolanti, salivazione eccessiva, crampi allo stomaco, sudorazione eccessiva, tremori, mancanza di coordinamento muscolare, spasmi muscolari, confusione mentale, obnubilazione della vista, difficoltà respiratoria, tosse, polso rapido, colorito giallo o arrossato, lacrimazione.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di ingestione di prodotto, provocare il vomito se il paziente è cosciente.
Il vomito è provocato o meccanicamente o somministrando una soluzione salina calda (2 cucchiai di sale in una tazza di acqua calda).
Somministrare una abbondante quantità di carbone medicinale attivato.
Non somministrare mai niente per bocca ad un paziente in stato di incoscienza.
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche
È un insetticida a largo spettro d'azione che alle caratteristiche proprie di un piretroide unisce l'attività abbattente e traslaminare del profenofos.
Il profenofos oltre all'attività insetticida svolge una consistente attività acaricida largamente sufficiente a tenere sotto controllo insorgenti popolazioni di acari.

Campi di applicazione e dosi d'impiego
Pesco: 0,1-0,12% (100-120 cc/hl di acqua) contro afidi, cocciniglie, Anarsia, Cidia, tripidi, acari.

Arancio / limone: 0,1-0,12% (100-120 cc/hl di acqua) contro afidi, Tignola, cocciniglie, acari.

Barbabietola da zucchero: 1,5 l/ha contro afidi, Altica, Cleono, Lisso, nottue, in 600-1000 litri di acqua

Patata: 1,5 l/ha contro afidi, Dorifora, nottue, in 600-1000 litri di acqua

Mais: 1,5 l/ha contro nottue, Piralide e altri insetti terricoli, in 600-1000 litri di acqua

Fagiolino: 0,1-0,12% (100-120 cc/hl di acqua) contro Afide nero.

Cavolo cappuccio / cavolfiore: 0,1-0,12% (100-120 cc/hl di acqua) contro Mamestra, afidi, nottue, Cavolaia.

Colture floreali (in pieno campo): 0,1-0,12% (100-120 cc/hl di acqua) contro afidi, aleurodidi, nottue, tortricidi, tripidi, acari.

Pioppo: 0,15% (150 cc/hl di acqua) contro afidi, crisomelidi, Sesamia;
0,25% (250 cc/hl di acqua) contro Saperda, Punteruolo, Rodilegno.
Il prodotto alle dosi d'impiego svolge una buona attività acaricida contro: Panonychus ulmi, Tetranychus urticae (Ragnetto rosso e giallo).

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione spiccatamente alcalina.
« Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci, è nocivo per gli animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti:
14 giorni per patate;
21 giorni per fagiolino;
28 giorni per mais;
70 giorni per arancio e limone;
64 giorni per barbabietola da zucchero.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO It 1

6580

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

RHODAX RB

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la peronospora della vite
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 30 di Fosetyl Al
gr. 30 di Rame puro sottoforma di ossicloruro tetraramico
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

E' un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.

La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.

Nei confronti della Peronospora se ne consiglia l'impiego come preventivo pur possedendo anche efficacia curativa.

La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

Queste caratteristiche, unite alla grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la peronospora della vite anche con interventi distanziati a cadenza fissa.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

Il prodotto va impiegato sulla vite dal primo trattamento antiperonosporico fino alla fase di « chiusura del grappolo » compresa.

Il primo trattamento va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm. 10.

Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo.

Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di « chiusura del grappolo » compresa.

Dose: gr. 400/hl.

Dalla fase di chiusura del grappolo fino alla raccolta continuare la lotta con prodotti della Linea Cuprothex, indicati per questo periodo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40139 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilim.: Paganica (Aq)

Reg. n. 6580 **Ministero della Sanità del** 13 DIC 1985

Contenuto netto Kg.

7/85

6581

VITIRIL COMBI

Fungicida organico sistemico e di contatto per trattamenti liquidi contro peronospora della vite, peronospora, alternaria e septoria del pomodoro, peronospora e alternaria della patata

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Vitiril Combi contengono:
g 10 di oxadixil* puro
g 35 di folpet puro
disperdenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschere durante la manipolazione e l'impiego del prodotto. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomatologia

L'unica sintomatologia nota per l'Oxadixil è quella sperimentale: flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori.

La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.

Il Folpet ha la seguente sintomatologia:

azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei o diarrea.

Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.

Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

In caso di ingestione

Far vomitare il paziente, ma mai se è in stato di incoscienza: quando non si verifica il vomito ed il paziente non è in stato d'incoscienza è raccomandata la lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua): digitale.

In caso di contaminazione degli occhi

Lavare gli occhi con acqua corrente per circa 15 minuti.

Se necessario somministrare pomata oftalmica anestetica o collirio.

In caso di inalazione

Stendere il paziente all'aria aperta e coprirlo bene tenendolo al caldo.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Vite, pomodoro e patata: 0,2-0,25% (200-250 g per 100 lt d'acqua). **N.B.** - Su pomodoro il prodotto ha un'azione collaterale contro il marciume grigio (Botrytis).

Sulla vite si consigliano non più di quattro trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo; successivamente proseguire intervenendo con prodotti tradizionali cuproorganici o cuprici. Su **pomodoro e patata** iniziare i trattamenti dal momento in cui si creano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Nei trattamenti di chiusura intervenire con prodotti tradizionali di copertura.

Avvertenza: Usare la dose più elevata quando le condizioni ambientali e di suscettibilità della coltura sono particolarmente favorevoli. Usare sempre un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione impiegando 2-2,5 kg di formulato per ettaro.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare su vivai di vite

Compatibilità: il Vitiril Combi è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; non miscibile con antiparassitari a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri ad es.) e olii minerali. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: si possono verificare fenomeni di fitotossicità se il trattamento viene eseguito a meno di 3 settimane da uno precedente con olii minerali.

Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto per pomodoro e patata; 15 giorni prima del raccolto per la vite; 40 giorni prima della vendemmia per le uve da vinificare per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Filago (BG)

Registrazione Ministero Sanità n. 6581 **del** 13 DIC 1985

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)

Divisione Agraria

Commissionaria:

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO